





































































# Een duidelijke focus op allergieën

## 1 Kruisreacties

Allergisch voor:


Boom-pollen	Gras-pollen	Huisstofmijt	Peul-vruchten	Noten	Vis	Schaal-dieren	Granen	Koemelk	Koemelk	Koemelk	Latex	Fruit (rosaceae)	Fruit (curcubiales)	Fruit
														
														
														

Risico van kruisallergie voor:

Pit-en steenfruit en noten	Groente, granen, fruit	Schaal- en weekdieren	Andere peul-vruchten	Andere noten	Andere vissen	Andere schaal-dieren	Andere granen	Rundvlees	Geiten-melk	Paarden-melk	Fruit	Andere rosaceae	Ander fruit	Latex
55%			5%	37%	50%	75%	20%	10%	92%	4%	55%	92%	35%	11%
														
														
														
														
														
														
														


Bron: Sicherer SH Clinical implications of cross-reactive food allergy J Allergy Clin Immunol 2001; 108 (6): 881-889.

## 2 ARIA Classificatie van allergische rhinitis




Bron: Bousquet et al. (2008)

## 3 Behandelingsstrategie



Bron: Bousquet et al. (2008)

## 4 Pollenkalender



De weersomstandigheden kunnen van jaar tot jaar wisselen. Geadviseerd wordt om rekening te houden met afwijkingen van de bloeiperiode van ± 10-14 dagen.