11.11.2024



11.11.2024

VITAZYME®
Bioestimulante no microbiano y fertilizante

Composición	
Vitamina B1 (tiamina)	0,30 mg/100 g
Vitamina B2 (riboflavina)	0,02 mg/100 g
Vitamina B6 (piridoxina)	0,13 mg/100g
Potasio (K2O)	0,80%
Fierro (Fe-EDTA)	0,2%
Cobre (Cu-EDTA)	0,07%
Zinc (Zn-EDTA)	0,06%
Metales pesados	
Plomo (Pb)	1,752 mg/Kg
Cadmio (Cd)	0,942 mg/Kg
Arsénico (As)	0,161 mg/Kg
Mercurio (Hg)	<0,000755 mg/Kg
Parámetros físico químicos	
Solubilidad en agua (a 20°C)	100%
pH producto puro	3,5 – 4,2
Densidad (a 20°C)	1007 g/L

VITAZYME® es un "bioestimulante y fertilizante" de plantas que contiene activadores biológicos, que son productos de procesos de fermentación provenientes de granos naturales: maíz (*Zea mays*), trigo (*Triticum vulgare*), y alfalfa (*Medicago sativa*). Estos agentes activos incluyen además de microelementos, enzimas y vitamina-B. **VITAZYME®** usado dentro de un programa de manejo mejora la condición de la planta al activar, acelerar y mejorar procesos metabólicos, lo que se traduce en mejora de factores de producción como color, maduración, etc.

PRECAUCIONES Y ADVERTENCIAS:

- durante la preparación de la mezcla y durante la aplicación: vestir guantes impermeables, antiparras y delantal. Evitar el contacto con la piel, ojos y ropa. No comer, beber ni fumar durante su utilización. Si ocurre algún problema, detener el trabajo, aplicar primeros auxilios y llamar a un médico. En caso de derrames proveer de adecuada ventilación.
- después de su manejo: lavarse las manos y cara con agua y jabón antes de comer, beber, fumar o ir al baño; lavarse muy bien todo el cuerpo antes de dejar el lugar de trabajo. Lavar aparte la ropa y el equipo usados. Una vez vacío el envase, realizar el Proceso de Triple Lavado: agregar agua hasta ¼ de su capacidad, agitar por 30 segundos y vaciar el contenido a la pulverizadora. Repetir esta operación TRES VECES. Luego, perforar los envases vacíos y eliminarlos de acuerdo a las instrucciones de las autoridades competentes. No dañar la etiqueta durante todo este proceso.
Almacenar bajo llave, en su envase original cerrado y con la etiqueta correspondiente, a la sombra, en un lugar seco y bien ventilado, lejos de alimentos, forrajes, fuentes de calor y fuera del alcance de los niños. No almacenar a temperaturas bajo 4 °C y sobre 32 °C.
Primeros auxilios: En caso de contacto con la piel, sacar la ropa y lavar con agua y jabón las partes del cuerpo afectadas. En caso de contacto con los ojos, lavarlos inmediatamente con agua limpia por 15 minutos.
Antídoto: no se conoce un antídoto específico. Aplicar tratamiento sintomático.
Tratamiento médico de emergencia: Muy leve irritante ocular.
Información ecotoxicológica: no tóxico a aves, abejas, peces u otros organismos acuáticos.

"MANTENER FUERA DEL ALCANCE DE LOS NIÑOS Y DE PERSONAS INEXPERTAS"
"EN CASO DE INTOXICACIÓN MOSTRAR LA ETIQUETA, EL FOLLETO O EL ENVASE AL PERSONAL DE SALUD"
"NO TRANSPORTAR NI ALMACENAR CON ALIMENTOS, PRODUCTOS VEGETALES O CUALESQUIERA OTROS QUE ESTÉN DESTINADOS AL USO O CONSUMO HUMANO O ANIMAL"
"NO LAVAR LOS ENVASES O EQUIPOS DE APLICACIÓN EN LAGOS, RÍOS Y OTRAS FUENTES DE AGUA"
"NO REINGRESAR AL ÁREA TRATADA ANTES DEL PERIODO INDICADO EN LA ETIQUETA"
"REALIZAR TRIPLE LAVADO DE LOS ENVASES, INUTILIZARLOS Y ELIMINARLOS DE ACUERDO CON INSTRUCCIONES DE LAS AUTORIDADES COMPETENTES"
"LA ELIMINACIÓN DE RESIDUOS DEBERÁ EFECTUARSE DE ACUERDO CON INSTRUCCIONES DE LA AUTORIDAD COMPETENTE"

Convenio CITUC/AFIPA - Atención las 24 horas, los 7 días de la semana:
En caso de INTOXICACIÓN llamar al: 2 2635 3800
En caso de EMERGENCIAS QUÍMICAS, DERRAME o INCENDIO, llamar al: 2 2247 3600

"LEA ATENTAMENTE LA ETIQUETA ANTES DE USAR EL PRODUCTO"

Para mayor información de la definición de las oportunidades de aplicación, contactar al asesor agroAMIGO de su zona.
NOTA: aspectos generales del desarrollo de las plantas, maduración de la fruta y coloración son sin duda influenciados por otros factores que también deben ser considerados a la hora de efectuar un plan de manejo. Medidas aisladas tendrán menores efectos o estos no se harán evidentes.
Método para preparar la mezcla: agregar la cantidad de **VITAZYME®** necesaria, al estanque del equipo aplicador parcialmente lleno de agua, mientras funciona el agitador. Agregar el resto de agua al estanque completando el volumen deseado. Agitar la mezcla antes y durante la aplicación.
Compatibilidad: VITAZYME® es compatible física y químicamente en mezclas de tanque con productos fitosanitarios (En el caso de Cerezos puede ser mezclado con ácido giberélico). Sin embargo, como no es posible conocer la compatibilidad de **VITAZYME®** con todos los productos del mercado, Syngenta S.A. no asume ninguna responsabilidad por mezclas hechas con productos que no sean mencionados específicamente en esta etiqueta. Se recomienda hacer una prueba previa, bajo responsabilidad del usuario, para observar los aspectos físicos de las mezclas y sus reacciones sobre las plantas tratadas en los días siguientes a la aplicación. Para mayores antecedentes, comunicarse con nuestro departamento técnico.
Fitotoxicidad: utilizado de acuerdo a las recomendaciones de la etiqueta no es probable que **VITAZYME®** presente fitotoxicidad en plantas
Importante: la información contenida en esta etiqueta representa el más reciente conocimiento de Syngenta en las materias informadas. No obstante, Syngenta garantiza exclusivamente la calidad del Producto y de su contenido activo, mientras esté bajo su control directo. Las instrucciones de conservación y uso describen, conforme a las pruebas realizadas, la forma apropiada de operar el Producto para obtener los resultados esperados. Sin embargo, dichas instrucciones no constituyen garantía explícita ni implícita, debido a la existencia de circunstancias externas en un medio biológico cambiante, que se encuentran fuera del control de Syngenta. Todos nuestros productos han sido debidamente probados: a pesar de ello, no es posible testear todos los usos, formas o métodos de aplicación, medios agroclimáticos, suelos, fechas de aplicación y sistemas de cultivo a los que el Usuario pueda eventualmente someter al Producto, por los que Syngenta no se hace responsable. Ante cualquier duda, consulte con su asesor técnico de Syngenta. Asimismo, una vez que el Producto sale del control directo de Syngenta, cumpliendo las características anteriormente señaladas, el Usuario asume todos los riesgos asociados al uso, momento y manejo del Producto, aun siguiendo las instrucciones contenidas en esta etiqueta, como asimismo del cumplimiento de las tolerancias de residuos permitidos en las jurisdicciones relevantes. La información de la presente etiqueta sobre naturaleza y uso del Producto anula cualquier otra, ya sea escrita u oral. Para información respecto a Límites Máximos de Residuos en países de destino para los cultivos mencionados en esta etiqueta, sugerimos consultar con nuestro Departamento Técnico.

Lote de fabricación: Ver en el envase.
Fecha de fabricación: (mes/año).
Fecha de vencimiento: Ver en el envase.

Contenido Neto del Envase: 5 Litros

hinge

hinge

INSTRUCCIONES DE USO:
VITAZYME® es un es un bioestimulante no microbiano con accion fertilizante que proporciona tolerancia a las plantas en condiciones de estrés hídrico, salino, de temperatura o el provocado por factores abióticos.® **VITAZYME** en frutales actúa sobre factores del rendimiento, la condición de la fruta, el color de cubrimiento y contribuye a homogenizar los estados fenológicos hacia la cosecha y contribuye a disminuir la deshidratación de escobajos y pedicelos.
Aplicar **VITAZYME®** de acuerdo a los siguientes programas de tratamiento:

Cultivos	Dosis	Observaciones
Vides (Uva de mesa, Uva vinífera, Uva pisquera)	50 cc / 100 L de agua (mínimo 1 L /ha)	Aplicar vía foliar a partir de brotación y repetir cada 7 - 14 días según la etapa del cultivo, las condiciones climáticas y el objetivo buscado. Asegurar un cubrimiento uniforme de la planta, evitando el escurrimiento.
Cerezos	50 cc / 100 L de agua (mínimo 1 L /ha)	Aplicar vía foliar a partir de floración y repetir cada 7 - 14 días según la etapa del cultivo, las condiciones climáticas y el objetivo buscado. Asegurar un cubrimiento uniforme de la planta, evitando el escurrimiento.
Pomáceas (Manzanos, Perales, Membrilleros)	50 cc / 100 L de agua (mínimo 1 L /ha)	Aplicar vía foliar a partir de floración y repetir cada 7 - 14 días según la etapa del cultivo, las condiciones climáticas y el objetivo buscado. Asegurar un cubrimiento uniforme de la planta, evitando el escurrimiento.
Carozos (Durazneros, Nectarinos, Ciruelos, Damascos, Almendros)	50 cc / 100 L de agua (mínimo 1 L /ha)	Aplicar vía foliar a partir de floración y repetir cada 7 - 14 días según la etapa del cultivo, las condiciones climáticas y el objetivo buscado. Asegurar un cubrimiento uniforme de la planta, evitando el escurrimiento.
Cítricos (Naranjos, Limoneros, Clementinos, otros)	50 cc / 100 L de agua (mínimo 1 L /ha)	Aplicación foliar: Aplicar a partir de floración y repetir cada 7 - 14 días según la etapa del cultivo, las condiciones climáticas y el objetivo buscado. Asegurar un cubrimiento uniforme de la planta, evitando el escurrimiento. Aplicación vía riego: Aplicar 1 L/ha a través del sistema de riego en el último tercio del ciclo de riego, asegurando que el producto quede completamente aplicado en el sector de riego correcto, evitando el lavado del producto.
Paltos	50 cc / 100 L de agua (mínimo 1 L /ha)	Aplicación foliar: Aplicar en época de inducción floral e inicio de expansión de panículas hasta 50% de floración. Repetir cada 7 - 14 días según el estado del cultivo, las condiciones climáticas y el objetivo buscado. Asegurar un cubrimiento uniforme de la planta, evitando el escurrimiento. Aplicación vía riego: Aplicar 1 L/ha a través del sistema de riego en el último tercio del ciclo de riego, asegurando que el producto quede completamente aplicado en el sector de riego correcto, evitando el lavado del producto. No mezclar con productos inhibidores de crecimiento y distanciar la aplicación entre estos en al menos 2 semanas.
Arándanos, Frambuesas, Frutillas, Moras, Murtas y otros berries	50 cc / 100 L de agua (mínimo 1 L /ha)	Aplicar vía foliar a partir de floración y repetir cada 7 - 14 días según la etapa del cultivo, las condiciones climáticas y el objetivo buscado. Asegurar un cubrimiento uniforme de la planta, evitando el escurrimiento.
Nogales, Pecanos	50 cc / 100 L de agua (mínimo 1 L /ha)	Aplicar vía foliar desde elongación de amentos, repetir con una frecuencia de 7 - 14 días. Asegurar un cubrimiento uniforme de la planta, evitando el escurrimiento.
Avellanos, Pistachos	50 cc / 100 L de agua (mínimo 1 L /ha)	Aplicar vía foliar desde inicio de floración o en cuaja. Asegurar un cubrimiento uniforme de la planta, evitando el escurrimiento.
Kiwis	50 cc / 100 L de agua (mínimo 1 L /ha)	Aplicar vía foliar desde brotación. Aplicar previo a un evento de estrés abiótico, en floración y crecimiento de fruto. Asegurar un cubrimiento uniforme de la planta, evitando el escurrimiento.
Olivos	50 cc / 100 L de agua (mínimo 1 L /ha)	Aplicar vía foliar desde inicio de floración. Aplicar previo a un evento de estrés abiótico y en crecimiento de fruto. Asegurar un cubrimiento uniforme de la planta, evitando el escurrimiento.
Tomates, Pimientos, Ajíes, Berenjenas, Pepino Dulce	100 cc / 100 L de agua (mínimo 1 L /ha)	Aplicar vía foliar a partir del trasplante, repetir en floración y repetir nuevamente a los 7 - 14 días, según las condiciones climáticas y el objetivo buscado. Asegurar un cubrimiento uniforme de la planta, evitando el escurrimiento.
Trigo, Cebada, Avena y Triticale	100 cc / 100 L de agua (mínimo 1 L /ha)	Aplicar vía foliar en momentos críticos: 3° hoja, macolla, encañado o formación de espiga, hoja bandera y/o llenado de granos. Asegurar un cubrimiento uniforme de la planta, evitando el escurrimiento.
Raps o Canola	100 cc / 100 L de agua (mínimo 1 L /ha)	Aplicar vía foliar en momentos críticos, desde estado de roseta hasta final de floración. Asegurar un cubrimiento uniforme de la planta, evitando el escurrimiento.
Cebolla, Ajo, Chalota, Puerro, Bunching	100 cc / 100 L de agua (mínimo 1 L /ha)	Aplicar vía foliar al momento del trasplante. Repetir a los 20 días post-trasplante y luego aplicar cada 10 días después de esta última aplicación, hasta bulbo formado. Aplicar previo a un evento de estrés abiótico o 10 a 14 días posterior a una aplicación de herbicida. Asegurar un cubrimiento uniforme de la planta, evitando el escurrimiento.
Lechuga, Apio, Acelga, Kale, Espinaca, Rúcula	100 cc / 100 L de agua (mínimo 1 L /ha)	Aplicar vía foliar a partir de trasplante y repetir a los 7 - 14 días, según las condiciones climáticas y el objetivo buscado. Asegurar un cubrimiento uniforme de la planta, evitando el escurrimiento.
Zanahoria	100 cc / 100 L de agua (mínimo 1 L /ha)	Aplicar vía foliar previo a un evento de estrés abiótico o 10 a 14 días posterior a una aplicación de herbicida. Asegurar un cubrimiento uniforme de la planta, evitando el escurrimiento.
Sandía, Melón, Zapallo, Zapallo italiano, Pepino	100 cc / 100 L de agua (mínimo 1 L /ha)	Aplicar vía foliar desde el momento del trasplante. Aplicar previo a un evento de estrés abiótico, en floración y crecimiento de fruto. Asegurar un cubrimiento uniforme de la planta, evitando el escurrimiento.
Brásicas (Brócoli, Coliflor, Repollo, Repollito de bruselas)	100 cc / 100 L de agua (mínimo 1 L /ha)	Aplicar vía foliar o vía riego al momento del trasplante, repetir al inicio de formación de la pella o pan. Aplicar previo a un evento de estrés abiótico. Asegurar un cubrimiento uniforme de la planta, evitando el escurrimiento. Aplicación vía riego: Aplicar 1 L/ha a través del sistema de riego en el último tercio del ciclo de riego, asegurando que el producto quede completamente aplicado en el sector de riego correcto, evitando el lavado del producto.
Poroto, Frejol, Haba, Arveja	100 cc / 100 L de agua (mínimo 1 L /ha)	Aplicar vía foliar a partir de 3 o 4 hojas verdaderas. Aplicar previo a un evento de estrés abiótico, en floración y llenado de vainas. Asegurar un cubrimiento uniforme de la planta, evitando el escurrimiento.
Papa	100 cc / 100 L de agua (mínimo 1 L /ha)	Aplicar vía foliar previo al cierre de hileras y en floración. Aplicar previo a un evento de estrés abiótico. Asegurar un cubrimiento uniforme de la planta, evitando el escurrimiento.


You should receive an inkjet printed color proof within 2 business days. Please refer to that printed proof for color accuracy.

Est. 1957 TABCO inc
www.tabcoinc.com
ph (913) 287-3333 • fax (913) 287-3338

Customer: Plant Designs
CS Representative: Andrea Hanks • ahanks@tabcoinc.com
P.O.#: _____ **Tabco Part #:** 55393 (DL)
Date: 11/3/22 | 2/13/23 | 2/23/23 | 3/16/23 | 3/29/23 | 12/19/24 | 1/22/25 | 2/27/25 | 2/27/25 | 5/21/25 | 6/4/25 | 6/11/25

Description: Vitazyme 5 Liter Ext
Varnish: ☐ Pattern ☐ Flood **Lamination:** ☒ **Size:** 7.00 "Across x 5.75 "Around **Unwind #:** 3

Colors:
Cyan FR | Magenta FR | Yellow FR
Black FR | Violet FR | Black BK
Black BS | Release BS | Deadener BS



PDF proofs are electronic files intended for delivery via the internet. They are intended for proofing of content, size, placement and color breaks. They are not intended to represent exact colors. Every effort has been taken to ensure the accuracy and conformance to applicable regulations on this proof. HOWEVER, please check carefully as the final liability rests solely with the CUSTOMER.

☐ Approved for Copy & Layout ☐ Make corrections & resubmit
☐ Approved Inkjet Proof for Color

Signature: _____ **Date:** _____