



SAFLAX®



Tips



© H. Zell - CC-BY-SA-3.0

Carica papaya

	 Български	BG		2		 Malti	MT		5
	 Dansk	DK		2		 Nederlands	NL		5
	 Deutsch	DE		2		 Norsk	NO		6
	 English	UK		2		 Polski	PL		6
	 Eesti	EE		3		 Português	PT		6
	 Suomalainen	FI		3		 Românesc	RO		6
	 Français	FR		3		 Svenska	SE		7
	 Ελληνική	GR		3		 Slovensky	SK		7
	 Gaeilge	IE		4		 Slovenski	SI		7
	 íslenskur	IS		4		 Español	ES		7
	 Italiano	IT		4		 Český	CZ		8
	 Hrvatski	HR		4		 Türkçe	TR		8
	 Latviešu	LV		5		 Magyar	HU		8
	 Lietuvių kalba	LT		5		 日本語	JP		9



Тропическо пъпешово дърво / папая

Carica papaya

Дозатор за тропически плодове - питателен и вкусен

Папаята, която расте като палма, е своеобразно растение. Стволът му не се вдървява, поради което всъщност не може да се нарече дърво. И техните големи плодове са ботанически плодове. Неговите кожести, многозёбни листа приличат на тези на смокиня и се завиват спираловидно около стъблото. Цветовете са кремани и ароматни. Неузрелите плодове могат да се използват като зеленчуци за приготвяне на лютеница, къри и салса. Зрялата плът е сладка, а вкусът се подобрява с малко лимонов сок или джинджифил. Името папая идва от езика на индианците араваки, които използват плодовете папая като лечебно растение. Между другото, през 2008 г. папаята беше едва петото растение, чийто геном беше напълно секвениран. **Естествено местоположение:** Произходът на папаята е в южно Мексико. Вече е бил култивиран от индианците от Централна Америка и Бразилия в предколумбовите времена. **Успешно отглеждане:** Отглеждането от семена на закрито е възможно през цялата година. Първо оставете семената да се накиснат в стайна топла вода за една нощ, за да подобрят покълването и след това ги поставете на около един сантиметър дълбочина във влажен субстрат за отглеждане. Покрийте съда с култура с домакинско фолио, което сте осигурили с дупки. Това предпазва почвата от изсушаване. Трябва да отстранявате фолиото за 2 часа на всеки два до три дни. Това предотвратява образуването на мухъл върху растящата почва. Поставете саксията със семена на светло и топло място с 20 до 25° по Целзий и поддържайте почвата влажна, но не мокра. Покълването става след три до четири седмици. **Най-доброто местоположение:** Като тропически растения пъпешовите дървета предпочитат светли и слънчеви места. Закътано, топло място в градината или на балкона също е идеално през лятото. Дори младите растения понасят изгарящото слънце. **Оптимална грижа:** Нуждата от вода на тропическото пъпешово дърво е доста ниска. Достатъчно е да поддържате почвата само леко влажна - по-високата влажност е по-вероятно да доведе до увреждане на корените. Затова е най-добре винаги да оставяте горния слой на почвата да изсъхне между поливането с вода с възможно най-ниско съдържание на вар (дъждовна вода). Торете на всеки 14 дни от май до октомври с течен растителен тор за контейнери. **През зимата:** Не се притеснявайте, ако вашата папая загуби почти всичките си листа през зимата и само върхът на издънката показва малко живот. Дръжте кореновата топка доста суха сега. Особено когато младите растения презимуват, те трябва да са светли, без течение и поне при температури от 15° до 25° по Целзий. Меките дървесни клони могат да бъдат отрязани и след това трябва да бъдат запечатани с кит за дърво.



Tropisk melontræ / papaya

Carica papaya

Tropical Fruit Dispenser - Nærende og lækker

Papaya, der vokser som en palme, er en ejendommelig plante. Dens stamme bliver ikke lignificeret, hvorfor den faktisk ikke kan kaldes et træ. Og deres store frugter er botanisk bær. Dens læderagtige, flertandede blade ligner dem fra en figen og spiraler rundt om stilken. Blomsterne er cremefarvede og velduftende. Umodne frugter kan bruges som grøntsager til tilberedning af chutneys, karryretter og salsaer. Det modne kød er sødt og med lidt citronsaft eller ingefær forstærkes smagen. Navnet papaya kommer fra sproget hos Arawak-indianerne, som bruger papaya-frugten som lægeplante. Papaya var i øvrigt i 2008 kun den femte plante, hvis genom var fuldstændigt sekventeret. **Naturlig beliggenhed:** Oprindelsen af papaya er i det sydlige Mexico. Det blev allerede dyrket af indianerne i Mellemamerika og Brasilien i præcolumbianske tider. **Succesfuld dyrkning:** Dyrkning fra frø indendørs er muligt hele året rundt. Lad først frøene trække i stuevarmt vand natten over for at forbedre spiringen, og læg dem derefter omkring en centimeter dybt i fugtigt vækstsubstrat. Dæk dyrkningskarret til med husholdningsfilm, som du forsyner med huller. Dette beskytter jorden mod udtørring. Du bør fjerne folien i 2 timer hver anden til tredje dag. Dette forhindrer mug i at dannes på den voksende jord. Stil frøpotten et let og varmt sted med 20 til 25° Celsius og hold pottejorden fugtig, men ikke våd. Spiring sker efter efter tre uger til fire uger. **Den bedste beliggenhed:** Som tropiske planter foretrækker melontræer lyse og solrige steder. Et lyst, varmt sted i haven eller på altanen er også ideelt om sommeren. Selv unge planter tåler brændende sol. **Optimal pleje:** Vandbehovet for det tropiske melontræ er ret lavt. Det er tilstrækkeligt kun at holde jorden lidt fugtig - højere fugt er mere tilbøjelige til at føre til rotskader. Det er derfor bedst altid at lade det øverste jordlag tørre ud mellem vanding med vand, der er så lavt i kalk som muligt (regnvand). Gød hver 14. dag fra maj til oktober med flydende beholderplantegødning. **Om vinteren:** Bare rolig, hvis din papaya mister næsten alle sine blade om vinteren, og kun skudspidsen viser lidt liv. Hold rodklumpen nogenlunde tør nu. Især når unge planter overvintrer, skal de være lette, trækfri og mindst ved temperaturer på 15° til 25° Celsius. De bløde træagtige grene kan skæres tilbage og skal derefter forsegles med træspatel.



Tropischer Melonenbaum / Papaya

Carica papaya

Tropischer Fruchtspender - Nährreich und lecker

Die palmenähnlich wachsende Papaya ist eine eigenartige Pflanze. Ihr Stamm verholzt nicht, weshalb sie eigentlich nicht als Baum bezeichnet werden kann. Und ihre großen Früchte sind botanisch betrachtet Beeren. Ihre ledrigen, mehrfach gezahnten Blätter ähneln denen einer Feige und sind spiralförmig um den Stamm angeordnet. Die Blüten sind cremefarben und wohlriechend. Unreife Früchte kann man wie Gemüse für die Zubereitung von Chutneys, Currys, und Salsas verwenden. Das reife Fruchtfleisch ist süßlich und mit etwas Zitronensaft oder Ingwer wird der Geschmack noch verstärkt. Der Name Papaya stammt aus der Sprache der Arawak-Indianer, die die Papaya-Frucht als Heilpflanze verwenden. Die Papaya war im Jahr 2008 übrigens erst die fünfte Pflanze, deren Genom komplett sequenziert wurde. **Naturstandort:** Der Ursprung der Papaya liegt im südlichen Mexiko. Sie wurde von den Indianern Mittelamerikas und Brasiliens bereits in vorkolumbianischer Zeit kultiviert. **Anzucht:** Im Haus ist die Anzucht aus Samen das ganze Jahr über möglich. Lassen Sie die Samen zunächst über Nacht in raumwarmem Wasser vorquellen, um die Keimfähigkeit zu verbessern und setzen Sie sie danach circa einen Zentimeter tief in feuchtes Anzuchtsubstrat. Decken Sie das Anzuchtgefäß mit Klarsichtfolie ab, die Sie mit Löchern versehen. So ist die Erde vor Austrocknung geschützt. Alle zwei bis drei Tage sollten Sie die Folie für 2 Stunden entfernen. Das beugt einer Schimmelbildung auf der Anzuchterde vor. Stellen Sie das Anzuchtgefäß an einen hellen und warmen Ort mit 20 bis 25° Celsius und halten Sie die Anzuchterde feucht, aber nicht nass. Die Keimung erfolgt nach nach drei bis vier Wochen. **Standort:** Melonenbäume bevorzugen als Tropenpflanzen helle und sonnige Standorte. Den Sommer über ist auch ein windgeschützter warmer Platz im Garten oder auf dem Balkon ideal. Auch Jungpflanzen vertragen bereits pralle Sonne. **Pflege:** Der Wasserbedarf des Tropischen Melonenbaums ist eher gering. Es reicht, die Erde lediglich leicht feucht zu halten - höhere Feuchtigkeit führt eher zu Wurzelschäden. Lassen Sie die oberste Erdschicht zwischen den Wassergaben mit möglichst kalkarmem Wasser (Regenwasser) daher am besten immer erst antrocknen. Düngen Sie von Mai bis Oktober im Abstand von 14 Tagen mit flüssigem Kübelpflanzenzünger. **Im Winter:** Sorgen Sie sich nicht, wenn Ihre Papaya im Winter fast alle Blätter verliert und nur die Triebspitze noch ein wenig Leben zeigt. Halten Sie den Wurzelballen jetzt ziemlich trocken. Gerade die Überwinterung von Jungpflanzen sollte hell, zugfrei und mindestens bei Temperaturen von 15° bis 25°Celsius erfolgen. Die weichholzigen Äste können zurückgeschnitten werden und sollten dann mit Baumkitt abgedichtet werden.



Melon Tree

Carica papaya

Tropical Fruit-producer - nutritious and delicious

The palm-like Papaya is a very peculiar plant. It's not really a tree since its stem doesn't lignify, and from a botanical point of view, its huge fruits are actually berries. Its leathery, multiple dented leaves - resembling a fig - are seated spirally around the stem. The blossoms are cream-coloured with an aromatic scent. Unripe fruits are used like vegetables to make chutneys, curries and salsas. The ripe fruit pulp has a sweet taste which can be intensified by adding a little lemon juice or ginger. The name Papaya originates from the language of the Arawak Indians that used the fruit as medicinal plant. By the way, the Melon Tree was just the fifth plant in 2008, of which its genomes were completely sequenced. **Natural location:** The origin of the Melon Tree is the south of Mexico. It was already cultivated in pre-columbian times by the Indians of Middle America and Brazil. **Successful cultivation:** Seed propagation indoors is possible throughout the year. To increase the germinability, you should place the seeds overnight in warm water for priming. Then plant the seeds about 1 cm deep in moist potting compost and cover the seed container with clear film to prevent the earth from drying out. Don't forget to make some holes in the clear film and take it every second or third day completely off for about 2 hours. That way you avoid mold formation on your potting compost. Place the seed container somewhere bright and warm with a temperature between 20°C and 25° Celsius and keep the earth moist, but not wet. The germination starts after three to four weeks. **The best location:** The Melon Tree is a tropical plant and prefers to be kept in a bright and sunny spot. During summer, it can also be moved to a wind-protected and warm place in the garden or on your balcony. Even younger plants can resist the blazing sun. **Optimal care:** The tropical Melon Tree needs rather less water, and it will be enough, to keep the earth a bit moist. Too much water might cause damage to the roots. Therefore, it is recommended, to let the upper layer of earth dry out between the watering periods with lime-deficient water or rain water. Between May and October you should also provide your plant with fluid fertilizer for tub plants every two weeks. **In the winter:** There is nothing to worry, if your Papaya plant casts almost all the leaves during winter time and shows signs of life only at the top of the sprout. Keep the clogged roots now rather dry. Especially during the hibernation of younger plants, you should keep the pot in a bright and draft-free place with a temperature between 15° and 25° Celsius. The soft-wooded branches can be pruned and then treated with a wound seal product.



Troopiline melonipuu / papaia

Carica papaya

Troopiliste puuviljade jaotur – toitev ja maitsev

Palmi moodi kasvav papaia on omapärane taim. Tema tüvi ei muutu pruunseks, mistõttu teda tegelikult puuks nimetada ei saa. Ja nende suured viljad on botaaniliselt marjad. Selle nahkjad mitmehambulised lehed meenutavad viigimarja lehti ja keerduvad ümber varre. Lilled on kreemika värvusega ja lõhnavad. Kõpsemata puuvilju saab kasutada nagu kõõvilgi chutneyde, karride ja salsade valmistamiseks. Kyps viljalih on magus jävähese sidrunimahla või ingveriga maitset täiustatakse. Papaia nimi pärineb arawaki indiaanlaste keelest, kes kasutavad papaia vilju ravimtaimena. Muide, 2008. aastal oli papaia alles viies taim, mille genoom oli täielikult sekveneeritud. **Looduslik asukoht:** Papaia päritolu on Mehhiko lõunaosa. Seda kasvasid juba Kolumbuse-eelse ajal Kesk-Ameerika ja Brasiilia indiaanlased. **Edukas kasvatamine:** Seemnetest siseruumides kasvatamine on võimalik aastaringsest. Esmalt laske seemnetel idanemise parandamiseks üle öö toasoojas vees leotada ja seejärel asetage need umbes ühe sentimeetri sügavusele niiskesse kasvusubstraati. Kata kultuurianum toidukilega, mille varustad aukudega. See kaitseb mulda kuivamise eest. Peaksite fooliumi eemaldama 2 tunniga iga kahe kuni kolme päeva järel. See takistab hallituse teket kasvupinnal. Asetage külvipott valgusküllasesse ja sooja kohta, mille temperatuur on 20–25 °C, ning hoidke istutusmuld niiskena, kuid mitte märjana. Idanemine toimub pärast kolmekuni neli nädalat. **Parim asukoht:** Troopiliste taimedena eelistavad melonipuud heledaid ja päikesepaistelisi kohti. Varjualune soe koht aias või rõdul on ideaalne ka suvisel ajal. Isegi noored taimed taluvad lõõskavat päikest. **Optimaalne hooldus:** Troopilise melonipuu veevajadus on üsna madal. Piisab, kui muld on veidi niiske – suurem niiskus põhjustab suurema tõenäosusega juurekahjustusi. Seetõttu on võimalikult lubjavee veega (vihmavei) kastmise vahel kõige parem lasta pealmisel mullakihi alati kuivada. Väetage maist oktoobrini iga 14 päeva järel vedela konteineritaimede väetisega. **Talvel:** Ärge muretsege, kui teie papaia kaotab talvel peaaegu kõik lehed ja ainult võrse ots näitab veidi elu. Hoidke juurepall nüüd üsna kuiv. Eriti siis, kui noored taimed talvituvad, peaksid nad olema kerged, tuuletõmbuseta ja vähemalt 15–25 °C temperatuuriga. Pehmed puitunud oksad saab tagasi lõigata ja seejärel tihendada puupahtliga.



Trooppinen melonipuu / papaija

Carica papaya

Trooppisten hedelmien annostelija - Ravitseva ja herkullinen

Papaija, joka kasvaa kuin palmu, on erikoinen kasvi. Sen runko ei lignitty, minkä vuoksi sitä ei voi varsinaisesti kutsua puuksi. Ja niiden suuret hedelmät ovat kasvitieteellisesti marjoja. Sen nahkaiset, monihampaaiset lehdet muistuttavat viikunan lehtiä ja kiertyvät varren ympärillä. Kukat ovat kermanvärisiä ja tuoksuvia. Kypsytymättömiä hedelmiä voidaan käyttää vihannesten tavoin chutney, curryn ja salsan valmistukseen. Kypsä hedelmäliha on makeaa jahieman sitruunamehua tai inkivääriä lisää makua. Nimi papaija tulee arawak-intiaanien kielestä, joka käyttää papaijan hedelmiä lääkekasvina. Muuten, vuonna 2008 papaija oli vasta viides kasvi, jonka genomi oli täysin sekvensoitu. **Luonnollinen sijainti:** Papaijan alkuperä on Etelä-Meksikossa. Keski-Amerikan ja Brasiilian intiaanit viljelivät sitä jo esikolumbiaanisenä aikana. **Onnistunut viljely:** Kasvatusta siemenistä sisätiloissa on mahdollista ympäri vuoden. Anna siementen ensin liota huoneenlämpöisessä vedessä yön yli parantaaksesi itävyyttä ja aseta ne sitten noin sentin syvyyteen kosteaan kasvualustaan. Peitä viljelyastia kelmulla, johon on tehty reikiä. Tämä suojaa maaperää kuivumiselta. Poista folio 2 tuntiin ajaksi kahden tai kolmen päivän välein. Tämä estää homeen muodostumisen kasvumaahan. Aseta siemenruukku valoisaa ja lämpimään paikkaan, jonka lämpötila on 20–25 °C, ja pidä istutusmaa kosteana, mutta ei märkänä. Itäminen tapahtuu kolmen jälkeenneljän viikkoon asti. **Paras sijainti:** Trooppisina kasveina melonipuit suosivat valoisia ja aurinkoisia paikkoja. Suojaisa, lämmin paikka puutarhassa tai parvekkeella on ihanteellinen myös kesällä. Nuoretkin kasvit sietävät paahtavaa aurinkoa. **Optimaalinen hoito:** Trooppisen melonipuun vedentarve on melko alhainen. Riittää, että maaperä pidetään vain hieman kosteana - korkeampi kosteus johtaa todennäköisemmin juurivaurioihin. Siksi on parasta antaa aina pinnan pinnan kuivua mahdollisimman vähän kalkkipitoisella vedellä (sadevesi) kastelun välillä. Lannoita 14 päivän välein toukokuusta lokakuuhun nestemäisellä säilökasvin lannoitteella. **Talvella:** Älä huoli, jos papaijas menettää talvella melkein kaikki lehdet ja vain verson kärjessä on vähän elämää. Pidä juuripallo nyt melko kuivana. Varsinkin nuorten kasvien talvehtien niiden tulee olla kevyitä, vedettomia ja vähintään 15–25 asteen lämpötiloissa. Pehmeät puiset oksat voidaan leikata takaisin ja tiivistää puukitillä.



Papayer

Carica papaya

Donneur de fruits tropical - Aliment riche et délicieux

Le papayer, qui croît comme un palmier, est une plante étrange. Le tronc ne se lignifie pas, donc il ne peut pas être un arbre. De plus, ses gros fruits sont considérés comme étant des baies. Ses multiples feuilles dentelées, qui sont un peu comme le cuir, ressemblent à celles d'une figue et sont ordonnées en forme de spirale autour du tronc. Les fleurs sont couleure crème et parfumées. Les fruits verts peuvent servir de légumes pour la préparation de chutneys, de currys, et de salsas. La pulpe des fruits mûrs est sucrée et la saveur est intensifiée avec un peu de jus de citron ou de gingembre. Le nom papayer vient de la langue des Indiens Arawak, qui utilisent la papaye comme plante médicinale. En 2008, la papaye est devenue seulement la cinquième plante dont le génome a été complètement séquencé. **Emplacement naturel:** L'origine du papayer se situe dans le sud du Mexique. Il fut cultivé à l'époque pré-colombienne par les Indiens de l'Amérique centrale et du Brésil. **Culture réussie:** La culture des graines à la maison est possible tout au long de l'année. Pour améliorer la faculté germinative des graines, vous devez d'abord les laisser dans de l'eau à température ambiante pendant la nuit, puis les mettre dans du substrat humide à environ un centimètre de profondeur. Couvrez le récipient avec une feuille transparente dans laquelle vous faites des trous. Comme ça, le terreau est protégé du dessèchement. Vous devez enlever la feuille pendant deux heures tous les deux ou trois jours. Ceci prévient la formation de moisissures dans le terreau. Mettez le récipient dans un endroit lumineux et chaud de 20° à 25° Celsius et gardez le terreau humide, mais pas mouillé. La germination a lieu après trois à quatre semaines. **Le meilleur emplacement:** En tant que plantes tropicales, les papayers préfèrent des endroits lumineux et ensoleillés. Pendant l'été, un endroit chaud et protégé du vent dans le jardin ou sur le balcon est aussi idéal. Les jeunes plantes tolèrent le plein soleil aussi. **Soins optimaux:** Le besoin en eau du papayer est plutôt faible. Il suffit de maintenir la terre légèrement humide, une terre trop humide entraîne des dommages aux racines. Laissez la couche de sol supérieure entre les arrosages avec le plus d'eau peu calcaire possible (eau de pluie) pour qu'elle se dessèche toujours en premier. Engraissez de mai à octobre tous les 14 jours avec de l'engrais liquide. **En hiver:** Ne vous inquiétez pas si votre papayer perd presque toutes ses feuilles et seule la pousse apicale a l'air encore vivante en hiver. Gardez les mottes de racines assez sèches. L'hivernage des jeunes plantes doit avoir lieu dans des endroits lumineux, sans air, et à une température minimale de 15° à 25° Celsius. Les branches tendres peuvent être taillées, les plaies devront ensuite être scellées avec un cicatrisant.



Τροπικό δέντρο πεπόνι / παπάγια

Carica papaya

Τροπικά φρούτα - Θρεπτικό και νόστιμο

Η παπάγια, που μεγαλώνει σαν φοίνικα, είναι ένα ιδιόμορφο φυτό. Ο κορμός του δεν λιγνώνεται, γι' αυτό και δεν μπορεί να ονομαστεί δέντρο. Και οι μεγάλοι καρποί τους είναι βοτανικά μούρα. Τα δερματώδη, πολυδόντια φύλλα του μοιάζουν με αυτά της σικιάς και σπειροειδώς γύρω από το στέλεχος. Τα άνθη είναι κρεμ και αρωματικά. Τα άγουρα φρούτα μπορούν να χρησιμοποιηθούν όπως τα λαχανικά για την παρασκευή τσάντνι, κάρυ και σάλτσας. Η ώριμη σάρκα είναι γλυκιά και με λίγο χυμό λεμονιού ή τζίντζερ η γεύση ενισχύεται. Το όνομα παπάγια προέρχεται από τη γλώσσα των Ινδιάνων Arawak, οι οποίοι χρησιμοποιούν τον καρπό της παπάγιας ως φαρμακευτικό φυτό. Παρεμπιπτόντως, το 2008 η παπάγια ήταν μόνο το πέμπτο φυτό του οποίου το γονιδίωμα αναλύθηκε πλήρως. **Φυσική τοποθεσία:** Η προέλευση της παπάγιας είναι στο νότιο Μεξικό. Καλλιεργούνταν ήδη από τους Ινδιάνους της Κεντρικής Αμερικής και της Βραζιλίας στην προκολομβιανή εποχή. **Επιτυχημένη καλλιέργεια:** Η καλλιέργεια από σπόρους σε εσωτερικούς χώρους είναι δυνατή όλο το χρόνο. Αρχικά αφήστε τους σπόρους να μουλιάσουν σε ζεστό νερό για μια νύχτα για να βελτιώσετε τη βλάστηση και στη συνέχεια τοποθετήστε τους περίπου ένα εκατοστό βάθος σε υγρό υπόστρωμα ανάπτυξης. Καλύψτε το δοχείο καλλιέργειας με μεμβράνη, την οποία ανοίγετε με τρύπες. Αυτό προστατεύει το έδαφος από το στέγνωμα. Θα πρέπει να αφαιρείτε το αλουμινοχαρτό για 2 ώρες κάθε δύο έως τρεις ημέρες. Αυτό αποτρέπει τη δημιουργία μούχλας στο αναπτυσσόμενο έδαφος. Τοποθετήστε τη γλάστρα σε ένα ελαφρύ και ζεστό μέρος με θερμοκρασία 20 έως 25° Κελσίου και διατηρήστε το χώμα της γλάστρας υγρό αλλά όχι υγρό. Η βλάστηση εμφανίζεται μετά από τρεις έως και τέσσερις εβδομάδες. **Η καλύτερη τοποθεσία:** Ως τροπικά φυτά, τα πεπόνια προτιμούν φωτεινές και ηλιόλουστες τοποθεσίες. Ένα προστατευμένο, ζεστό μέρος στον κήπο ή στο μπαλκόνι είναι επίσης ιδανικό κατά τη διάρκεια του καλοκαιριού. Ακόμη και τα νεαρά φυτά ανέχονται τον καυτό ήλιο. **Βέλτιστη φροντίδα:** Οι ανάγκες του τροπικού πεπονιού σε νερό είναι μάλλον χαμηλές. Αρκεί να διατηρείται το έδαφος μόνο ελαφρώς υγρό - η υψηλότερη υγρασία είναι πιο πιθανό να οδηγήσει σε βλάβη των ριζών. Επομένως, είναι καλύτερο να αφήνετε πάντα το ανώτερο στρώμα του εδάφους να στεγνώνει ανάμεσα στο πότισμα με νερό όσο το δυνατόν χαμηλότερο σε ασβέστη (νερό της βροχής). Λιπάνετε κάθε 14 ημέρες από τον Μάιο έως τον Οκτώβριο με υγρό λίπασμα φυτών δοχείων. **Το χειμώνα:** Μην ανησυχείτε αν η παπάγια σας χάσει σχεδόν όλα της τα φύλλα το χειμώνα και μόνο η άκρη του βλαστού δείχνει λίγη ζωή. Κρατήστε τη ρίζα αρκετά στεγνή τώρα. Ειδικά όταν τα νεαρά φυτά διαχειμάζουν, θα πρέπει να είναι ελαφριά, χωρίς ρεύματα και τουλάχιστον σε θερμοκρασίες από 15° έως 25° Κελσίου. Τα μαλακά ξυλώδη κλαδιά μπορούν να κοπούν και στη συνέχεια να σφραγιστούν με στόκο δέντρου.



Crann melún trópaiceach / papaya

Carica papaya

Dáileoir Torthaí Tropical - Cothaitheach agus delicious

Is planda aisteach é an papaya, a fhásann cosúil le crann pailme. Ní lignítear a stoc, agus is é sin an fáth nach féidir crann a thabhairt air. Agus is caora luibheolaíoch iad a gcuid torthaí móra. Tá a dhuilleoga leathair, ilfhiacail cosúil le duilleoga fige agus bíseach timpeall an ghais. Tá na bláthanna uachtar daite agus cumhra. Is féidir torthaí neamhaibí a úsáid mar ghlasraí le haghaidh Seataí, cuiríní agus salsas a ullmhú. Is é an flesh aibí milis agusle sú líomóide beag nó ginger cuirtear an blas níos fearr. Tagann an t-ainm papaya ó theanga na nIndiach Arawak, a úsáideann na torthaí papaya mar phlanda míochaine. Teagmhasach, i 2008 ní raibh an papaya ach an cúigiú planda a raibh a ghéinim in ord iomlán. **Suíomh nádúrtha:** Tá bunús an papaya i ndeisceart Mheicsiceo. Bhí sé saothraithe cheana féin ag na hIndiacha Mheiriceá Láir agus an Bhraisail san aimsir réamh-Columbian. **Saothrú rathúil:** Is féidir fás ó shíolta taobh istigh ar feadh na bliana. Ar dtús lig do na síolta soak in uisce te seomra thar oíche chun péacadh a fheabhsú agus ansin cuir iad thart ar aon ceintiméadar ar doimhneacht i bhfoshraith tais atá ag fás. Clúdaigh an soitheach cultúir le scannán cling, a sholáthraíonn tú le poill. Cosnaíonn sé seo an ithir ó thriomú amach. Ba chóir duit an scragall a bhaint ar feadh 2 uair gach dhá nó trí lá. Cuireann sé seo cosc ar mhúnlú a fhoirmiú ar an ithir atá ag fás. Cuir an pota síolta in áit éadrom te ag 20 go 25 ° Celsius agus coinnigh an ithir potaithe tais ach ní fluich. Tarlaíonn péacadh tar éis trísuas le ceithre seachtaine. **An suíomh is fearr:** Mar phlanda trópaiceach, is fearr le crainn melún suíomhanna geal agus griannmhara. Tá áit dhídeanach, te sa ghairdín nó ar an mbalcóin oiriúnach freisin i rith an tsamhraidh. Fiú plandaí óga fhulaingt ghrian blazing. **Cúram is fearr is féidir:** Tá riachtanas uisce an chrainn melon trópaiceach sách íseal. Is leor an ithir a choinneáil ach beagán tais - is dóichí go mbeidh damáiste fréimhe mar thoradh ar thaise níos airde. Mar sin is fearr an ciseal barr ithreach a thriomú i gcónaí idir í a uiscíu le huisce atá chomh hiseal agus is féidir in aol (uisce báistí). Fertilize gach 14 lá ó Bhealtaine go Deireadh Fómhair le leasachán plandaí coimeádán leachtach. **Sa gheimhreadh:** Ná bíodh inní ort má chailleadh do papaya beagnach a dhuilleoga go léir sa gheimhreadh agus nach dtaispeánann ach an rinn shoot beagán beatha. Coinnigh an liathróid fréimhe go cothrom tirim anois. Go háirithe nuair a bhíonn plandaí óga ag geimhreadh, ba chóir go mbeadh siad éadrom, saor ó dhréacht agus ar a laghad ag teocht 15 ° go 25 ° Celsius. Is féidir na craobhacha boga adhmaid a ghearradh siar agus ba chóir iad a shéallú le putty crann.



Suðrænt melónutré / papaya

Carica papaya

Tropical Fruit Dispenser - Næringarríkur og ljúffengur

Papaya, sem vex eins og pálmatré, er sérkennileg planta. Stofn hans verður ekki litnótt og þess vegna er ekki hægt að kalla hann tré. Og stórir ávextir þeirra eru grasafraðilega ber. Leðurkennd, margtennt blöð hennar líkjast fíkjú og spirál um stöngulinn. Blómin eru kremlituð og ilmandi. Hægt er að nota óþroskaða ávexti eins og grænmeti til að búa til chutney, karrí og salsa. Þroskað hold er sætt og með smá sítrónusafa eða engifer eykst bragðið. Nafnið papaya kemur frá tungumáli Arawak indíána, sem nota papaya ávöxtinn sem lækningajurt. Tilviljun, árið 2008 var papaya aðeins fimmta plantan þar sem erfðamengi hennar var fullkomlega raðgreint. **Náttúruleg staðsetning:** Uppruni papaya er í suðurhluta Mexíkó. Það var þegar ræktað af indíánum í Mið-Ameríku og Brasilíu á tímum fyrir Kólumbíu. **Árangursrík ræktun:** Ræktun úr fræjum innandyrá er mögulegt allt árið um kring. Látið fræin fyrst liggja í bleyti í herbergisheitu vatni yfir nótt til að bæta spirun og setjið þau síðan um eins sentímetra djúpt í rakt vaxtarlag. Hyljið ræktunarflátið með matarfilmi, sem þú útvegar með götum. Þetta verndar jarðveginn gegn þurrkun. Þú ættir að fjarlægja álpappírinn í 2 klukkustundir á tveggja til þriggja daga fresti. Þetta kemur í veg fyrir að mygla myndist á vaxandi jarðvegi. Settu fræpottinn á léttan og heitan stað með 20 til 25° Celsíus og haltu pottjarðveginum rökum en ekki blautum. Spirun á sér stað eftir þrjúallt að fjórar vikur. **Besta staðsetningin:** Sem suðrænar plöntur kjósa melónutré bjarta og sólríka staði. Skjólssæll, hlýr staður í garðinum eða á svölunum er líka tilvalinn á sumrin. Jafnvel ungar plöntur þola glampandi sól. **Besta umönnun:** Vatnsþörf hitabeltismelónutrésins er frekar lítil. Það er nóg að halda jarðvegi aðeins rökum - meiri raka er líklegri til að leiða til rótskemmda. Það er því best að láta efsta jarðvegslagið alltaf þorna á milli vökvunar með eins lágu kalki og mögulegt er (regnvatn). Frjývgaðu á 14 daga fresti frá maí til október með fljótandi gámaplöntuáburði. **Á veturna:** Ekki hafa áhyggjur ef papaya þín missir næstum öll laufblöð sín á veturna og aðeins sprotaoddurinn sýnir smá líf. Haltu rótarkúlunni frekar þurrri núna. Sérstaklega þegar ungar plöntur yfir vetrartímann eiga þær að vera léttar, draglausar og að minnsta kosti við hitastig á bilinu 15° til 25° Celsíus. Hægt er að klippa mjúku viðargreinarnar og ætti þá að þetta þær með trjákiti.



Papaia

Carica papaya

Frutto tropicale benefico, ricco di sostanze nutritive e buonissimo

La papaia, che cresce simile a una palma, è una pianta particolare. Non lignifica sul tronco, per cui non può propriamente essere definita un albero e i suoi grossi frutti sono, dal punto di vista botanico, classificabili come bacche. Le foglie, coriacee e irregolarmente frastagliate somigliano a quelle del Fico e sono ordinate attorno al tronco in maniera spirale. I fiori sono color panna e profumati. I frutti non maturi possono essere utilizzati per la preparazione di piatti quali Chutney, Curry e salse. Il frutto maturo è dolce e, con un po' di succo di limone o di zenzero, il gusto risulterà più marcato. Il nome Papaia viene dalla lingua degli indiani Arawak, che utilizzavano il frutto come pianta officinale. Nell'anno 2008 la papaia è stata tra l'altro la quinta pianta di cui è stato completato il sequenziamento del genoma. **Posizione naturale:** La papaia ha origine nel sud del Messico. Veniva coltivata dagli indigeni dell'America Centrale e del Brasile già in epoca precolombiana. **Coltivazione riuscita:** La coltivazione da semi in casa è possibile durante tutto l'anno. Lasciate i semi per una notte in acqua a temperatura ambiente a gonfiarsi, per aumentarne la capacità di germinazione. In seguito piantateli nella terra di coltivo umida, a un centimetro di profondità. Coprite il recipiente di coltivazione con pellicola trasparente, sulla quale praticerete dei fori, in questo modo la terra eviterà di seccarsi. Ogni due o tre giorni rimuovete la pellicola per 2 ore, per prevenire la formazione di muffe sulla terra. Collocate il recipiente di coltivazione in un luogo luminoso e caldo, a una temperatura tra i 20° e i 25° C, mantenete la terra umida, ma non bagnata. La germinazione avverrà da tre a quattro settimane dopo. **La posizione migliore:** La papaia in quanto pianta tropicale predilige i luoghi luminosi e assolati. In estate è ideale un luogo caldo al riparo dal vento, in giardino o sul balcone. Anche le giovani piante sopportano il sole diretto. **Cura ottimale:** Il bisogno d'acqua della papaia tropicale è piuttosto scarso. E' sufficiente mantenere la terra leggermente umida, una maggiore umidità danneggerebbe le radici. Lasciate preferibilmente seccare lo strato di terra superiore prima di una nuova innaffiatura, con acqua il più possibile priva di calcare (acqua piovana). Da maggio a ottobre concimate ogni 14 giorni con fertilizzante liquido per piante da vaso. **In inverno:** Non preoccupatevi se la vostra papaia perderà quasi tutte le foglie in inverno, mostrando ancora un po' di vita solo nei germogli. In questo periodo mantenete il pane di radici piuttosto asciutto. Durante lo svernamento le piante giovani dovrebbero rimanere esposte alla luce, al riparo da correnti d'aria e a temperature tra i 15° e i 25° C. I rami in legno tenero possono essere potati e i tagli trattati con mastice cicatrizzante.



Tropsko drvo dinje / papaja

Carica papaya

Dozator tropskog voća - hranjiv i ukusan

Papaja, koja raste poput palme, osebujna je biljka. Njegovo deblo ne postaje lignificirano, zbog čega se zapravo ne može nazvati stablom. A njihovi veliki plodovi su botanički bobice. Njegovi kožasti listovi s više zubaca nalikuju lišću smokve i spiravno se okreću oko stabljike. Cvjetovi su krem boje i mirisni. Nezrelo voće može se koristiti kao povrće za pripremu chutneya, curryja i salse. Zrelo meso je slatko i malo soka od limuna ili đumbira okus se pojačava. Naziv papaja dolazi iz jezika Arawak Indijanaca, koji koriste plod papaje kao ljekovitu biljku. Inače, 2008. godine papaja je bila tek peta biljka čiji je genom potpuno sekvenciran. **Zemlja porijekla:** Podrijetlo papaje je u južnom Meksiku. Već su ga uzgajali Indijanci Srednje Amerike i Brazila u pretkolumbovsko doba. **Uspješan uzgoj:** Uzgoj iz sjemena u zatvorenom prostoru moguć je tijekom cijele godine. Najprije ostavite sjeme da se namoči u sobno toplo vodi preko noći kako bi poboljšali klijavost, a zatim ga stavite otprilike jedan centimetar duboko u vlažnu podlogu za uzgoj. Posudu s kulturom pokrijite prozirnom folijom koju ste opremili rupama. To štiti tlo od isušivanja. Svaka dva do tri dana skinite foliju na 2 sata. Time se sprječava stvaranje plijesni na tlu za uzgoj. Stavite posudu za sjeme na svijetlo i toplo mjesto s 20 do 25° Celzija i održavajte tlo za saksije vlažnim, ali ne mokrim. Klijanje se javlja nakon trido četiri tjedna. **Najbolja lokacija:** Kao tropske biljke, stabla dinje vole svijetla i sunčana mjesta. Ljeti je idealno i zaštićeno, toplo mjesto u vrtu ili na balkonu. Čak i mlade biljke podnose žarko sunce. **Optimalna njega:** Potreba tropske dinje za vodom prilično je mala. Dovoljno je tlo održavati samo blago vlažnim - veća vлага vjerojatnije će dovesti do oštećenja korijena. Stoga je najbolje između zalijevanja pustiti da se gornji sloj zemlje uvijek osuši vodom sa što manje vapna (kišnica). Gnojite svakih 14 dana od svibnja do listopada tekućim gnojivom za biljke u spremnicima. **U zimi:** Ne brinite ako vaša papaja zimi izgubi gotovo sve listove i samo vrh izdanka pokazuje malo života. Održavajte sad korijenovu balu prilično suhom. Osobito kada mlade biljke prezimljuju, treba im biti svijetlo, bez propuha i barem na temperaturama od 15° do 25° Celzijevih. Meke drvenaste grane mogu se odrezati i zatim ih treba zatvoriti kitom za drveće.



Tropu melones koks / papaija

Carica papaya

Tropisko augļu dozators - barojošs un garšīgs

Papaija, kas aug kā palma, ir savdabīgs augs. Tās stumbrs nesaslogojas, tāpēc to patiesībā nevar saukt par koku. Un to lielie augļi ir botāniski ogas. Tās ādaiņās, daudzdzobu lapas atgādina vīģes lapas un spirāli ap stublāju. Ziedi ir krēmkrāsas un smaržīgi. Negatavus augļus var izmantot tāpat kā dārzeņus čatniņū, karija un salsas pagatavošanai. Gatavs mikstums ir salds un ar neredzamu citrona sulas vai ingvera garša tiek pastiprināta. Papaijas nosaukums cēlies no aravaku indiāņu valodas, kuri izmanto papaijas augļus kā ārstniecības augu. Starp citu, 2008. gadā papaija bija tikai piektais augs, kura genoms tika pilnībā sekvenēts. **Dabiska vieta:** Papaijas izcelsme ir Meksikas dienvidos. Centrālamerikas un Brazīlijas indiāņi to kultivēja jau pirmskolumba laikos. **Veiksmīga audzēšana:** Audzēšana no sēklām telpās ir iespējama visu gadu. Vispirms ļaujiet sēklām nakti iemērt istabas siltā ūdenī, lai uzlabotu dīgspēju, un pēc tam ievietojiet tās apmēram viena centimetra dziļumā mitrā augšanas substrātā. Nosedziniet kultivēšanas trauku ar pārtikas plēvi, kuru nodrošina ar caurumiem. Tas pasargā augsni no izžūšanas. Jums vajadzētu noņemt foliju 2 stundas ik pēc divām līdz trim dienām. Tas novērš pelējuma veidošanos augošajā augsnē. Novietojiet sēklu podu gaišā un siltā vietā ar temperatūru 20 līdz 25 ° C un turiet augsni mitru, bet ne mitru. Dīgšana notiek pēc trim līdz četrām nedēļām. **Labākā atrašanās vieta:** Kā tropu augi meloņu koki dod priekšroku gaišam un saulainām vietām. Nojumta, silta vieta dārzā vai uz balkona ir ideāla arī vasarā. Pat jauni augi pacieš liesmojošu sauli. **Optimāla aprūpe:** Tropu melones kokam ir diezgan zems ūdens pieprasījums. Pietiek, ja augsne ir tikai nedaudz mitra - lielāks mitrums, visticamāk, var izraisīt sakņu bojājumus. Tāpēc vislabāk ir vienmēr ļaut augšējām augsnes slāņiem nožūt starp laistīšanu ar ūdeni, kurā ir pēc iespējas mazāk kaļķa (lietus ūdens). Mēslojiet ik pēc 14 dienām no maija līdz oktobrim ar šķīdru konteineru augu mēslojumu. **Ziemā:** Neuztraucieties, ja jūsu papaija ziemā zaudē gandrīz visas lapas un tikai dzinuma gals parāda mazu dzīvību. Turiet sakņu bumbu tagad diezgan sausu. Īpaši tad, kad jauni augi pārzīemo, tiem jābūt viegliem, bez caurvēja un vismaz 15° līdz 25°C temperatūrā. Mīksts koksnes zarus var nogriezt un pēc tam aizzīmogot ar koka špakteli.



Tropinis melionmedis / papaja

Carica papaya

Tropiņu vasiņu dozatorius – maistingas ir skanus

Papaja, auganti kaip palmē, yra savotiškas augalas. Jo kamienas nesuauaga, todėl jo iš tikrųjų negalima vadinti medžiu. O stambūs jų vaisiai botaniškai yra uogos. Jo odiniai, daugiadantys lapai primena figą ir spirale aplink stiebą. Gėlės yra kreminės spalvos ir kvapnios. Neprinokę vaisiai gali būti naudojami kaip daržovės ruošiant čatnius, karius ir salsas. Prinokę minkštimas yra saldus ir su trupučiu citrinos sulčių ar imbiero skonis paryškina. Papajos pavadinimas kilęs iš aravakų indėnų kalbos, kurie papajos vaisius naudoja kaip vaistinius augalus. Beje, 2008 m. papajos buvo tik penktas augalas, kurio genomas buvo visiškai sekvenuotas. **Natūrali vieta:** Papajos kilmė yra pietų Meksikoje. Ikkolumbiniais laikais jį augino jau Centrinės Amerikos ir Brazilijos indėnai. **Sėkmingas auginimas:** Auginti iš sėklų patalpose galima ištisus metus. Pirmiausia leiskite sėkloms per naktį mirkyti kambario šilto vandenyje, kad pagerėtų daigumas, o tada įdėkite jas maždaug vieno centimetro gylyje į drėgną auginimo substratą. Kultūros indą uždenkite maistine plėvele, kurioje yra skylės. Tai apsaugo dirvą nuo išdžiūvimo. Kas dvi ar tris dienas 2 valandas nuimkite foliją. Tai neleidsia augančioje dirvoje susidaryti pelėsiui. Sėklų vazoną pastatykite šviesioje ir šiltoje vietoje, kurios temperatūra yra 20–25 ° C, o vazono žemė turi būti drėgna, bet ne šlapia. Sudarykite po trijų iki keturių savičių. **Geriausia vieta:** Melionai, kaip atogrąžų augalai, renkasi šviesias ir saulėtas vietas. Apsauga, šilta vieta sode ar balkone taip pat puikiai tiks vasaros metu. Net jauni augalai toleruoja šaščią saulę. **Optimali priežiūra:** Atogrąžų melionų medžio vandens poreikis yra gana mažas. Pakanka, kad žemė būtų tik šiek tiek drėgna – didesnė drėgmė gali sukelti šaknų pažeidimus. Todėl geriausia visada leisti viršutiniam dirvožemio sluoksniui išdžiūti tarp laistymo kuo mažiau kalkių (lietaus vandeniu). Treškite kas 14 dienų nuo gegužės iki spalio skystomis konteinerių augalų trąšomis. **Ziemą:** Nesijaudinkite, jei jūsų papaja žiemą praranda beveik visus lapus ir tik ūglio galiukas rodo šiek tiek gyvumo. Dabar laikykite šaknies kamuolį gana sausą. Ypač žiemojant jauni augalai turi būti lengvi, be skersvėjų ir ne žemesnėje kaip 15–25 ° C temperatūroje. Minkštas sumedėjęs šakas galima nupjauti, o vėliau jas užsandarinti medžių glaistu.



Sigra tal-bettieħ tropikali / papaya

Carica papaya

Frott Tropikali Dispenser - Nutrittiv u Delicious

Il-papajja, li tikber bħal sigra tal-palm, hija pjanta partikolari. Iz-zokk tiegħu ma jsirx lignified, u huwa għalhekk li fil-fatt ma jistax jissejjaħ sigra. U l-frott kbir tagħhom huma botanikament berries. Il-weraq tal-ġilda tiegħu u b'ħafna snien jixbħu lil dawħ ta' tin u spirali madwar iz-zokk. Il-fjuri huma kulur il-krema u fragranti. Frott mhux misjur jista' j'intuza bħal hxejjex għall-preparazzjoni ta' chutneys, curries, u salsas. Il-laħam misjur huwa ħelu ubi fitt meraq tal-lumi jew ginger li toghma tissahħaħ. L-isem papaya ġej mil-lingwa tal-Indjani Arawak, li jużaw il-frott tal-papajja bħala pjanta medicinali. Incidentalment, fl-2008 il-papajja kienet biss il-ħames pjanta li l-ġenoma tagħha kienet kompletament sekwenzata. **Post naturali:** L-oġġini tal-papajja tinsab fin-Nofsinar tal-Messiku. Kien diġà kkultivat mill-Indjani ta' l-Amerika Ċentrali u l-Brazil fi żminijiet pre-Kolombjani. **Kultivazzjoni b'suċċess:** It-tkabbir miż-żrieragħ ġewwa huwa possibbli s-sena kollha. L-ewwel ħalli ż-żrieragħ jixxarrab f'ilma sħun tal-kamra matul il-lejl biex ittejjeb il-germinazzjoni u mbaġħad poġġihom madwar centimetru fond f'sottostrat ta' tkabbir niedja. Għatti l-bastiment tal-kultura b'cling film, li inti ttipprovi b'toqob. Dan jiproteġi l-ħamrija milli tinxf. Għandek tneħħi l-fojl għal sagħtejn kull jumejn jew tlett ijiem. Dan jipprevjeni l-iffurmar tal-moffa fuq il-ħamrija li qed tikber. Poġġi l-borma taż-żerriegħa f'post ħafif u sħun b'20 sa 25 ° Celsius u zomm il-ħamrija tal-qsa niedja izda mhux imxarrba. Il-germinazzjoni sseħħ wara wara t-tlietasa erba' ġimgħat. **L-aħjar post:** Bħala pjanti tropikali, is-sigra tal-bettieħ jippreferu postijiet qawwi u xemxi. Post kenn u sħun fil-ġnien jew fuq il-gallarija huwa wkoll ideali matul is-sajf. Anke pjanti zġħar jittolleraw ix-xemx tisreg. **Kura ottimali:** Ir-rekwiżit tal-ilma tas-sigra tal-bettieħ tropikali huwa pjuttost baxx. Huwa biżżejjed li l-ħamrija zżomm biss fitt niedja - umdità oġħla hija aktar probabbli li twassal għal ħsara fl-għeruq. Għalhekk huwa aħjar li dejjem tħalli s-saff ta' fuq tal-ħamrija jinxef bejn tisqija b'ilma li jkun baxx kemm jista' jkun fil-ġir (ilma tax-xita). Fertilizza kull 14-il jum minn Mejju sa Ottubru b'fertilizzant tal-pjanti tal-kontenitur likwidu. **Fix-xitwa:** Tinkwetax jekk il-papajja tiegħek tifle kwazi l-weraq kollha tagħha fix-xitwa u l-ponta tar-rimja biss turi fitt ħajja. Zomm il-boċċa ta' l-għeruq pjuttost niexfa issa. Speċjalment meta l-pjanti zġħar jagħmlu x-xitwa, għandhom ikunu ħfief, mingħajr abbozz u mill-inqas f'temperaturi ta' 15° sa 25° Celsius. Il-fergħat ta' l-injam artab jistgħu jinqatgħu lura u mbaġħad għandhom jiġu ssiġillati bi stokk tas-sigra.



Tropische Meloenboom / Papaja

Carica papaya

Dispenser voor tropisch fruit - voedzaam en lekker

De palmachtige papaja is een vreemde plant. Zijn stam verhout niet, daarom kan hij eigenlijk geen boom worden genoemd. En vanuit botanisch oogpunt zijn hun grote vruchten bessen. De leerachtige, meertandige bladeren lijken op die van een vijg en zijn in een spiraal rond de stam gerangschikt. De bloemen zijn cremekleurig en geurig. Net als groenten kunnen onrijpe vruchten worden gebruikt om chutneys, curries en salsa's te maken. Het rijpe vruchtvlees is zoet en met een beetje citroensap of gember wordt de smaak versterkt. De naam papaja komt uit de taal van de Arawak-indianen, die de papajafruit als medicinale plant gebruiken. Overigens was papaja in 2008 pas de vijfde plant waarvan het genoom volledig was gesequenced. **Natuurlijke locatie:** De oorsprong van de papaja ligt in het zuiden van Mexico. Het werd in de pre-Columbiaanse tijd gecultiveerd door de Indianen van Midden-Amerika en Brazilië. **Succesvolle teelt:** Binnen kweken uit zaden is het hele jaar mogelijk. Laat de zaden een nacht in warm water weken om de kiemkracht te verbeteren en plaats ze dan ongeveer een centimeter diep in het vochtige groeimedium. Dek de kweekbak af met vershoudfolie, die u van gaten heeft voorzien. Dit beschermt de aarde tegen uitdroging. Elke twee tot drie dagen moet u de film gedurende 2 uur verwijderen. Dit voorkomt schimmelvorming op de teeltgrond. Zet de kweekbak op een lichte en warme plaats met 20 à 25 ° Celsius en houd de kweekgrond vochtig, maar niet nat. Kieming vindt plaats na drie tot vier weken. **De beste locatie:** Meloenbomen geven de voorkeur aan heldere en zonnige locaties als tropische planten. In de zomer is een warme, beschutte plek in de tuin of op het balkon ideaal. Zelfs jonge planten kunnen de brandende zon weerstaan. **Optimale verzorging:** De waterbehoefte van de tropische meloenboom is vrij laag. Het is voldoende om de grond een beetje vochtig te houden - een hoger vochtgehalte heeft de neiging de wortels te beschadigen. Laat de bovenste grondlaag tussen de gietbeurten het beste altijd uitdrogen met zo min mogelijk kalkhoudend water (regenwater). Bemest van mei tot oktober elke 14 dagen met vloeibare potplantenmest. **In de winter:** Maak je geen zorgen als je papaja in de winter bijna al zijn bladeren verliest en alleen de punt van de scheut een beetje leven laat zien. Houd de kluit nu redelijk droog. De overwintering van jonge planten moet helder en tochtvrij zijn en minimaal bij temperaturen van 15° tot 25° Celsius. De zachte houtachtige takken kunnen worden teruggeknipt en moeten vervolgens worden verzegeld met boomkit.



Tropisk melontre / papaya

Carica papaya

Tropical Fruit Dispenser - Næringsrik og deilig

Papaya, som vokser som en palmette, er en særegen plante. Stammen blir ikke lignifisert, og derfor kan den faktisk ikke kalles et tre. Og deres store frukter er botanisk bær. Dens læraktige, flertannede blader ligner på en fiken og spiraler rundt stilken. Blomstene er kremfargede og velduftende. Umoden frukt kan brukes som grønnsaker til tilberedning av chutney, karriretter og salsaer. Det modne kjøttet er søtt og med litt sitronsaft eller ingefær forsterkes smaken. Navnet papaya kommer fra språket til Arawak-indianerne, som bruker papayafrukten som medisinsplante. Forresten, i 2008 var papayaen bare den femte planten hvis genom ble fullstendig sekvensert. **Naturlig beliggenhet:** Opprinnelsen til papayaen er i det sørlige Mexico. Den ble allerede dyrket av indianerne i Mellom-Amerika og Brasil i før-columbiansk tid. **Vellykket dyrking:** Å dyrke fra frø innendørs er mulig hele året. La først frøene trekke i romvarmt vann over natten for å forbedre spiringen, og plasser dem deretter omtrent en centimeter dypt i fuktig vekstsubstrat. Dekk kulturkaret med matfilm, som du forsyner med hull. Dette beskytter jorda mot å tørke ut. Du bør fjerne folien i 2 timer annenhver til tredje dag. Dette forhindrer at det dannes mugg på den voksende jorda. Plasser frøpotten på et lett og varmt sted med 20 til 25° Celsius og hold pottejord fuktig, men ikke våt. Spiring skjer etter treopptil fire uker. **Den beste beliggenheten:** Som tropiske planter foretrekker melontre lys og solrike steder. Et lunt, varmt sted i hagen eller på balkongen er også ideelt om sommeren. Selv unge planter tåler brennende sol. **Optimal omsorg:** Vannbehovet til det tropiske melontreet er ganske lavt. Det er tilstrekkelig å holde jorden bare litt fuktig - høyere fuktighet er mer sannsynlig å føre til rotskader. Det er derfor best å alltid la det øverste jordlaget tørke ut mellom vanning med minst mulig kalkfattig vann (regnvann). Gjødse hver 14. dag fra mai til oktober med flytende beholderplantegjødsel. **Om vinteren:** Ikke bekymre deg hvis papayaen mister nesten alle bladene om vinteren og bare skuddspissen viser litt liv. Hold rotklumpen ganske tørr nå. Spesielt når unge planter overvintrer, bør de være lette, trekkfrie og minst ved temperaturer på 15° til 25° Celsius. De myke tregrenene kan kuttes tilbake og bør deretter forsegles med tre kitt.



Tropikalne Drzewo Melonowe

Carica papaya

Dozownik owoców tropikalnych - pożywny i pyszny

Papaja przypominająca palmę to bardzo osobliwa roślina. W rzeczywistości nie jest to drzewo, ponieważ jego łodyga nie drzewuje, a z botanicznego punktu widzenia jego ogromne owoce są w rzeczywistości jagodami. Jego skórzaste, wielokrotnie wgniecionie liście - przypominające figę - osadzone są spiralnie wokół łodygi. Kwiaty są kremowe z aromatycznym zapachem. Niedojrzałe owoce są używane, podobnie jak warzywa, do robienia chutneyów, curry i salsy. Dojrzały miąższ owocowy ma słodki smak, który można zintensyfikować przez dodanie odrobiny soku z cytryny lub imbiru. Nazwa Papaya pochodzi od języka Indian Arawak, którzy używali tego owocu jako rośliny leczniczej. Nawiąsem mówiąc, drzewo melonowe było dopiero piątą rośliną w 2008 roku, której genomy zostały całkowicie zsekwencjonowane. **Naturalne położenie:** Drzewo Melon pochodzi z południa Meksyku. Uprawiany był już w czasach przedkolumbijskich przez Indian z Ameryki Środkowej i Brazylii. **Udana uprawa:** Rozmnażanie nasion w pomieszczeniach jest możliwe przez cały rok. Aby zwiększyć zdolność kiełkowania, należy umieścić nasiona na noc w ciepłej wodzie do gruntowania. Następnie posadź nasiona na głębokość około 1 cm w wilgotnym kompoście doniczkowym i przykryj pojemnik na nasiona przezroczystą folią, aby zapobiec wysychaniu ziemi. Nie zapomnij zrobić dziur w przezroczystej folii i zdejmuj ją co drugi lub trzeci dzień na około 2 godziny. W ten sposób unikniesz tworzenia się pleśni na kompoście doniczkowym. Umieść pojemnik na nasiona w miejscu jasnym i ciepłym o temperaturze od 20 ° C do 25 ° Celsjusza i utrzymuj ziemię w stanie wilgotnym, ale nie mokrym. Kiełkowanie rozpoczyna się po trzech do czterech tygodni. **Najlepsza lokalizacja:** Melon jest rośliną tropikalną i woli być trzymana w jasnym i słonecznym miejscu. Latem można go również przenieść w chronione przed wiatrem i ciepłe miejsce w ogrodzie lub na balkonie. Nawet młodsze rośliny mogą oprzeć się palącemu słońcu. **Optymalna pielęgnacja:** Tropikalne drzewo melonowe potrzebuje raczej mniej wody i wystarczy, aby ziemia była trochę wilgotna. Zbyt dużo wody może spowodować uszkodzenie korzeni. Dlatego zaleca się pozostawić górną warstwę ziemi do wyschnięcia pomiędzy okresami podlewania wodą ubogą w wapno lub deszczówką. W okresie od maja do października co dwa tygodnie należy również dostarczać roślinie płynny nawóz do roślin doniczkowych. **W zimę:** Nie ma się czym martwić, jeśli twoja papaja rzuci prawie wszystkie liście zimą i wykazuje oznaki życia tylko na wierzchołku kielka. Utrzymuj zakrzepłe korzenie teraz raczej suche. Szczególnie podczas hibernacji młodszych roślin doniczkę należy trzymać w jasnym i wolnym od przeciągu miejscu o temperaturze od 15 ° do 25 ° Celsjusza. Gałęzie z miękkiego drewna można przycinać, a następnie traktować preparatem do rany.



Árvore de melão tropical / mamão

Carica papaya

Dispensador de Frutas Tropicais - Nutritivo e delicioso

O mamão, que cresce como uma palmeira, é uma planta peculiar. Seu tronco não se torna lignificado, razão pela qual não pode ser chamada de árvore. E seus frutos grandes são botanicamente bagas. Suas folhas coriáceas e multidentadas lembram as de um figo e espiralam ao redor do caule. As flores são de cor creme e perfumadas. Frutas verdes podem ser usadas como legumes para a preparação de chutneys, curries e salsas. A carne madura é doce e com um pouco de suco de limão ou gengibre o sabor é realçado. O nome mamão vem da língua dos índios Arawak, que usam o fruto do mamão como planta medicinal. Aliás, em 2008 o mamão foi apenas a quinta planta cujo genoma foi totalmente sequenciado. **Localização natural:** A origem do mamão está no sul do México. Já era cultivada pelos índios da América Central e do Brasil na época pré-colombiana. **Cultivo bem sucedido:** Cultivar a partir de sementes dentro de casa é possível durante todo o ano. Primeiro, deixe as sementes de molho em água morna durante a noite para melhorar a germinação e, em seguida, coloque-as a cerca de um centímetro de profundidade no substrato de crescimento úmido. Cubra o recipiente de cultura com filme plástico, que você fornece com furos. Isso protege o solo de secar. Você deve remover o papel alumínio por 2 horas a cada dois ou três dias. Isso evita a formação de mofo no solo em crescimento. Coloque o vaso de sementes em um local claro e quente com 20 a 25 ° Celsius e mantenha o solo do vaso úmido, mas não molhado. A germinação ocorre depois de três a quatro semanas. **A melhor localização:** Como plantas tropicais, os meloeiros preferem locais claros e ensolarados. Um local abrigado e quente no jardim ou na varanda também é ideal durante o verão. Mesmo as plantas jovens toleram o sol escaldante. **Cuidado ideal:** A necessidade de água do melão tropical é bastante baixa. É suficiente manter o solo apenas ligeiramente úmido - umidade mais alta tem maior probabilidade de causar danos às raízes. Portanto, é melhor deixar sempre a camada superior do solo secar entre as regas com água com o menor teor de cálcio possível (água da chuva). Fertilize a cada 14 dias, de maio a outubro, com fertilizante líquido para plantas em recipientes. **No inverno:** Não se preocupe se o seu mamão perder quase todas as folhas no inverno e apenas a ponta do broto apresentar um pouco de vida. Mantenha a raiz bem seca agora. Especialmente quando as plantas jovens hibernam, elas devem ser leves, sem correntes de ar e com temperaturas de pelo menos 15° a 25° Celsius. Os galhos lenhosos maduros podem ser cortados e devem ser selados com massa de vidraceiro.



Papaya

Carica papaya

Distribuitor de fructe tropicale - hrănitor și delicios

Papaya în formă de palmier este o plantă particulară. Trunchiul său nu se lignifică, motiv pentru care nu poate fi numit de fapt copac. Botanic, fructele lor mari sunt fructe de padure. Frunzele sale pieleoase, cu mai mulți dinți, seamănă cu cele ale unui smochin și sunt aranjate în spirală în jurul trunchiului. Florile sunt de culoare crem și parfumate. La fel ca legumele, fructele neaoapte pot fi folosite pentru a face chutneys, curry și salsas. Pulpa coaptă este dulce și cu puțin suc de lămâie sau ghimbir gustul este sporit. Numele de papaya provine din limba indienilor Arawak, care folosesc fructul papaya ca plantă medicinală. De altfel, în 2008 papaya a fost doar a cincea plantă al cărei genom a fost complet secvențiat. **Locație naturală:** Originea papaya se află în sudul Mexicului. A fost cultivată de indienii din America Centrală și Brazilia în epoca precolumbiană. **Cultivare de succes:** Cultivarea din semințe în interior este posibilă pe tot parcursul anului. Lăsați semințele să se înmoaie în apă caldă peste noapte pentru a îmbunătăți capacitatea de germinare și apoi puneți-le la o adâncime de aproximativ un centimetru în mediul de creștere umed. Acoperiți vasul de cultivare cu folie alimentară, pe care ați prevăzut-o cu găuri. Acest lucru protejează pământul de uscare. La fiecare două până la trei zile ar trebui să scoateți filmul timp de 2 ore. Acest lucru împiedică formarea mușgaiului pe solul de cultivare. Așezați vasul de cultivare într-un loc luminos și cald, cu 20-25 ° Celsius și mențineți solul de cultivare umed, dar nu umed. Germinarea are loc după trei până la patru săptămâni. **Cea mai bună locație:** Pepenii preferă locații luminoase și însorite ca plante tropicale. În timpul verii, un loc cald și adăpostit în grădiniță sau pe balcon este ideal. Chiar și plantele tinere pot rezista la soare aprins. **Îngrijire optimă:** Necesarul de apă al pepenului tropical este destul de scăzut. Este suficient să mențineți solul ușor umed - niveluri mai ridicate de umiditate tind să afecteze rădăcinile. Cel mai bine este să lăsați întotdeauna stratul superior al solului să se usuce între udarea cu apă cât mai scăzută în var (apă de ploaie). Fertilizați din mai până în octombrie la fiecare 14 zile cu îngrășământ lichid pentru plante în ghivece. **În iarnă:** Nu vă faceți griji dacă papaya își pierde aproape toate frunzele în timpul iernii și doar vârful lăstarului arată puțin viață. Păstrați rădăcina destul de uscată acum. Iernarea în special a plantelor tinere ar trebui să fie ușoară, fără curenți și cel puțin la temperaturi cuprinse între 15° și 25° Celsius. Ramurile lemnoase moi pot fi tăiate și ar trebui apoi sigilate cu chit de copac.



Tropiskt Melonträd / Papaya

Carica papaya

Tropisk fruktdispenser - näringsrik och utsökt

Den palmliknande papaya är en konstig växt. Stammen lignifierar inte, varför det faktiskt inte kan kallas ett träd. Botaniskt är deras stora frukter bär. Dess läderartade, flertandade löv liknar en fikon och är ordnade i en spiral runt stammen. Blommorna är krämfärgade och doftande. Liksom grönsaker kan omogna frukter användas för att göra chutneys, curry och salsa. Den mogna massan är söt och med lite citronsaft eller ingefära förstärks smaken. Namnet papaya kommer från Arawak-indianernas språk, som använder papayafrukten som en medicinalväxt. Förresten, 2008 var papaya bara den femte växten vars genom hade sekvenserats helt. **Naturligt läge:** Papaya ursprung är i södra Mexiko. Det odlades av indianerna i Centralamerika och Brasilien under pre-colombianska tider. **Framgångsrik odling:** Att odla från frön inomhus är möjligt året runt. Låt fröna blötläggas i varmt vatten över natten för att förbättra groingskapaciteten och placera dem sedan cirka en centimeter djupt i det fuktiga odlingsmediet. Täck odlingskärlet med plastfolie, som du har försett med hål. Detta skyddar jorden från att torka ut. Varannan till var tredje dag ska du ta bort filmen i två timmar. Detta förhindrar bildning av mögel på odlingsjorden. Placera odlingskärlet på en ljus och varm plats med 20 till 25 ° Celsius och håll odlingsjorden fuktig men inte våt. Spiring sker efter tre till fyra veckor. **Den bästa platsen:** Melonträd föredrar ljusa och soliga platser som tropiska växter. Under sommaren är en varm, skyddad plats i trädgården eller på balkongen perfekt. Unga växter tål också glödande sol. **Optimal vård:** Vattenbehovet i det tropiska melonträdet är ganska lågt. Det räcker att bara hålla jorden lite fuktig - högre fuktnivåer tenderar att skada rötterna. Det är bäst att alltid låta det översta jordskiktet torka ut mellan vattnings med så låg kalk som möjligt (regnvatten). Från maj till oktober befruktas med flytande krukväxtgödsel var 14:e dag. **På vintern:** Oroa dig inte om din papaya tappar nästan alla löv på vintern och bara spetsen visar lite liv. Håll rotkulan ganska torr nu. Övervintringen av unga växter bör vara ljus, dragfri och åtminstone vid temperaturer mellan 15 ° och 25 ° Celsius. De mjuka träartade grenarna kan skäras ned och ska sedan förseglas med träd kitt.



Tropický melonový strom / papája

Carica papaya

Dávkováč tropického ovocia - výživný a chutný

Papája, ktorá rastie ako palma, je zvláštna rastlina. Jeho kmeň nedrevnatí, a preto ho vlastne nemožno nazvať stromom. A ich veľké plody sú botanicky bobule. Jeho kožovitý, mnohozubý listy pripomínajú listy figy a špirálovito okolo stonky. Kvety sú krémovej farby a voňavé. Nezrelé ovocie možno použiť ako zeleninu na prípravu chutney, kari a salsy. Zrelá dužina je sladká a s trochou citrónovej šťavy alebo zázvoru sa chuť zvýrazní. Názov papája pochádza z jazyka indiánov Arawak, ktorí používajú plody papáje ako liečivú rastlinu. Mimochodom, v roku 2008 bola papája iba piatou rastlinou, ktorej genóm bol kompletne sekvenovaný. **Prirodzená poloha:** Pôvod papáje je v južnom Mexiku. Pestovali ho už Indiáni zo Strednej Ameriky a Brazílie v predkolumbovských časoch. **Úspešná kultivácia:** Pestovanie zo semien v interiéri je možné po celý rok. Semená nechajte najskôr cez noc namočiť v izbovej vode, aby sa zlepšilo klíčenie, a potom ich umiestnite asi jeden centimeter hlboko do vlhkého pestovateľského substrátu. Kultivačnú nádobu prikryte potravinovou fóliou, ktorú opatríte otvormi. To chráni pôdu pred vysychaním. Fóliu by ste mali odstraňovať na 2 hodiny každé dva až tri dni. To zabráni tvorbe plesní na rastúcej pôde. Črepník umiestnite na svetlé a teplé miesto s teplotou 20 až 25 °C a udržiavajte pôdu v črepníku vlhkú, ale nie mokrá. Klíčenie nastáva po trocha štyri týždne. **Najlepšie umiestnenie:** Ako tropické rastliny uprednostňujú melonové stromy svetlé a slnečné miesta. Cez leto je ideálne aj chránené teplé miesto v záhrade alebo na balkóne. Dokonca aj mladé rastliny tolerujú horúce slnko. **Optimálna starostlivosť:** Potreba vody tropického melónu je pomerne nízka. Pôdu stačí udržiavať len mierne vlhkú - vyššia vlhkosť skôr povedie k poškodeniu koreňov. Najlepšie je preto vždy medzi zálievkou nechať vrchnú vrstvu pôdy vyschnúť vodou s čo najnižším obsahom vápna (dažďová voda). Od mája do októbra prihnojujte každých 14 dní tekutým hnojivom pre kontajnerové rastliny. **V zime:** Nerobte si starosti, ak vaša papája v zime stratí takmer všetky listy a iba špička výhonku ukazuje trochu života. Teraz udržiavajte koreňový bal pomerne suchý. Najmä keď mladé rastliny prezimujú, mali by byť svetlé, bez prievanu a aspoň pri teplotách 15° až 25° Celzia. Mäkké drevené konáre je možné odrezáť a potom ich utesniť tmelom na stromy.



Tropska melona / papaja

Carica papaya

Dozator za tropsko sadje - hranljiv in okusen

Papaja, ki raste kot palma, je svojevrstna rastlina. Njegovo deblo ne oleseni, zato ga pravzaprav ne moremo imenovati drevo. In njihovi veliki plodovi so botanično jagode. Njeni usnjeni listi z več zobmi so podobni figovim listom in se spiralno vijejo okoli stebela. Cvetovi so kremne barve in dišeči. Nezrelo sadje lahko uporabimo kot zelenjavo za pripravo čatnijev, karijev in sals. Zrelo meso je sladko in z malo limoninega soka ali ingverja se okus okrepi. Ime papaja izhaja iz jezika Indijancev Arawak, ki uporabljajo plod papaje kot zdravilno rastlino. Mimogrede, leta 2008 je bila papaja šele peta rastlina, katere genóm je bil popolnoma sekvenčiran. **Naravni habitat:** Izvor papaje je v južni Mehiki. V predkolumbovih časih so jo gojili že Indijanci Srednje Amerike in Brazílije. **Navodila za gojenje:** Gojenje iz semen v zaprtih prostorih je možno vse leto. Najprej pustite semena čez noč namakati v sobno topli vodi, da izboljšate kalitev, nato pa jih položite približno en centimeter globoko v vlažen rastni substrat. Posodo z kulturo pokrijte s folijo za živila, ki jo opremite z luknjami. To ščiti tla pred izsušitvijo. Vsake dva do tri dni za 2 uri odstranite folijo. S tem preprečimo nastanek plesni na rastni zemlji. Lonček s semeni postavite na svetlo in toplo mesto s temperaturo od 20 do 25 °C, zemlja v lončku pa naj bo vlažna, vendar ne mokra. Kaljenje se pojavi po treh do štiri tedne. **Najboljša lokacija:** Kot tropske rastline imajo melone raje svetla in sončna mesta. Poleti je idealen tudi zaščiten, topel prostor na vrtu ali balkonu. Tudi mlade rastline prenašajo žgoče sonce. **Optimalna nega:** Potreba tropske melone po vodi je precej majhna. Zadostuje, da je zemlja le rahlo vlažna - večja vlaga bo bolj verjetno povzročila poškodbe korenin. Zato je najbolje, da se zgornja plast zemlje med zalivanjem vedno posuši z vodo, ki vsebuje čim manj apna (deževnica). Gnojite vsakih 14 dni od maja do oktobra s tekočim gnojilom za rastline. **V zimskem času:** Ne skrbite, če vaša papaja pozimi izgubi skoraj vse liste in le konica poganjka kaže malo življenja. Zdaj naj bo koreninska gruda dokaj suha. Predvsem ko mlade rastline prezimijo, naj bodo svetle, brez prepriha in vsaj pri temperaturah od 15° do 25° Celzija. Mehke olesenele veje lahko odrežete in jih nato zatesnite s kitom za drevesa.



Papaya

Carica papaya

Dispensador de frutas tropicales - ricas en nutrientes y sabrosas

La papaya es una planta peculiar y crece de forma similar a la palmera. Su tronco no se forma en madera, por lo que no se puede denominar árbol y sus frutas se consideran bayas. Sus hojas dentadas se parecen a las de las higueras y se colocan en forma de espiral alrededor del tronco. Las flores son de color crema y fragantes. Las bayas inmaduras se pueden utilizar como verdura para la elaboración de Chutneys, Curry y salsas. La fruta madura es dulce y con un poco de limón se intensifica el sabor. El nombre de papaya proviene del lenguaje de los indios Arawak, que utilizan esta fruta como remedio. En 2008 la papaya fue la quinta planta cuyo genoma fue completamente secuenciado. **Ubicación natural:** El origen de la papaya se sitúa en el sur de México. Ha sido cultivada en tiempos precolombinos por los indios de Centroamérica y los brasileños. **Cultivo exitoso:** La semilla se puede criar en interior durante todo el año. Para aumentar la capacidad de germinación, se aconseja mantener las semillas durante una noche en agua a temperatura ambiente. Introduzca las semillas en sustrato húmedo a un centímetro de profundidad. Cubra el recipiente de cultivo con un film transparente y agujereéelo. Así protegerá la tierra de la desecación. Para evitar la putrefacción del sustrato retire el film cada dos o tres días durante 2 horas. Coloque el recipiente de cultivo en un lugar luminoso y cálido con entre 20 y 25 grados y mantenga el sustrato húmedo, pero no mojado. La germinación se producirá a las tres a cuatro semanas. **La mejor ubicación:** El árbol del melón prefiere, como planta tropical, lugares luminosos y soleados. Durante el verano le gusta un lugar cálido, protegido del viento, en el jardín o la terraza. Incluso las plantas jóvenes toleran el pleno sol. **Cuidado óptimo:** La demanda de agua del árbol del melón es moderada. Es suficiente con mantener la tierra un poco húmeda, una humedad superior puede provocar daños en las raíces. Deje que la tierra de la primera capa se seque un poco y riegue con agua baja en cal (agua de lluvia). Suministre fertilizante líquido para macetas cada 14 días desde mayo a octubre. **En el invierno:** No se preocupe si su papaya pierde todas las hojas en invierno y solo las puntas de los brotes muestran vida. Mantenga el cepellón casi seco. Las plantas jóvenes invernan mejor en lugares luminosos, protegidos de corriente y con temperaturas de entre 15 y 25 grados. Las ramas tiernas pueden ser podadas y deben ser tapados con masilla cicatrizante.



Tropický meloun / papája

Carica papaya

Dávkoř tropického ovoce – výživný a chutný

Papája, která roste jako palma, je zvláštní rostlina. Jeho kmen nezdrěvňuje, a proto se vlastně nedá nazvat stromem. A jejich velké plody jsou botanicky bobule. Jeho kořovitě, mnohozubé listy připomínají listy fíku a spirálovitě kolem stonku. Květy jsou krémové barvy a voňavé. Nezralé ovoce lze použít jako zeleninu pro přípravu chutney, kari a salsy. Zralá dužina je sladká a s trochou citronové šťávy nebo zázvoru se chut zvyrazní. Název papája pochází z jazyka indiánů Arawak, kteří používají plody papáje jako léčivou rostlinu. Mimochodem, v roce 2008 byla papája teprve pátou rostlinou, jejíž genom byl kompletně sekvencován. **Přirozená poloha:** Původ papáje je v jižním Mexiku. Pěstovali ji již Indiáni ze Střední Ameriky a Brazílie v předkolumbovských dobách. **Úspěšné pěstování:** Pěstování ze semínek v interiéru je možné po celý rok. Nejprve nechte semena namočit přes noc v pokojové vodě, aby se zlepšilo klíčení, a poté je vložte asi jeden centimetr hluboko do vlhkého pěstebního substrátu. Kultivační nádobu zakryjte potravinářskou fólií, kterou opatřte otvory. To chrání půdu před vysycháním. Fólii byste měli odstraňovat na 2 hodiny každé dva až tři dny. Tím se zabrání tvorbě plísní na rostoucí půdě. Umístěte květináč na světlé a teplé místo s teplotou 20 až 25 °C a udržujte půdu v květináči vlhkou, ale ne mokrou. Klíčení nastává po třech až čtyřech týdnech. **Nelepší umístění:** Jako tropické rostliny dávají melouny přednost světlým a slunným místům. Přes léto je ideální i chráněné teplé místo na zahradě nebo na balkoně. Dokonce i mladé rostliny snášejí žhnoucí slunce. **Optimální péče:** Potřeba vody tropického melounu je poměrně nízká. Půdu stačí udržovat jen mírně vlhkou – vyšší vlhkost spíše vede k poškození kořenů. Nejlepší je proto vždy mezi závlivkou nechat vrchní vrstvu zeminy vyschnout vodou s co nejnižším obsahem vápna (dešťová voda). Od května do října přihnojíte každých 14 dní tekutým hnojivem pro kontejnerové rostliny. **V zimě:** Nebojte se, pokud vaše papája v zimě ztratí téměř všechny listy a pouze špička výhonku ukazuje trochu života. Nyní udržujte kořenový bal poměrně suchý. Zejména při přezimování mladých rostlin by měly být světlé, bez průvanu a minimálně při teplotách 15° až 25° Celsia. Měkké dřevěné větve mohou být odříznuty a poté by měly být utěsněny tmelem na stromy.



Tropikal kavun ağacı / papaya

Carica papaya

Tropikal Meyve Sebili - Besleyici ve lezzetli

Palmiye ağacı gibi büyüyen papaya, kendine has bir bitkidir. Gövdesi odunlaşmaz, bu yüzden aslında ağaç olarak adlandırılmaz. Ve büyük meyveleri botanik olarak meyvelerdir. Kösele, çok dişli yaprakları incirinkine benzer ve gövde etrafında sarmalır. Çiçekleri krem renkli ve hoş kokuludur. Olgunlaşmamış meyveler, Hint turşusu, köri ve salsaların hazırlanmasında sebzeler gibi kullanılabilir. Olgun et tatlıdır ve biraz limon suyu veya zencefil ile tadı artırılır. Papaya adı, papaya meyvesini şifalı bir bitki olarak kullanan Arawak Kızılderililerinin dilinden gelmektedir. Bu arada, 2008'de papaya, genomu tamamen sıralanan yalnızca beşinci bitkiydi. **Doğal konum:** Papayanın anavatanı güney Meksika'dır. Kolomb öncesi zamanlarda Orta Amerika ve Brezilya Kızılderilileri tarafından zaten yetiştiriliyordu. **Başarılı yetiştirme:** İç mekanlarda tohumlardan büyümek tüm yıl boyunca mümkündür. İlk önce tohumların çimlenmeyi iyileştirmek için gece boyunca oda sıcaklığında suda ıslanmasına izin verin ve ardından onları nemli büyüyen substratın yaklaşık bir santimetre derinliğine yerleştirin. Kültür kabının üzerini delikler açtığınız streç film ile kapatın. Bu, toprağın kurumasını önler. Folyoyu her iki ila üç günde bir 2 saat çıkarmalısınız. Bu, büyüyen toprakta küf oluşumunu önler. Tohum saksısını 20 ila 25°C sıcaklıkta hafif ve sıcak bir yere koyun ve sakı toprağını nemli tutun ama ıslak değil. Çimlenme üçten sonra gerçekleşir. dört haftaya kadar. **En iyi konum:** Tropikal bitki olarak kavun ağaçları aydınlık ve güneşli yerleri tercih eder. Yaz aylarında bahçede veya balkonda korunaklı, sıcak bir yer de idealdir. Genç bitkiler bile yanan güneşi tolere eder. **Optimum bakım:** Tropikal kavun ağacının su ihtiyacı oldukça düşüktür. Toprağı sadece hafif nemli tutmak yeterlidir - daha yüksek nemin kök hasarına yol açması daha olasıdır. Bu nedenle mümkün olduğu kadar az kireç içeren suyla (yağmur suyu) sulama arasında toprağın üst tabakasının kurumasına izin vermek en iyisidir. Sıvı kap bitki gübresi ile Mayıs'tan Ekim'e kadar her 14 günde bir gübreleyin. **Kışın:** Papayanız kışın neredeyse tüm yapraklarını kaybederse ve sadece sürgün ucu biraz canlılık gösterirse merak etmeyin. Kök topunu şimdi oldukça kuru tutun. Özellikle genç bitkiler kışı geçirdiğinde, hafif, hava cereyansız ve en az 15° ila 25°C sıcaklıkta olmalıdırlar. Yumuşak odunsu dallar kesilebilir ve ardından ağaç macunu ile kapatılmalıdır.



Trópusi dinnyefa / papaya

Carica papaya

Trópusi gyümölcs adagoló – tápláló és finom

A pálmaként növekvő papaya különös növény. Törzse nem lignifikálódik, ezért tulajdonképpen nem is nevezhető fának. Nagy termésűek pedig botanikailag bogyók. Bórszerű, többfogú levelei a füge leveleihez hasonlítanak, és a szár körül spirál alakúak. A virágok krémszínűek és illatosak. Az éretlen gyümölcsök zöldségekhez hasonlóan használhatók chutney, curry és salsa készítéséhez. Az érett hús édes és egy kis citromlével vagy gyömbérrel az íz fokozódik. A papaya név az arawak indiánok nyelvéből származik, akik a papaya gyümölcsét gyógynövényként használják. Egyébként 2008-ban a papaya csak az ötödik növény volt, amelynek genomját teljesen szekvenálták. **Természetes elhelyezkedés:** A papaya eredete Mexikó déli részén található. Közép-Amerika és Brazília indiánjai már a Kolumbusz előtti időkben termesztették. **Sikeres termesztés:** A beltéri magvak termesztése egész évben lehetséges. Először hagyja a magokat egy éjszakán át szobameleg vízben ázni, hogy javítsa a csírázást, majd helyezze őket körülbelül egy centiméter mélyre nedves termesztőfelületre. Fedje le a tenyészedényt ragasztó fóliával, amelyet lyukakkal lát el. Ez megvédi a talajt a kiszáradástól. A fóliát két-három naponta 2 órára le kell venni. Ez megakadályozza a penészképződést a növekvő talajon. Helyezze a magcserepet világos és meleg helyre, ahol a hőmérséklet 20-25°C, és a virágföldet tartsa nedvesen, de ne nedvesen. A csírázás három után következik belegfeljebb négy hétig. **A legjobb hely:** Trópusi növényként a dinnyefák a világos és napos helyeket részesítik előnyben. Nyáron is ideális egy védett, meleg hely a kertben vagy az erkélyen. Még a fiatal növények is tolerálják a tűző napot. **Optimális gondozás:** A trópusi dinnyefa vízigénye meglehetősen alacsony. Elegendő csak enyhén nedvesen tartani a talajt – a nagyobb nedvesség nagyobb valószínűséggel gyökérgyomolygáshoz vezet. Ezért a legjobb, ha a talaj felső rétegét mindig hagyjuk kiszáradni a lehető legmérszégényebb vízzel (esővízzel) történő öntözés között. Májustól októberig 14 naponként trágyázzon folyékony tartályos növényi műtrágyával. **Télen:** Ne aggódjon, ha a papaya télen szinte minden levelét elveszíti, és csak a hajtás hegye mutat egy kis életet. Tartsa a gyökérgolyót most meglehetősen szárazon. Különösen a fiatal növények áttelelésekor legyenek könnyűek, huzatmentesek és legalább 15-25 °C hőmérsékletűek. A puha fás ágakat vissza lehet vágni, majd fagittal le kell zárni.

: : : : :



パパイア

Carica papaya

栄養価が高く美味しいトロピカルフルーツ

非常に特有な植物です。植物学的には木ではなく茎になるこの大きな果実は実際は木の実です。複数の革質の葉が茎の周囲にらせん状についています。クリーム色の香りのよい花を咲かせます。熟す前の果実はチャツネ・カレー・サルサなどに使われます。熟した果実は少量のレモンジュースやしょうが汁を加えることでさらに甘みを増します。パパイアという名前は、薬草として果物を使用したアラワクインディアンの言葉に由来します。2008年には5番目にそのゲノムが完全に配列されました。

自然な場所: 生息地はメキシコ南部です。中米とブラジルのインディアンによって先コロンブス期にすでに栽培されていました。

栽培成功:

種子繁殖は室内で年間を通して可能です。発芽率を上げる方法として、種を温水に一晩浸します。湿った培養土の深さ約1cmに種を植え、サランラップなどの透明フィルムで鉢をカバーします。透明フィルムには空気穴をいくつかあけ、2~3日に1回は約2時間、完全にフィルムを鉢から外します。そうすることで、カビの発生を防ぎます。20℃~25℃の明るく暖かい場所に置き、用土は湿った状態に保ちます。3~4週間後に発芽します。

最高のロケーション:

熱帯植物ですので明るく日当たりの良い場所を好み、夏にはベランダや庭の風の当たらない暖かい場所に置くこともできます。若い苗木でも強い太陽光に耐えることが可能です。

最適なケア:

水やりは少量にして、用土が湿っている状態に保ちます。水のやり過ぎは根を痛める原因になりますので、石灰の含有量が少ない水か雨水を用土の表面が乾燥した時に与えます。5月から10月の間は液体肥料を2週間ごとに与えます。

冬に:

冬の間に葉をすべて落としたとしても、新芽が出てくれば心配の必要はありません。根は乾燥した状態に保ち、冬籠りは15℃~25℃で明るく無風の場所に保管します。剪定後は切口被覆布材を使用します。

SKU: 12327 / Tropischer Melonenbaum / Papaya