

DAWKOWANIE I ZALECENIA STOSOWANIA

Nawożone uprawy sadownicze, warzywnicze

Cebula, czosnek, kapustne, marchewka, por, bakłażan, brokuł, kalafior, szparagi	Zalecenia dotyczące stosowania: Od początku intensywnego wzrostu wegetatywnego. Stosować 3–4 zabiegi w sezonie wegetacyjnym
Papryka, pomidor, ziemniak, ogórek, cukinia	Dawka min. > 1,5 ml na 1 l wody
Sałata, szpinak, fasola, groszek, pietruszka	Dawka maks. > 3,0 ml na 1 l wody
Winogrona	Odstęp pomiędzy zabiegami > 7 dni
Jabłoń, grusza (t<20°C)	
Jabłoń, grusza (t>20°C)	
Brzoskwinia, czereśnia, śliwa, wiśnia	
Jeżyna, malina letnia i jesienna, porzeczka	
Truskawka uprawiana w gruncie i pod osłonami	

Nawożone uprawy rolnicze

Burak cukrowy	Zalecenia dotyczące stosowania: Wraz z zabiegiem fungicydowym
Rzepak	
Kukurydza	Dawka min. > 0,1 litra na hektar
Zboża	Dawka maks. > 0,5 litra na hektar
Soja	Dawka wody > 200–300 litrów na hektar