

I13

Przepiórka Odchów II

Mieszanka paszowa pełnoporcjowa dla przepiórek

Sposób stosowania: dla przepiórek na okres odchowu od 11 dnia do rozpoczęcia nieśności (ok.42 dnia życia).

Forma paszy: Kruszonka

Skład pszenica, śruta poekstrakcyjna paszowa z nasion soi, kukurydza, śruta poekstrakcyjna słonecznikowa, białko ziemniaczane,, węglan wapnia, olej sojowy, fosforan jednowapniowy, chlorek sodu, wodorowęglan sodu

Dodatkowe informacje: Produkt zawiera genetycznie zmodyfikowaną śrutę sojową.

Składniki analityczne w 1 kg	Białko surowe	230	g	Fosfor	5.7	g
	Tłuszcz surowy	31	g	Sód	1.5	g
	Włókno surowe	32	g	Lizyna	12.2	g
	Popiół surowy	54	g	Metionina	5.1	g
	Wapń	7.6	g			

Dodatki w 1 kg

Witaminy i prowitaminy

Witamina A (octan retinylu; 3a672a)	10000	JM
Witamina D3 (cholekalcyferol; 3a671)	3000	JM
Witamina E (octan dl-alfa-tokoferylu; 3a700)	80	mg
Biotyna (3a880)	160	mcg

Mikroelementy

Żelazo (siarczan żelaza jednowodny; 3b103)	50	mg
Miedź (siarczan miedzi pięciowodny; 3b405)	12	mg
Cynk (tlenek cynku; 3b603)	70	mg
Mangan (tlenek manganu; 3b502)	80	mg
Jod (granulowany jodan wapnia; 3b203)	1	mg
Selen (powlekany, gran. selenin sodu; 3b802)	0.2	mg

Substancje polepszające strawność

Endo-1,4 beta- ksylanaza (EC 3.2.1.8; 4a11)	2480	U/kg
6- fitaza (EC 3.1.3.26; 4a24)	1000	FTU/kg

Przeciwutleniacze

BHT (E321)	0.1	mg
Galusan propylu (E310)	0.01	mg

Dodatki zootechniczne

Zawiera deaktywator mikotoksyn i stabilizator mikroflory jelitowej.

Data produkcji i nr serii

Okres przydatności Wykorzystać przed upływem 3 miesięcy od daty produkcji.

Warunki przechowywania i stosowania:

Wyrób stosować zgodnie z przeznaczeniem. Przechować w suchym i chłodnym miejscu. Producent nie odpowiada za skutki niewłaściwego przechowywania i stosowania wyrobu gotowego.