

DAWKOWANIE	DAWKA [L/HA]	TERMINY STOSOWANIA
Jabłoń, Grusza	1-2l/ha powtarzać co 7 dni	Pierwszy zabieg wykonać na początku wegetacji. Kolejne przed i po kwitnieniu, w czasie dojrzewania owoców oraz przed zbiorami.
Wiśnia, Czereśnia, Śliwa	1-2l/ha powtarzać co 7 dni	Pierwszy zabieg wykonać na początku wegetacji. Kolejne przed i po kwitnieniu, w czasie dojrzewania owoców oraz przed zbiorami.
Truskawka, Malina, Jeżyna	1-2l/ha powtarzać co 7 dni	Zabiegi wykonywać w czasie intensywnego przyrostu liści i pędów, w czasie kwitnienia, w okresie dojrzewania i wzrostu owoców oraz przed i w trakcie zbioru owoców.
Borówka Porzeczki	1-2l/ha powtarzać co 7 dni	Zabiegi wykonywać w czasie intensywnego przyrostu liści i pędów, w czasie kwitnienia, w okresie dojrzewania i wzrostu owoców oraz przed i w trakcie zbioru owoców.
Ogólne zalecenia	1. Stosować Barrier Si-Ca od początku wegetacji uprawy, aby jak najwcześniej inicjować odporność roślin. Zabiegi wykonywać co 10-14 dni. 2. Wykonywać 2-3 zabiegi w okresie intensywnego wzrostu owoców, w odstępach 7-dniowych w celu uzyskania bardziej jędrnych owoców o dłuższym okresie trwałości pozbiorczej.	