

Potas

Azot

Fosfor

BOPON surfinie

Specjalistyczny nawóz mineralny do wszystkich odmian surfinii. Odpowiednio dobrane proporcje makro i mikroelementów zapewniają roślinom optymalny wzrost oraz przyspieszają zawiązywanie się pąków kwiatowych. Regularne stosowanie nawozu zapewnia długie i obfite kwitnienie oraz intensywne wybarwienie kwiatów i liści.

**Stosowanie:**

Rozpuścić 10 ml
nawozu
(1/3 nakrętki)
w 1,2 l wody.



do stosowania przez
podlewanie lub drogą dolistną

Nawozić rośliny 3 razy w tygodniu. Przed użyciem wstrząsnąć. Stosować wyłącznie w uzasadnionej potrzebie. Nie przekraczać dawki.

I II III **IV V VI VII VIII IX** X XI XII

WIELOSKŁADNIKOWY PŁYNNY NIEORGANICZNY NAWÓZ MAKROSKŁADNIKOWY

Zawartość składników pokarmowych (m/m): 6 % azot całkowity (N) [w tym 5,3 % azot mocznikowy], 5 % całkowity pięciotlenek fosforu (P_2O_5) (=2,2 % P) [w tym 5 % rozpuszczalny w wodzie pięciotlenek fosforu (P_2O_5) (=2,2 % P)], 5 % tlenek potasu (K_2O) rozpuszczalny w wodzie (=4,2 % K). **Mikroskładniki całkowicie rozpuszczalne w wodzie (m/m):** 0,02 % bor (B) w postaci kwasu borowego, 0,002 % miedź (Cu)*, 0,02 % żelazo (Fe)*, 0,015 % mangan (Mn)*, 0,002 % molbden (Mo) w postaci soli amonowej, 0,015 % cynk (Zn)*.

*schelatowane przez EDTA (zakres pH gwarantujący zadowalającą stabilność: 4 – 7)

Postać roztwór

Wykaz składników powyżej 5 % (w przeliczeniu na suchą masę): mocznik¹ (CAS: 57-13-6), fosforan monopotasowy¹ (CAS: 7778-77-0), chlorek potasu¹ (CAS: 7447-40-7)

Gdzie: ¹ – CMC i pierwotne surowce i mieszaniny

Środki ostrożności i przechowywanie: Uwaga H317 Może powodować reakcję alergiczną skóry. P101 W razie konieczności zasięgnięcia porady lekarza, należy pokazać pojemnik lub etykietę. P102 Chronić przed dziećmi. P302 + P352 W PRZYPADKU KONTAKTU ZE SKÓRĄ: umyć dużą ilością wody z mydłem. P501 Zawartość / pojemnik usunąć do uprawnionych firm utylizacji odpadów niebezpiecznych. Zawiera masę reakcyjną 5-chloro-2-metylo-2H-izotiazol-3-onu i 2-metylo-2H-izotiazol-3-onu (3:1) oraz 1,2-benzotiazol-3-(2H)-on. W razie przypadkowego spożycia skonsultować się z lekarzem. Przechowywać z dala od żywności, w temperaturze 5°C – 30°C. W temperaturze poniżej 5°C możliwe jest wytrącenie się osadu, które jest odwracalne i nie wpływa na działanie nawozu. Ten nawóz zawiera mocznik, który

może uwalniać amoniak i wpływać na jakość powietrza. W zależności od miejscowych warunków należy wprowadzić odpowiednie środki zaradcze. W trakcie przechowywania stężenie azotu amonowego wzrasta do 0,5 – 1,8 %. Data ważności i nr seryjna opakowaniu.

UFI: OPH0-40R3-400M-5D85

Producent: BROŚ sp. z o.o., ul. Karpia 24

61-619 Poznań, tel. 61 826 25 12

e-mail: biuro@bros.pl

Zawartość
netto: **1000 ml/1140 g**



ET/28604

