

Jak stosować Magnicur One-Day?

- 1 Przed zastosowaniem środka na rośliny ozdobne wykonać na każdej uprawianej odmianie **próbny zabieg** w celu sprawdzenia, czy w ciągu 7 dni nie wystąpiły objawy uszkodzenia roślin.
- 2 W ramach strategii przeciwdziałania odporności zaleca się stosować środek tylko zapobiegawczo, naprzemiennie ze środkami z innych grup chemicznych, o odmiennym mechanizmie działania.
- 3 Zalecany termin stosowania od maja do sierpnia.



Dawkowanie:

✱ **Malina**

✗ szara pleśń, zamieranie pędów maliny

Maksymalna/zalecana dawka dla jednorazowego zastosowania: **15 ml/100 m²**

Termin stosowania:

- w zwalczaniu szarej pleśni zaleca się stosowanie środka od początku kwitnienia, jak również ze względu na krótki okres karencji, tuż przed i pomiędzy zbiorami
- w zwalczaniu zamierania pędów maliny pierwszy zabieg wykonać, gdy nowe pędy osiągną wysokość 20 cm

Maksymalna liczba zabiegów w sezonie wegetacyjnym: 3

Odstęp między zabiegami: co najmniej 7 dni

Zalecana ilość wody: 5-10 l/100 m²

 Truskawka

 szara pleśń

Maksymalna/zalecana dawka dla jednorazowego zastosowania: **15 ml/100 m²**

Termin stosowania:

- od początku kwitnienia, jak również ze względu na krótki okres karencji, tuż przed i pomiędzy zbiorami

Maksymalna liczba zabiegów w sezonie wegetacyjnym: 3

Odstęp między zabiegami: co najmniej 7 dni

Zalecana ilość wody: 5-10 l/100 m²

 Tulipan (uprawa w gruncie)

 szara pleśń

Maksymalne/zalecane stężenie dla jednorazowego zastosowania: **0,1% (10 ml środka/10 l wody)**

Termin stosowania: zapobiegawczo lub po wystąpieniu pierwszych objawów choroby

Maksymalna liczba zabiegów w sezonie wegetacyjnym: 3

Odstęp między zabiegami: co najmniej 7 dni

Zalecana ilość cieczy użytkowej: 10 l/100 m²

✳ **Jeżyna, malinojeżyna**

✕ szara pleśń

Maksymalna/zalecana dawka dla jednorazowego zastosowania: **15 ml/100 m²**

Termin stosowania:

- w zwalczaniu szarej pleśni zaleca się stosowanie środka od początku kwitnienia, jak również ze względu na krótki okres karencji, tuż przed i pomiędzy zbiorami
- w zwalczaniu zamierania pędów maliny pierwszy zabieg wykonać, gdy nowe pędy osiągną wysokość 20 cm

Maksymalna liczba zabiegów w sezonie wegetacyjnym: 3

Odstęp między zabiegami: co najmniej 8 dni

Zalecana ilość wody: 5-10 l/100 m²

✳ **Porzeczka biała, porzeczka czarna, porzeczka czerwona, borówka wysoka (amerykańska), agrest, żurawina**

✕ szara pleśń

Maksymalna/zalecana dawka dla jednorazowego zastosowania: **15 ml/100 m²**

Termin stosowania środka:

- od fazy widocznych pierwszych pąków kwiatowych (zbite grono) obok rozwiniętych liści, jak również ze względu na krótki okres karencji, tuż przed i pomiędzy zbiorami

Maksymalna liczba zabiegów w sezonie wegetacyjnym: 3

Odstęp między zabiegami: co najmniej 10 dni

Zalecana ilość wody: maksymalnie 20 l/100 m²