



SAFLAX®



Tips



© Chris Ilsley - About © : Contact SAFLAX

Acer palmatum atropurpureum

	 Български	BG		2		 Malti	MT		5
	 Dansk	DK		2		 Nederlands	NL		5
	 Deutsch	DE		2		 Norsk	NO		6
	 English	UK		2		 Polski	PL		6
	 Eesti	EE		3		 Português	PT		6
	 Suomalainen	FI		3		 Românesc	RO		6
	 Français	FR		3		 Svenska	SE		7
	 Ελληνική	GR		3		 Slovensky	SK		7
	 Gaeilge	IE		4		 Slovenski	SI		7
	 íslenskur	IS		4		 Español	ES		7
	 Italiano	IT		4		 Český	CZ		8
	 Hrvatski	HR		4		 Türkçe	TR		8
	 Latviešu	LV		5		 Magyar	HU		8
	 Lietuvių kalba	LT		5		 日本語	JP		9



Червен ветриловиден клен Acer palmatum atropurpureum Яркочервен малък външен бонсай

Благодарение на изчистената си форма с полукръгла корона, японският клен е популярно малко дърво в дизайна на бонсай. Терминът palmatum произлиза от латинското palma = длан и се отнася до пръстовидно нарязани листа. Тъмночервените листа стават яркочервени през есента, преди дървото да се разлисти през зимата. **Естествено местоположение:** Японският клен първоначално се среща в североизточен Китай, както и в Япония и Корея, където обича да расте като малко дърво в сенчести гори. В Япония се отглежда като декоративно дърво, а също и като бонсай. **Успешно отглеждане:** Отглеждането е възможно цялгодишно. Поставете семето в найлонова торбичка в обикновената част на хладилника за една седмица. Това ще го стимулира да поникне по-бързо. Едва след това го поставете на около сантиметър дълбочина във влажна почва за отглеждане. Покрийте съда с култура с домакинско фолио, което сте осигурили с дупки. Това предпазва почвата от изсушаване. Трябва да отстранявате фолиото за 2 часа на всеки два до три дни. Това предотвратява образуването на мухъл върху растящата почва. Поставете саксията със семена на светло и топло място с 20 до 25° по Целзий и поддържайте почвата влажна, но не мокра. Първите разсад трябва да се появят след десет до дванадесет седмици. **Най-доброто местоположение:** Японският клен предпочита слънчево до частично засенчено и защитено от вятър място. Върховете на листата са склонни да покафеняват на пълно слънце. **Оптимална грижа:** Acer расте в горния почвен слой със силни корени като плитки корени с много фини корени и следователно се нуждае от редовно и често поливане, като трябва да избягвате преовлажняване. Наторявайте растението редовно на всеки четири седмици от април до октомври с течен тор за бонсай. Японският клен е подходящ за всички изправени стилове и особено за свободно изправената форма, »Moyogi«. Редовната резитба след поникването води до фино разклоняване, което води и до намаляване на размера на листата. Винаги отрязвайте до два чифта листа, когато са се образували пет чифта листа. Можете също така да прищипнете новия растеж след подрязване за по-нататъшно усъвършенстване, като внимателно отчупите пъпките на втората двойка листа с върха на пръстите си. Като награда за тази работа ще получите фино разклоняване на клоните. Тънките, дървесни клонки са лесни за свързване. Най-добре е да пресадите японския клен в началото на март, когато пъпките му набъбват. По-младите бонсай се трансплантират в търговска почва за бонсай на разстояние от две, а по-старите растения само на всеки пет до десет години. **През зимата:** През зимните месеци нуждата от вода след окапването на листата е значително по-малка. Но дори и през зимата растението не трябва да изсъхва. Защитено, хладно място без твърде много минусови температури сега е идеално, защото корените не понасят силни студове. Препоръчва се и защита от вятър, за да се предотврати изсъхването на фините клони.



Rød vifte ahorn Acer palmatum atropurpureum Lyserød lille udendørs bonsai

På grund af sin yndefulde form med en halvcirkelformet krone er den japanske ahorn et populært lille træ i bonsai-design. Udtrykket palmatum stammer fra det latinske palma = palme og henviser til de fingerlignende spalteblade. De mørkerøde blade bliver lyserøde om efteråret, før træet fælder bladene om vinteren. **Naturlig beliggenhed:** Den japanske ahorn findes oprindeligt i det nordøstlige Kina samt i Japan og Korea, hvor den ynder at vokse som et lille træ i skyggefulde skove. I Japan dyrkes det som et prydt træ og også som en bonsai. **Successful dyrkning:** Dyrkning er mulig hele året rundt. Put den Frø i en plastikpose i den almindelige køleskabsafdeling i en uge. Dette vil stimulere det til at spire hurtigere. Først derefter indstilles Planten den cirka en tomme dyb i fugtig pottejord. Dæk dyrkningskarret til med husholdningsfilm, som du forsyner med huller. Dette beskytter jorden mod udtørring. Du bør fjerne folien i 2 timer hver anden til tredje dag. Dette forhindrer mug i at dannes på den voksende jord. Stil frøpotten et let og varmt sted med 20 til 25° Celsius og hold pottejorden fugtig, men ikke våd. De første frøplanter bør dukke op efter ti til tolv uger. **Den bedste beliggenhed:** Den japanske ahorn foretrækker et solrigt til delvist skygget og vindbeskyttet sted. Bladspidserne har en tendens til at blive brune i fuld sol. **Optimal pleje:** Aceren vokser i muldjorden med stærke rødder som lavvandede rødder med mange fine rødder og har derfor brug for regelmæssig og hyppig vanding, hvorved du skal undgå vandfyldning. Gød planten regelmæssigt hver fjerde uge fra april til oktober med flydende bonsai-gødning. Den japanske ahorn er velegnet til alle opretstående stilarter og især den frit opretstående form, »Moyogi«. Regelmæssig beskæring efter spiring resulterer i fin forgrening, hvilket også medfører en reduktion af bladernes størrelse. Klip altid tilbage til to blade, når der er dannet fem blade. Du kan også knibe den nye vækst efter beskæring for yderligere forfining ved forsigtigt at bryde knopperne ud af det andet bladpar med fingerspidserne. Som belønning for dette arbejde får du en fin forgrening af grenene. Tynde, træagtige kviste er nemme at tråde. Det er bedst at ompotte den japanske ahorn i begyndelsen af marts, når dens knopper svulmer op. Yngre bonsai transplanteres i kommercielt tilgængelig bonsai-jord i en afstand af to og ældre planter kun hvert femte til tiende år. **Om vinteren:** I vintermånederne er det Betydeligt lavere vandbehov efter bladtab. Men selv om vinteren bør planten ikke tørre ud. Et beskyttet, køligt sted uden for meget minusgrader er nu ideelt, fordi rødderne ikke tåler hård frost. Vindbeskyttelse anbefales også for at forhindre de fine grene i at tørre ud.



Roter Fächerahorn Acer palmatum atropurpureum Leuchtender roter kleiner Freiland-Bonsai

Aufgrund seiner grünen Form mit halbrunder Krone ist der Fächerahorn ein in der Bonsaigestaltung beliebter kleiner Baum. Der Begriff palmatum leitet sich vom lateinischen palma = Handfläche ab und weist auf die fingerartig geschlitzten Blätter hin. Die dunkelroten Blätter gehen im Herbst in leuchtendes Karminrot über, bevor der Baum zum Winter seine Blätter abwirft. **Naturstandort:** Der Fächer-Ahorn kommt ursprünglich im Nordosten Chinas sowie in Japan und Korea vor, wo er als kleiner Baum gern in schattigen Wäldern wächst. In Japan wird er als Zierbaum und auch als Bonsai gezogen. **Anzucht:** Die Anzucht ist das ganze Jahr über möglich. Legen Sie den Samen für eine Woche in einer Plastiktüte in den normalen Kühlschrankbereich. So wird er zur schnelleren Keimung angeregt. Erst dann setzen Sie ihn circa einen Zentimeter tief in feuchte Anzuchterde. Bedecken das Anzuchtgefäß mit Klarsichtfolie, die Sie mit Löchern versehen. So ist die Erde vor Austrocknung geschützt. Alle zwei bis drei Tage sollten Sie die Folie für 2 Stunden entfernen. Das beugt einer Schimmelbildung auf der Anzuchterde vor. Stellen Sie das Anzuchtgefäß an einen hellen und warmen Ort mit 20 bis 25° Celsius und halten Sie die Anzuchterde feucht, aber nicht nass. Nach zehn bis zwölf Wochen sollten die ersten Sämlinge erscheinen. **Standort:** Der Fächerahorn bevorzugt einen sonnigen bis halbschattigen und windgeschützten Standort. Auf volle Sonne reagieren die Blattspitzen gerne mit einer Braunfärbung. **Pflege:** Der Acer wächst im Oberboden stark durchwurzelt als Flachwurzler mit vielen Feinwurzeln und benötigt daher gleichmäßige und viele Wassergaben, wobei Sie Staunässe vermeiden sollten. Düngen Sie die Pflanze von April bis Oktober mit flüssigem Bonsaidünger regelmäßig alle vier Wochen. Der Fächerahorn eignet sich für alle aufrechten Stilarten und besonders die frei aufrechte Form, »Moyogi«. Bei einem regelmäßigen Schnitt nach dem Austrieb ergibt sich eine feine Verzweigung, die auch zu einer Verkleinerung der Blätter führt. Schneiden Sie immer auf zwei Blattpaare zurück, wenn sich fünf Blattpaare gebildet haben. Zudem können Sie den Neuaustrieb nach dem Rückschnitt zur weiteren Verfeinerung noch pinzieren, indem Sie die Knospen des zweiten Blattpaares mit den Fingerspitzen vorsichtig herausbrechen. Als Lohn dieser Arbeiten erhalten Sie eine feine Verzweigung der Äste. Verholzte dünne Zweige lassen sich gut drahten. Am besten topft man den Fächerahorn Anfang März um, wenn seine Knospen anschwellen. Jüngere Bonsai pflanzt man im Abstand von zwei und ältere Pflanzen nur alle fünf bis zehn Jahre in handelsübliche Bonsaierde um. Reduzieren Sie den Wurzelballen dabei um etwa ein Drittel und entfernen Sie verfilzte Wurzeln vollständig. **Im Winter:** In den Wintermonaten ist der Wasserbedarf nach dem Laubverlust deutlich geringer. Aber auch im Winter sollte die Pflanze nicht austrocknen. Ein geschützter kühler Standort ohne allzustarke Minusgrade ist jetzt ideal, weil die Wurzeln keinen starken Frost vertragen. Zudem ist ein Windschutz gegen das Austrocknen der feinen Äste empfehlenswert.



Bonsai - Red Japanese Maple Acer palmatum atropurpureum Bright red coloured, small Outdoor Bonsai

Due to its delicate shape with semicircular crown, the Red Japanese Maple is a popular small tree for bonsai cultivation. The word palmatum in its botanical name comes from the Latin word palma, which means palm of the hand, and points to the finger-like slotted leaves that change their dark red colour into a bright carmine red during autumn. Close to the winter season the tree will cast the leaves. **Natural location:** The Red Japanese Maple has its natural habitat in Northeast China, Japan and Korea, where it often grows in shady forests. In Japan it is being cultivated as ornamental tree and as bonsai. **Successful cultivation:** Seed propagation indoors is possible throughout the year. To increase the germinability, you should initially keep the seeds in the refrigerator for about a week. Then, plant the seeds about 1 cm deep into moist potting compost and cover the seed container with clear film to prevent the earth from drying out. Don't forget to make some holes in the clear film and take it every second or third day completely off for about 2 hours. That way you avoid mold formation on your potting compost. Place the seed container somewhere bright and warm with a temperature between 20°C and 25° Celsius and keep the earth moist, but not wet. The first seedlings will come up after ten to twelve weeks. **The best location:** The small tree prefers a sunny or half-shaded and wind-protected place. In the full sun, the tip of the leaves might get a brown colouring. **Optimal care:** The Red Japanese Maple is a shallow rooted tree that grows strong roots in the topsoil and develops many smaller fine roots. Therefore, it needs consistently plenty of water, but without waterlogging. From April until October you may give fluid fertilizer for bonsai plants every four weeks. The Red Japanese Maple is suited for all upright types of bonsai cultivation, especially the free upright form, Moyogi. With a consistent pruning after sprouting, you can achieve a neat ramification that also results in smaller leaves. Always cut back to only two pairs of leaves, as soon as the plant developed five pairs. Additionally you may refine the new shoots through pinching, by carefully taking out the buds of the second leaf pair with your fingertips. As a reward you will get a nice ramification of the branches. Slender, lignified twigs are good for wiring. The Red Japanese Maple can best be repotted at the beginning of March, when the buds start to swell - young plants should be shifted every two years and matured trees only every five to ten years. Ideally, you use common bonsai earth for potting and prune the clogged roots to one third of its size by taking especially the felted parts completely out. **In the winter:** In the winter time, after casting the leaves, the Red Japanese Maple needs considerably less watering, but see that it doesn't dry out. Since the roots are very limited frost-resistant, the best place for your plant is a sheltered, cool location without frost and preferably wind-protected to prevent the delicate branches from drying out.



Punane lehvikvaher Acer palmatum atropurpureum Erkpunane väike välibonsai

Tänu oma graatsilisele poolringikujulise krooniga kujule on Jaapani vaher populaarne väike puu bonsai disainis. Termin palmatum tuleneb ladinakeelsest sõnast palma = palm ja viitab sõrmetaoliste pilulehtedele. Tumeponased lehed muutuvad sügisel helepunaseks, enne kui puu talvel lehed maha ajab. **Looduslik asukoht:** Jaapani vahtar leidub algselt nii Kirde-Hiinas kui ka Jaapanis ja Koreas, kus talle meeldib kasvada väikese puuna varjulistes metsades. Jaapanis kasvatatakse seda ilupuuna ja ka bonsaina. **Edukas kasvatamine:** Kasvatamine on võimalik aastaringiselt. PannaSeemned kilekotis tavalises külmkapis nädalaks. See stimuleerib seda kiiremini idanema. Alles seejärel seadkelstutuge see umbes tolli sügavusele niiskesse potimulda. Kata kultuurianum toidukilega, mille varustad aukudega. See kaitsneb mulda kuivamise eest. Peaksite fooliumi eemaldama 2 tunniks iga kahe kuni kolme päeva järel. See takistab hallituse teket kasvupinnal. Asetage külvipott valgusküllasesse ja sooja kohta, mille temperatuur on 20–25 ° C, ning hoidke istutusmuld niiskena, kuid mitte märjana. Esimesed seemikud peaksid ilmuma kümne kuni kaheteistkümne nädala pärast. **Parim asukoht:** Jaapani vaher eelistab päikeselist kuni osaliselt varjulist ja tuule eest kaitstud kasvukohta. Lehtede tipud kipuvad päikese käes pruuniks minema. **Optimaalne hooldus:** Acer kasvab tugevate juurtega pinnases madalate juurtena, millel on palju peeneid juuri ja vajab seetõttu regulaarset ja sagedast kastmist, mistõttu peaksite vältima vettimist. Väetage taime regulaarselt iga nelja nädala järel aprillist oktoobrini vedela bonsai väetisega. Jaapani vaher sobib kõikidele püstistele stiilidele ja eriti vabalt püstisele vormile «Moyogi». Regulaarne pügamine pärast võrsumist toob kaasa peene hargnemise, mis toob kaasa ka lehtede suuruse vähenemise. Lõika alati tagasi kahe paari lehtedeni, kui on moodustunud viis paari lehti. Võite ka pärast pügamist uut kasvu näpistada, et veelgi täpsustada, murdes teise lehepaari pungad sõrmeotstega ettevaatlikult välja. Selle töö eest saate tasu peene okste hargnemise. Peenikesi puitunud oksa on lihtne traatida. Jaapani vaher on kõige parem ümber istutada märtsi alguses, kui selle pungad paisuvad. Nooremaid bonsaid siirdatakse kaubanduslikult saadavasse bonsai pinnasesse kahe ja vanema taime kaugusel ainult iga viie kuni kümne aasta järel. **Talvel:** Talvekuudel on Oluliselt väiksem veevajadus pärast lehtede kadumist. Kuid isegi talvel ei tohiks taim kuivada. Varjatud ja jahe asukoht, kus pole liiga palju miinustemperatuure, on nüüd ideaalne, sest juured ei talu tugevat külma. Peente okste kuivamise vältimiseks on soovitatav kasutada ka tuulekaitset.



Punainen tuuletinvaahtera Acer palmatum atropurpureum Kirkkaan punainen pieni ulkobonsai

Puoliympyrän muotoisen kruunun ansiosta japanilainen vaahtera on suosittu pieni puu bonsai-designissa. Termi palmatum on johdettu latinan sanasta palma = palm ja viittaa sormenmuotoisiin halkeamiin lehtiin. Tummanpunaiset lehdet muuttuvat kirkkaan ruskeiksi syksyllä ennen kuin puu pudottaa lehtiään talvella. **Luonnollinen sijainti:** Japanilaista vaahteraa tavataan alun perin Koillis-Kiinassa sekä Japanissa ja Koreassa, missä se kasvaa mielellään pienenä puuna varjoisissa metsissä. Japanissa sitä kasvatetaan koristepuuna ja myös bonsaina. **Onnistunut viljely:** Viljely on mahdollista ympäri vuoden. LaittaaSiemenet muovipussissa tavallisessa jääkaappiosassa viikon ajan. Tämä stimuloi sitä itämää nopeammin. Aseta vasta sitten istuta se noin tuuman syvyyteen kosteaan ruukkumaahan. Peitä viljelyastia kelmulla, johon on tehty reikiä. Tämä suojaaa maaperää kuivumiselta. Poista folio 2 tunnin ajaksi kahden tai kolmen päivän välein. Tämä estää homeen muodostumisen kasvumaahan. Aseta siemenruukku valoisaan ja lämpimään paikkaan, jonka lämpötila on 20–25 °C, ja pidä istutusmaa kosteana, mutta ei märkänä. Ensimmäisten taimien pitäisi ilmestyä kymmenen tai kahdentoista viikon kuluttua. **Paras sijainti:** Japanilainen vaahtera suosii aurinkoista tai osittain varjostettua ja tuulelta suojattua paikkaa. Lehtien kärjet yleensä muuttuvat ruskeiksi täydessä auringossa. **Optimaalinen hoito:** Acer kasvaa pintamaassa, jossa on vahvat juuret, matalina juurina, joissa on monia hienojakoisia juuria, ja siksi se tarvitsee säännöllistä ja toistuvaa kastelua, joten sinun tulee välttää kastamista. Lannoita kasvi säännöllisesti neljän viikon välein huhtikuusta lokakuuhun nestemäisellä bonsai-lannoitteella. Japanilainen vaahtera sopii kaikkiin pystytyyleihin ja erityisesti vapaasti pystysuoraan muotoon «Moyogi». Säännöllinen karsiminen itämisen jälkeen johtaa hienoon haarautumiseen, mikä johtaa myös lehtien koon pienentämiseen. Leikkaa aina kahdeksi lehtipariksi, kun viisi lehtiparia on muodostunut. Voit myös nipistää uutta kasvua karsimisen jälkeen lisähienotusta varten irrottamalla varovasti sormenpäilläsi toisen lehtiparin silmut. Palkintona tästä työstä saat hienon oksien haarautumisen. Ohuet, puumaiset oksat on helppo lankata. Japanilainen vaahtera on parasta istuttaa uudelleen maaliskuun alussa, kun sen silmut turpoavat. Nuoremmat bonsai istutetaan kaupallisesti saatavilla olevaan bonsai-maahan kahden ja vanhemman kasvin itäisytydelä vain viiden tai kymmenen vuoden välein. **Talvella:** Talvikuukausina se onHuomattavasti pienempi vedentarve lehtien häviämisen jälkeen. Mutta jopa talvella kasvin ei pitäisi kuivua. Suojainen, viileä paikka, jossa ei ole liikaa pakkasta, on nyt ihanteellinen, koska juuret eivät siedä kovaa pakkasta. Myös tuulensuojaa suositellaan estämään hienojen oksien kuivuminen.



Erable du Japon pourpre Acer palmatum atropurpureum Petit bonsai de jardin rouge brillant

L'érable du Japon est un petit bonsai populaire grâce à sa forme élégante et sa couronne semi-circulaire. Le terme palmata vient du latin palma = paume et fait allusion aux feuilles fendues en forme de doigt. Les feuilles rouge foncé se colorent en carmin vivifiant avant que l'arbre ne jette ses feuilles pour l'hiver. **Emplacement naturel:** L'érable du Japon vient du nord-est de la Chine, ainsi que du Japon et de la Corée, où elle croît dans les forêts ombragées. Il sert d'arbre ornemental et même de bonsai au Japon. **Culture réussie:** La culture des graines est possible tout au long de l'année. Mettez les graines dans un sac plastique dans le réfrigérateur pendant une semaine. Ceci stimule la germination. Ensuite, mettez les graines dans du substrat humide à environ un centimètre de profondeur. Couvrez le récipient avec une feuille transparente dans laquelle vous faites des trous. Comme ça, le terreau est protégé du dessèchement. Vous devez enlever la feuille pendant deux heures tous les deux ou trois jours. Ceci prévient la formation de moisissures dans le terreau. Mettez le récipient dans un endroit lumineux et chaud de 20° à 25° Celsius et gardez le terreau humide, mais pas mouillé. Les premiers semis apparaissent après dix à douze semaines. **Le meilleur emplacement:** L'érable du Japon a besoin d'un emplacement ensoleillé à mi-ombragé et protégé du vent. La pointe des feuilles réagit au plein soleil avec une coloration brune. **Soins optimaux:** Comme il s'agit d'une plante à racines plates, l'érable du Japon croît avec un grand nombre de racines fines dans la terre végétale et a donc besoin d'un arrosage régulier et copieux. Évitez l'eau stagnante. Engraissez la plante toutes les quatre semaines d'avril à octobre avec de l'engrais liquide pour bonsais. L'érable du Japon s'adapte à tous les styles et surtout à la forme libre Moyogi. Une taille régulière après la pousse donne une ramification fine qui mène aussi à une diminution de la taille des feuilles. Coupez toujours deux paires de feuilles lorsque cinq paires de feuilles se sont formées. De plus, vous pouvez pincer la nouvelle pousse après la taille pour la raffiner encore plus en cassant les bourgeons de la deuxième paire de feuilles prudemment avec le bout du doigt. La récompense sera une fine ramification de la branche. Les branches minces et ligneuses peuvent être bien ligaturées. Rempotez l'érable du Japon de préférence en mars lorsque ses bourgeons gonflent. Les jeunes bonsais sont rempotés tous les deux ans et les bonsais plus anciens tous les cinq à dix ans dans du terreau de bonsai commercial. Raccourcissez la motte de racines d'environ un tiers et enlevez les racines emmêlées. **En hiver:** Le besoin en eau est considérablement plus faible après la chute des feuilles en hiver. Par contre, la plante ne doit pas se dessécher en hiver. Un emplacement protégé et froid sans de températures glaciales trop fortes et idéal, car les racines ne supportent pas le gel. Il est aussi conseillé d'avoir une protection du vent pour que les branches fines ne se dessèchent pas.



Κόκκινος ανεμιστήρας σφενδάμου Acer palmatum atropurpureum Φωτεινό κόκκινο μικρό υπαίθριο μπονσάι

Λόγω του χαριτωμένου σχήματός του με ημικυκλική κορώνα, ο ιαπωνικός σφένδαμος είναι ένα δημοφιλές μικρό δέντρο σε σχέδιο μπονσάι. Ο όρος palmatum προέρχεται από το λατινικό palma = παλάμη και αναφέρεται στα φύλλα που μοιάζουν με δάχτυλο. Τα σκούρα κόκκινα φύλλα γίνονται λαμπερά κατακόκκινα το φθινόπωρο πριν το δέντρο ρίξει τα φύλλα του το χειμώνα. **Φυσική τοποθεσία:** Ο ιαπωνικός σφένδαμος βρίσκεται αρχικά στη Βορειοανατολική Κίνα καθώς και στην Ιαπωνία και την Κορέα, όπου του αρέσει να μεγαλώνει ως μικρό δέντρο σε σκιά ή δάση. Στην Ιαπωνία καλλιεργείται ως καλλιπωτικό δέντρο αλλά και ως μπονσάι. **Επιτυχημένη καλλιέργεια:** Η καλλιέργεια είναι δυνατή όλο το χρόνο. Βάλτε ταπλόροι σε πλαστική σακούλα στο κανονικό τμήμα του ψυγείου για μια εβδομάδα. Αυτό θα τονώσει να φυτρώσει πιο γρήγορα. Μόνο τότε ρυθμίστεΦυτέψτε το περίπου μια ίντσα βαθιά σε υγρό χώμα γλάστρας. Καλύψτε το δοχείο καλλιέργειας με μεμβράνη, την οποία ανοίγετε με τρύπες. Αυτό προστατεύει το έδαφος από το στέγνωμα. Θα πρέπει να αφαιρείτε το αλουμινοχαρτό για 2 ώρες κάθε δύο έως τρεις ημέρες. Αυτό αποτρέπει τη δημιουργία μούχλας στο αναπτυσσόμενο έδαφος. Τοποθετήστε τη γλάστρα σε ένα ελαφρύ και ζεστό μέρος με θερμοκρασία 20 έως 25° Κελσίου και διατηρήστε το χώμα της γλάστρας υγρό αλλά όχι υγρό. Τα πρώτα σπορόφυτα πρέπει να εμφανιστούν μετά από δέκα έως δώδεκα εβδομάδες. **Η καλύτερη τοποθεσία:** Ο ιαπωνικός σφένδαμος προτιμά μια ηλιόλουστη έως μερικώς σκιασμένη και προστατευμένη από τον αέρα τοποθεσία. Οι άκρες των φύλλων τείνουν να γίνονται καφέ στον ήλιο. **Βέλτιστη φροντίδα:** Το Acer αναπτύσσεται στο φυτικό έδαφος με δυνατές ρίζες σαν ριζές με πολλές λεπτές ρίζες και γι' αυτό χρειάζεται τακτικό και συχνό πότισμα, οπότε θα πρέπει να αποφυγείτε την υπερχέλιση. Λιπαίνετε το φυτό τακτικά κάθε τέσσερις εβδομάδες από τον Απρίλιο έως τον Οκτώβριο με υγρό λίπασμα μπονσάι. Το ιαπωνικό σφενδάμι είναι κατάλληλο για όλα τα όρθια στυλ και ειδικά για την ελεύθερη όρθια μορφή «Moyogi». Το τακτικό κλάδεμα μετά τη βλάστηση έχει ως αποτέλεσμα τη λεπτή διακλάδωση, η οποία οδηγεί επίσης σε μείωση του μεγέθους των φύλλων. Κόβετε πάντα σε δύο ζευγάρια φύλλα όταν έχουν σχηματιστεί πέντε ζεύγη φύλλων. Μπορείτε επίσης να τσιμπήσετε τη νέα ανάπτυξη μετά το κλάδεμα για περαιτέρω βελτίωση, απλώνοντας προσεκτικά τα μπουμπούκια του δεύτερου ζεύγους φύλλων με τις άκρες των δακτύλων σας. Ως ανταμοιβή για αυτή τη δουλειά, θα λάβετε μια ωραία διακλάδωση των κλαδιών. Τα λεπτά, ζυγώδη κλαδιά είναι εύκολο να σφραγιστούν. Είναι καλύτερα να επανατοποθετήσετε τον ιαπωνικό σφένδαμο στις αρχές Μαρτίου, όταν τα μπουμπούκια του διογκώνονται. Τα νεότερα μπονσάι μεταφυτεύονται σε εμπορικά διαθέσιμο χώμα μπονσάι σε απόσταση δύο και μεγαλύτερων φυτών μόνο κάθε πέντε έως δέκα χρόνια. **Το χειμώνα:** Τους χειμερινούς μήνες είναι εξαιρετικά χαμηλότερη απαίτηση σε νερό μετά την απώλεια φύλλων. Αλλά ακόμη και το χειμώνα, το φυτό δεν πρέπει να στεγνώσει. Μια προστατευμένη, δροσερή τοποθεσία χωρίς υπερβολικές θερμοκρασίες κάτω από το μηδέν είναι πλέον ιδανική, επειδή οι ρίζες δεν ανέχονται σοβαρό παγετό. Συνιστάται επίσης προστασία από τον αέρα για να αποφευχθεί η ξήρανση των λεπτών κλαδιών.



Maple lucht leanúna dearg

Acer palmatum atropurpureum

Bonsai beag dearg geal amuigh faoin aer

Mar gheall ar a chruth galánta le coróin leathchiorclach, is crann beag coitianta é maple na Seapáine i ndearadh bonsai. Díorthaítear an téarma palmatum ón Laidin palma = pailme agus tagraíonn sé do na duilleoga scoilte meánóg. Casann na duilleoga dorch dearga corcairdhearg geal san fhómhar sula gcailleann an crann a dhuilleoga sa gheimhreadh. **Suíomh nádúrtha:** Tá an maple Seapánach le fáil ar dtús in oirthuaisceart na Síne agus sa tSeapáin agus sa Chóiré, áit ar maith leis fás mar chrann beag i bhforaoisí scáthacha. Sa tSeapáin fástar é mar chrann ornáideach agus freisin mar bonsai. **Saothrú rathúil:** Is féidir saothrú ar feadh na bliana. Cuir anSólta i málá plaisteach sa rannóg cuisneoir rialta ar feadh seachtaine. Spreagfaidh sé seo é a phéacadh níos tapúla. Ach ansin a leagtarCuir é thart ar orlach domhain in ithir potaithe tais. Clúdaigh an soitheach cultúir le scannán cling, a sholáthraíonn tú le poill. Cosnaíonn sé seo an ithir ó thriomú amach. Ba chóir duit an scragall a bhaint ar feadh 2 uair gach dhá nó trí lá. Cuireann sé seo cosc ar mhúlna a fhoirmiú ar an ithir atá ag fás. Cuir an pota solta in áit éadrom te ag 20 go 25 ° Celsius agus coinnigh an ithir potaithe tais ach ní fliuch. Ba chóir go mbeadh na chéad síológa le feiceáil tar éis deich go dhá sheachtain déag. **An suíomh is fearr:** Is fearr le maple na Seapáine suíomh griannhar go páirteach scáthaithe agus cosanta ag an ngaoth. Is gnách go n-iompaíonn leideanna na duilleoga donn ar an ghrian iomlán. **Cúram is fearr is féidir:** Fásann an Acer sa bharrthír le fréamhacha láidre mar fhreámhacha éadomhain le go leor fréamhacha mín agus mar sin tá gá le huiscíu rialta agus minic, rud ar chóir duit uisce a sheachaint. Fertilize an planda go rialta gach ceithre seachtaine ó Aibreán go Deireadh Fómhair le leasachán bonsai leachtach. Tá an maple Seapánach oiriúnach do gach stíl ina seasamh agus go háirithe an fhoirm ina seasamh faoi shaoirse, "Moyogi". Mar thoradh ar bhearradh rialta tar éis sprouting tá branching fineáil, rud a fhágann go laghdaítear méid na duilleoga freisin. Gearr siar go dtí dhá phéire duilleoga i gcónaí nuair a bhíonn cúig phéire duilleoga déanta. Is féidir leat an fás nua a phionnadh freisin tar éis bearradh le haghaidh tuilleadh mionchoigeartaithe trí bachlóga an dara péire duilleoga a bhriseadh amach go cúramach le do mhéara. Mar luach saothair as an obair seo, gheobhaidh tú craobhacha breátha de na brainsí. Is furasta craobhóga tanáí adhmaid a shreangú. Is fearr an maple Seapánach a athchur go luath i mí an Mhárta nuair a bhíonn a bachlóga ag at. Déantar bonsai níos óige a thrasphlandú in ithir bonsai atá ar fáil go tráchtála ar fad idir dhá phlanda agus plandaí níos sine ach gach cúig go deich mbliana. **Sa gheimhreadh:** I míonna an gheimhridh tá séRiachtanas uisce go suntasach níos ísle tar éis cailteanas duille. Ach fiú sa gheimhreadh, níor chóir an gléasra a thriomú. Tá suíomh fothain, fionnuar gan an iomarca teochtáí fo-nialas oiriúnach anois mar ní fhulaingíonn na fréamhacha sioc mór. Moltar cosaint gaoithe freisin chun na brainsí fineáil a chosc ó thriomú amach.



Rauður viftu hlynur

Acer palmatum atropurpureum

Skærrautt lítið úti bonsai

Vegna tignarlegrar lögunar með hálfhringlaga kórónu er japanski hlynurinn vinsælt lítið tré í bonsai hönnun. Hugtakið palmatum er dregið af latnesku palma = löfa og vísar til fingralíkra rifblaða. Dökkrauðu laufin verða skærrauð á haustin áður en tréð fellir laufin á veturna. **Náttúruleg staðsetning:** Japanski hlynurinn er upphaflega að finna í norðausturhluta Kína sem og í Japan og Kóreu, þar sem hann vill gjarnan vaxa sem lítið tré í skuggalegum skógum. Í Japan er það ræktað sem skrauttré og einnig sem bonsai. **Árangursrik ræktun:** Ræktun er möguleg allt árið um kring. SettuFræ í plastpoka í venjulegum kælihluta í viku. Þetta mun örva það til að spíra hraðar. Aðeins þá stilltGróðursettu það um það bil tommu djúpt í rökum pottajarðvegi. Hyljið ræktunarlítið með matarfilmu, sem þú útvegar með götum. Þetta verndar jarðvegin gegn þurrkun. Þú ættir að fjarlægja álpappírinn í 2 klukkustundir á tveggja til þriggja daga fresti. Þetta kemur í veg fyrir að mygla myndist á vaxandi jarðvegi. Settu fræpottinn á léttan og heitan stað með 20 til 25° Celsius og haltu pottajarðveginum rökum en ekki blautum. Fyrstu plönturnar ættu að birtast eftir tíu til tólf vikur. **Besta staðsetningin:** Japanski hlynurinn vill frekar sólríkan stað en hálfskygðan og vindverndaðan stað. Endar laufanna hafa tilhneigingu til að verða brúnir í fullri sól. **Besta umönnun:** Acer vex í gróðurmoldinni með sterkum rótum sem grunnar rætur með mörgum finum rótum og þarf því reglulega og tíða vökvun, þannig að forðast ætti vatnslosun. Frjóvgaðu plöntuna reglulega á fjögurra vikna fresti frá apríl til október með fljótandi Bonsai áburði. Japanski hlynurinn hentar öllum uppréttum stílum og sérstaklega frjálsglega upprétu forminu, »Moyogi«. Regluleg klipping eftir spírun veldur finum greiningu sem einnig leiðir til lækkunar á stærð laufanna. Skerið alltaf aftur í tvö laufapör þegar fimm laufapör hafa myndast. Þú getur líka klipað nýja vöxtinn eftir klippingu til frekari betrunbóta með því að brjóta varlega út bruma annars laufaparsins með fingurgómunum. Í verðlaun fyrir þetta starf færðu fina greiningu á greininum. Auðvelt er að víra þunna, viðarkennað kvisti. Best er að umpotta japanska hlynnum í byrjun mars þegar brum hans eru að bólga. Yngri bonsai eru ígrædd í almennt fánlegur bonsai jarðveg í fjarlægð tveggja og eldri plantna aðeins á fimm til tíu ára fresti. **A veturna:** Á vetrarmánuðunum er þaðVerulega minni vatnspörf eftir laufmissi. En jafnvel á veturna ætti plöntan ekki að þorna. Skjólslæ og kaldur staðsetning án of mikils frosts er nú tilvalin vegna þess að ræturnar pola ekki mikið frost. Einnig er mælt með vindvörn til að koma í veg fyrir að finu greinarnar þorni.



Acero palmato rosso

Acer palmatum atropurpureum

Piccolo bonsai da esterno dal colore rosso brillante

A causa della sua forma gracile dalla chioma semisferica, l'acero palmato rosso è un piccolo albero che si fa apprezzare nella coltivazione dei bonsai. La denominazione palmatum deriva dal latino palma = palmo della mano, in riferimento alla foglia divisa in 5 lobi, come le dita di una mano. Le foglie di color rosso scuro si tingono in autunno di un rosso carminio brillante, prima di cadere in inverno. **Posizione naturale:** L'acero palmato rosso è nativo del nord-est della Cina così come di Giappone e Corea, dove cresce come piccolo albero nelle foreste ombreggiate. In Giappone viene coltivato come albero ornamentale e anche come Bonsai. **Coltivazione riuscita:** La coltivazione da semi in casa è possibile durante tutto l'anno. Lasciate i semi per una settimana in una busta di plastica dentro il frigorifero, per aumentarne la germinabilità. In seguito collocate i semi a circa un centimetro di profondità nel substrato di coltivo umido. Coprite il recipiente di coltivazione con pellicola trasparente, sulla quale praticherete dei fori, in questo modo la terra eviterà di seccarsi. Ogni due o tre giorni rimuovete la pellicola per 2 ore, per prevenire la formazione di muffe sulla terra. Collocate il recipiente di coltivazione in un luogo luminoso e caldo, a una temperatura fra i 20° e i 25°C e mantenete il substrato umido, ma non bagnato. Le prime piantine dovrebbero spuntare da dieci a dodici settimane dopo. **La posizione migliore:** L'acero giapponese rosso predilige ambienti soleggiati fino a mezz'ombra, riparati dal vento, al pieno sole le punte delle foglie diventano marroni. **Cura ottimale:** L'Acero radica superficialmente, con molte radici sottili ma robuste, per questo ha bisogno di molte innaffiature, evitando i ristagni idrici. Da aprile a ottobre, concimate regolarmente la pianta con fertilizzante liquido per bonsai ogni quattro settimane. L'Acero palmato si adatta a tutti gli stili eretti e in particolare allo stile eretto Moyogi. Cimdandolo regolarmente dopo lo spuntare dei germogli si ottiene una bella ramificazione, che porta anche al rimpicciolimento delle foglie. Tagliate sempre due coppie di foglie, quando si sono sviluppate cinque coppie. Dopo la potatura potete stringere ancora il nuovo getto per un ulteriore affinamento, asportando delicatamente i germogli della seconda coppia di foglie con la punta delle dita. Come ricompensa per questo lavoro otterrete una bella ramificazione della pianta. I rami lignificati sottili si lasciano legare facilmente. E' preferibile rinvasare l'Acero palmato all'inizio di marzo, allo sbocciare dei germogli. Trapiantate i bonsai giovani ogni due anni, quelli più adulti ogni cinque - dieci anni, in terra per bonsai disponibile in commercio. Per quest'operazione riducete di circa un terzo il pane di radici, e rimuovete completamente le radici aggrovigliate. **In inverno:** Nei mesi invernali il fabbisogno d'acqua dopo la caduta delle foglie è piuttosto scarso, ma la pianta non dovrebbe seccare neppure in inverno. In questo periodo è ideale scegliere un ambiente riparato e fresco, con temperature che non scendano troppo sotto lo zero. E' inoltre consigliabile una protezione dal vento, per evitare che le ramificazioni delicate si seccino.



Crveni lepezasti javor

Acer palmatum atropurpureum

Jarko crveni mali vanjski bonsai

Zbog svog gracioznog oblika s polukružnom krošnjom, japanski javor je popularno stablo u bonsai dizajnu. Izraz palmatum potječe od latinskog palma = dlan i odnosi se na prstasto razrezane listove. Tamnocrveno lišće postaje jarko grimizno u jesen prije nego stablo zimi odbaci lišće. **Zemlja porijekla:** Japanski javor izvorno se nalazi u sjeveroistočnoj Kini, kao iu Japanu i Koreji, gdje voli rasti kao malo drvo u sjenovitim šumama. U Japanu se uzgaja kao ukrasno drvo, ali i kao bonsai. **Uspješan uzgoj:** Uzgoj je moguć tijekom cijele godine. StaviSjeme u plastičnoj vrećici u redovnom dijelu hladnjaka tjedan dana. To će ga potaknuti na brže klijanje. Tek tada postavitePosadite ga otprilike jedan inč duboko u vlažnu zemlju za posude. Posudu s kulturom prekritje prozirnom folijom koju ste opremili rupama. To štiti tlo od isušivanja. Svaka dva do tri dana skinite foliju na 2 sata. Time se sprječava stvaranje plijesni na tlu za uzgoj. Stavite posudu za sjeme na svijetlo i toplo mjesto s 20 do 25° Celzijia i održavajte tlo za saksije vlažnim, ali ne mokrim. Prve sadnice trebale bi se pojaviti nakon deset do dvanaest tjedana. **Najbolja lokacija:** Japanski javor voli sunčano do djelomično zasjenjeno i od vjetra zaštićeno mjesto. Vrhovi lišća imaju tendenciju da postanu smeđi na punom suncu. **Optimalna njega:** Acer raste u površinskom sloju tla s jakim korijenjem kao plitkim korijenjem s mnogo sitnih korijena i stoga ga je potrebno redovito i često zalijevati, pri čemu treba izbjegavati nakupljanje vode. Gnojite biljku redovito svaka četiri tjedna od travnja do listopada tekućim gnojivom za bonsai. Japanski javor je pogodan za sve uspravne stilove, a posebno za slobodno uspravnu formu, »Moyogi«. Redovita rezidba nakon nicanja rezultira finim grananjem, što također dovodi do smanjenja veličine lišća. Uvijek režite na dva para listova kada se formira pet pari listova. Također možete pristipnuti novi rast nakon rezidbe radi daljnjeg poboljšanja tako da pažljivo vršcima prstiju izlomite pupoljke drugog para lišća. Kao nagradu za ovaj rad, dobit ćete fino grananje grana. Tanke, drvenaste grančice lako se ožiču. Najbolje je presaditi japanski javor početkom ožujka kada mu pupoljci nabubre. Mlađi bonsai presađuju se u komercijalno dostupnu zemlju za bonsai na razmak od dvije, a starije biljke tek svakih pet do deset godina. **U zimi:** U zimskim mjesecima jeZnačajno niža potreba za vodom nakon gubitka lišća. Ali čak i zimi, biljka se ne bi trebala sušiti. Zaštićeno, hladno mjesto bez previsokih temperatura ispod ništice sada je idealno jer korijenje ne podnosi jak mrz. Također se preporučuje zaštita od vjetra kako bi se spriječilo sušenje finih grana.



Sarkanā vēdekļa kļava

Acer palmatum atropurpureum

Koši sarkans mazs āra pundurkociņš

Pateicoties savai graciozai formai ar pusapaļa vainagu, japāņu kļava ir populārs mazs koks pundurkociņu dizainā. Termins palmatum ir atvasināts no latīņu valodas palma = palma un attiecas uz pirkstiem līdzīgām šķēļumiem. Tumši sarkanās lapas rudenī kļūst spilgti tumšsarkanas, pirms koks ziemā nomet lapas. **Dabiska vieta:** Japānas kļava sākotnēji ir sastopama Ķīnas ziemeļaustrumos, kā arī Japānā un Korejā, kur tai patīk augt kā mazam kokam ēnainos mežos. Japānā to audzē kā dekoratīvo koku un arī kā pundurkociņu. **Veiksmīga audzēšana:** Audzēšana iespējama visu gadu. Ielieciet Sēklas plastmasas maisiņā parastajā ledusskapja daļā nedēļu. Tas stimulēs to ātrāk dīgt. Tikai pēc tam iestatiet Stādiet to apmēram collu dziļi mitrā podīn zemē. Nosedziet kultivēšanas trauku ar pārtikas plēvi, kuru nodrošina ar caurumiem. Tas pasargā augsnī no izžūšanas. Jums vajadzētu ņemt foliju 2 stundas ik pēc divām līdz trim dienām. Tas novērš pelējuma veidošanos augošajā augsnē. Novietojiet sēklu podu gaišā un siltā vietā ar temperatūru 20 līdz 25 ° C un turiet augsnī mitru, bet ne mitru. Pirmajiem stadiem vajadzētu parādīties pēc desmit līdz divpadsmit nedēļām. **Labākā atrašanās vieta:** Japāņu kļava dod priekšroku saulainai vai daļēji noēnotai un no vēja aizsargātai vietai. Lapu galiem ir tendence kļūt brūniem pilnā saulē. **Optimāla aprūpe:** Acer aug augšnes virskārtā ar spēcīgām saknēm kā sekla saknes ar daudzām smalkām saknēm, un tāpēc tai ir nepieciešama regulāra un bieža laistīšana, tādējādi izvairoties no aizsērēšanas. Mēslojiet augu regulāri ik pēc četrām nedēļām no aprīļa līdz oktobrim ar šķīdru pundurkociņu mēslojumu. Japāņu kļava ir piemērota visiem stāvos stiliem un jo īpaši brīvi stāvošajai formai "Moyogi". Regulāra atzarošana pēc dīgšanas rada smalku sazarojumu, kas arī samazina lapu izmēru. Vienmēr nogrieziet līdz diviem lapu pāriem, kad ir izveidojušies pieci lapu pāri. Jūs varat arī satvert jauno augumu pēc atzarošanas, lai to turpinātu uzlabot, uzmanīgi ar pirkstu galiem izlaužot otrā lapu pāra pumpurus. Kā atdzībību par šo darbu saņemsiet smalku zaru atzarojumu. Tievus, kokainus zarus ir viegli stiept. Japāņu kļavu vislabāk pārstādīt marta sākumā, kad tās pumpuri uzbriest. Jaunākā pundurkociņš tiek pārstādīts komerciāli pieejamā pundurkociņa augsnē divu un vecāku augu attālumā tikai reizi piecos līdz desmit gados. **Ziemā:** Ziemas mēnešos tā ir ļēvājama mazāka ūdens nepieciešamība pēc lapu zuduma. Bet pat ziemā augam nevajadzētu izžūt. Patvērta, vēsa vieta bez pārāk zemas nulles tagad ir ideāla, jo saknes nepanes stipru salu. Ieteicama arī aizsardzība pret vēju, lai smalkie zari neizžūtu.



Raudonas vēduoklinis kļavas

Acer palmatum atropurpureum

Ryškiai raudonas mažas lauko bonsas

Dēļ savo grakščios formas su pusapvaliu vainiku japoninis kļavas yra populiarus mažas bonsai dizaino medis. Terminas palmatum kilęs iš lotyniško žodžio palma = palmė ir reiškia į pirštą panašius plyšinius lapus. Tamsiai raudoni lapai rudenį nusidažo ryškiai tamsiai raudona spalva, prieš medžiui numetant lapus žiemą. **Natūrali vieta:** Japoninis kļavas iš pradžių randamas šiaurės rytų Kinijoje, taip pat Japonijoje ir Korėjoje, kur jis mėgsta augti kaip mažas medis pavėsinguose miškuose. Japonijoje auginamas kaip dekoratyvinis medis, taip pat kaip bonsai. **Sėkmingas auginimas:** Galima auginti ištisus metus. Įdėti Sėklos plastikiniame maišelyje įprastoje šaldytuvo dalyje savaitę. Tai paspartins jų greičiau sudygti. Tik tada nustatykite Pasodinkite jį maždaug colio gyliu drėgnoje vazoninėje žemėje. Kultūros indą uždenkite maistine plėvele, kurioje yra skylės. Tai apsaugo dirvą nuo išdžiūvimo. Kas dvi ar tris dienas 2 valandas nuimkite foliją. Tai neleids žemėje dirvoje susidaryti pelėsiui. Sėklų vazoną pastatykite šviesioje ir šiltoje vietoje, kurios temperatūra yra 20–25 ° C, o vazono žemė turi būti drėgna, bet ne šlapia. Pirmieji daigai turėtų pasirodyti po dešimties-dvylikos savaičių. **Geriausia vieta:** Japoninis kļavas renkasi saulėtą, o ne iš dalies pavėsį ir apsaugotą nuo vėjo vietą. Visoje saulėje lapų galiukai linkę ruduoti. **Optimali priežiūra:** Acer auga viršutiniame dirvožemio sluoksnyje su stipriomis šaknimis kaip seklios šaknys su daug smulkių šaknų, todėl ji reikalauja reguliariai ir dažnai laistyti, todėl turėtumėte vengti užmirkimo. Tręškite augalą reguliariai kas keturias savaites nuo balandžio iki spalio skystomis bŃsų trąšomis. Japoniškas kļavas tinka visiems vertikaliems stiliams, o ypač laisvai vertikaliai formai „Moyogi“. Reguliarus genėjimas po sudygimo sukelia smulkius šakojimus, o tai taip pat sumažina lapų dydį. Visada nupjaukite iki dviejų porų lapų, kai susiformuoja penkių porų lapų. Atsargiai pirštų galiukais išlaužkite antrosios lapų poros pumpurus, po genėjimo taip pat galite sugnybti naują ataugą, kad ją patbulintumėte. Kaip atlygi už šį darbą gausite puikų šakų išsišakojimą. Plonas, sumedėjusias šakeles lengva vieluoti. Japoninį kļavą geriausia persodinti kovo pradžioje, kai brinksta jo pumpurai. Jaunesni bonsai į parduodamą bŃsų dirvą persodinami dviejų ir vyresnių augalų atstumu tik kas penkerius–dešimt metų. **Ziemą:** Žiemos mėnesiais gražymiai mažesnis vandens poreikis nukritus lapams. Tačiau net ir žiemą augalas neturėtų išdžiūti. Apsaugota, vėsi vieta, kurioje nėra per daug minusinės temperatūros, dabar yra ideali, nes šaknys netoleruoja stipraus šalčio. Taip pat rekomenduojama apsaugoti nuo vėjo, kad smulkios šakos neišdžiūtų.



Aggru tal-fann aħmar

Acer palmatum atropurpureum

Bonsai žgħir fil-beraħ aħmar jgħajjat

Minħabba l-forma grazzjuża tagħha b'kuruna semicircular, l-aggru Gappuniż huwa sigra žgħira popolari fid-disinn tal-bonsai. It-terminu palmatum huwa derivat mil-Latin palma = palm u jirreferi għall-weraq tal-qasma li jixbħu s-swaba '. Il-weraq aħmar skur isir krimżi jgħajjat fil-harifa qabel ma s-sigra titfa' l-weraq tagħha fix-xitwa. **Post natūrali:** L-aggru Gappuniż jinsab oriġinarjament fil-Grigal taċ-Cina fix ukoll fil-Gappun u l-Korea, fejn iħobb jikber bħala sigra žgħira fil-foresti dellija. Fil-Gappun hija mkabbara bħala sigra ornamentalni u wkoll bħala bonsai. **Kultivazzjoni b'suċċess:** Il-kultivazzjoni hija possibbli s-sena kollha. Poġġi l-Żrieragħ f'borża tal-plastik fis-sezzjoni tal-frigġ regolari għal ġimgha. Dan jistimulaha biex tiġġermina aktar malajr. Imbagħad biss issettjaħallah madwar pulzier fond fil-hamrija tal-qasari niedja. Għatti l-bastiment tal-kultura b'cling film, li inti tipprovi b'toqob. Dan jipproteġi l-hamrija milli tinxf. Għandek tneħħi l-fojl għal sagħtejn kull jumejn jew tlett ijiem. Dan jipprevjeni l-iffurmar tal-moffa fuq il-hamrija li qed tikber. Poġġi l-borma taż-żerriegħa f'post haħif u shun b'20 sa 25 ° Celsius u żomm il-hamrija tal-qasari niedja iżda mhux imxarrba. L-ewwel nebbieta għandhom jidhru wara għaxar sa tnax-il ġimgha. **L-aħjar post:** L-aggru Gappuniż jippreferi post xemxi għal parzjalment oskura u protett mir-riħ. Il-ponot tal-weraq għandhom tendenza li jsiru kannella fix-xemx shiħa. **Kura ottimali:** L-Acer jikber fil-hamrija tal-wiċċ b'għeruq b'saħħithom bħala għeruq baxxi b'haħna għeruq fini u għalhekk jeħtieġ tisqija regolari u frekwenti, li biha għandek tevita l-ilma. Fertilizza l-pjanta regolament kull erba 'ġimghat minn April sa Ottubru b'fertilizzant Bonsai likwidu. L-aggru Gappuniż huwa adattat għall-istili wieqfa kollha u speċjalment il-forma wieqfa liberament, »Moyogi«. Żbir regolari wara n-nebbieta jirriżulta f'fergħat fini, li jwassal ukoll għal tnaqqis fid-daqs tal-weraq. Dejjem aqta 'lura għal żewġ pari weraq meta jkun f'furmata hames pari weraq. Tista 'wkoll toqros it-tkabir il-gdid wara ż-żbir għal aktar irfinar billi tkisser bir-reqqa l-blanżuni tat-tieni par ta' weraq b'subgħajk. Bħala premju għal dan ix-xogħol, int se tircievi fergħa fina tal-fergħat. friegħi rraq u inġam huma faċli għall-wajer. L-aħjar huwa li l-aggru Gappuniż jerga 'jinħatar fil-bidu ta' Marzu meta l-blanżuni tiegħu jkun nefaħ. Bonsai iżgħar huma trappantati f'hamrija bonsai disponibbli kummerċjalment f'distanza ta' żewġ pjanti jew aktar kull hames sa għaxar snin biss. **Fix-xitwa:** Fix-xhur tax-xitwa humaRekwizit ta' ilma aktar baxx b'mod sinifikanti wara t-telf tal-weraq. Iżda anke fix-xitwa, l-impjant m'għandux jinxef. Post kenn u frisk mingħajr wisq temperaturi taħt iż-żero issa huwa ideali għalhekk l-għeruq ma jittollerawx għata qawwiya. Il-protezzjoni mir-riħ hija rrakkomandata wkoll biex tevita li l-fergħat fini jinxfu.



Bonsai - Rode Japanse Esdoorn

Acer palmatum atropurpureum

Helderrode kleine bonsai voor buiten

Vanwege zijn sierlijke vorm met een halfronde kroon is de Japanse esdoorn een populaire kleine boom in bonsai-ontwerp. De term palmatum is afgeleid van het Latijnse palma = handpalm en duidt de bladeren aan die als vingers zijn ingesnedden. De donkerrode bladeren verkleuren naar helder karmijnrood in de herfst voordat de boom in de winter zijn bladeren laat vallen. **Natuurlijke locatie:** De Japanse esdoorn komt oorspronkelijk voor in het noordoosten van China, maar ook in Japan en Korea, waar hij graag als kleine boom groeit in schaduwrijke bossen. In Japan wordt hij gekweekt als sierboom en ook als bonsai. **Succesvolle teelt:** Teelt is het hele jaar mogelijk. Plaats het zaad een week in een plastic zak in de normale koelkast. Dit stimuleert het om sneller te ontkiemen. Pas dan plaats je hem ongeveer 2,5 cm diep in vochtige potgrond. Dek de kweekbak af met vershoudfolie, die u van gaten heeft voorzien. Dit beschermt de aarde tegen uitdroging. Om de twee tot drie dagen moet u de film gedurende 2 uur verwijderen. Dit voorkomt schimmelvorming op de teeltgrond. Zet de kweekbak op een lichte en warme plaats met 20 à 25 ° Celsius en houd de kweekgrond vochtig, maar niet nat. De eerste zaailingen zouden na tien tot twaalf weken moeten verschijnen. **De beste locatie:** De Japanse esdoorn geeft de voorkeur aan een zonnige tot gedeeltelijk beschaduwde standplaats beschermd tegen de wind. De bladpunten reageren op de volle zon met een bruine kleur. **Optimale verzorging:** De Acer groeit diep geworteld in de bovengrond als een ondiepe wortel met veel fijne wortels en heeft daarom gelijkmatig en veel water nodig, waarbij wateroverlast dient te worden vermeden. Bemest de plant van april tot oktober regelmatig om de vier weken met vloeibare bŃnsaivoeding. De Japanse esdoorn is geschikt voor alle rechtopstaande stijlen en vooral de vrije opstaande vorm, »Moyogi«. Een regelmatig snoei na het ontkiemen resulteert in een fijne vertakking, wat ook leidt tot een verkleining van de bladgrootte. Snoei altijd terug tot twee paar bladeren als er vijf paar bladeren zijn gevormd. U kunt de nieuwe scheuten na het snoeien ook knippen voor verdere verfijning door voorzichtig met uw vingertoppen de knoppen van het tweede paar bladeren uit te breken. Als beloning voor dit werk ontvang je een fijne vertakking van de takken. Lignified, dunne takken zijn gemakkelijk te bedraden. U kunt de Japanse esdoorn het beste begin maart verpotten als de toppen opzwellen. Jongere bonsai worden elke vijf tot tien jaar overgeplant in in de handel verkrijgbare bŃnsaigrond en oudere planten worden elke vijf tot tien jaar geplant. **In de winter:** In de wintermaanden is de waterbehoefte na bladverlies beduidend lager. Maar de plant mag ook in de winter niet uitdrogen. Een beschermd, koele standplaats zonder te hoge vriestemperaturen is nu ideaal, omdat de wortels geen strenge vorst kunnen verdragen. Daarnaast is een windscherm om te voorkomen dat de fijne takken uitdrogen aan te raden.



Rød viftelønn

Acer palmatum atropurpureum

Knallrød liten utendørs bonsai

På grunn av sin grasiøse form med en halvsirkelformet krone, er den japanske lønnen et populært lite tre i bonsai-design. Begrepet palmatum er avledet fra latin palma = palme og refererer til de fingerlignende spaltebladene. De mørkerøde bladene blir lyserøde om høsten før treet faller bladene om vinteren.

Naturlig beliggenhet: Den japanske lønnen finnes opprinnelig i det nordøstlige Kina samt i Japan og Korea, hvor den gjerne vokser som et lite tre i skyggefulle skoger. I Japan dyrkes det som et pryddre og også som en bonsai. **Vellykket dyrking:** Dyrking er mulig hele året. Sett Frø i en plastpose i den vanlige kjøleskapsdelen i en uke. Dette vil stimulere den til å spire raskere. Først da settes Planten dem omtrent en tomme dypt i fuktig pottejord. Dekk kulturkaret med matfilm, som du forsyner med hull. Dette beskytter jorda mot å tørke ut. Du bør fjerne folien i 2 timer annenhver til tredje dag. Dette forhindrer at det dannes mugg på den voksende jorda. Plasser frøpotten på et lett og varmt sted med 20 til 25 ° Celsius og hold pottejorda fuktig, men ikke våt. De første frøplantene skal vises etter ti til tolv uker. **Den beste beliggenheten:** Den japanske lønnen foretrekker en solrik til delvis skyggefull og vindbeskyttet plassering. Spissene på bladene har en tendens til å bli brune i full sol. **Optimal omsorg:** Acer vokser i matjorden med sterke røtter som grunne røtter med mange fine røtter og trenger derfor regelmessig og hyppig vanning, slik at du bør unngå vannlogging. Gjødse planten regelmessig hver fjerde uke fra april til oktober med flytende bonsaigjødsel. Den japanske lønnen passer for alle oppreiste stiler og spesielt den fritt oppreiste formen, »Moyogi«. Regelmessig beskæring etter spiring gir fin forgrening, som også fører til reduksjon i bladstørrelsen. Kutt alltid tilbake til to bladpar når fem bladpar har dannet seg. Du kan også klype den nye veksten etter beskæring for ytterligere foredling ved å forsiktig bryte ut knoppene på det andre bladparet med fingertuppene. Som belønning for dette arbeidet vil du motta en fin forgrening av grenene. Tynne, treaktige kvister er lette å wire. Det er best å ompotte den japanske lønnen i begynnelsen av mars når knoppene hovner opp. Yngre bonsai blir transplantert inn i kommersielt tilgjengelig bonsaijord i en avstand på to og eldre planter bare hvert femte til tiende år. **Om vinteren:** I vintermånedene er det Betydelig lavere vannbehov etter bladtap. Men selv om vinteren bør ikke planten tørke ut. Et lunt, kjølig sted uten for mye minusgrader er nå ideelt fordi røttene ikke tåler sterk frost. Vindbeskyttelse anbefales også for å hindre at de fine greinene tørker ut.



Bonsai - Czerwony Klon Japoński

Acer palmatum atropurpureum

Jasnoczerwone małe bonsai na zewnątrz

Ze względu na swój delikatny kształt z półkolistą koroną czerwony klon japoński jest popularnym niedużym drzewkiem do uprawy bonsai. Słowo palmatum w swojej botanicznej nazwie pochodzi od łacińskiego słowa palma, które oznacza dłoń i wskazuje na przypominające palce liście, które jesienią zmieniają swój ciemnoczerwony kolor na jasnoczerwony karminowy. Tuż przed zimą drzewo będzie rzucać liście. **Naturalne położenie:** Klon japoński czerwony ma swoje naturalne środowisko w północno-wschodnich Chinach, Japonii i Korei, gdzie często rośnie w zacienionych lasach. W Japonii jest uprawiana jako drzewo ozdobne i bonsai. **Udana uprawa:** Rozmnażanie nasion w pomieszczeniach jest możliwe przez cały rok. Aby zwiększyć zdolność kiełkowania, należy początkowo przechowywać nasiona w lodówce przez około tydzień. Następnie umieść nasiona na głębokości około 1 cm w wilgotnym kompozycie doniczkowym i przykryj pojemnik na nasiona przezroczystą folią, aby zapobiec wysychaniu ziemi. Nie zapomnij zrobić dziur w przezroczystej folii i zdejmować ją co drugi lub trzeci dzień na około 2 godziny. W ten sposób unikniesz tworzenia się pleśni na kompozycie doniczkowym. Umieść pojemnik na nasiona w miejscu jasnym i ciepłym o temperaturze od 20 ° C do 25 ° Celsjusza i utrzymuj ziemię wilgotną, ale nie mokrą. Pierwsze sadzonki wyrosną po dziesięciu do dwunastu tygodniach. **Najlepsza lokalizacja:** Małe drzewo preferuje miejsce słoneczne lub półcieniste i osłonięte od wiatru. W pełnym słońcu czubki liści mogą nabrać brązowego zabarwienia. **Optymalna pielęgnacja:** Czerwony klon japoński to płytko ukorzenione drzewo, które wyrasta z silnych korzeni w wierzchniej warstwie gleby i rozwija wiele mniejszych drobnych korzeni. Dlatego potrzebuje stale dużo wody, ale bez podlewania. Od kwietnia do października możesz co cztery tygodnie podawać płynny nawóz do roślin bonsai. Czerwony klon japoński nadaje się do wszystkich rodzajów uprawy bonsai w pozycji pionowej, zwłaszcza do wolnostojącej odmiany Moyogi. Dzięki konsekwentnemu przycinaniu po wykiełkowaniu można uzyskać zgrabne rozgałęzienie, które skutkuje również mniejszymi liśćmi. Zawsze przycinaj tylko do dwóch par liści, gdy tylko roślina rozwinię pięć par. Dodatkowo możesz udoskonalić nowe pędy poprzez uszczyplenie, ostrożnie wyjmując paki drugiej pary liści opuszkami palców. W nagrodę otrzymasz ładne rozgałęzienie gałęzi. Smukłe, zdrewniałe gałązki są dobre do okablowania. Klon japoński najlepiej przesadzić na początku marca, kiedy paki zaczynają puchnąć - młode rośliny należy przesunąć co dwa lata, a dojrzałe drzewa tylko co pięć do dziesięciu lat. Idealnie, **W zimę:** W okresie zimowym, po rzuceniu liści, czerwony klon japoński potrzebuje znacznie mniej podlewania, ale uważaj, aby nie wysychał. Ponieważ korzenie są bardzo odporne na mróz, najlepszym miejscem dla Twojej rośliny jest miejsce osłonięte, chłodne, pozbawione mrozu i najlepiej chronione przed wiatrem, aby zapobiec wysychaniu delikatnych gałęzi.



Bordo vermelho

Acer palmatum atropurpureum

Bonsai pequeno vermelho brilhante ao ar livre

Devido à sua forma graciosa com uma coroa semicircular, o bordo japonês é uma pequena árvore popular no design de bonsai. O termo palmatum é derivado do latim palma = palma e refere-se às folhas em forma de dedo. As folhas vermelhas escuras ficam carmesim brilhantes no outono antes que a árvore perca suas folhas no inverno. **Localização natural:** O bordo japonês é originalmente encontrado no nordeste da China, bem como no Japão e na Coreia, onde gosta de crescer como uma pequena árvore em florestas sombreadas. No Japão é cultivada como árvore ornamental e também como bonsai. **Cultivo bem sucedido:** O cultivo é possível durante todo o ano. Coloque oSementes em um saco plástico na seção normal da geladeira por uma semana. Isso vai estimulá-la a germinar mais rápido. Só então definaPlante-o com cerca de 2,5 cm de profundidade em solo úmido para vasos. Cubra o recipiente de cultura com filme plástico, que você fornece com furos. Isso protege o solo de secar. Você deve remover o papel alumínio por 2 horas a cada dois ou três dias. Isso evita a formação de mofo no solo em crescimento. Coloque o vaso de sementes em um local claro e quente com 20 a 25 ° Celsius e mantenha o solo do vaso úmido, mas não molhado. As primeiras mudas devem aparecer após dez a doze semanas. **A melhor localização:** O bordo japonês prefere um local ensolarado a parcialmente sombreado e protegido do vento. As pontas das folhas tendem a ficar marrons em pleno sol. **Cuidado ideal:** O Acer cresce no solo com raízes fortes como raízes rasas com muitas raízes finas e, portanto, precisa de rega regular e frequente, evitando o encharcamento. Fertilize a planta regularmente a cada quatro semanas, de abril a outubro, com fertilizante líquido para bonsai. O bordo japonês é adequado para todos os estilos verticais e especialmente para a forma livremente vertical, »Moyogi«. A poda regular após a brotação resulta em ramificação fina, o que também leva à redução do tamanho das folhas. Sempre corte dois pares de folhas quando cinco pares de folhas se formarem. Você também pode beliscar o novo crescimento após a poda para maior refinamento, quebrando cuidadosamente os botões do segundo par de folhas com a ponta dos dedos. Como recompensa por este trabalho, você receberá uma bela ramificação dos galhos. Galhos finos e lenhosos são fáceis de amarrar. É melhor replantar o bordo japonês no início de março, quando seus botões estão crescendo. Bonsai mais jovens são transplantados para solo de bonsai comercialmente disponível a uma distância de dois e plantas mais velhas apenas a cada cinco a dez anos. **No inverno:** Nos meses de inverno éNecessidade de água significativamente menor após a perda de folhas. Mas mesmo no inverno, a planta não deve secar. Um local fresco e protegido, sem muitas temperaturas abaixo de zero, agora é ideal porque as raízes não toleram geadas severas. A proteção contra o vento também é recomendada para evitar que os galhos finos sequem.



Bonsai - Arțar Japonez

Acer palmatum atropurpureum

Bonsai mici în aer liber roșu aprins

Datorită forme sale grațioase, cu o coroană semicirculară, arțarul japonez este un mic copac popular în design bonsai. Termenul palmatum este derivat din latina palma = palmă și se referă la frunzele care sunt tăiate ca degetele. Frunzele roșii închise se transformă într-un roșu carmin strălucitor toamna înainte ca arborele să-și vârsă frunzele iarna. **Locație naturală:** Arțarul japonez se găsește inițial în nord-estul Chinei, precum și în Japonia și Coreea, unde îl place să crească ca un copac mic în pădurile umbrite. În Japonia este cultivat ca arbore ornamental și, de asemenea, ca bonsai. **Cultivare de succes:** Cultivarea este posibilă pe tot parcursul anului. Așezați semințele într-o pungă de plastic în zona normală a frigiderului timp de o săptămână. Acest lucru îl stimulează să germineze mai repede. Doar atunci îl așezați cu o adâncime de aproximativ un centimetru în sol umed de ghiveci. Acorperți vasul de cultivare cu folie alimentară, pe care ați prevăzut-o cu găuri. Acest lucru protejează pământul de uscare. La fiecare două până la trei zile ar trebui să îndepărtați filmul timp de 2 ore. Acest lucru previne formarea mucegaiei pe solul de cultivare. Așezați vasul de cultivare într-un loc luminos și cald, cu 20-25 ° Celsius și mențineți solul de cultivare umed, dar nu umed. Primele răsaduri trebuie să apară după zece până la doisprezece săptămâni. **Cea mai bună locație:** Arțarul japonez preferă o locație însorită, parțial umbră, protejată de vânt. Vârful frunzelor reacționează la soare plin cu o culoare maro. **Îngrijire optimă:** Acer crește adânc înrădăcinat în solul superior ca o rădăcină superficială, cu multe rădăcini fine și, prin urmare, are nevoie de udare uniformă și de multe, prin care ar trebui să evitați inundarea. Fertilizați planta în mod regulat la fiecare patru săptămâni din aprilie până în octombrie cu îngrășământ bonsai lichid. Arțarul japonez este potrivit pentru toate stilurile în poziție verticală și, în special, în forma verticală liberă, »Moyogi«. O tăiere regulată după înmușurire are ca rezultat o ramificare fină, ceea ce duce și la o reducere a dimensiunii frunzelor. Reduceți întotdeauna la două perechi de frunze când s-au format cinci perechi de frunze. De asemenea, puteți ciupi noii lăstari după tăiere pentru a rafinare suplimentară, rupând cu grijă mugurii celei de-a doua perechi de frunze cu vârful degetelor. Ca recompensă pentru această muncă, veți primi ramificații fine ale ramurilor. Ramurile subțiri aliniate sunt ușor de sărmă. Cel mai bine este să transferați arțarul japonez la începutul lunii martie, când mugurii săi se umflă. Bonsaiul mai tânăr trebuie transplantat la fiecare cinci până la zece ani în solul comercial al bonsaiului la fiecare două sau mai multe plante. **În iarnă:** În lunile de iarnă, necesarul de apă după pierderea frunzelor este semnificativ mai mic. Dar planta nu trebuie să se usuce nici iarna. O locație protejată și rece, fără temperaturi de îngheț excesive, este acum ideală, deoarece rădăcinile nu pot tolera înghețul sever. În plus, se recomandă un paravent pentru a preveni uscarea ramurilor fine.



Bonsai - Röd Japansk Lönn

Acer palmatum atropurpureum

Ljus röd liten utomhusbonsai

På grund av sin eleganta form med en halvcirkelformad krona är den japanska lönnen ett populärt litet träd i bonsai-design. Termen palmatum härstammar från den latinska palma = handflatan och indikerar bladen som är skurna som fingrar. De mörkröda bladen blir ljusa karminröda på hösten innan trädet tappar sina löv på vintern. **Naturligt läge:** Den japanska lönnen finns ursprungligen i nordöstra Kina såväl som i Japan och Korea, där den gillar att växa som ett litet träd i skuggiga skogar. I Japan odlas den som ett prydnadsträd och också som en bonsai. **Framgångsrik odling:** Odling är möjlig året runt. Placera fröet i en plastpåse i det normala kylskåpet i en vecka. Detta stimulerar det att gro snabbare. Först då placerar du den ungefär en tum djupt i fuktig krukväxtjord. Täck odlingskärlet med plastfolie, som du har försett med hål. Detta skyddar jorden från att torka ut. Varannan till var tredje dag ska du ta bort filmen i två timmar. Detta förhindrar att mögel bildas på odlingsjorden. Placera odlingskärlet på en ljus och varm plats med 20 till 25 ° Celsius och håll odlingsjorden fuktig men inte våt. De första plantorna ska visas efter tio till tolv veckor. **Den bästa platsen:** Den japanska lönnen föredrar en solig till delvis skuggad plats skyddad från vinden. Bladspetsarna reagerar på full sol med en brun färg. **Optimal vård:** Acer växer djupt rotad i matjorden som en grund rot med många fina rötter och behöver därför jämn och mycket vattning, varigenom du bör undvika vattentätning. Gödsla växten regelbundet var fjärde vecka från april till oktober med flytande bonsai-gödselmedel. Den japanska lönnen är lämplig för alla stående stilar och särskilt den fria stående formen, »Moyogi«. En regelbunden klippning efter skottet resulterar i fin förgrening, vilket också leder till en minskning av lövstorleken. Skär alltid ned till två bladpar när fem bladpar har bildats. Du kan också nypa de nya skotten efter beskärning för ytterligare förfining genom att försiktigt bryta ut knopparna på det andra bladparet med fingertopparna. Som en belöning för detta arbete får du fin gren av grenarna. Lignifierade, tunna grenar är lätta att tråda. Det är bäst att repotera den japanska lönnen i början av mars, när dess knoppar sväller. Yngre bonsai bör transplanteras vart femte till tio år i kommersiell bonsaijord varannan och äldre växter. **På vintern:** Under vintermånaderna är vattenbehovet efter förlust av löv betydligt lägre. Men även på vintern bör växten inte torka ut. En skyddad, sval plats utan alltför frystande temperaturer är nu perfekt eftersom rötterna inte tål hård frost. Dessutom rekommenderas vindskydd för att förhindra att de fina grenarna torkar ut.



Červený vejár javor

Acer palmatum atropurpureum

Žiarivo červený malý vonkajší bonsaj

Japonský javor je pre svoj ladný tvar s polkruhovou korunou obľúbeným malým stromom v bonsajovom prevedení. Termín palmatum je odvodený z latinského palma = dlaň a označuje prstovité štrbinové listy. Tmavočervené listy sa na jeseň sfarbia do jasne karminovej farby predtým, ako strom v zime zhodí listy. **Prirodzená poloha:** Japonský javor sa pôvodne vyskytuje v severovýchodnej Číne, ako aj v Japonsku a Kórei, kde rád rastie ako malý strom v tienistých lesoch. V Japonsku sa pestuje ako okrasný strom aj ako bonsaj. **Úspešná kultivácia:** Pestovanie je možné počas celého roka. Vložte semená v plastovom vrecku v bežnej časti chladničky na týždeň. To ho stimuluje k rýchlejšiemu klíčeniu. Až potom nastavte. Zasadte ju asi palec hlboko do vlhkej zeminy. Kultivačnú nádobu prikryte potravinovou fóliou, ktorú opatríte otvormi. To chráni pôdu pred vysychaním. Fóliu by ste mali odstraňovať na 2 hodiny každé dva až tri dni. To zabráňuje tvorbe plesní na rastúcej pôde. Črepník umiestnite na svetlé a teplé miesto s teplotou 20 až 25 °C a udržiajte pôdu v črepníku vlhkú, ale nie mokrá. Prvé sadenice by sa mali objaviť po desiatich až dvanástich týždňoch. **Najlepšie umiestnenie:** Javor japonský preferuje slnečné až čiastočne zatienené a vetru chránené stanovište. Končeky listov majú tendenciu na plnom slnku hnednúť. **Optimálna starostlivosť:** Acer rastie v ornici so silnými koreňmi ako plytké korene s mnohými jemnými korienkami, a preto potrebuje pravidelnú a častú zálievku, pričom by ste sa mali vyhýbať premokreniu. Rastlinu pravidelne každé štyri týždne od apríla do októbra prihnojíte tekutým hnojivom na bonsaje. Japonský javor je vhodný pre všetky vzpriamené štýly a najmä pre voľne stojacu formu »Moyogi«. Pravidelný rez po vypučaní má za následok jemné rozkonárenie, čo vedie aj k zmenšeniu veľkosti listov. Vždy zrežte na dva páry listov, keď sa vytvorí päť párov listov. Nový prírastok môžete po orezaní pre ďalšie zušľachtenie zaštipnúť aj tak, že končekmi prstov opatrne vylomíte púčiky druhého páru listov. Ako odmenu za túto prácu dostanete jemné rozvetvenie konárov. Tenké, drevité vetvičky sa ľahko drôtujú. Japonský javor je najlepšie presadiť začiatkom marca, keď jeho puky napučia. Mladšie bonsaje sa presádzajú do komerčne dostupnej bonsajovej pôdy na vzdialenosť dvoch a staršie rastliny len každých päť až desať rokov. **V zime:** V zimných mesiacoch je výrazne nižšia potreba vody po strate listov. Ale ani v zime by rastlina nemala vyschnúť. Ideálne je teraz chránené, chladné miesto bez prihlých mínusových teplôt, pretože korene neznášajú silný mráz. Odporúča sa aj ochrana pred vetrom, aby sa zabránilo vysychaniu jemných konárov.



Rdeči pahljačasti javor

Acer palmatum atropurpureum

Svetlo rdeč majhen zunanji bonsaj

Japonski javor je zaradi svoje graciozne oblike s polkrožno krošnjou priljubljeno manjše drevo v bonsajski zasnovi. Izraz palmatum izhaja iz latinskega palma = dlaň in se nanaša na prstasto razrezane liste. Temno rdeči listi jeseni postanejo svetlo škrlatni, preden drevo pozimi odvrže listje. **Naravni habitat:** Japonski javor najdemo na severovzhodu Kitajske, pa tudi na Japonskem in v Koreji, kjer rado raste kot majhno drevo v senčnih gozdovih. Na Japonskem ga gojijo kot okrasno drevo in tudi kot bonsaj. **Navodila za gojenje:** Gojenje je možno vse leto. Posadite semena v plastični vrečki v običajnem delu hladilnika za en teden. To ga bo spodbudilo k hitrejšemu kaljenju. Šele nato nastavite. Posadite ga približno centimeter globoko v vlažno zemljo za lončke. Posodo z kulturo pokrijte s folijo za živila, ki jo opremite z luknjami. To ščiti tla pred izsušitvijo. Vsake dva do tri dni za 2 uri odstranite folijo. S tem preprečimo nastanek plesni na rastni zemlji. Lonček s semeni postavite na svetlo in toplo mesto s temperaturo od 20 do 25 °C, zemlja v lončku pa naj bo vlažna, vendar ne mokra. Prve sadike naj bi se pojavile po desetih do dvanajstih tednih. **Najboljša lokacija:** Japonski javor ima najraje sončno do delno senčno in pred vetrom zaščiteno lego. Konice listov na soncu ponavadi porjavijo. **Optimalna nega:** Acer raste v zgornji plasti zemlje z močnimi koreninami kot plitvimi koreninami z veliko drobnimi koreninami, zato potrebuje redno in pogosto zalivanje, pri čemer se izogibajte zalivanju. Rastlino redno gnojite vsake štiri tedne od aprila do oktobra s tekočim gnojilom za bonsaj. Japonski javor je primeren za vse pokončne oblike, še posebej za prosto pokončno obliko »moyogi«. Redno obrezovanje po kaljenju povzroči fino razvejanje, kar vodi tudi do zmanjšanja velikosti listov. Ko se oblikuje pet parov listov, jih vedno odrežite na dva para listov. Novo rast lahko po obrezovanju tudi priščišnete za nadaljnje izboljšanje, tako da s konicami prstov previdno izlomite popke drugega para listov. Kot nagrado za to delo boste prejeli fino razvejanje vej. Tanke olesenele vejice je enostavno očistiti. Japonski javor je najboljše presaditi v začetku marca, ko njegovi popki nabreknejo. Mlajše bonsaje presadimo v komercialno dostopno zemljo za bonsaj na razdaljo dveh, starejše rastline pa le vsakih pet do deset let. **V zimskem času:** V zimskih mesecih je bistveno manjša potreba po vodi po izgubi listov. Toda tudi pozimi se rastlina ne sme izsušiti. Zaščitena, hladna lokacija brez previsokih temperatur pod ničlo je zdaj idealna, saj korenine ne prenesejo hude zmrzali. Priporočljiva je tudi zaščita pred vetrom, da se drobne vejice ne izsušijo.



Arce japonés

Acer palmatum atropurpureum

Pequeño bonsái de exterior de color rojo brillante

El arce japonés es un árbol pequeño y popular para el cultivo como bonsái debido a su forma esbelta, con una corona semicircular. El término deriva del latín palmatum palma = palma de la mano y hace referencia a las hojas ranuradas en forma de dedo. Las hojas de color rojo oscuro en otoño, pasan a un color carmesí brillante antes de que el árbol pierda todo su follaje para el invierno. **Ubicación natural:** El arce japonés es originalmente del noreste de China, Japón y Corea, donde crece como árbol pequeño en bosques sombreados. En Japón se cultiva como un árbol ornamental y como bonsái. **Cultivo exitoso:** La semilla se puede criar durante todo el año. Deposite las semillas durante una semana en el frigorífico. Este tratamiento ayuda a mejorar la germinación de las mismas. Introduzca las semillas a un centímetro de profundidad en sustrato húmedo. Cubra el recipiente de cultivo con un film transparente y agujereéelo. Así protegerá la tierra de la desecación. Para evitar la putrefacción del sustrato retire el film cada dos o tres días durante 2 horas. Coloque el recipiente de cultivo en un lugar luminoso y cálido entre 20 y 25 grados y mantenga el sustrato húmedo, pero no mojado. La germinación se produce aproximadamente a las diez a doce semanas. **La mejor ubicación:** El arce japonés prefiere lugares desde soleados hasta semi sombra y protegidos del viento. Al sol directo las puntas de las hojas reaccionan con una coloración marrón. **Cuidado óptimo:** El arce crece con raíces bien arraigadas en la capa superior del suelo y con muchas raíces finas, por lo tanto requiere un riego uniforme y abundante, pero debe evitar el anegamiento. Sumínistrela cada cuatro semanas, de abril a octubre, fertilizante líquido para bonsái. El arce japonés es ideal para el cultivo de todos los estilos verticales y sobre todo de la forma Moyogi: Con una poda regula después del brote, resulta una ramificación distinguida que también provoca una disminución de las hojas. Puede siempre a dos pares de hojas cuando se hayan desarrollado 5 pares de hojas. Además, puede refinar el brote aún, más si después de la poda elimina con las puntas de los dedos, cuidadosamente, el segundo capullo del par de hojas. Como premio de la labor obtendrá una distinguida ramificación de las ramas. Las ramas leñosas delgadas sirven muy bien para colocar el alambre. El arce japonés se trasplanta en marzo, cuando los capullos empiezan a hincharse. Los bonsáis jóvenes se trasplantan cada dos años y después cada cinco a diez años, en tierra común para bonsái. Reduzca el cepellón a un tercio y elimine las raíces apelmazadas. **En el invierno:** Durante los meses de invierno, después de la caída del follaje, necesita bastante menos agua, pero evite que la planta se seque. Un lugar protegido y fresco sin grandes heladas es ideal, porque las raíces no toleran heladas. Además se recomienda un lugar protegido del viento para evitar que se sequen las ramas.



Červený vějířový javor Acer palmatum atropurpureum Jasně červená malá venkovní bonsai

Japonský javor je pro svůj ladný tvar s půlkruhovou korunou oblíbeným malým stromem v bonsajovém provedení. Termín palmatum je odvozen z latinského palma = dlaň a označuje prstovité štěrbinovité listy. Tmavě červené listy se na podzim zbarví do jasně karmínové, než strom v zimě shodí listy. **Přirozená poloha:** Japonský javor se původně vyskytuje v severovýchodní Číně a také v Japonsku a Koreji, kde rád roste jako malý strom ve stinných lesích. V Japonsku se pěstuje jako okrasný strom a také jako bonsai. **Úspěšné pěstování:** Pěstování je možné celoročně. Dá se semena v igelitovém sáčku v běžné chladničce na týden. To ji stimuluje k rychlejšímu klíčení. Teprve poté nastavte Zasaďte ji asi centimetr hluboko do vlhké zeminy. Kultivační nádobu zakryjte potravinářskou fólií, kterou opatřte otvory. To chrání půdu před vysycháním. Fólii byste měli odstraňovat na 2 hodiny každé dva až tři dny. Tím se zabrání tvorbě plísni na rostoucí půdě. Umístěte květináč na světlé a teplé místo s teplotou 20 až 25 °C a udržujte půdu v květináči vlhkou, ale ne mokrou. První sazenice by se měly objevit po deseti až dvanácti týdnech. **Nejlepší umístění:** Javor japonský preferuje slunné až částečně zastíněné a větru chráněné stanoviště. Konce listů mají tendenci na plném slunci hnědnout. **Optimální péče:** Acer roste v ornici se silnými kořeny jako mělké kořeny s mnoha jemnými kořeny, a proto potřebuje pravidelnou a častou závlivu, přičemž byste se měli vyhnout přemokření. Rostlinu pravidelně každé čtyři týdny od dubna do října přihnojíte tekutým hnojivem na bonsaje. Japonský javor je vhodný pro všechny vzpřímené styly a zejména pro volně vzpřímenou formu »Moyogi«. Pravidelným řezem po vyrašení dochází k jemnému větvení, což vede i ke zmenšení velikosti listů. Vždy seřízněte na dva páry listů, když se vytvoří pět párů listů. Nový přírůstek můžete po seříznutí také zaštipnout pro další zušlechtní tak, že konečky prstů opatrně vylomité poupata druhého páru listů. Jako odměnu za tuto práci dostanete jemné rozvětvení větví. Tenké, dřevité větvičky se snadno drátkují. Nejlepší je přesadit japonský javor začátkem března, když jeho poupata nabobtnají. Mladší bonsaje se přesazují do komerčně dostupné bonsajové půdy na vzdálenost dvou a starší rostliny pouze každých pět až deset let. **V zimě:** V zimních měsících je výrazně nižší potřeba vody po ztrátě listů. Ale ani v zimě by rostlina neměla uschnout. Ideální je nyní chráněné chladné místo bez přílišných minusových teplot, protože kořeny nesnášejí silný mráz. Doporučuje se také ochrana proti větru, aby se zabránilo vysychání jemných větví.



Kırmızı yelpaze akçaağaç Acer palmatum atropurpureum Parlak kırmızı küçük açık bonsai

Yarım daire biçimli tacı olan zarif şekli nedeniyle Japon akçaağacı, bonsai tasarımıyla popüler bir küçük ağaçtır. Palmatum terimi Latince palma = palm kelimesinden türetilmiştir ve parmak benzeri yarık yaprakları ifade eder. Koyu kırmızı yapraklar, küçük ağaç yapraklarını dökmeden önce sonbaharda parlak kırmızıya döner. **Doğal konum:** Japon akçaağaç aslen kuzeydoğu Çin'de ve gölgeli ormanlarda küçük bir ağaç olarak büyümeyi sevdiği Japonya ve Kore'de bulunur. Japonya'da süs ağacı ve ayrıca bonsai olarak yetiştirilir. **Başarılı yetiştirme:** Yetiştirme tüm yıl boyunca mümkündür. Koyu Bir hafta boyunca normal buzdolabı bölümünde plastik bir torba içinde tohumlar. Bu, daha hızlı çimlenmesini teşvik edecektir. Ancak o zaman ayarla Nemli sakı toprağına yaklaşık bir inç derinliğinde dakin. Kültür kabının üzerini delikler açtığınız streç film ile kapatın. Bu, toprağın kurumasını önler. Folyoyu her iki ila üç günde bir 2 saat çıkarmalısınız. Bu, büyüyen toprakta küf oluşumunu önler. Tohum sakısını 20 ila 25°C sıcaklıkta hafif ve sıcak bir yere koyun ve sakı toprağıni nemli tutun ama ıslak değil. İlk fideler on ila on iki hafta sonra görünmelidir. **En iyi konum:** Japon akçaağaç, güneşli ila kısmen gölgeli ve rüzgar korumalı bir yeri tercih eder. Yaprakların uçları tam güneşte kahverengiyeye dönme eğilimindedir. **Optimum bakım:** Acer, pek çok ince köklü sığ kökler kadar güçlü köklere sahip üst toprakta yetişir ve bu nedenle düzenli ve sık sulamaya ihtiyaç duyar, bu nedenle su basmasını önlemeniz gerekir. Bitkiyi Nisan'dan Ekim'e kadar dört haftada bir sıvı bonsai gübresiyle düzenli olarak gübreleyin. Japon akçaağacı tüm dik stiller ve özellikle serbest dik form olan »Moyogi« için uygundur. Filizlenmeden sonra düzenli budama, ince dallanma ile sonuçlanır, bu da yaprakların boyutunda bir azalmaya yol açar. Beş çift yaprak oluştuğunda daima iki çift yaprak olacak şekilde kesin. Ayrıca, ikinci yaprak çiftinin tomurcuklarını parmak uçlarınızla dikkatlice kırarak daha fazla inceltme için budamadan sonra yeni büyümeyi sıkıştırabilirsiniz. Bu çalışmanın bir ödülü olarak, dalların iyi bir şekilde dallanmasını alacaksınız. İnce, odunsu dalların tellenmesi kolaydır. Japon akçaağacının sakısını Mart ayı başlarında, tomurcukları şişerken tekrarlamak en iyisidir. Daha genç bonsailer, ticari olarak temin edilebilen bonsai toprağına iki ve daha yaşlı bitkiler arasında sadece beş ila on yılda bir nakledilir. **Kışın:** Kış aylarında ise Yaprak kaybindan sonra önemli ölçüde daha düşük su gereksinimi. Ancak kışın bile bitki kurumamalıdır. Çok fazla sıfırın altındaki sıcaklıkların olmadığı korunaklı, serin bir yer artık idealdir çünkü kökler şiddetli dona tahammül etmez. İnce dalların kurumasını önlemek için rüzgar koruması da önerilir.



Vörös legyező juhar Acer palmatum atropurpureum Világos piros kis szabadtéri bonsai

A kecses formájának és félköríves koronájának köszönhetően a japán juhar a bonsai dizájnban kedvelt kis fa. A palmatum kifejezés a latin palma = tenyér szóból származik, és az ujjszerű hasított levelekre utal. A sötétvörös levelek ősszel fényes bíborvörössé válnak, mielőtt a fa télen lehullatná a leveleit. **Természetes elhelyezkedés:** A japán juhar eredetileg Északkelet-Kínában, valamint Japánban és Koreában található, ahol szívesen nő kis faként az árnyas erdőkben. Japánban díszfaként és bonsaiként is termesztik. **Sikeres termesztés:** Termesztése egész évben lehetséges. Tedd a Magvak műanyag zacskóban a normál hűtőszekrényben egy hétig. Ez arra ösztönzi, hogy gyorsabban csírázzon. Csak ezután állítsa be! Utltesse körülbelül egy hüvelyk mélyre nedves virágföldbe. Fedje le a tenyészédényt ragasztó fóliával, amelyet lyukakkal lát el. Ez megvédi a talajt a kiszáradástól. A fóliát két-három naponta 2 órára le kell venni. Ez megakadályozza a penészképződést a növekvő talajon. Helyezze a magcserepet világos és meleg helyre, ahol a hőmérséklet 20-25°C, és a virágföldet tartsa nedvesen, de ne nedvesen. Az első palántáknak tíz-tizenkét hét után kell megjelenniük. **A legjobb hely:** A japán juhar a napos, vagy a részben árnyékos, szélvédett helyet kedveli. A levelek hegye hajlamos megbarnulni teljes napfényben. **Optimális gondozás:** Az Acer a termőtalajban erős gyökerekkel növekszik, mint sekély gyökerek, sok finom gyökérrel, ezért rendszeres és gyakori öntözésre van szüksége, így kerülni kell a vizesedést. Áprilistól októberig rendszeresen trágyázzuk meg a növényt négyhetente folyékony bonsai műtrágyával. **Télen:** A téli hónapokban az A lombhullás után lényegesen kisebb vízigény. De még télen sem szabad kiszáradnia a növénynek. A védett, hűvös hely, ahol nincs túl sok mínusz, most ideális, mert a gyökerek nem tűrik az erős fagyot. A finom ágak kiszáradásának megelőzése érdekében szélvédelem is javasolt.

: : : : :



イロハモミジ

Acer palmatum atropurpureum

赤が鮮やかな小さな屋外盆栽

半円形の繊細な樹冠で盆栽栽培に人気のある品種です。名称のpalmatumは、手のひらを意味するラテン語のpalmaに由来し、指のような形の葉は秋には濃い赤色から明るいえんじ色に変化します。冬が近づくと葉を散らします。

自然な場所: 中国北東部、日本、韓国が生息地で、しばしば森の中の日陰で生育します。日本では観賞用木や盆栽として栽培されています。

栽培成功:

種子繁殖は室内で年間を通して可能です。発芽率を高めるには、最初に種を冷蔵庫で約1週間保管します。湿った培養土の深さ約1cmに種を植え、サランラップなどの透明フィルムで鉢をカバーします。透明フィルムには空気穴をいくつかあけ、2~3日に1回は約2時間、完全にフィルムを鉢から外します。そうすることで、カビの発生を防ぎます。20°C~25°Cの明るく暖かい場所に置き、用土は湿った状態に保ちます。通常は約10~12週間後に発芽します。

最高のロケーション: 半日陰または日当たりの良い防風された場所を好みます。完全な日差しだと葉の先端が茶色になることがあります。

最適なケア:

土壌の浅い位置に強く根をはり、多くの小さな細かい根を形成するので、一貫してたっぷりの水が必要ですが、水溜まりができないように注意します。4月~10月の間は盆栽用の液体肥料を4週間ごとに与えることもできます。

すべての直幹の樹形に適し、特に模様木に適しています。発芽後の一貫した剪定により、より小さな葉の整った分枝を形成することが可能になります。5組の葉が形成したら、すぐに2組の葉を残して剪定してください。さらに指先で第2の葉の芽を取り除くことで新芽がより良い状態に仕上がります。努力に応じて良い分枝が得られるでしょう。細い木質化した小枝が針金かけに適しています。新芽が膨らみ始める3月上旬が植え替えに最適な時期です；若い木は2年毎、成熟した木は5~10年ごとに植え替えが必要で、理想的には塊根を1/3のサイズに剪定し標準の盆栽土壌を使用してください。

冬に:

冬に葉を散らした後は水は控えめに与えますが、乾燥しないように注意が必要です。根は限られた耐寒性なので、霜が降りない涼しい、繊細な枝が乾燥しないように防風された場所での保管が最適です。

SKU: 14952 / Roter Fächerahorn