

A13

BROJLER II

Mieszanka paszowa pełnoporcjowa dla brojlerów w chowie zagrodowym.

Sposób stosowania: dla brojlerów w chowie zagrodowym od 4 tyg. życia do końca tucz, jako wyłączna pasza. Nie wymaga okresu karencji. Niebezpieczny dla koniowatych i indyków. Zawiera jonofor dlatego niewskazane jest jednoczesne stosowanie z niektórymi substancjami leczniczymi (np. tiamulina).

Forma paszy: Granulat

Skład pszenica, kukurydza, śruta poekstrakcyjna paszowa z nasion soi, pszenżyto, śruta poekstrakcyjna słonecznikowa, tłuszcz drobiowy, węglan wapnia, chlorek sodu, siarczan sodu, fosforan jednowapniowy

Dodatkowe informacje: Produkt zawiera genetycznie zmodyfikowaną śrutę sojową.

Składniki analityczne w 1 kg	Białko surowe	181	g	Fosfor	3.8	g
	Tłuszcz surowy	38	g	Sód	1.4	g
	Włókno surowe	29	g	Lizyna	10.7	g
	Popiół surowy	41	g	Metionina	4.6	g
	Wapń	5.6	g			

Dodatki w 1 kg

Witaminy i prowitaminy	Witamina A (octan retinyli; 3a672a)	10000	JM
	Witamina D3 (cholekalcyferol; 3a671)	3000	JM
	Witamina E (octan dl-alfa-tokoferylu; 3a700)	30	mg
	Biotyna (3a880)	160	mcg

Mikroelementy	Żelazo (siarczan żelaza jednowodny; 3b103)	50	mg
	Miedź (siarczan miedzi pięciowodny; 3b405)	12	mg
	Cynk (tlenek cynku; 3b603)	70	mg
	Mangan (tlenek manganu; 3b502)	80	mg
	Jod (granulowany jodan wapnia; 3b203)	1	mg
	Selen (powlekany gran.selenin sodu; 3b802)	0.2	mg

Substancje polepszające strawność	6- fitaza (EC 3.1.3.26; 4a24)	1000	FTU/kg
	Endo-1,4 beta- ksylanaza (EC 3.2.1.8; 4a1617)	2250	EPU/kg

Przeciwutleniacze	Galusan propylu (E310)	0.01	mg
	BHT (E321)	0.1	mg

Kokcydiostatyki:	Salinomycyna (5 1 766)	60	ppm
-------------------------	------------------------	----	-----

Data produkcji i nr serii

Okres przydatności Wykorzystać przed upływem 3 miesięcy od daty produkcji.

Warunki przechowywania i stosowania: Wyrób stosować zgodnie z przeznaczeniem. Przechować w suchym i chłodnym miejscu. Producent nie odpowiada za skutki niewłaściwego przechowywania i stosowania wyrobu gotowego.