

AGRO-SORB® Folium

Stymulator wzrostu
do stosowania dolistnego




Złoty Medal
Międzynarodowych
targów FERMA 2018

Zawiera
biologicznie aktywne
WOLNE AMINOKWASY
Z HYDROLIZY ENZYMATYCZNEJ

HISTYDYNA	SERYNA	ARGININA	GLICYNA	KWAS ASPARAGINOWY	KWAS GLUTAMINOWY	
TREONINA	ALANINA	PROLINA	CYSTEINA	LIZYNA	TYROZYNA	METIONINA
WALINA	IZOLEUCYNA	LEUCYNA	FENYLOALANINA	TRYPTOFAN		

UWAGA
Naturalne
aminokwasy
z hydrolizy
enzymatycznej
gwarantują jakość!



5
Litrow

AGRO-SORB® Folium to płynny stymulator wzrostu zawierający naturalne, wolne L-α (lewoskrętne) aminokwasy powstałe z hydrolizy enzymatycznej do stosowania dolistnego szczególnie w okresach stresowych. **AGRO-SORB® Folium** wspomaga regenerację roślin po okresach stresowych, zwiększa liczbę łuszczyń, poprawia i zwiększa kwitnienie oraz powoduje wzrost intensywności fotosyntezy.

Instrukcja stosowania i przechowywania stymulatora wzrostu AGRO-SORB® Folium

Dawkę, terminy i sposób stosowania

Uprawa	Stosowanie	Dawka l/ha (jednorazowa)	Ilość cieczy roboczej l/ha	Termin
Rzepak ozimy	Stosowanie dolistne	1-2	200-300	Wykonać łącznie 3 zabiegi: - 1 zabieg jesienią w fazie 5-8 liści, - 1-2 zabiegi wiosną - pierwszy po wznowieniu wegetacji, - drugi przed kwitnieniem oraz dodatkowo po wystąpieniu warunków stresowych
Rzepak jary	Stosowanie dolistne	1-2	200-300	Wykonać 1-2 zabiegi: - pierwszy w fazie 5-8 liści, - drugi przed kwitnieniem oraz dodatkowo po wystąpieniu warunków stresowych
Zboża ozime	Stosowanie dolistne	1-2	200-300	Wykonać łącznie 3 zabiegi: - 1 zabieg jesienią w fazie 3-4 liści, - 1-2 zabiegi wiosną - pierwszy w fazie rozszewnia wegetacji, - drugi przed fazą kłoszenia (przed kwitnieniem) oraz dodatkowo po wystąpieniu warunków stresowych
Zboża jare	Stosowanie dolistne	1-2	200-300	Wykonać łącznie 1-2 zabiegi: - pierwszy w fazie kłoszenia roślin, - drugi przed fazą kłoszenia (przed kwitnieniem) oraz dodatkowo po wystąpieniu warunków stresowych
Kukurydza	Stosowanie dolistne	1-2	200-300	Wykonać 1-2 zabiegi: - od fazy 4-6 liści do uzyskania wysokości roślin, uniemożliwiającej zabiegi oprysku oraz dodatkowo po wystąpieniu warunków stresowych
Pomidor	Stosowanie dolistne	1-2	200	Wykonać 1-2 zabiegi: - kwitnienie 1 grona, - kwitnienie 3 grona oraz dodatkowo w przypadku pojawienia się warunków stresowych
Opiepek	Stosowanie dolistne	1-2	200	Wykonać 1-2 zabiegi: - w okresie kwitnienia, oraz dodatkowo w przypadku pojawienia się warunków stresowych
Warzywa korzeniowe	Stosowanie dolistne	1-3	300-600	Wykonać 1-2 zabiegi: - na początku lipca, oraz dodatkowo w przypadku pojawienia się warunków stresowych
Warzywa kapustne	Stosowanie dolistne	1-3	300-600	Wykonać 1-2 zabiegi: - w fazie wiązania główek lub róz oraz dodatkowo w przypadku pojawienia się warunków stresowych
Warzywa cebulowe	Stosowanie dolistne	1-3	300-600	Wykonać 1-2 zabiegi: - w fazie wiązania cebul, oraz dodatkowo w przypadku pojawienia się warunków stresowych
Sady	Stosowanie dolistne	0,5-1		Każdorazowo do wspomaganie zabiegów z nawozami dolistnymi i środkami ochrony roślin jak: fungicydy, insektydy, Adjuwanty.
		1-2	300-800	Wykonać łącznie 3 opryski w sezonie, - na początku kwitnienia, - w fazie opadania płatków kwiatowych, - 2-3 tygodnie po kwitnieniu oraz dodatkowo po wystąpieniu warunków stresowych
Rośliny rabatowo-balkonowe	Stosowanie dolistne	50-100 ml	10 l stężenie 0,5-1,0%	Stymulator wzrostu stosować jednorazowo w formie oprysku po przyjeździe roślin (2 typowe po posadzeniu) oraz dodatkowo po wystąpieniu warunków stresowych
Trawniki	Stosowanie dolistne	50-100 ml	10 l stężenie 0,5-1,0%	Opryskiwać/trawnik po rozpoczęciu wegetacji oraz 2-3 tygodnie po koseniu oraz dodatkowo po wystąpieniu warunków stresowych

Skład:

Wolne aminokwasy (FAA)	 (102g/L)	 9,3% (m/m)
Aminokwasy ogółem (TAA)		 12,0% (m/m)
Azot całkowity (N)		 2,1% (m/m)
Bor (B)		 0,02% (m/m)
Mangan (Mn)		 0,05% (m/m)
Cynk (Zn)		 0,07% (m/m)
Postać		 płynna

Sposób sporządzania cieczy użytkowej

Przed przystąpieniem do sporządzania cieczy użytkowej dokładnie ustalić potrzebną jej ilość. Odmierzona ilość stymulatora wzrostu wlać do zbiornika opryskiwacza napełnionego częściowo wodą (z włączonym mieszadłem), uzupełnić wodą do potrzebnej ilości i dokładnie wymieszać. Opróżnione opakowanie przepłukać trzykrotnie wodą, a popłuczynny wlać do zbiornika opryskiwacza z cieczą użytkową. Po pracy aparatę dokładnie umyć.

Środki ostrożności

Zabezpieczyć przed przypadkowym spożyciem. Podczas stosowania zachować podstawowe środki ostrożności, w tym uniknąć zanieczyszczenia skóry i oczu. Po pracy umyć ręce wodą z mydłem. W przypadku dostania się środka do oczu przemyć dużą ilością wody i zasięgnąć porady lekarza. Używać okularów, rękawic i ubrań ochronnych. Nie dopuścić do przedostawania się do kanalizacji/wód powierzchniowych/wód gruntowych.

Przechowywanie stymulatora wzrostu

Przechowywać w temperaturze od 0°C do +30°C w oryginalnych opakowaniach, dokładnie zamkniętych w suchym pomieszczeniu. Przechowywać w miejscu niedostępnym dla dzieci, z dala od zwierząt, żywności i pasz dla zwierząt.

UWAGA

AGRO-SORB® Folium może być stosowany łącznie ze środkami ochrony roślin.

Stymulator wzrostu jest zwykle zgodny z większością powszechnie używanych środków ochrony roślin i nawozów. Należy uniknąć mieszanin wysokozasadowych. W przypadku wątpliwości zalecane jest wcześniejsze sprawdzenie mieszaniny. Zalecane jest dostosowanie się do ogólnych zasad obowiązujących w przypadku łącznego stosowania agrochemikaliów. Zwłaszcza zasady konieczności natychmiastowego zastosowania mieszaniny po sporządzeniu cieczy użytkowej oraz nieprzechowywania cieczy w zbiorniku opryskiwacza po oprysku.

Zakres stosowania

Stymulator wzrostu AGRO-SORB® Folium może być stosowany w uprawach roślin polowych, sadowniczych, w warzywnictwie, w uprawach roślin ozdobnych i na trawniki, szczególnie w warunkach sadowiczych. **Stymulator wzrostu AGRO-SORB® Folium** zaleca się stosować dolistnie w formie opryskiwania roślin.