



SAFLAX®



Tips



© John ocampo modified by Penarc - CC-BY-SA-3.0

Passiflora ligularis

	 Български	BG		2		 Malti	MT		5
	 Dansk	DK		2		 Nederlands	NL		5
	 Deutsch	DE		2		 Norsk	NO		6
	 English	UK		2		 Polski	PL		6
	 Eesti	EE		3		 Português	PT		6
	 Suomalainen	FI		3		 Românesc	RO		6
	 Français	FR		3		 Svenska	SE		7
	 Ελληνική	GR		3		 Slovensky	SK		7
	 Gaeilge	IE		4		 Slovenski	SI		7
	 íslenskur	IS		4		 Español	ES		7
	 Italiano	IT		4		 Český	CZ		8
	 Hrvatski	HR		4		 Türkçe	TR		8
	 Latviešu	LV		5		 Magyar	HU		8
	 Lietuvių kalba	LT		5		 日本語	JP		9



Сладка гранадила

Passiflora ligularis

Растението за вкусния сок от маракуя

Сладката гранадила, която расте като увивно растение, не само дава най-големите плодове от всички пасифлори за богатия на витамини сок от маракуя, но се различава от своите роднини и в други отношения. Листата им не са пръстовидни, както обикновено, а почти сърцевидни и имат цели ръбове. Ореолът на вашите до 10 сантиметра големи цветя е ивичен бяло-лилав. Цветовете често са по двойки на дръжки с дължина до четири сантиметра. Passiflora ligularis расте бавно и се уива по-малко от своите роднини, но расте почти право нагоре. Но може лесно да се управлява на катерушки. Незрелите плодове са синьо-зелени и често покрити с малки зеленикаво-бели петна, узрелите плодове имат лъскава оранжево-жълта кожа. Плодовете често се консумират пресни със семената като десерт. **Естествено местоположение:** Естественят ареал е в Южна Америка, Централна Америка и Мексико. Сега се отглежда и в субтропичните райони на Африка, Азия и Австралия. **Успешно отглеждане:** Отглеждането от семена на закрито е възможно през цялата година. За да се увеличи способността за покълване на семената, те трябва първо да се накиснат във вода със стайна температура за една нощ. След това поръсете семената върху влажна почва за отглеждане и ги покрийте само тънко със средата за отглеждане. Опънете хранително фолио върху съда с култура и пробийте няколко дупки във фолиото. Това предпазва почвата от изсушаване. Трябва да отстранявате фолиото за 2 часа на всеки два до три дни. Това предотвратява образуването на мухъл върху растящата почва. Поставете саксията със семена на светло и топло място с 20 до 25° по Целзий и поддържайте почвата влажна, но не мокра. Опитът показва, че след това са необходими две до четири седмици, за да покълнат. **Най-доброто местоположение:** Много слънце насърчава богатия цъфтеж. При доста над 40° по Целзий обаче пасифлората спира да расте и цъфти и отлага цъфтежа за по-хладните месеци на късното лято или есента. Места на открито също се предлагат от май до октомври. Но трябва да се внесе преди първите нощни слани. **Оптимална грижа:** Сладката гранадила е пестелива по отношение на качеството на почвата. Винаги поддържайте почвата влажна, но избягвайте преовлажняване и прекомерно варовита вода за напояване. Тежката суша може да доведе до загуба на листа и заразяване с паякообразни акари. Най-добре е да покривате нуждите от хранителни вещества всяка седмица от април до октомври с течен растителен тор в контейнери. Издънки, които растат твърде дълги и вече не могат да намерят място върху помощното средство за катерене, могат да бъдат съкратени незабавно от април до юни. Тъй като пасифлората бързо се вкоренява в саксията, трябва да я пресадите в малко по-голям съд през март всяка година. **През зимата:** Сладката гранадила презимува най-добре при ярка светлина от 5 до 15° по Целзий. Ако сладката гранадила презимува като стайно растение, трябва да изберете много светло място, в противен случай растението ще изсъхне. В зависимост от топлината и светлината на зимното място, част от листата остава или напълно се отделя. Продължете да поливате леко, в зависимост от останалата листна маса, за да не изсъхне напълно кореновата топка. Енергично поддържане до дължина на издънката 20-30 см в края на зимата е възможно безпроблемно, тъй като пасифлората се регенерира бързо. След това новите издънки се правят отново от март до април.



Sød granadilla

Passiflora ligularis

Planten til den lækre passionsfrugtjuice

Den søde granadilla, der vokser som klatreplante, producerer ikke blot de største frugter af alle passionsblomster til den vitaminrige passionsfrugtjuice, men adskiller sig også fra sine slægtninge på andre punkter. Deres blade er ikke fingerformede som normalt, men næsten hjerteformede og har hele kanter. Aureolen på dine op til 10 centimeter store blomster er båndet hvid-lilla. Blomsterne er ofte parvis på stilke op til fire centimeter lange. Passiflora ligularis vokser langsomt og snor sig mindre end sine slægtninge, men vokser næsten lige op. Men den kan nemt styres op på klatrestativer. Umodne frugter er blågrønne og ofte dækket med små grønlig-hvide pletter, modne frugter har en skinnende orange-gul hud. Frugterne spises ofte friske med frøene som dessert. **Naturlig beliggenhed:** Det naturlige udbredelsesområde er i Sydamerika, Mellemamerika og Mexico. Den dyrkes nu også i de subtropiske områder i Afrika, Asien og Australien. **Successful dyrkning:** Dyrkning fra frø indendørs er muligt hele året rundt. For at øge spireevnen af frøene skal de først ligge i blød i vand ved stuetemperatur natten over. Drys derefter frøene på fugtig vækstjord og dæk dem kun tyndt med vækstmediet. Stræk husholdningsfilm over dyrkningskarret og prik et par huller i filmen. Dette beskytter jorden mod udtørring. Du bør fjerne folien i 2 timer hver anden til tredje dag. Dette forhindrer mug i at dannes på den voksende jord. Stil frøpotten et let og varmt sted med 20 til 25° Celsius og hold pottejorden fugtig, men ikke våd. Erfaringsmæssigt tager det så to til fire uger at spire. **Den bedste beliggenhed:** Masser af sol fremmer rig blomstring. Ved godt 40° Celsius holder passionsblomsten dog op med at vokse og blomstre og udskyder blomstringen til de køligere måneder i sensommeren eller efteråret. Udendørs siddepladser er også tilgængelige fra maj til oktober. Men den skal ind i den første nattefrost. **Optimal pleje:** The Sweet Granadilla er nøjsom med hensyn til jordkvalitet. Hold altid jorden fugtig, men undgå oversvømmelser og overdrevent kalkholdigt vandingsvand. Alvorlig tørke kan føre til bladtab og angreb af spindemider. Det er bedst at dække næringsbehovet ugentligt fra april til oktober med flydende beholderplantegødning. Skud, der bliver for lange og ikke længere kan finde plads på klatrehjælpen, kan afkortes med det samme fra april til juni. Da passionsblomsten hurtigt roder gennem potten, bør du ompotte den i en lidt større beholder i marts hvert år. **Om vinteren:** Den søde granadilla dvaler bedst i skarp lys ved 5 til 15° Celsius. Hvis den søde granadilla overvintrer som stueplante, bør du vælge en meget lys placering, ellers vil planten visne. Afhængigt af vinterstedets varme og lys, forbliver en del af løvet eller er helt fældet. Fortsæt med at vande lidt, afhængigt af den resterende bladmasse, så rodklumpen ikke tørrer helt ud. En kraftig beskæring til en skudlængde på 20-30 cm sidst på vinteren er mulig uden problemer, da passionsblomsterne genskaber hurtigt. De nye skud finder derefter sted igen fra marts til april.



Süße Granadilla

Passiflora ligularis

Die Pflanze für den leckeren Maracuja-Saft

Die als Kletterpflanze wachsende Süße Granadilla bildet nicht nur die größten Früchte aller Passionsblumen für den vitaminreichen Maracuja-Saft aus, sondern unterscheidet sich auch sonst von ihren Verwandten. Ihre Blätter sind nicht wie sonst finger-, sondern fast herzförmig und ganzrandig. Der Strahlenkranz Ihrer bis zu 10 Zentimeter großen Blüten ist weiß-lila bebändert. Die Blüten stehen häufig in Paaren an bis zu vier Zentimeter langen Stielen. Die Passiflora ligularis wächst langsam und schlingt weniger stark als ihre Verwandten, sondern wächst fast gerade nach oben. Sie lässt sich aber gut an Klettergerüsten emporlenken. Unreife Früchte sind blaugrün und häufig mit kleinen grünlich-weißen Punkten bedeckt, reife Früchte haben eine glänzende orangegelbe Schale. Die Früchte werden mit den Samen gerne frisch als Dessert gegessen. **Naturstandort:** Das natürliche Verbreitungsgebiet liegt in Südamerika, Mittelamerika und Mexiko. Mittlerweile wird sie auch in den subtropischen Gebieten Afrikas, Asiens und Australiens kultiviert. **Anzucht:** Im Haus ist die Anzucht aus Samen das ganze Jahr über möglich. Um die Keimfähigkeit der Samen zu erhöhen, sollten sie zunächst über Nacht in Wasser bei Raumtemperatur anquellen. Streuen Sie den Samen dann auf feuchte Anzuchterde und bedecken Sie sie nur dünn mit dem Anzuchtsubstrat. Spannen Sie Klarsichtfolie über das Anzuchtgefäß und stechen Sie einige Löcher in die Folie. So ist die Erde vor Austrocknung geschützt. Alle zwei bis drei Tage sollten Sie die Folie für 2 Stunden entfernen. Das beugt einer Schimmelbildung auf der Anzuchterde vor. Stellen Sie das Anzuchtgefäß an einen hellen und warmen Ort mit 20 bis 25° Celsius und halten Sie die Anzuchterde feucht, aber nicht nass. Bis zur Keimung dauert es dann erfahrungsgemäß zwei bis vier Wochen. **Standort:** Viel Sonne fördert eine reiche Blüte. Bei deutlich über 40° Celsius stellt die Passionsblume allerdings ihre Wachstums- und Blütenentwicklung ein und verschiebt die Blüte auf die kühleren Monate im Spätsommer oder Herbst. Von Mai bis Oktober ist auch ein Platz im Freien möglich. Vor den ersten Nachtfrösten muss sie aber heringeholt werden. **Pflege:** Die Süße Granadilla ist hinsichtlich der Bodenqualität genügsam. Halten Sie die Erde stets feucht, aber vermeiden Sie Staunässe und allzu kalkhaltiges Gießwasser. Starke Trockenheit kann zu Blattverlusten und Befall durch Spinnmilben führen. Den Nährstoffbedarf decken Sie am besten von April bis Oktober wöchentlich mit flüssigem Kübelpflanzendünger. Triebe, die zu lang werden und an der Kletterhilfe keinen Platz mehr finden, können von April bis Juni sofort eingekürzt werden. Da die Passionsblume den Topf rasch durchwurzelt, sollten Sie sie jedes Jahr im März in ein leicht größeres Gefäß umtopfen. **Im Winter:** Am besten überwintert die Süße Granadilla hell bei 5 bis 15° Celsius. Überwintert die Süße Granadilla als Zimmerpflanze, sollten Sie einen sehr hellen Standort wählen, da die Pflanze sonst vergeilt. Je nach Wärme und Licht des Winterplatzes bleibt ein Teil des Laubs erhalten oder wird vollständig abgeworfen. Wässern Sie weiter leicht in Abhängigkeit der verbleibenden Blattmasse sowie, dass der Wurzelballen nicht völlig austrocknet. Ein kräftiger Rückschnitt auf eine Trieblänge von 20-30 cm im Spätwinter ist problemlos möglich, da sich Passionsblumen rasch regenerieren. Der Neuaustrieb erfolgt dann wieder ab März bis April.



Sweet Granadilla

Passiflora ligularis

The plant for the tasty passion fruit juice

The Sweet Granadilla is a climbing plant that not only produces the biggest fruits of all Passiflora species that is used for the vitamin-packed passion fruit juice, but it differs from its relatives in other aspects as well. Its leaves are not commonly finger-shaped, but almost heart-shaped entirely, and the corona of its up to 10 cm big flowers is white-purple ribboned. The blossoms are mostly coming in pairs on up to 4 cm long stalks. The Passiflora ligularis is slow-growing and twines less than other species - instead it grows almost straight up, while it can easily be directed with a climbing aid. Unripe fruits have a blue-green colour, often with small green-white dots, whereas matured fruits show a shiny yellow-orange coloured skin. The fresh fruits and seeds are commonly eaten for dessert. **Natural location:** The natural habitat of the Sweet Granadilla is in South America, Middle America and Mexico. Nowadays it has been cultivated in subtropical regions in Africa, Asia and Australia as well. **Successful cultivation:** Seed propagation indoors is possible throughout the year. To increase the germinability, you should place the seeds over night in a bowl with lukewarm water for priming. After that, spread the seeds onto moist potting compost, put just a little compost earth on top and cover the seed container with clear film to prevent the earth from drying out. Don't forget to make some holes in the clear film and take it every second or third day completely off for about 2 hours. That way you avoid mold formation on your potting compost. Place the seed container somewhere bright and warm with a temperature between 20° and 25° Celsius and keep the earth moist, but not wet. Usually it takes two to four weeks until germination. **The best location:** Plenty of sun will increase the blossoming. Only in temperatures of more than 40° Celsius, the Sweet Granadilla will delay its growth and flowering until the cooler months in late summer or autumn. Between May and October it can also be kept outdoors, but it has to be moved inside ahead of the first nightly frost. **Optimal care:** The Sweet Granadilla doesn't need any special soil for cultivation. Just keep the earth constantly moist without waterlogging and use preferably lime-deficient water. There is a higher risk of damaging the foliage or spider mites, when the plant is kept too dry. From April until October, you may give fluid fertilizer for tub plants on a weekly basis. Long sprouts that outgrow the climbing aid, can be pruned between April and June. Since the roots of the Sweet Granadilla develop rather quick, you should shift up the plant every year around March to a slightly bigger pot. **In the winter:** The Sweet Granadilla hibernates best at a temperature between 5° and 15° Celsius. Indoor plants should be kept in a very bright place, otherwise it might come to etiolation. Depending on the level of warmth and light in which the plant is kept, it either casts the leaves completely or only partly. Keep watering your Passiflora modestly in accordance to the foliage and let the roots don't dry out. Since the Sweet Granadilla regenerates rather fast, an even strong pruning with cutting back the long sprouts to 20 or 30 cm can easily be done in late winter. The plant will shoot again from March to April.



Magus granadill

Passiflora ligularis

Maitsva passionimahla taim

Ronitaimena kasvav magus granadill ei anna vitamiinirikkaale kannatuslilledest mitte ainult kõige suuremaid vilju, vaid erineb oma sugulastest ka muus osas. Nende lehed ei ole nagu tavaliselt sõrmekujulised, vaid peaaegu südamekujulised ja tervete servadega. Teie kuni 10 sentimeetri pikkuste lillede oreool on valge-lilla riba. Õied on sageli paarikaupa kuni nelja sentimeetri pikkustel vartel. Passiflora ligularis kasvab aeglaselt ja nõõrib vähem kui tema sugulased, kuid kasvab peaaegu sirgelt. Kuid seda saab hõlpsasti ronimisraamidel üles juhtida. Ebaküpsed viljad on sinakasrohelised ja sageli kaetud väikeste rohekasvalgete laikudega, küpsel viljadel on läikiv oranžikaskollane koor. Puuvilju süüakse sageli värskest koos seemnetega magustoiduna. **Looduslik asukoht:** Looduslik levila on Lõuna-Ameerikas, Kesk-Ameerikas ja Mehhikos. Nüüd kasvatatakse seda ka Aafrika, Aasia ja Austraalia subtroopilistes piirkondades. **Edukas kasvatamine:** Seemnetest siseruumides kasvatamine on võimalik aastaringsest. Seemnete idanemisvõime suurendamiseks tuleks neid esmalt üle öö toatemperatuuril vees leotada. Seejärel puista seemned niiskele kasvupinnasele ja kata need ainult õhukeselt kasvusubstraadiga. Venitage kultuurianuma kohale toidukile ja torkake kilesse mõned augud. See kaitseb mulda kuivamise eest. Peaksite fooliumi eemaldama 2 tunniks iga kahe kuni kolme päeva järel. See takistab hallituse teket kasvupinnal. Asetage külvipott valgusküllasesse ja sooja kohta, mille temperatuur on 20–25 °C, ning hoidke istutust muld niiskena, kuid mitte märjana. Kogemused on näidanud, et seejärel kulub idanemiseks kaks kuni neli nädalat. **Parim asukoht:** Palju päikest soodustab rikkalikku õitsemist. Kui temperatuur on tunduvalt üle 40 °C, lõpetab kannatuslill kasvamise ja õitsemise ning lükkab õitsemise edasi jähedamatele suvekuudele või sügisse. Maist oktoobrini on saadaval ka välistimed. Aga see tuleb ära tuua enne esimesi öökülmi. **Optimaalne hooldus:** Sweet Granadilla on mullakvaliteedi osas kokkuhoidlik. Hoidke muld alati niiske, kuid vältige vettimist ja liigset lubjarikast kastmisvett. Tõsine põud võib põhjustada lehtede kadu ja ämbliknäärte nakatumist. Toitainete vajadus on kõige parem katta aprillist oktoobrini kord nädalas vedela konteinertaimede väetisega. Võrsed, mis kasvavad liiga pikaks ja ei leia enam ronimisabil ruumi, võib aprillist juunini kohe lühendada. Kuna kannatuslill juurdub kiiresti potist läbi, tuleks see iga aasta märtsis veidi suuremasse anumasse ümber istutada. **Talvel:** Magus granadill talvitub kõige paremini eredas valguses temperatuuril 5–15 °C. Kui magus granadill talvitub toataimena, tuleks valida väga valgusküllane kasvukoht, muidu taim närbub. Olenevalt talvekoha soojusest ja valgusest jääb osa lehestikku alles või langeb täiesti maha. Jätake veidi kastmist, olenevalt järelejäanud lehemassist, et juurepall täielikult ära ei kuivaks. Jõuline pügamine 20-30 cm võrse pikkuseni hilistalvel on võimalik probleemideta, kuna kannatuslilled uuenevad kiiresti. Uued võrsed toimuvad siis uuesti märtsist aprillini.



Makea granadilla

Passiflora ligularis

Herkullisen passionhedelmämehun kasvi

Kiipeilykasvina kasvava makea granadilla ei ainoastaan tuota vitamiinirikkaale passionhedelmämehulle kaikäista passionkukista suurimmat hedelmät, vaan eroaa myös muilta osin sukulaisistaan. Niiden lehdet eivät ole tavalliseen tapaan sormenmuotoisia, vaan melkein sydämenmuotoisia ja niissä on kokonaiset reunat. Jopa 10 senttimetriä isojen kukkasi aureoli on valko-violettiainehainen. Kukat ovat usein pareittain jopa neljän senttimetrin pituisissa varssissa. Passiflora ligularis kasvaa hitaasti ja lankaa vähemmän kuin sen sukulaiset, mutta kasvaa lähes suoraan ylöspäin. Mutta sitä voidaan helposti ohjata kiipeilytelineillä. Epäkypsät hedelmät ovat sinivihreitä ja usein peitetty pienillä vihertävänvalkoisilla täplillä, kypsillä hedelmillä on kiiltävä oranssinkeltainen kuori. Hedelmät syödään usein tuoreina siementen kanssa jälkiruokana. **Luonnollinen sijainti:** Luonnollinen levinneisyysalue on Etelä-Amerikassa, Keski-Amerikassa ja Meksikossa. Nyt sitä viljellään myös Afrikassa, Aasian ja Australian subtrooppisilla alueilla. **Onnistunut viljely:** Kasvatus siemenistä sisätiloissa on mahdollista ympäri vuoden. Siementen itämiskyvyn lisäämiseksi niitä tulee ensin liottaa huoneenlämpöisessä vedessä yön yli. Ripottele sitten siemenet kostealle kasvumaalle ja peitä ne vain ohuesti kasvualustalla. Venytä elintarviketalvella viljelyastian päälle ja pistele kalvoon muutamia reikiä. Tämä suojaa maaperää kuivumiselta. Poista folio 2 tunnin ajaksi kahden tai kolmen päivän välein. Tämä estää homeen muodostumisen kasvumaahan. Aseta siemenruokku valoisaan ja lämpimään paikkaan, jonka lämpötila on 20–25 °C, ja pidä istutusmaa kosteana, mutta ei märkänä. Kokemus on osoittanut, että sen itäminen kestää kahdesta neljään viikkoa. **Paras sijainti:** Paljon aurinkoa edistää runsasta kukintaa. Reilusti yli 40 °C:ssa passionkukka kuitenkin lakkaa kasvamasta ja kukkimasta ja siirtää kukinnan viileämpiin kuukausiin, loppukesään tai syksyyn. Istutapaikkoja ulkona on myös saatavilla toukokuusta lokakuuhun. Mutta se on tuotava ennen ensimmäisiä yöpakkasia. **Optimaalinen hoito:** Sweet Granadilla on säästäväinen maaperän laadun suhteen. Pidä maaperä aina kosteana, mutta vältä kasteluvettä ja liian kalkkipitoista kasteluvettä. Vaikaa kuivuus voi johtaa lehtien katoamiseen ja hämähäkipunkkitartuntaan. Ravinteiden tarve on parasta kattaa viikoittain huhti-lokakuussa nestemäisellä säiliökasvin lannoitteella. Lian pitkiä kasvavia versoja, jotka eivät enää löydä kiipeilyapuun tilaa, voidaan lyhentää heti huhtikuusta kesäkuuhun. Koska passionkukka juurtuu nopeasti ruukun läpi, sinun tulee istuttaa se jokaisen vuoden maaliskuussa hieman isompaan astiaan. **Talvella:** Makea granadilla talvehtii parhaiten kirkkaassa valossa 5-15 °C:ssa. Jos makea granadilla talvehtii huonekasvina, kannattaa valita erittäin valoisa paikka, muuten kasvi kiihtuu. Talvipaikan lämmöstä ja valosta riippuen osa lehdistä jää jäljelle tai irtaosa kokonaan. Jätka kastelua hieman jäljellä olevasta lehtimassasta riippuen, mutta juuripallo ei kuivu kokonaan. Voimakas karsiminen 20-30 cm verson pituuteen lopputalvella on mahdollista ilman ongelmia, koska passionkukat uusiutuvat nopeasti. Uudet versot tapahtuvat sitten uudelleen maaliskuusta huhtikuuhun.



Grenadelle

Passiflora ligularis

La plante pour le jus de maracudja

La grenadelle, qui pousse comme une plante grimpante, forme non seulement les gros fruits de toutes les passiflores pour le jus de maracudja riche en vitamines, mais elle se distingue aussi des autres passiflores. Ses feuilles ne sont pas en forme de doigt comme les autres passiflores, mais presque en forme de coeur et entières. La couronne rayonnante de ses fleurs de 10 cm de long maximum est rayée en blanc et lilas. Les fleurs sont fréquemment en paires sur des tiges jusqu'à 4 cm de long. La grenadelle grandit lentement et grimpe moins que les autres passiflores, mais elle grandit presque verticalement. Par contre, elle peut bien s'attacher à un support pour plantes grimpantes. Des fruits non arrivés à maturité sont bleu verdâtre et sont souvent couverts de petits points blanc verdâtre, les fruits mûrs ont une cosse jaune orange vif. Les fruits sont mangés frais avec les graines comme dessert. **Emplacement naturel:** L'aire de distribution naturelle se trouve en Amérique du Sud, Amérique centrale, et au Mexique. La grenadelle est désormais cultivée dans les zones subtropicales d'Afrique, d'Asie, et d'Australie aussi. **Culture réussie:** La culture des graines à la maison est possible tout au long de l'année. Pour améliorer la faculté germinative des graines, vous devez d'abord mettre les graines dans de l'eau à température ambiante pendant la nuit. Ensuite, parsemez les graines sur du terreau humide et recouvrez les légèrement avec le substrat. Couvrez le récipient avec une feuille transparente dans laquelle vous faites des trous. Comme ça, le terreau est protégé du dessèchement. Vous devez enlever la feuille pendant deux heures tous les deux ou trois jours. Ceci prévient la formation de moisissures dans le terreau. Mettez le récipient dans un endroit lumineux et chaud de 20° à 25° Celsius et gardez le terreau humide, mais pas mouillé. La germination a lieu après deux à quatre semaines en général. **Le meilleur emplacement:** Beaucoup de soleil favorise une floraison abondante. Cependant, dans des températures supérieures à 40° Celsius, la grenadelle ajuste sa croissance et son développement de fleurs et reporte la floraison aux mois plus froids en fin d'été ou en automne. Il est aussi possible de la mettre en plein air de mai à octobre. Par contre, il faudra la récupérer avant les premiers gels de nuit. **Soins optimaux:** La grenadelle est peu exigeante concernant la qualité de terre. Gardez toujours la terre humide, mais évitez l'eau stagnante et l'eau trop calcaire. Des sécheresses fortes peuvent entraîner la perte de feuilles et une infestation d'acariens. Vous comblez son besoin en nutriments avec un engraissement hebdomadaire d'avril à octobre avec de l'engrais liquide pour plantes en pot. Les rameaux qui sont devenus trop longs et qui n'ont plus de place sur le support peuvent être raccourcis d'avril à juin. Comme la grenadelle s'enracine rapidement dans le pot, vous devez la rempoter tous les ans en mars dans un récipient un peu plus gros. **En hiver:** La grenadelle hiverne de préférence dans un emplacement lumineux avec une température entre 5° et 15°. Si la grenadelle hiverne dans la chambre, vous devez choisir un endroit très lumineux, car la plante s'étiole sinon. En fonction de la chaleur et de la lumière, soit une partie du feuillage reste, soit le feuillage est entièrement rejeté. Arrosez en fonction de la masse de feuilles restante pour que la motte de racines ne se dessèche pas totalement. Vous pouvez couper 20 à 30 centimètres sur les rameaux sans problème, car les grenadelles se régénèrent rapidement. La nouvelle pousse a lieu à partir de mars à avril.



Γλυκιά γκραναδιλία

Passiflora ligularis

Το φυτό για τον απολαυστικό χυμό φρούτων του πάθους

Η γλυκιά γκραναδιλία, που αναπτύσσεται ως αναρριχώμενο φυτό, όχι μόνο παράγει τους μεγαλύτερους καρπούς από όλα τα λουλούδια του πάθους για τον παλιό και σε βιταμίνες χυμό φρούτου του πάθους, αλλά διαφέρει επίσης από τους συγγενείς της σε άλλα σημεία. Τα φύλλα τους δεν έχουν σχήμα δακτύλου ως συνηθώς, αλλά σχεδόν σε σχήμα καρδιάς και έχουν ολόκληρη περιθώρια. Η τρύπα των μεγάλων λουλουδιών σας έως και 10 εκατοστά έχει λωρίδες λευκού-μωβ. Τα άνθη είναι συχνά σε ζευγάρια σε μίσχους μήκους έως και τεσσάρων εκατοστών. Η Passiflora ligularis μεγαλώνει αργά και παράγει λιγότερο από τους συγγενείς της, αλλά μπορεί εύκολα να κατευνάσεται σε πλαίσια αναρρίχησης. Τα ανώριμα φρούτα είναι γαλαζοπράσινα και συχνά καλύπτονται με μικρές πρασινωμένες κηλίδες, τα ώριμα φρούτα έχουν λαμπρό πορτοκαλοκίτρινο δέρμα. Τα φρούτα τρώγονται συχνά φρέσκα με τους σπόρους ως επιδόρπιο. **Φυσική τοποθεσία:** Η φυσική περιοχή βρίσκεται στη Νότια Αμερική, την Κεντρική Αμερική και το Μεξικό. Τώρα καλλιεργείται και στις υποτροπικές περιοχές της Αφρικής, της Ασίας και της Αυστραλίας. **Επιτυχημένη καλλιέργεια:** Η καλλιέργεια από σπόρους σε εσωτερικούς χώρους είναι δυνατή όλο το χρόνο. Για να αυξηθεί η βλαστική ικανότητα των σπόρων, θα πρέπει πρώτα να βουλκίσουν σε νερό σε θερμοκρασία δωματίου όλη τη νύχτα. Στη συνέχεια, πασπαλίζετε τους σπόρους σε υγρό έδαφος ανάπτυξης και καλύψτε τους μόνο αραία με το καλλιεργητικό μέσο. Τεντώστε μεμβράνη πάνω από το δοχείο καλλιέργειας και ανοίξτε μερικές τρύπες στη μεμβράνη. Αυτό προστατεύει το έδαφος από το στέγνωμα. Θα πρέπει να αφαιρέτε το αλουμινοχαρτό για 2 ώρες κάθε δύο έως τρεις ημέρες. Αυτό αποτρέπει τη δημιουργία μούχλας στο αναπτυσσόμενο έδαφος. Τοποθετήστε τη γλάστρα σε ένα ελαφρύ και ζεστό μέρος με θερμοκρασία 20 έως 25° Κελσίου και διατηρήστε το χώμα της γλάστρας υγρό αλλά όχι υγρό. Η εμπειρία έχει δείξει ότι στη συνέχεια χρειάζονται δύο έως τέσσερις εβδομάδες για να βλαστήσει. **Η καλύτερη τοποθεσία:** Ο παλιός ήλιος προάγει την πλούσια ανθοφορία. Σε πολύ πάνω από 40 ° Κελσίου, ωστόσο, το λουλούδι του πάθους σταματά να αναπτύσσεται και να ανθίζει και αναβάλλει την ανθοφορία για τους πιο δροσερούς μήνες του τέλους του καλοκαιριού ή του φθινοπώρου. Διατίθενται επίσης υπαίθρια καθίσματα από Μάιο έως Οκτώβριο. Αλλά πρέπει να φέρεται πριν από τους πρώτους παγετούς τη νύχτα. **Βέλτιστη φροντίδα:** Η Sweet Granadilla είναι λιτή όσον αφορά την ποιότητα του εδάφους. Διατηρείται πάντα το έδαφος υγρό, αλλά αποφεύγετε την υπερχείλιση και το υπερβολικό αερατισμό νερό άρδευσης. Η έντονη ξηρασία μπορεί να οδηγήσει σε απώλεια φύλλων και προσβολή από ακάρεα αράχνης. Είναι καλύτερο να καλύψετε τις ανάγκες σε θρεπτικά συστατικά εβδομαδιαία από τον Απρίλιο έως τον Οκτώβριο με υγρό λίπασμα φυτών δοχείων. Οι βλαστοί που μακραίνουν πολύ και δεν βρίσκουν πλέον χώρο στο βοηθημα αναρρίχησης μπορούν να συντομευτούν αμέσως από τον Απρίλιο έως τον Ιούνιο. Δεδομένου ότι το λουλούδι του πάθους ριζώνει γρήγορα μέσα από τη γλάστρα, θα πρέπει να το μεταφέρετε σε ένα ελαφρώς μεγαλύτερο δοχείο τον Μάρτιο κάθε έτους. **Το χειμώνα:** Η γλυκιά γκραναδιλία διαχειμάζει καλύτερα σε έντονο φως στους 5 έως 15° Κελσίου. Εάν η γλυκιά γκραναδιλία διαχειμάζει ως φυτό εσωτερικού χώρου, θα πρέπει να επιλέξετε μια πολύ φωτεινή τοποθεσία διαφορετικά το φυτό θα μαραζήσει. Ανάλογα με τη ζεστασία και το φως του χειμερινού τόπου, μέρος του φυλλώματος παραμένει ή αποβάλλεται εντελώς. Συνεχίστε να ποτίζετε ελαφρώς, ανάλογα με τη μάζα των φύλλων που έχει απομείνει, για να μην στεγνώσει τελείως η ρίζα. Εάν δυνατό κλάδεμα σε μήκος βλαστού 20-30 cm στη τέλη του χειμώνα είναι δυνατό κανένα πρόβλημα, αφού τα λουλούδια του πάθους αναγεννιούνται γρήγορα. Στη συνέχεια, οι νέοι βλαστοί πραγματοποιούνται ξανά από τον Μάρτιο έως τον Απρίλιο.



Granadilla milis

Passiflora ligularis

An planda le haghaidh an sú torthaí paisean delicious

Ní hamháin go dtáirgíonn an grenadilla milis, a fhásann mar phlanda dreapadóireachta, na torthaí is mó de gach bláthanna paisean don sú torthaí paisean atá saibhir i vitimín, ach tá sé difriúil óna ghaolta ar bhealach eile freisin. Níl a gcuid duilleoga méar-chruthach mar is gnách, ach beagnach croí-chruthach agus tá imeall iomlán acu. Tá an aureole de do bláthanna móra suas le 10 ceintiméadar bandáilte bán-corca. Is minic a bhíonn na bláthanna i mbeirteanna ar stalks suas le ceithre ceintiméadar ar fad. Fásann an Passiflora ligularis go mall agus lúbann sé níos lú ná a ghaolta, ach fásann sé beagnach díreach suas. Ach is féidir é a stiúradh go héasca ar fhrámaí dreapadóireachta. Tá torthaí neamhaibí gorm-uaine agus go minic clúdaithe le spotaí beaga glasa-bán, tá craiceann lonnacha oraíste-buí ag torthaí aibí. Is minic aitheann na torthaí úr leis na síolta mar mhílseog. **Suíomh nádúrtha:** Tá an raon nádúrtha i Meiriceá Theas, Meiriceá Láir agus Meicsiceo. Saothraítear anois é i limistéir fothrópaiceacha na hAfraice, na hÁise agus na hAstráile. **Saothrú rathúil:** Is féidir fás ó shíolta taobh istigh ar feadh na bliana. D'fhonn cumas pheacadh na síolta a mhéadú, ba chóir iad a sáithiú in uisce ar dtús ag teacht an tseomra thar oíche. Ansin sprinkle na síolta ar ithir tais atá ag fás agus gan ach iad a chlúdach go tanáí leis an meán fáis. Sín an scannán cumhdaithe thar an soitheach cultúir agus cuir cúpla poll sa scannán. Cosnaíonn sé seo an ithir ó thriomú amach. Ba chóir duit an scragall a bhaint ar feadh 2 uair gach dhá nó trí lá. Cuireann sé seo cosc ar mhúnla a fhoirmiú ar an ithir atá ag fás. Cuir an pota síolta in áit éadrom te ag 20 go 25 ° Celsius agus coinnigh an ithir potaithe tais ach ní fliuch. Léiríonn taithí go dtógann sé dhá nó ceithre seachtaine ansin chun péacadh. **An suíomh is fearr:** Cothaíonn go leor gréine bláthanna saibhir. Ag go maith os cionn 40 ° Celsius, áfach, stopann an bláth paisean ag fás agus ag bláthú agus cuireann sé bláthanna siar go dtí míonna níos fuairé deireadh an tsamhraidh nó an fhómhair. Tá suíocháin lasmuigh ar fáil freisin ó Bhealtaine go Deireadh Fómhair. Ach ní mór é a thabhairt isteach roimh an sioc den chéad oíche. **Cúram is fearr is féidir:** Tá an Sweet Granadilla frugal ó thaobh cháilíocht na hithreach. Coinnigh an ithir tais i gcónaí, ach seachain uisciúcháin agus ró-uisce uisciúcháin cailcreach. D'fhéadfadh cailteanas duilleá agus inmhiolú damhán alla bheith mar thoradh ar thriomach trom. Is fearr an riachtanas cothaitheach a chlúdach go seachtainiúil ó Aibreán go Deireadh Fómhair le leasachán plandaí coimeádan leachtach. Is féidir shoots a fhásann ró-fhada agus nach féidir leo spás a fháil a thuilleadh ar an gcúnamh dreapadóireachta a ghiorú láithreach ó Aibreán go Meitheamh. Ós rud é go bhfréamhaíonn an bláth paisean go tapa tríd an bpota, ba chóir duit é a athchur isteach i gcoimeádan beagán níos mó i mí an Mhárta gach bliain. **Sa gheimhreadh:** Is fearr an granadilla milis a gheimhridh i solas geal ag 5 go 15 ° Celsius. Má éiríonn an granadilla milis mar ghléasra tí, ba cheart duit suíomh an-gheal a roghnú, ar shlí eile beidh an gléasra wilt. Ag brath ar théamh agus solas an áit gheimhridh, fanann cuid den duilleáir nó a chaillfidh go hiomlán. Leanúint ar aghaidh ag uisce beagán, ag brath ar mhais na duille atá fágtha, ionas nach dtriomaíonn an liathróid fréimhe go hiomlán. Is féidir bearradh briomhar go fad shoot de 20-30 cm go déanach sa gheimhreadh gan aon fhadhbanna, ós rud é go n-athghníonn bláthanna paisean go tapa. Tarlaíonn na shoots nua ansin arís ó Mhárta go Aibreán.



Sæt granadilla

Passiflora ligularis

Plöntan fyrir dýrindis ástríðisufa

Sæta granadillan, sem vex sem klifurplanta, gefur ekki aðeins af sér stærstu ávexti allra ástríðublóma fyrir hinn vítamínríka ástríðuávxatasafa, heldur er hún einnig að öðru leyti frábrugðin settjum sínum. Blöðin þeirra eru ekki fingurlaga eins og venjulega, heldur næstum hjartalaga og hafa heilar brúnir. Aureole á allt að 10 sentimetrar stórum blómum þínum er hvítflöubláur. Blómin eru oft í þörum á stönglum allt að fjögurra sentimetrar löngum. Passiflora ligularis vex hægt og tvinnast minna en ættingjar, en vex nánast beint upp. En það er auðvelt að stýra því upp á klifurgrind. Öþroskaðir ávextir eru blágrænir og oft þakir litlum grænhvítum blettum, þroskaðir ávextir eru með glansandi appelsínugult hýði. Ávextirnir eru oft borðaðir ferskir með fræjunum sem eftirrætt. **Náttúrulegt staðsetning:** Náttúrulegt svið er í Suður-Ameríku, Mið-Ameríku og Mexíkó. Það er nú einnig ræktað á subtropical svæðum Afríku, Asíu og Ástralíu. **Árangursrík ræktun:** Ræktun úr fræjum innandyrar er mögulegt allt árið um kring. Til að auka spírunargetu fræanna ættu þau fyrst að liggja í bleyti í vatni við stofuhita yfir nótt. Stráðið síðan fræjunum á rakan vaxtarjörðveg og hyljið þau aðeins þunnt með vaxtarmiðlunum. Teygðu matarfilmu yfir ræktunariláðið og stingdu nokkrum göt á filmuna. Þetta verndar jarðveginn gegn þurrkun. Þú ættir að fjarlægja álpappírinn í 2 klukkustundir á tveggja til þriggja daga fresti. Þetta kemur í veg fyrir að mygla myndist á vaxandi jarðvegi. Settu fræpottinn á léttan og heitan stað með 20 til 25 ° Celsius og haltu pottjarðveginum rökum en ekki blautum. Reykslan hefur sýnt að það tekur þá tvær til fjórar vikur að spíra. **Besta staðsetningin:** Mikil sól stuðlar að ríki flóru. Við vel yfir 40 ° Celsius hættir ástríðublómið hins vegar að vaxa og blómstra og frestar flóru til svalari mánaða síðsumars eða hausts. Utisæta er einnig í boði frá maí til október. En það þarf að koma honum inn fyrir fyrstu næturfrost. **Besta umönnun:** The Sweet Granadilla er sparsamur hvað varðar jarðvegsgæði. Haltu jarðveginum alltaf rökum en forðastu vatnslosun og of kalkríkt áveituvatn. Miklir þurrkar geta leitt til taps á laufblöðum og kóngulómaitasmit. Best er að dekka næringarþörfina vikulega frá apríl til október með fljótandi látsplöntuáburði. Skýtur sem verða of langar og geta ekki lengur fundið pláss á klifurhjálpinni má stytta strax frá apríl til júní. Þar sem ástríðublómið rótar fljótt í gegnum pottinn, ættir þú að endurpotta því í aðeins stærra ílát í mars ár hvert. **Á veturna:** Sæta granadillan liggur best í dvali í björtu ljósi við 5 til 15 ° Celsius. Ef sæta granadillan yfirvetrar sem stofuplanta ættirðu að velja mjög bjartan stað, annars mun plöntan visna. Það fer eftir hlýju og birtu á vetrarstaðnum, hluti af lafi stendur eftir eða er alveg úthellt. Haltu áfram að vökva örliði, allt eftir bláðmassa sem eftir er, svo að rótarkúlan þorni ekki alveg. Kröftug klipping í 20-30 cm skotlengd síðla vetrar er möguleg án vandræða, þar sem ástríðublóm endurnýjast fljótt. Nýju tókurnar eiga sér síðan stað aftur frá mars til apríl.



Granadilla

Passiflora ligularis

La pianta del delizioso succo di Maracuja

La Granadilla cresce come rampicante e si distingue dalle sue simili per vari aspetti, non solo perché produce i frutti più grandi fra tutti i fiori della passione, da cui si ricava il famoso succo di Maracuja ricco di vitamine. Le sue foglie non sono digitate, ma piuttosto cuoriformi e dal bordo uniforme. L'aureola è bordata di bianco-viola, il fiore cresce fino a un'ampiezza di 10 centimetri. I fiori si trovano spesso in coppie, su steli lunghi fino a quattro centimetri. La Passiflora ligularis cresce lentamente e si arrampica in maniera meno resistente delle sue simili, ma cresce dritta verso l'alto. Si lascia comunque ben direzionare con un tutore. I frutti non maturi sono verdi-bluastri e spesso coperti di puntini bianco-verdi, i frutti maturi hanno una buccia brillante color giallo-arancio. I frutti, compresi i semi, vengono spesso consumati freschi come dessert. **Posizione naturale:** L'habitat naturale della Passiflora è in Sud America, America Centrale e Messico. In seguito si è diffusa anche nelle zone subtropicali dell'Africa, dell'Asia e dell'Australia. **Coltivazione riuscita:** La coltivazione da semi in casa è possibile durante tutto l'anno. Per aumentare la germinabilità dei semi, lasciateli immersi per una notte in acqua a temperatura ambiente affinché si gonfino. Poi distribuiteli sulla terra di coltivo umida e copriteli leggermente con il substrato. Coprite il recipiente di coltivazione con pellicola trasparente, sulla quale praticherete dei fori, in questo modo la terra eviterà di seccarsi. Ogni due o tre giorni rimuovete la pellicola per 2 ore, per prevenire la formazione di muffe sulla terra. Collocate il recipiente di coltivazione in un luogo luminoso e caldo, a una temperatura fra i 20° e i 25°C e mantenete la terra umida, ma non bagnata. La germinazione dura di norma da due a quattro settimane. **La posizione migliore:** Molto sole favorisce una fioritura rigogliosa. Tuttavia, con temperature superiori a 40° C la Granadilla sospende la sua crescita e la produzione di fiori, posticipando i fiori ai mesi più freschi in tarda estate o in autunno. Da maggio a ottobre è possibile collocarla all'aperto, è importante riportarla all'interno prima delle prime gelate notturne. **Cura ottimale:** La Granadilla non ha grosse pretese in quanto al tipo di terreno. Mantenete la terra sempre umida con acqua povera di calcare, evitando il ristagno idrico causato dall'acqua restante nel sottovaso. La siccità può portare alla perdita delle foglie e ad infestazioni di parassiti. Per soddisfare il fabbisogno di sostanze nutritive, da aprile a ottobre si consiglia la somministrazione di fertilizzante per piante da vaso una volta a settimana. Da aprile a giugno potete cimare subito i getti che diventano troppo lunghi e non trovano posto sul tutore. I fiori della passione mettono radici velocemente in vaso, per questo dovete trapiantare ogni anno a marzo in un recipiente un po' più grande. **In inverno:** Per lo svernamento della Granadilla si consiglia un ambiente luminoso, tra i 5° e i 15° C. Se si appresta a passare l'inverno come pianta da appartamento, scegliete un luogo molto luminoso, altrimenti la pianta appassisce. A seconda della temperatura e delle condizioni di luce il fogliame può rimanere sulla pianta o cadere. Continuate ad innaffiare, ma fate attenzione al volume di foglie, che sarà probabilmente diminuito. Nel tardo inverno potete realizzare una potatura vigorosa dei getti, di circa 20 o 30 centimetri, poiché la Passiflora si rigenera rapidamente. La nuova fioritura riappare da marzo ad aprile.



Slatka granadila

Passiflora ligularis

Biljka za ukusni sok od marakuje

Slatka granadila, koja raste kao biljka penjačica, ne samo da daje najveće plodove od svih pasiflora za sok od marakuje bogat vitaminima, nego se od svojih srodnika razlikuje i po drugim stvarima. Listovi im nisu prastaki kao inače, već gotovo srokli i imaju cijele rubove. Oreol vaših do 10 centimetara velikih cvjetova je trakasto bijelo-ljubičaste boje. Cvjetovi su često u paru na peteljcima dugim do četiri centimetra. Passiflora ligularis raste sporo i manje se uvija od svojih srodnika, ali raste gotovo ravno prema gore. Ali može se lako usmjeriti na penjalice. Nezreli plodovi su plavo-zeleni i često prekriveni malim zelenkasto-bijelim mrljama, zreli plodovi imaju sjajnu narančasto-žutu kožicu. Plodovi se često jedu svježi sa sjemenkama kao desert. **Zemlja porijekla:** Prirodni areal je u Južnoj Americi, Srednjoj Americi i Meksiku. Sada se također uzgaja u suptropskim područjima Afrike, Azije i Australije. **Uspešan uzgoj:** Uzgoj iz sjemena u zatvorenom prostoru moguć je tijekom cijele godine. Kako bi se povećala sposobnost klijavosti sjemenki, prvo ih treba preko noći potopiti u vodu sobne temperature. Zatim pospite sjeme na vlažno tlo za uzgoj i samo ga tanko prekrijte supstratom. Razvucite prozornu foliju preko posude s kulturom i probušite nekoliko rupa u foliju. To štiti tlo od isušivanja. Svaka dva do tri dana skinite foliju na 2 sata. Time se sprječava stvaranje plijesni na tlu za uzgoj. Stavite posudu za sjeme na svijetlo i toplo mjesto s 20 do 25° Celzija i održavajte tlo za saksije vlažnim, ali ne mokrim. Iskustvo je pokazalo da tada treba dva do četiri tjedna da proklija. **Najbolja lokacija:** Puno sunca potiče bogatu cvatnju. Međutim, na znatno višim od 40 ° C pasiflora prestaje rasti i cvjetati i odgađa cvatnju za hladnije mjesec kasno ljeto ili jesen. Vanjska garnitura također je dostupna od svibnja do listopada. Ali mora se unijeti prije prvih noćnih mrazova. **Optimalna njega:** Sweet Granadilla je šteditliva u pogledu kvalitete tla. Održavajte tlo uvijek vlažnim, ali izbjegavajte natapanje i pretjerano vapnenacku vodu za navodnjavanje. Jaka suša može dovesti do gubitka lišća i zaraze paukovim grinjama. Najbolje je pokrivati potrebe za hranjivim tvarima tjedno od travnja do listopada tekućim gnojivom za biljke u spremnicima. Mladice koje izrastu predugo i više ne mogu naći mjesta na penjalici mogu se odmah skratiti od travnja do lipnja. Budući da pasiflora brzo prolazi kroz lonac, trebali biste je presaditi u nešto veću posudu u ožujku svake godine. **U zimi:** Slatka granadila najbolje hibernira na jakom svjetlu na 5 do 15°C. Ako slatka granadila prezimi kao sobna biljka, trebali biste odabrati vrlo svijetlo mjesto, inače će biljka uvenuti. Ovisno o toplini i svijetlosti zimskog mjesta, dio lišća ostaje ili potpuno otpada. Nastaviti lagano zalijevati, ovisno o preostaloj lišnoj masi, kako se korijenova balda ne bi potpuno osušila. Snažna rezidba na duljinu izboja 20-30 cm u kasnu zimu moguća je bez problema jer se pasiflora brzo regenerira. Novi izbojci zatim se ponovno pojavljuju od ožujka do travnja.



Saldā granadilla

Passiflora ligularis

Augs garšīgai marakujas sulai

Saldā granadilla, kas aug kā kāpšanas augs, vitamīniem bagātajai marakujas sulai ne tikai dod lielākus augļus no visiem pasifloras ziediem, bet arī atšķiras no saviem radniekiem citos aspektos. Viņu lapas nav pirksta formas, kā parasti, bet gandrīz sirds formas un ir veselām malām. Jūsu līdz 10 centimetriem lielo ziedu aureole ir balti violeta joslā. Ziedi bieži vien ir pa pāriem un līdz četriem centimetriem gariem kātiem. Passiflora ligularis aug lēni un vītņojas mazāk nekā tās radinieki, bet aug gandrīz taisni. Bet to var viegli vadīt uz kāpšanas rāmjiem. Nenobriedušie augļi ir zilganzaļi un bieži kļūti ar maziem zilganbaltiem plankumiem, nobriedušiem augļiem ir spīdīga oranži dzeltena miza. Augļus bieži ēd svaigus ar sēklām kā desertu. **Dabiska vieta:** Dabiskais areāls atrodas Dienvidamerikā, Centrālamerikā un Meksikā. Tagad to audzē arī subtropu apgabalos Āfrikā, Āzijā un Austrālijā. **Veiksmīga audzēšana:** Audzēšana no sēklām telpās ir iespējama visu gadu. Lai palielinātu sēklu dīgstspēju, tās vispirms uz nakti jāmērcē istabas temperatūrā ūdenī. Pēc tam apkaisa sēklas mitrā augšanas augsnē un tikai plānā kārtā pārklāj ar augšanas vidi. Izstiepiet pārtikas plēvi virs kultivēšanas trauka un ieduriet plēvē dažus caurumus. Tas pasargā augsni no izžūšanas. Jums vajadzētu noņemt foliju 2 stundas ik pēc divām līdz trim dienām. Tas novērš pelējuma veidošanos augošajā augsnē. Novietojiet sēklu podu gaišā un siltā vietā ar temperatūru 20 līdz 25 ° C un turiet augsni mitru, bet ne mitru. Pieredze rāda, ka pēc tam uzdīgšanai nepieciešamas divas līdz četras nedēļas. **Labākā atrašanās vieta:** Daudz saules veicina bagātīgu ziedēšanu. Tomēr, ja temperatūra ir krietni virs 40 ° C, kaislības zieds pārstāj augt un ziedēt un atliek ziedēšanu uz vēsākajiem vasaras beigām vai rudens mēnešiem. No maija līdz oktobrim ir pieejamas arī sēdvietas ārpus telpām. Bet tas ir jāievieš pirms pirmajām nakts salnām. **Optimāla aprūpe:** Sweet Granadilla ir taupīgs augsnes kvalitātes ziņā. Vienmēr uzturiet augsni mitru, taču izvairieties no aizsērēšanas un pārmērīgi kalķaina apūdeņošanas ūdens. Smags sausums var izraisīt lapu zudumu un zirnekļa ērcu invāziju. Vislabāk ir katru nedēļu no aprīļa līdz oktobrim segt barības vielu nepieciešamību ar šķidru konteineru augu mēslojumu. Dzinumus, kas izaug pārāk gari un vairs nevar atrast vietu uz kāpšanas palīgdlīdzekļa, var nekavējoties saīsināt no aprīļa līdz jūnijam. Tā kā pasifloras zieds ātri iesakņojas podā, katra gada martā to vajadzētu pārstādīt nedaudz lielākā traukā. **Ziemā:** Saldā granadilla vislabāk pārziemo spilgtā gaismā 5–15 ° C temperatūrā. Ja saldā granadilla pārziemo kā telpaugs, jāizvēlas ļoti gaiša vieta, pretējā gadījumā augs nomirst. Atkarībā no ziemas vietu salstums un gaismas daļa lapotnes paliek vai pilnībā nobirst. Turpiniet nedaudz laistīt atkarībā no atlikušās lapu masas, lai sakņu kamols pilnībā neizžūtu. Ziemas beigās bez problēmām iespējama enerģiska atzarošana līdz dzinuma garumam 20–30 cm, jo pasifloras ziedi ātri atjaunojas. Pēc tam jaunie dzinumi atkal notiek no marta līdz aprīlim.



Saldžios granadilēs

Passiflora ligularis

Augalas skanioms pasiflorų sultims

Saldžioji granadilė, auganti kaip vijoklinis augalas, vitaminingoms pasiflorų sultims iš visų pasiflorų ne tik išaugina didžiausius vaisius, bet ir skiriasi nuo savo giminaičių kitais atžvilgiais. Jų lapai yra ne piršto formos, kaip įprasta, o beveik širdies formos ir turi visas pakraščius. Jūsų iki 10 centimetrų didelių gėlių aureolė yra baltai violetinė. Gėlės dažnai būna poromis ant iki keturių centimetrų ilgio stiebelių. Passiflora ligularis auga lėtai ir susisuka mažiau nei jo giminaičiai, bet auga beveik tiesiai į viršų. Tačiau ji galima lengvai vairuoti ant laipiojimo rėmų. Nesubrendę vaisiai yra melsvai žali ir dažnai padengti mažomis žalsvais dėmėmis, prinoke vaisiai turi blizgančią oranžinės-gelsvos spalvos odelę. Vaisiai dažnai valgomai švieži su sėklomis kaip desertas. **Natūrali vieta:** Natūralus arealas yra Pietų Amerikoje, Centrinėje Amerikoje ir Meksikoje. Dabar jis taip pat auginamas subtropinėse Afrikos, Azijos ir Australijos srityse. **Sėkmingas auginimas:** Auginti iš sėklų patalpoje galima ištisus metus. Norint padidinti sėklų daigumą, jas pirmiausia reikėtų per naktį pamirkyti kambario temperatūros vandenyje. Tada pabarstykite sėklas ant drėgnos auginimo žemės ir tik plonai uždenkite auginimo terpe. Ant kultivavimo indo užtieskite maistinę plėvelę ir įdarykite kelias skylutes. Tai apsaugo dirvą nuo išdžiūvimo. Kas dvi ar tris dienas 2 valandas nuimkite foliją. Tai neleidsia augančioje dirvoje susidaryti pelėsiui. Sėklų vazoną pastatykite šviesioje ir šiltoje vietoje, kurios temperatūra yra 20–25 ° C, o vazono žemė turi būti drėgna, bet ne šlapia. Patirtis rodo, kad tada sudygs ta nuo dviejų iki keturių savičių. **Geriausia vieta:** Daug saulės skatina gausų žydėjimą. Tačiau esant gerokai aukštesnei nei 40 ° C temperatūrai, pasiflora nustoja augti ir žydėti, o žydėjimas nukeliamas į vėsesnius vasaros pabaigos ar rudens mėnesius. Lauke taip pat galima sėdėti nuo gegužės iki spalio. Tačiau ji reikia atnešti iki pirmųjų nakties šalnų. **Optimali priežiūra:** „Sweet Granadilla“ yra taupus dirvožemio kokybei. Visada laikykite dirvą drėgną, tačiau venkite užmirškimo ir per daug kalkingo laistymo vandens. Didelė sausra gali sukelti lapų praradimą ir voratinklinių erkių užkrėtimą. Maistinių medžiagų poreikį geriausia kas savaitę nuo balandžio iki spalio padengti skystomis konteinerinėmis augalų trąšomis. Ūglius, kurie užauga per ilgį ir neberanda vietos ant laipiojimo pagalbinės priemonės, galima iš karto patrupinti nuo balandžio iki birželio. Kadangi pasifloros gėlė greitai įsiaknija per vazoną, kiekvienų metų kovo mėnesį turėtumėte persodinti ją į šiek tiek didesnę indą. **Ziema:** Saldžiosios granadilės geriausiai žiemoja ryškioje šviesoje nuo 5 iki 15 ° C. Jei saldžiosios granadilės žiemoja kaip kambarinis augalas, reikėtų rinktis labai šviesią vietą, kitaip augalas nuvys. Priklausomai nuo žiemos vietos šilumos ir šviesos, dalis lapijos lieka arba visiškai nubyra. Toliau šiek tiek laikykite, priklausomai nuo likusių lapų masės, kad šaknų gumulėlis visiškai neišdžiūtų. Žiemos pabaigoje be problemų galimas energingas genėjimas iki 20–30 cm ilgio, nes pasifloros greitai atsinaujina. Tada nauji ūgliai vėl vyksta nuo kovo iki balandžio.



Granadilla helwa

Passiflora ligularis

L-impjant għall-meraq Delicious tal-frott tal-passjoni

Il-grenadilla helwa, li tikber bħala pjanta li tixbit, mhux biss tipproduċi l-akbar frott tal-fjuri tal-passjoni kollha għall-meraq tal-frott tal-passjoni b'ħafna vitamini, iżda wkoll differenti mill-graba tagħha f'aspetti oħra. Il-weraq tagħhom mhemmxiex f'forma ta' 'saba' bħas-soltu, iżda kważi f'forma ta' 'qalb u għandhom margiġni shah. L-awreola tal-fjuri kbar tiegħe sa 10 centimetri hija banded abjad-vjola. Il-fjuri spiss ikunu f'pari fuq żuk ukw twal sa erba' centimetri. Il-Passiflora ligularis tikber bil-mod u spag inqas mill-graba tagħha, iżda tikber kważi dritta 'l fuq. Iżda jista' jiġi mmexxi faċilment fuq frejms tat-tixbit. Frott immaturu huma blu-aħdar u ħafna drabi mgħottija b'tikek zgħir bojod fl-aħdar, frott misjur għandu gilda oranġjo-isfar tiegħ. Il-frott spiss jittiekel frisk maż-żrieragħ bħala dezerta. **Post naturali:** Il-firxa naturali tinsab fl-Amerika l'Isfel, l-Amerika Centrali u l-Messiku. Issa huwa kkultivat ukoll f'żoni subtropikali tal-Afrika, l-Asja u l-Awstralja. **Kultivazzjoni b'suċċess:** It-tkabbir miż-żrieragħ għewwa huwa possibbli s-sena kollha. Sabiex tiżdid il-kapaċità tal-germinazzjoni taż-żrieragħ, l-ewwel għandhom jixxarrbu fl-ilma f'temperatura tal-kamra matul il-lejl. Imbagħad roxx iż-żrieragħ fuq ħamrija niedja li qed tikber u tkoprihom biss iriq bil-mezz tat-tkabbir. Stretch cling film fuq il-bastiment tal-kultura u poka f'it toqob fil-film. Dan jipproteġi l-ħamrija milli tinxf. Għandek tneħħi l-fojl għal sagħtejn kull jumejn jew tlett ijiem. Dan jipprevjeni l-iffurmar tal-moffa fuq il-ħamrija li qed tikber. Poġġi l-borma taż-żerriegħa f'post ħafif u shun b'20 sa 25 ° Celsius u żomm il-ħamrija tal-qsa niedja iżda mhux imxarrba. L-esperjenza wriet li mbagħad tieħu ġimgħtejn sa erba' ġimgħat biex tiġġermina. **L-aħjar post:** Lottijiet ta' 'xemx jippromwovi fl-jurta rikka. F'ħafna aktar minn 40 ° Celsius, madankollu, il-fjura tal-passjoni tieqaf tikber u tifjorixxi u tipposponi l-fjur għax-xhur aktar keshin tas-sajf tard jew tal-ħarifa. Bilqiegħda fuq barra hija wkoll disponibbli minn Mejju sa Ottubru. Iżda trid tingħieb qabel l-ewwel għata tal-lejl. **Kura ottimali:** Il-Granada Helwa hija frugali f'termini ta' kwalità tal-ħamrija. Dejjem żomm il-ħamrija niedja, imma evita l-ilma u l-ilma tal-irrigazzjoni eċċessivament kalkarju. Nixfa severa tista' twassal għal telf ta' weraq u infestazzjoni tad-dud tal-brimba. L-aħjar huwa li tkopri l-ħtieġa tan-nutrijent kull ġimgħa minn April sa Ottubru b'fertilizzant tal-pjanti tal-kontenitur likwidu. Ir-rimjiet li jikbru wisq u ma jistgħux isibu aktar spazju fuq l-għajjnuna għat-tixbit jistgħu jitqassru immedjatament minn April sa Ġunju. Peress li l-fjura tal-passjoni malajr tneħħi l-għeruq mill-borma, għandek repotha f'kontenitur kemmxejn akbar f'Marzu ta' kull sena. **Fix-xitwa:** Il-granadilla helwa tiberna l-aħjar f'dawl qawwi f'temperatura ta' 5 sa 15 ° Celsius. Jekk il-granadilla helwa tixbit bħala pjanta tad-dar, għandek tagħzel post qawwi ħafna, inkella l-pjanta dbiel. Skont is-shana u d-dawl tal-post tax-xitwa, parti mill-weraq tibqa' 'jew tintefa' kompletament. Kompli ilma f'it, skond il-massa tal-weraq li jifdal, sabiex il-boċċa ta' l-għeruq ma tinxf kompletament. Żbir vigoruż għal tul ta' rimja ta' 20-30 cm fl-aħħar tax-xitwa huwa possibbli mingħajr problemi, peress li l-fjuri tal-passjoni jirriġeneraw malajr. Ir-rimjiet il-godda mbagħad jerġgħu jsiru minn Marzu sa April.



Zoete Granadilla

Passiflora ligularis

De plant voor het heerlijke passievruchtensap

De zoete grenadille, die groeit als klimplant, vormt niet alleen de grootste vrucht van alle passiebloemen voor het vitaminerijke passievruchtensap, maar verschilt ook op andere manieren van zijn verwanten. Het blad is niet zoals gewoonlijk vingervormig, maar bijna hartvormig en met hele randen. De corona van je tot 10 centimeter grote bloemen is wit-paars gestreept. De bloemen staan vaak paarsgewijs aan stengels tot vier centimeter lang. De Passiflora ligularis groeit langzaam en kronkelt minder dan zijn verwanten, maar groeit bijna recht omhoog. Maar hij kan gemakkelijk op klimrekken worden gestuurd. Onrijpe vruchten zijn blauwgroen en vaak bedekt met kleine groenachtig witte stippen, rijpe vruchten hebben een glanzende oranjegele schil. De vruchten worden als toetje vers met de zaden gegeten. **Natuurlijke locatie:** Het natuurlijke verspreidingsgebied is in Zuid-Amerika, Midden-Amerika en Mexico. Het wordt nu ook verbouwd in de subtropische gebieden van Afrika, Azië en Australië. **Succesvolle teelt:** Binnen kweken uit zaden is het hele jaar mogelijk. Om de kiemkracht van de zaden te vergeten, moeten ze eerst een nacht in water van kamertemperatuur weken. Strooi de zaden vervolgens op vochtige potgrond en bedek ze slechts dun met het groeimedium. Rek vershoudfolie over de kweekbak en prik een paar gaatjes in de folie. Dit beschermt de aarde tegen uitdroging. Om de twee tot drie dagen moet u de film gedurende 2 uur verwijderen. Dit voorkomt schimmelvorming op de teeltgrond. Zet de kweekbak op een lichte en warme plaats met 20 à 25 ° Celsius en houd de kweekgrond vochtig, maar niet nat. De ervaring leert dat het twee tot vier weken duurt voordat ze ontkiemen. **De beste locatie:** Veel zon bevordert een rijke bloei. Bij ruim 40 ° Celsius stopt de passiebloem echter met groeien en het ontwikkelen van bloemen en stelt ze de bloei uit naar de koelere maanden in de nazomer of herfst. Van mei tot oktober is ook een buitenruimte mogelijk. Voor de eerste nachtvorst moet het echter worden binnengebracht. **Optimale verzorging:** De zoete granadilla is zuinig qua bodemkwaliteit. Houd de grond altijd vochtig, maar vermijd wateroverlast en te kalkhoudend gietwater. Ernstige droogte kan leiden tot bladverlies en spintmijten. De beste manier om aan de voedingsbehoeften te voldoen, is wekelijks van april tot oktober met vloeibare potplantenmest. Te lange scheuten die niet op de klimplank passen, kunnen van april tot juni direct worden ingekort. Omdat de passiebloem snel door de pot wortelt, moet je deze elk jaar in maart in een iets grotere pot verpotten. **In de winter:** De zoete granadilla overwintert het best bij een lichte temperatuur van 5 tot 15 ° Celsius. Als de Sweet Granadilla overwintert als kamerplant, kies dan voor een zeer lichte standplaats, anders hardt de plant uit. Afhankelijk van de warmte en het licht van de winterplaats blijft een deel van het loof behouden of wordt volledig afgestoten. Afhankelijk van de resterende bladmassa zoveel water blijven geven dat de kluit niet helemaal uitdroogt. Een sterke terugsnij tot een scheutlengte van 20-30 cm in de late winter is zonder problemen mogelijk, daar de passiebloemen snel regenereren. De nieuwe shoot vindt dan weer plaats van maart tot april.



Søt granadilla Passiflora ligularis Planten for den deilige pasjonsfruktjuice

Den søte granadillaen, som vokser som en klatreplante, produserer ikke bare de største fruktene av alle pasjonsblomster til den vitaminrike pasjonsfruktjuicen, men skiller seg også fra sine slektninger på andre måter. Bladene deres er ikke fingerformede som vanlig, men nesten hjerteformede og har hele marginer. Aureolen til dine opptil 10 centimeter store blomster er båndet hvit-lilla. Blomstene er ofte parvis på stilker opptil fire centimeter lange. Passiflora ligularis vokser sakte og snor seg mindre enn sine slektninger, men vokser nesten rett opp. Men den kan enkelt styres opp på klatrestativer. Umodne frukter er blågrønne og ofte dekket med små grønnhvite flekker, modne frukter har et skinnende oransje-gult skall. Fruktene spises ofte ferske med frøene som dessert. **Naturlig beliggenhet:** Det naturlige området er i Sør-Amerika, Mellom-Amerika og Mexico. Den dyrkes nå også i de subtropiske områdene i Afrika, Asia og Australia. **Vellykket dyrking:** Å dyrke fra frø innendørs er mulig hele året. For å øke spireevnen til frøene bør de først bløtlegges i vann ved romtemperatur over natten. Dryss så frøene på fuktig vekstjord og dekk dem kun tynt med vekstmediet. Strekk matkåret over kulturkaret og stikk noen hull i filmen. Dette beskytter jorda mot å tørke ut. Du bør fjerne folien i 2 timer annenhver til tredje dag. Dette forhindrer at det dannes mugg på den voksende jorda. Plasser frøpotten på et lett og varmt sted med 20 til 25 ° Celsius og hold pottejorda fuktig, men ikke våt. Erfaring har vist at det tar to til fire uker å spire. **Den beste beliggenheten:** Mye sol fremmer rik blomstring. Ved godt over 40 ° Celsius slutter imidlertid pasjonsblomsten å vokse og blomstre og utsetter blomstringen til de kjøligere månedene sensommeren eller høsten. Uteservering er også tilgjengelig fra mai til oktober. Men den må inn før de første nattefrostene. **Optimal omsorg:** The Sweet Granadilla er nøysom når det gjelder jordkvalitet. Hold alltid jorda fuktig, men unngå vannfylling og for kalkholdig vanningsvann. Alvorlig tørke kan føre til tap av blader og angrep av edderkoppmidd. Det er best å dekke næringsbehovet ukentlig fra april til oktober med flytende beholderplantegjødsel. Skudd som blir for lange og ikke lenger får plass på klatrehjelpen kan forkortes umiddelbart fra april til juni. Siden pasjonsblomsten raskt røtter gjennom potten, bør du ompotte den i en litt større beholder i mars hvert år. **Om vinteren:** Den søte granadillaen dvaler best i sterkt lys ved 5 til 15 ° Celsius. Hvis den søte granadillaen overvintrer som stueplante, bør du velge et veldig lyst sted, ellers vil planten visne. Avhengig av varmen og lyset på vinterstedet, forblir en del av løvet eller er helt falt. Fortsett å vanne litt, avhengig av gjenværende bladmasse, slik at rotklumpen ikke tørker helt ut. En kraftig beskjæring til en skuddlengde på 20-30 cm på senvinteren er mulig uten problemer, siden pasjonsblomster fornyes raskt. De nye skuddene finner sted igjen fra mars til april.



Słodka Granadilla Passiflora ligularis Roślina na przepyszny sok z marakui

Sweet Granadilla to pnącze, które nie tylko produkuje największe owoce ze wszystkich gatunków Passiflora, które są używane do produkcji soku z marakui z witaminami, ale różni się od swoich pokrewnych również innymi aspektami. Jego liście nie są zwykłe palcowe, ale prawie całkowicie w kształcie serca, a korona dużych kwiatów do 10 cm jest biało-fioletowa z wązka. Kwitnienie głównie parami na łodygach o długości do 4 cm. Passiflora ligularis rośnie wolno i wije się mniej niż inne gatunki - zamiast tego rośnie prawie prosto, podczas gdy można ją łatwo skierować za pomocą pomocy wspinaczkowej. Niedojrzałe owoce mają niebiesko-zieloną barwę, często z małymi zielono-białymi kropkami, natomiast dojrzałe owoce mają błyszczącą żółto-pomarańczową skórkę. Świeże owoce i nasiona są powszechnie spożywane na deser. **Naturalne położenie:** Naturalne siedlisko Sweet Granadilla znajduje się w Ameryce Południowej, Ameryce Środkowej i Meksyku. Obecnie uprawiana jest również w subtropikalnych regionach Afryki, Azji i Australii. **Udana uprawa:** Rozmnażanie nasion w pomieszczeniach jest możliwe przez cały rok. Aby zwiększyć zdolność kiełkowania, nasiona należy umieścić na noc w misce z letnią wodą w celu przygotowania. Następnie rozłóż nasiona na wilgotnym kompoście doniczkowym, nałóż niewielką ilość ziemi kompostowej na wierzch i przykryj pojemnik na nasiona przezroczystą folią, aby zapobiec wysychaniu ziemi. Nie zapomnij zrobić dziur w przezroczystej folii i zdejmuj ją co drugi lub trzeci dzień na około 2 godziny. W ten sposób unikniesz tworzenia się pleśni na kompoście doniczkowym. Umieść pojemnik na nasiona w miejscu jasnym i ciepłym o temperaturze od 20 ° do 25 ° Celsjusza i utrzymuj ziemię wilgotną, ale nie mokrą. Zazwyczaj kiełkowanie trwa od dwóch do czterech tygodni. **Najlepsza lokalizacja:** Dużo słońca przyspieszy kwitnienie. Tylko w temperaturach powyżej 40 ° Celsjusza Sweet Granadilla opóźni swój wzrost i kwitnienie do chłodniejszych miesięcy późnym latem lub jesienią. Od maja do października można go również trzymać na zewnątrz, ale przed pierwszym nocnym przymrozkiem należy go przenieść do środka. **Optymalna pielęgnacja:** Sweet Granadilla nie potrzebuje żadnej specjalnej gleby do uprawy. Po prostu utrzymuj ziemię w stałej wilgotności bez podlewania i używaj najlepiej wody z niedoborem wapna. Istnieje większe ryzyko uszkodzenia liści lub przedziorków, gdy roślina jest zbyt sucha. Od kwietnia do października możesz co tydzień podawać płynny nawóz do roślin doniczkowych. Długie pędy, które wyrastają z pomocy wspinaczkowej, można przycinać od kwietnia do czerwca. Ponieważ korzenie Słodkiej Granadilli rozwijają się dość szybko, co roku w okolicach marca należy przesuwać roślinę do nieco większej doniczki. **W zimie:** Sweet Granadilla najlepiej hibernuje w temperaturze od 5 ° C do 15 ° Celsjusza. Rośliny domowe powinny być trzymane w bardzo jasnym miejscu, w przeciwnym razie może dojść do uszkodzenia. W zależności od poziomu ciepła i światła, w jakim utrzymywana jest roślina, rzuca liście całkowicie lub tylko częściowo. Podlewać swoją Passiflorę skromnie, zgodnie z listowiem i nie pozwól, aby korzenie wyschły. Ponieważ Sweet Granadilla regeneruje się dość szybko, późną zimą można z łatwością wykonać nawet mocne cięcie z przycięciem długich pędów do 20 lub 30 cm. Roślina będzie strzelać ponownie od marca do kwietnia.



Granadilha doce Passiflora ligularis A planta para o delicioso suco de maracujá

A romã doce, que cresce como trepadeira, não só produz os maiores frutos de todas as flores de maracujá para o suco de maracujá rico em vitaminas, mas também difere de seus parentes em outros aspectos. Suas folhas não são em forma de dedo como de costume, mas quase em forma de coração e têm margens inteiras. A auréola de suas flores grandes de até 10 centímetros é listrada de branco a roxo. As flores são frequentemente em pares em hastes de até quatro centímetros de comprimento. A Passiflora ligularis cresce lentamente e se enrola menos que suas parentes, mas cresce quase reta. Mas pode ser facilmente conduzido em estruturas de escalada. Os frutos imaturos são verde-azulados e muitas vezes cobertos com pequenas manchas branco-esverdeadas, os frutos maduros têm uma casca amarelo-alaranjada brilhante. As frutas são frequentemente comidas frescas com as sementes como sobremesa. **Localização natural:** A distribuição natural é na América do Sul, América Central e México. Agora também é cultivada nas áreas subtropicais da África, Ásia e Austrália. **Cultivo bem sucedido:** Cultivar a partir de sementes dentro de casa é possível durante todo o ano. Para aumentar a capacidade de germinação das sementes, elas devem primeiro ficar de molho em água à temperatura ambiente durante a noite. Em seguida, polvilhe as sementes em solo úmido e cubra-as apenas com o meio de cultivo. Estique o filme plástico sobre o recipiente de cultura e faça alguns furos no filme. Isso protege o solo de secar. Você deve remover o papel alumínio por 2 horas a cada dois ou três dias. Isso evita a formação de mofo no solo em crescimento. Coloque o vaso de sementes em um local claro e quente com 20 a 25 ° Celsius e mantenha o solo do vaso úmido, mas não molhado. A experiência mostra que leva de duas a quatro semanas para germinar. **A melhor localização:** Muito sol promove uma rica floração. Com bem mais de 40 ° Celsius, no entanto, a flor da paixão para de crescer e florescer e adia a floração para os meses mais frios do final do verão ou outono. Assentos ao ar livre também estão disponíveis de maio a outubro. Mas tem que ser trazido antes das primeiras geadas noturnas. **Cuidado ideal:** O Sweet Granadilla é frugal em termos de qualidade do solo. Mantenha sempre o solo úmido, mas evite o encharcamento e a água de irrigação excessivamente calcária. A seca severa pode levar à perda de folhas e infestação de ácaros. É melhor cobrir a necessidade de nutrientes semanalmente de abril a outubro com fertilizante líquido para plantas. Os brotos que crescem muito e não conseguem mais encontrar espaço no auxílio de escalada podem ser encurtados imediatamente de abril a junho. Como a maracujá se enraíza rapidamente no vaso, você deve replantá-la em um recipiente um pouco maior em março de cada ano. **No inverno:** A doce granadilla hiberna melhor sob luz forte de 5 a 15 ° Celsius. Se a doce granadilla hiberna como planta de casa, você deve escolher um local bem iluminado, caso contrário, a planta murchará. Dependendo do calor e da luz do local de inverno, parte da folhagem permanece ou cai completamente. Continue a regar ligeiramente, dependendo da massa foliar restante, para que o torrão não seque completamente. Uma poda vigorosa para um comprimento de broto de 20-30 cm no final do inverno é possível sem problemas, pois as flores de maracujá se regeneram rapidamente. As novas brotações ocorrem novamente de março a abril.



Granadilla Dulce Passiflora ligularis Planta pentru deliciosul suc de fructe din pasiune

Grenadila dulce, care crește ca plantă câțărătoare, nu numai că formează cele mai mari fructe din toate florile pasiunii pentru sucul bogat în vitamine din fructul pasiunii, dar diferă și de rudele sale în alte moduri. Frunzele sale nu sunt în formă de deget ca de obicei, ci aproape în formă de inimă și cu margini întregi. Nimbul florilor tale, care au o dimensiune de până la 10 centimetri, este bandat în alb și violet. Florile sunt adesea în perechi pe tulpini de până la patru centimetri lungime. Passiflora ligularis crește încet și se răsucesce mai puțin decât rudele sale, dar crește aproape drept în sus. Dar poate fi direcționat cu ușurință pe rame de alpinism. Fructele necoapte sunt albastru-verzi și adesea acoperite cu mici puncte alb-verzuie, fructele coapte au o piele strălucitoare de culoare galben-portocaliu. Fructele se consumă proaspete cu semințele ca desert. **Locație naturală:** Gama naturală este în America de Sud, America Centrală și Mexic. Acum este cultivată și în zonele subtropicale din Africa, Asia și Australia. **Cultivare de succes:** Cultivarea din semințe în interior este posibilă pe tot parcursul anului. Pentru a crește capacitatea de germinare a semințelor, acestea trebuie mai întâi să se înmoale în apă la temperatura camerei peste noapte. Apoi presărați semințele pe sol umed de ghevi și acoperiți-le doar subțire cu creșterea. Întindeți folia alimentară peste recipientul de cultivare și introduceți câteva găuri în film. Acest lucru protejează pământul de uscare. La fiecare două până la trei zile ar trebui să îndepărtați filmul timp de 2 ore. Acest lucru previne formarea mucegaiei pe solul de cultivare. Așezați vasul de cultivare într-un loc luminos și cald, cu 20-25 ° Celsius și mențineți solul de cultivare umed, dar nu umed. Experiența arată că durează două până la patru săptămâni până la germinare. **Cea mai bună locație:** Mult soare favorizează înflorirea bogată. Cu mult peste 40 ° Celsius, totuși, floarea pasiunii încetează să crească și să dezvolte flori și amână înflorirea la lunile mai reci la sfârșitul verii sau toamna. Din mai până în octombrie este posibil și un spațiu în aer liber. Înainte de îngheturile din prima noapte, totuși, trebuie adus. **Îngrijire optimă:** Granadilla dulce este frugală în ceea ce privește calitatea solului. Păstrați întotdeauna solul umed, dar evitați umezeala și apa de irigare care este prea calcaroasă. Seceta severă poate duce la pierderea frunzelor și la infestarea cu acarieni. Cel mai bun mod de a îndeplini cerințele nutriționale este săptămânal din aprilie până în octombrie cu îngrășământ lichid pentru plante în ghevi. Lăstarii care devin prea lungi și nu se pot încadra pe ajutorul pentru urcare pot fi scurtați imediat din aprilie până în iunie. Întrucât rădăcinile florilor pasiunii trec rapid prin ghevi, ar trebui să le repotați într-un recipient puțin mai mare în luna martie a fiecărui an. **În iarnă:** Granadilla dulce hibernează cel mai bine la o temperatură ușoară de 5 până la 15 ° Celsius. Dacă Granadilla dulce iernează ca plantă de apartament, ar trebui să alegeți o locație foarte luminoasă, altfel planta se va vindeca. În funcție de căldura și lumina locului de iarnă, o parte din frunziș este păstrată sau complet vărsată. În funcție de masa frunzelor rămase, continuați să udați atât de mult încât bila de rădăcină să nu se usuce complet. O tăiere puternică înapoi la o lungime de lăstare de 20-30 cm la sfârșitul iernii este posibilă fără probleme, deoarece florile pasiunii se regenerază rapid. Noua filmare are loc din nou din martie până în aprilie.



Söt Granadilla Passiflora ligularis Växten för den läckra passionsfruktsaften

Den söta grenadilla, som växer som en klättringsväxt, bildar inte bara de största frukterna av alla passionblommor för den vitaminrika passionsfruktsaften utan skiljer sig också från sina släktingar på andra sätt. Bladen är inte fingerformade som vanligt, utan nästan hjärtformade och med hela marginaler. Kronan på dina upp till 10 centimeter stora blommor är vitlila. Blommorna är ofta parvis på stjälkarna upp till fyra centimeter långa. Passiflora ligularis växer långsamt och vrider sig mindre än sina släktingar, men växer nästan rakt uppåt. Men det kan enkelt styras upp på klätterställen. Omogna frukter är blågröna och ofta täckta med små grönvita prickar, mogna frukter har en blank orange-gul hud. Frukterna äts färska med fröna som en efterrätt. **Naturligt läge:** Det naturliga utbudet finns i Sydamerika, Centralamerika och Mexiko. Det odlas nu också i de subtropiska områdena Afrika, Asien och Australien. **Framgångsrik odling:** Att odla från frön inomhus är möjligt året runt. För att öka fröns gröningskapacitet bör de först blötas i vatten vid rumtemperatur över natten. Strö sedan frön på fuktig krukväxt och täck dem bara tunt med ett växande substrat. Sträck folie över odlingsbehållaren och sticka några hål i filmen. Detta skyddar jorden från att torka ut. Varannan till var tredje dag ska du ta bort filmen i två timmar. Detta förhindrar att mögel bildas på odlingsjorden. Placera odlingskärlet på en ljus och varm plats med 20 till 25 ° Celsius och håll odlingsjorden fuktig men inte våt. Erfarenheten visar att det tar två till fyra veckor för spiring. **Den bästa platsen:** Gott om sol främjar riklig blomning. Vid långt över 40 ° C slutar dock passionsblomman växa och utveckla blommor och skjuter upp blomningen till de kallare månaderna på sensommaren eller hösten. Från maj till oktober är det också möjligt med ett utomhusutrymme. Innan de första nattfrostarerna måste den dock tas in. **Optimal vård:** Den söta granadilla är sparsam när det gäller jordkvaliteten. Håll alltid jorden fuktig, men undvik vatten- och bevattningsvatten som är för kalkhaltigt. Allvarlig torka kan leda till bladförlust och angrepp av spindelmider. Det är bäst att täcka närsämsbehovet varje vecka från april till oktober med flytande krukväxtgödsel. Skott som blir för långa och inte passar på klättringshjälpen kan förkortas omedelbart från april till juni. Eftersom passionsblomman rötter snabbt genom potten bör du lägga om den i en något större behållare i mars varje år. **På vintern:** Den söta granadilla övervintrar bäst vid en ljustremperatur på 5 till 15 ° Celsius. Om Sweet Granadilla övervintrar som en krukväxt, bör du välja en mycket ljus plats, annars kommer växten att bota. Beroende på vinterplatsens värme och ljus behålls en del av lövverket eller skjuts helt ut. Beroende på kvarvarande lövmassa, fortsätt att vattna så mycket att rotkulan inte torkar helt ut. En stark nedskärning till en skottlängd på 20-30 cm på senvintern är möjlig utan problem, eftersom passionblommor regenererar snabbt. Den nya filmen äger rum sedan från mars till april.



Sladká granadilla Passiflora ligularis Rastlina pre lahodnú šťavu z marakuje

Sladká granadilla, ktorá rastie ako popínava rastlina, dáva nielen najväčšie plody zo všetkých mučenky pre šťavu z mučenky bohatej na vitamíny, ale od svojich príbuzných sa odlišuje aj v iných ohľadoch. Ich listy nie sú v tvare prstov ako zvyčajne, ale takmer v tvare srdca a majú celé okraje. Aureola vašich až 10 centimetrov veľkých kvetov je páskavá bielo-fialová. Kvety sú často v pároch na stopkách dlhých až štyri centimetre. Passiflora ligularis rastie pomaly a motá sa menej ako jej príbuzní, ale rastie takmer rovnako. Ale dá sa ľahko nasmerovať na preliezky. Nezrelé plody sú modrozelené a často pokryté malými zelenobielymi škvrnami, zrelé plody majú lesklú oranžovožltú šupku. Plody sa často konzumujú čerstvé so semenami ako dezert. **Prirodzená poloha:** Prirodzený areál je v Južnej Amerike, Strednej Amerike a Mexiku. V súčasnosti sa pestuje aj v subtropických oblastiach Afriky, Ázie a Austrálie. **Úspešná kultivácia:** Pestovanie zo semien v interiéri je možné po celý rok. Aby sa zvýšila klíčivosť semien, mali by sa najskôr cez noc namočiť do vody pri izbovej teplote. Semená potom nasypte na vlhkú pôdu na pestovanie a pestovateľským médiom ich prikryte len natenko. Natiahnite príľnavú fóliu na nádobu s kultúrou a urobte do nej niekoľko otvorov. To chráni pôdu pred vysychaním. Fóliu by ste mali odstraňovať na 2 hodiny každé dva až tri dni. To zabráňuje tvorbe plesní na rastúcej pôde. Črepník umiestnite na svetlé a teplé miesto s teplotou 20 až 25 ° C a udržiavajte pôdu v črepníku vlhkú, ale nie mokrú. Prax ukázala, že klíčenie potom trvá dva až štyri týždne. **Najlepšie umiestnenie:** Vela slnka podporuje bohaté kvitnutie. Pri teplotách výrazne nad 40 ° C však mučenka prestáva rásť a kvitnúť a kvitnutie odkladá na chladnejšie mesiace neskorého leta alebo jesene. Od mája do októbra je k dispozícii aj vonkajšie posedenie. Treba ho ale priviesť pred prvými nočnými mrazmi. **Optimálna starostlivosť:** Sladká Granadilla je šetrná z hľadiska kvality pôdy. Pôdu udržiavajte vždy vlhkú, ale vyhňte sa premokreniu a nadmerne väpenej závlahovej vode. Sladká granadilla prezimuje ako izbová rastlina, mali by ste zvoliť veľmi svetlé miesto, inak rastlina vädnje. V závislosti od tepla a svetla na zimovisku časť listia zostáva alebo úplne opadáva. Pokračujte v miernej zálievke, podľa zvyšnej hmoty listov, aby koreňový bal úplne nevyschol. Výrazný rez na dĺžku výhonku 20-30 cm koncom zimy je možný bez problémov, pretože mučenky rýchlo regenerujú. Nové výhonky sa potom uskutočnia opäť od marca do apríla.



Sladka granadilla Passiflora ligularis Rastlina za okusen sok iz pasijonke

Sladka granadilla, ki raste kot vzpenjavka, poleg tega, da za vitamínsko bogat sok pasijonke ne obrodi največjih plodov med vsemi pasijonkami, ampak se od svojih sorodnic razlikuje tudi v drugih pogledih. Njihovi listi niso prstasti kot običajno, ampak skoraj srčasti in imajo cele robove. Aureola vaših do 10 centimetrov velikih cvetov je trakasto belo-vijolična. Cvetovi so pogosto v parih na do štiri centimetre dolgih pecljih. Passiflora ligularis raste počasi in se manj zvija kot njeni sorodniki, vendar raste skoraj naravnost navzgor. Z lahkoto pa ga je mogoče usmerjati na plezalnih okvirjih. Nezreli plodovi so modrozeleni in pogosto pokriti z majhnimi zelenkasto-belimi lisami, zreli plodovi imajo bleščečo oranžno-rumeno lupino. Plodove pogosto uživamo sveže s semeni kot sladico. **Naravni habitat:** Naravno območje razširjenosti je v Južni Ameriki, Srednji Ameriki in Mehiki. Zdaj ga gojijo tudi v subtropskih območjih Afrike, Azije in Avstralije. **Navodila za gojenje:** Gojenje iz semen v zaprtih prostorih je možno vse leto. Da bi povečali kalivost semen, jih najprej čez noč namočite v vodi pri sobni temperaturi. Nato semena potresemo po vlažni rastni zemlji in jih le na tanko prekrijemo z rastnim substratom. Preko posode s kulturo napnite živilsko folijo in v folijo prebodite nekaj lukenj. To štiti tla pred izsušitvijo. Vsake dva do tri dni za 2 uri odstranite folijo. S tem preprečimo nastanek plesni na rastni zemlji. Lonček s semeni postavite na svetlo in toplo mesto s temperaturo od 20 do 25 ° C, zemlja v lončku pa naj bo vlažna, vendar ne mokra. Izkušnje so pokazale, da potem traja od dva do štiri tedne, da vzklji. **Najboljša lokacija:** Veliko sonca spodbuja bogato cvetenje. Pri krepko nad 40 ° C pa pasijonka preneha rasti in cveteti ter prestavi cvetenje na hladnejše mesece pozno poletje ali jesen. Od maja do oktobra so na voljo tudi sedeži na prostem. Vendar ga je treba prinesiti pred prvimi nočnimi zmrzali. **Optimalna nega:** Sweet Granadilla je varčna glede kakovosti tal. Tla naj bodo vedno vlažna, vendar se izogibajte premočevanju in pretirano apnenčasti vodi za namakanje. Huda suša lahko povzroči izgubo listov in okužbo s pajkovimi pršicami. Najbolje je, da potrebo po hranilih pokrivате tedensko od aprila do oktobra s tekočim rastlinskim gnojilom v posodah. Poganjke, ki se predolgo razrastejo in ne najdejo več prostora na plezalnem pripomočku, lahko od aprila do junija takoj skrajšamo. Ker se pasijonka hitro ukorenini skozi lonec, jo vsako leto marca presadite v nekoliko večjo posodo. **V zimskem času:** Sladka granadilla najbolje prezimi pri močni svetlobi pri 5 do 15 ° C. Če sladka granadilla prezimi kot sobna rastlina, izberite zelo svetlo lego, drugače bo rastlina ovenela. Odvisno od toplote in svetlobe zimskega prostora ostane del listja ali pa se popolnoma odvzre. Še naprej rahlo zalivamo, odvisno od preostale listne mase, da se koreninska gruda popolnoma ne izsuši. Močna rez na poganjke dolžine 20-30 cm pozno pozimi je mogoča brez težav, saj se pasijonke hitro obnovijo. Novi poganjki nato spet potekajo od marca do aprila.



Granadilla Passiflora ligularis La planta para zumo de la deliciosa fruta de la pasión

La granadilla es una planta trepadora y no solo desarrolla los frutos más grandes de todas las granadas para un zumo rico en vitaminas, sino que también se diferencia de las demás en otros aspectos. Sus hojas no tienen la forma de dedos sino más bien de corazón con bordes enteros. La aureola de sus flores de hasta 10 centímetros, es bandeada de color blanco y morado. Las flores se colocan en pares sobre pedúnculos de hasta 4 centímetros. La passiflora ligularis crece lentamente y se enrosca menos que sus familiares, pero crece casi recta hacia arriba. Se la puede dirigir muy bien sobre un soporte para trepar. Los frutos inmaduros son de color azul verdoso y a menudo cubiertos con puntos blanco verdoso. Los frutos maduros tienen un color naranja brillante. La fruta se consume popularmente como postre con las semillas. **Ubicación natural:** El área natural de expansión se encuentra en América del Sur, América Central y México. Aunque también se cultiva en las zonas subtropicales de África, Asia y Australia. **Cultivo exitoso:** La semilla se puede criar en interior durante todo el año. Mantenga las semillas durante una noche en agua a temperatura ambiente, para hidratarlas y aumentar la germinación de las mismas. Después esparzalas sobre sustrato húmedo y cubralas ligeramente con el mismo sustrato. Cubra el recipiente de cultivo con un film transparente y agüjérelas. Así protegerá la tierra de la desecación. Para evitar la putrefacción del sustrato retire el film cada dos o tres días durante 2 horas. Coloque el recipiente de cultivo en un lugar luminoso y cálido entre 20 y 25 grados y mantenga el sustrato húmedo, pero no mojado. La germinación tarda habitualmente entre dos a cuatro semanas. **La mejor ubicación:** Mucho sol promueve una floración abundante. Pero con bastante más de 40 grados la flor de la pasión deja de crecer y de desarrollar flores y desplaza la floración a los meses de menos calor, al final del verano o en otoño. De mayo a octubre puede mantenerla en un espacio al aire libre. Antes de las primeras heladas debe colocarla en interior. **Cuidado óptimo:** La granadilla es poco exigente en cuanto a la calidad del suelo. Mantenga el suelo húmedo en todo momento, pero evite el anegamiento y el agua con mucha cal. Fuertes sequías puedes conducir a la pérdida de follaje y el ataque de ácaros. Las necesidades nutricionales se cubren con el suministro semanal desde abril a octubre, de fertilizante líquido para plantas en maceta. Los brotes que son demasiado largos y que no tienen espacio en el soporte para trepar, se pueden cortar de inmediato entre abril y junio. Dado que la granadilla desarrolla muchas raíces debe trasplantarla en marzo de cada año a un recipiente un poco más grande. **En el invierno:** La granadilla pasa el invierno preferentemente en un espacio luminoso y con temperaturas de entre 5 a 15 grados. Si mantiene la planta en interior debe proporcionarle un sitio muy luminoso, para evitar que cambie de color y se vuelva amarilla. Dependiendo de la luminosidad y temperatura mantiene una parte de su follaje o lo pierde completamente. Riegue según el follaje existente y para que no se seque el cepellón. Es posible una poda a finales de invierno, hasta una longitud de los brotes de 20 a 30 cm. ya que la planta se recupera muy rápidamente. El rebrote se producirá para marzo o abril.



Sladká granadilla

Passiflora ligularis

Rostlina pro lahodnou šťávu z mučenky

Sladká granadilla, která roste jako popínavá rostlina, produkuje nejen největší plody ze všech mučenek pro šťávu z mučenky bohaté na vitamíny, ale od svých příbuzných se liší i v jiných ohledech. Jejich listy nejsou prstovité jako obvykle, ale téměř srdčité a mají celokrajné okraje. Aureola vaších až 10 centimetrů velkých květů je páskovaná bílofialová. Květy jsou často v párech na stopkách dlouhých až čtyři centimetry. Passiflora ligularis roste pomalu a provazuje se méně než její příbuzní, ale roste téměř rovně. Dá se ale snadno nasměrovat na prolezačkách. Nezralé plody jsou modrozelené a často pokryté malými zelenobílými skvrnami, zralé plody mají lesklou oranžově žlutou slupku. Plody se často konzumují čerstvé se semeny jako dezert. **Přirozená poloha:** Přirozený areál je v Jižní Americe, Střední Americe a Mexiku. Nyní se pěstuje také v subtropických oblastech Afriky, Asie a Austrálie. **Úspěšné pěstování:** Pěstování ze semenek v interiéru je možné po celý rok. Aby se zvýšila klíčivost semen, měla by se nejprve přes noc namočit ve vodě při pokojové teplotě. Poté semena nasypte na vlhkou pěstební půdu a pouze je tence zakryjte pěstebním substrátem. Natáhněte přilnavou fólii přes kultivační nádobu a propíchněte do fólie několik otvorů. To chrání půdu před vysycháním. Fólii byste měli odstraňovat na 2 hodiny každé dva až tři dny. Tím se zabrání tvorbě plísní na rostoucí půdě. Umístěte květináč na světlé a teplé místo s teplotou 20 až 25 °C a udržujte půdu v květináči vlhkou, ale ne mokrou. Praxe ukazuje, že klíčení pak trvá dva až čtyři týdny. **Nejlepší umístění:** Hodně slunce podporuje bohaté kvetení. Při teplotách výrazně nad 40 °C však mučenka přestává růst a kvést a odkládá kvetení na chladnější měsíce pozdního léta nebo podzimu. Od května do října je k dispozici také venkovní posezení. Musí se ale přivést před prvními nočními mrazíky. **Optimální péče:** Sladká Granadilla je šetrná, pokud jde o kvalitu půdy. Půdu udržujte vždy vlhkou, ale vyvarujte se přemokření a nadměrně vápenité zvlahové vody. Silné sucho může vést ke ztrátě listů a napadení sviluškami. Nejlepší je pokrýt potřebu živin týdně od dubna do října tekutým hnojivem pro kontejnery. Příliš dlouhé výhonky, které již nenajdou místo na šplhací pomůcce, lze od dubna do června ihned zkrátit. Protože mučenka rychle prokořeňuje květináč, měli byste ji v březnu každého roku přesadit do o něco větší nádoby. **V zimě:** Sladká granadilla nejlépe hibernuje na jasném světle při 5 až 15° Celsia. Pokud granadilla přezimuje jako pokojová rostlina, měli byste zvolit velmi světlé stanoviště, jinak rostlina uvadne. V závislosti na teplotě a světle umístění často olistění zůstává nebo zcela opadá. Pokračujte v mírném zalévání v závislosti na zbylé hmotě listů, aby kořenový bal úplně nevyschl. V pozdní zimě je bez problémů možný razantní řez na délku výhonu 20-30 cm, protože mučenky rychle regenerují. Nové výhonky pak probíhají znovu od března do dubna.



Tatlı granadilla

Passiflora ligularis

Lezzetli çarkifelek meyve suyu için bitki

Tırmanıcı bir bitki olarak yetişen tatlı granadilla, vitamin bakımından zengin çarkifelek meyvesi suyu için tüm çarkifelek çiçeklerinin en büyük meyvelerini üretmekle kalmaz, aynı zamanda başka açılarından da akrobalarından ayrılır. Yaprakları her zamanki gibi parmak şeklinde değil, neredeyse kalp şeklindedir ve tüm kenarları vardır. 10 santimetreye kadar büyük çiçeklerinin halesi beyaz-mor bantlıdır. Çiçekler genellikle dört santimetre uzunluğa kadar olan saplarda çiftler halinde bulunur. Passiflora ligularis yavaş büyür ve akrobalarından daha az sarılır, ancak neredeyse dik olarak büyür. Ancak tırmanma çerçevelerinde kolayca yönlendirilebilir. Olgunlaşmamış meyveler mavi-yeşildir ve genellikle küçük yeşilimsi beyaz lekelerle kaplıdır, olgun meyveler parlak turuncu-sarı bir kabuğa sahiptir. Meyveler genellikle tatlı olarak tohumlarıyla birlikte taze olarak yenir. **Doğal konum:** Doğal aralık Güney Amerika, Orta Amerika ve Meksika'dadır. Artık Afrika, Asya ve Avustralya'nın subtropikal bölgelerinde de yetiştirilmektedir. **Başarılı yetiştirme:** İç mekanlarda tohumlardan büyüme tüm yıl boyunca mümkündür. Tohumların çimlenme kapasitelerini arttırmak için öncelikle oda sıcaklığındaki suda bir gece bekletmeleri gerekir. Daha sonra tohumları nemli büyüyen toprağa serpin ve yetiştirme ortamıyla sadece ince bir şekilde örtün. Kültür kabının üzerine streç film çekin ve filme birkaç delik açın. Bu, toprağın kurumasını önler. Folyoyu her iki ila üç günde bir 2 saat çıkarmalısınız. Bu, büyüyen toprakta küf oluşumunu önler. Tohum saksısını 20 ila 25°C sıcaklıkta hafif ve sıcak bir yere koyun ve saksı toprağını nemli tutun ama ıslak değil. Deneyimler, çimlenmenin iki ila dört hafta sürdüğünü göstermiştir. **En iyi konum:** Çok fazla güneş, zengin çiçeklenmeyi teşvik eder. Bununla birlikte, 40 °C'nin oldukça üzerinde, çarkifelek çiçeği büyümeyi ve çiçek açmayı durdurur ve çiçeklenmeyi yaz sonu veya sonbaharın daha soğuk aylarına erteler. Açık havada oturma alanı da mayıstan ekime kadar mevcuttur. Ancak ilk gece donlarından önce getirilmesi gerekir. **Optimum bakım:** Tatlı Granadilla, toprak kalitesi açısından tutumludur. Toprağı her zaman nemli tutun, ancak su birikmesinden ve aşırı kireçli sulama suyundan kaçının. Şiddetli kuraklık yaprak kaybına ve örtümcek akarı istilasına yol açabilir. Besin maddesi ihtiyacını Nisan'dan Ekim'e kadar haftalık olarak sıvı kap bitki gübresi ile karşılamak en iyisidir. Çok uzayan ve artık tırmanma yardımında yer bulamayan sürgünler, Nisan'dan Haziran'a kadar hemen kısaltılabilir. Çarkifelek saksıda hızla kök saldığından, her yılın Mart ayında biraz daha büyük bir saksıya dikmelisiniz. **Kışın:** Tatlı granadilla en iyi 5 ila 15°C sıcaklıktaki parlak ışıktaki kış uykusuna yatar. Tatlı granadilla kışı bir ev bitkisi olarak geçiriyorsa, çok aydınlık bir yer seçmelisiniz. aksi takdirde bitki solacaktır. Kışın bulunduğu yerin sıcaklığına ve ışığına bağlı olarak yaprakların bir kısmı kalır veya tamamen dökülür. Kalan yaprak kütlesine bağlı olarak hafifçe sulamaya devam edin, böylece kök toprağı tamamen kurumaz. Çarkifelek çiçekleri hızla yenilediğinden, kış sonunda 20-30 cm'lik bir sürgün uzunluğuna kadar güçlü bir budama sorunsuz bir şekilde mümkündür. Yeni sürgünler daha sonra Mart'tan Nisan'a kadar tekrar yapılır.



Édes granadilla

Passiflora ligularis

Az ízletes maracuja gyümölcsle növénye

A kúszónövényként termő édes grenadilla a vitamindús golgotagyümölcsle számára nemcsak a golgotavirágok legnagyobb termését hozza, hanem más tekintetben is eltér rokonaitól. Leveleik szokás szerint nem ujj alakúak, hanem szinte szív alakúak, és egész szélük van. Legfeljebb 10 centiméteres virágai aureolája fehér-lila sávós. A virágok gyakran párban, legfeljebb négy centiméter hosszú száron vannak. A Passiflora ligularis lassan növekszik, és kevésbé fonódik, mint rokonai, de szinte egyenesen felfelé nő. De könnyen fel lehet kormányozni mászókká. Az éretlen gyümölcsök kékeszöldek és gyakran kis zöldesfehér foltokkal borítottak, az érett gyümölcsök fényes narancssárga héjúak. A gyümölcsöket gyakran frissen, magokkal együtt fogyasztják desszertként. **Természetes elhelyezkedés:** Természetes elterjedési területe Dél-Amerika, Közép-Amerika és Mexikó. Ma már Afrika, Ázsia és Ausztrália szubtrópusi területein is termesztik. **Sikeres termesztés:** A beltéri magvak termesztése egész évben lehetséges. A magvak csírázóképessegének növelése érdekében először egy éjszakán át szobahőmérsékleten vízbe kell áztatni. Ezután szórjuk a magokat a nedves termőtalajba, és csak vékonyan takarjuk be a termesztőközeggel. Nyújtson ragasztófóliát a tenyészedényre, és szúrjon ki néhány lyukat a fóliába. Ez megvédi a talajt a kiszáradástól. A fóliát két-három naponta 2 órára le kell venni. Ez megakadályozza a penészképződést a növekvő talajon. Helyezze a magcserepet világos és meleg helyre, ahol a hőmérséklet 20-25°C, és a virágföldet tartsa nedvesen, de ne nedvesen. A tapasztalatok szerint ezután két-négy hétig tart a csírázás. **A legjobb hely:** A sok napsütés elősegíti a gazdag virágzást. Jóval 40 °C feletti hőmérsékleten azonban a golgotavirág leáll a növekedésben és a virágzásban, és a virágzást a nyár végi vagy őszi hűvösebb hónapokra halasztja. Májustól októberig szabadtéri ültetvények is rendelkezésre állnak. De az első éjszakai fagyok előtt be kell hozni. **Optimális gondozás:** A Sweet Granadilla takarékos a talajminőség szempontjából. Mindig tartsa nedvesen a talajt, de kerülje a vízesedést és a túl meszes öntözővizet. A súlyos szárazság levelek elvesztéséhez és takacsatka fertőzéshez vezethet. A tápanyagszükségletet legjobb, ha áprilistól októberig hetente folyékony tartályos növényi műtrágyával fedezzük. Azok a hajtások, amelyek túl hosszúvá nőnek, és már nem találhatnak helyet a mászóeszközön, áprilistól júniusig azonnal lerövidíthetők. Mivel a golgotavirág gyorsan gyökerezik a cserépben, minden év márciusában érdemes átültetni egy kicsit nagyobb edénybe. **Télen:** Az édes granadilla erős fényben, 5-15 °C-on hibernál a legjobban. Ha az édes granadilla szobanövényként telel át, érdemes nagyon világos helyet választani, különben a növény elhervad. A téli hely melegétől és fényétől függően a lombzat egy része megmarad, vagy teljesen lehall. Továbbra is enyhén öntözzük, a megmaradt levéltömegetől függően, hogy a gyökérgombóc ne száradjon ki teljesen. A tél végi 20-30 cm-es hajtáshosszúságú erőteljes metszés gond nélkül megoldható, hiszen a golgotavirágok gyorsan regenerálódnak. Az új hajtások márciustól áprilisig ismét megtörténnek.

: : : : :



スイート・グラナディラ

Passiflora ligularis

美味しいパッションフルーツを实らせる植物

スイート・グラナディラはつる植物で、ビタミンたっぷりのフルーツジュースに使用される果実はトケイソウ科の中でも最大です。そして、他の側面でも親戚にあたる種とは異なります。その葉は一般的には指の形または全体がほぼハート型で最大10cmの大きさの花冠は白紫色のリボンのようです。花は主に4cmの長さの茎と対になっています。成長が遅く、他の種よりも絡みつきが少ないです；支柱の使用により、ほぼ真っ直ぐに伸びます。熟していない果実は青緑色でしばしば緑白色の小さな斑点があり、熟した果実は黄橙色で光沢があります。果実と種は一般的にデザートに使用されます。

自然な場所: 生息地は南米、中米、メキシコです。現在ではアフリカ、アジア、オーストラリアの亜熱帯地域でも栽培されています。

栽培成功:

種子繁殖は室内で年間を通して可能です。発芽率を上げる方法として、種を温水に一晩浸します。その後、湿った用土に種をまき、その上から少量の用土をかぶせます。乾燥を防ぐためサランラップなどの透明フィルムでカバーします。透明フィルムには空気穴をいくつかあけ、2~3日に1回は約2時間、完全にフィルムを鉢から外します。そうすることで、カビの発生を防ぎます。20°C~25°Cの明るく暖かい場所に置き、用土は湿った状態に保ちます。通常2~4週間で発芽します。

最高のロケーション:

十分な日光が開花を促します。摂氏40°C以上の温度環境の場合、晩夏または秋に涼しくなるまで成長と開花は遅れるでしょう。5月から10月の間は屋外でも保管することができますが、最初の霜が降りる前に室内に移動する必要があります。

最適なケア:

特別な土壌は必要としませんが、土壌は常に湿った状態に保ちます。石灰含有量の少ない水を使用し水溜まりができないように注意します。植物が乾燥し過ぎると、葉にクモやダニがつく危険性が高くなります。4月~10月の間は鉢植え植物用の液体肥料を毎週与えます。支柱からはみ出して伸びる長い芽は、4月から6月に剪定できます。根の成長が速いので、毎年3月頃に少し大きめの鉢に植え替えます。

冬に:

5°C~15°Cの環境での冬越しが最良です。室内植物の場合は非常に明るい場所で保管しないと、根腐れすることがあります。植物が保管されている暖かさや光のレベルに応じて、完全にまたは部分的に葉を落とします。根が乾燥しない程度に水を与えます。再生が速いので、冬の終わりには長い芽を20cm~30cm簡単に剪定できます。3月から4月には再び発芽します。

SKU: 13172 / Süße Granadilla