

TEST DO SAMODZIELNEJ DIAGNOSTYKI PRZED PRZYJĘCIEM LEKU INVENTUM



Lek Inventum jest stosowany w leczeniu zaburzeń erekcji definiowanych jako niemożność uzyskania lub utrzymania wzwodu wystarczającego do odbycia stosunku płciowego. Lek jest przeznaczony dla dorosłych mężczyzn (w wieku powyżej 18 lat), którzy mają problemy z erekcją.

Przed zażyciem leku przeczytaj ulotkę.

Zaburzenia erekcji należą do najczęstszych zaburzeń seksualnych występujących u mężczyzn. Mogą być związane z wiekiem oraz wywołane przyjmowanymi lekami i/lub występowaniem chorób układu krążenia, miażdżycy, cukrzycy, chorób neurologicznych, a także nadużywaniem alkoholu i paleniem papierosów. Zaburzenia erekcji mogą występować częściej u pacjentów z chorobą tętnic wieńcowych, dlatego zaleca się poddanie ocenie medycznej w celu prewencji chorób układu krążenia oraz modyfikacji stylu życia.

Przed przyjęciem leku Inventum pacjent powinien upewnić się, czy którykolwiek ze stanów wymienionych w tabeli poniżej został u niego zdiagnozowany i czy przyjmuje wymienione w tabeli leki.	TAK lub NIE WIEM	NIE
Przyjmowanie leków stosowanych w chorobach serca i naczyń krwionośnych takich jak: - nitrogliceryna (np. Nitrocard, Nitromint, Perlinganit, Sustonit), - monoazotan izosorbidu (np. Effox, Mono Mack Depot, Mononit, Monosan, Olicard), - molsydomina (np. Molsidomina WZF), - lek przeciwniedokrwieny: nikorandyl, - pentaerytrytyl (np. Galpent, Pentaerythritol compositum). Leki wymienione powyżej są często stosowane w celu łagodzenia objawów dławicy piersiowej („ból w klatce piersiowej”).	☐ ☐ ☐ ☐ ☐	☐ ☐ ☐ ☐ ☐
Przyjmowanie azotynu amylu lub azotanu amylu (wykorzystywanych jako używki np. w celu zwiększenia doznań seksualnych).	☐	☐
Przyjmowanie riocyguaatu (np. Adempas) lub syldenafile stosowanych w leczeniu nadciśnienia płucnego (np. Revatio, Granpidam, Remidia, Mysildecard, Silungo).	☐	☐
Przyjmowanie leku rytonawiru (stosowanego w leczeniu zakażeń wirusem HIV).	☐	☐
Przyjmowanie leków alfa-adrenolitycznych (np. doksazosyny, tamsulosyny, alfuzosyny, terazosyny, sylodosyny) stosowanych w leczeniu wysokiego ciśnienia krwi lub łagodnego rozrostu prostaty.	☐	☐
Przyjmowanie leków zawierających sakubitryl z walsartanem (stosowanych w leczeniu niewydolności serca) (np. Entresto, Neparvis).	☐	☐
Ciężkie choroby serca objawiające się: - bólem w klatce piersiowej, brakiem tchu, kołataniem serca po wejściu na drugie piętro w ciągu 10 sekund lub dynamicznym spacerowaniu przez 20 minut, - bólem w klatce piersiowej podczas stosunku płciowego.	☐ ☐	☐ ☐
Inne choroby serca, takie jak: - umiarkowana lub ciężka wada zastawkowa serca, - kardiomiopatia przerostowa lub inna.	☐ ☐	☐ ☐
Przebyty w ciągu ostatnich 6 miesięcy zawał serca, udar mózgu, zagrażające życiu zaburzenia rytmu serca.	☐	☐
Niskie ciśnienie tętnicze w spoczynku poniżej 90/50 mmHg.	☐	☐
Nadciśnienie tętnicze w spoczynku powyżej 170/100 mmHg.	☐	☐
Dziedziczne zmiany degeneracyjne siatkówki , takie jak zwyrodnienie barwnikowe siatkówki.	☐	☐
Nagłe pogorszenie widzenia lub utrata wzroku.	☐	☐
Niedokrwistość sierpowatokrwinkowa (nieprawidłowość dotycząca krwinek czerwonych), szpiczak mnogi (choroba nowotworowa szpiku kostnego) lub białaczka (choroba nowotworowa krwi).	☐	☐
Zaburzenia krzepnięcia (takie jak hemofilia).	☐	☐
Anatomiczne zniekształcenie prącia lub choroba Peyroniego (objawiająca się skrzywieniem prącia).	☐	☐
Choroba wrzodowa , której objawy uległy pogorszeniu w ciągu 7 dni (ból w nadbrzuchu, wzdęcia, odbijania, nudności, wymioty).	☐	☐
Ciężka niewydolność wątroby.	☐	☐
Ciężkie zaburzenia czynności nerek.	☐	☐
Wynik testu:	Jedna lub więcej odpowiedzi TAK lub NIE WIEM	Wszystkie odpowiedzi NIE
Decyzja:	Pacjent NIE MOŻE przyjąć leku Inventum bez konsultacji z lekarzem	Pacjent MOŻE przyjąć lek Inventum