



SAFLAX®



Tips



© Ballerina311 - CC-BY-SA-3.0

Sabal palmetto

	 Български	BG	 2		 Malti	MT	 5
	 Dansk	DK	 2		 Nederlands	NL	 5
	 Deutsch	DE	 2		 Norsk	NO	 6
	 English	UK	 2		 Polski	PL	 6
	 Eesti	EE	 3		 Português	PT	 6
	 Suomalainen	FI	 3		 Românesc	RO	 6
	 Français	FR	 3		 Svenska	SE	 7
	 Ελληνική	GR	 3		 Slovensky	SK	 7
	 Gaeilge	IE	 4		 Slovenski	SI	 7
	 íslenskur	IS	 4		 Español	ES	 7
	 Italiano	IT	 4		 Český	CZ	 8
	 Hrvatski	HR	 4		 Türkçe	TR	 8
	 Latviešu	LV	 5		 Magyar	HU	 8
	 Lietuvių kalba	LT	 5		 日本語	JP	 9



Палмето палма

Sabal palmetto

Палмова красота от Флорида

Силният сив ствол на palmetto palmetto изглежда сплетен през годините, тъй като нацепените и разлагащи се остатъци от дръжките на листата все повече го покриват. Неговите красиви синьо-зелени до зелени кръгли ветрилообразни листа са изрязани почти до листната дръжка и са сгънати по протежение на средната жилка. Палмата, която не е вискателна по отношение на почвата, расте еднакво добре както в блатисти райони, така и на пясъчливи почви близо до брега и лесно издържа на замръзване. Обикновено образува един до три нови листни пръстена годишно. **Естествено местоположение:** Сабалското палмето е родом от югоизточната част на САЩ, счита се за символ на Флорида, но е широко разпространено и в американските щати Северна Каролина, Мисури, Луизиана и Тексас, както и на Бахамите. **Успешно отглеждане:** Отглеждането от семена на закрито е възможно през цялата година. Първо поставете семената в съд със стайна топла вода за дванадесет часа, за да набъбнат и по този начин да подобрят покълването. Едва след това го поставете на около един сантиметър дълбочина във влажна почва за отглеждане и покрийте семената със субстрата за отглеждане. Опънете хранително фолио върху контейнера за отглеждане и пробийте няколко дупки във фолиото. Това предпазва почвата от изсушаване. Трябва да отстранявате фолиото за 2 часа на всеки два до три дни. Това предотвратява образуването на мухъл върху растящата почва. Поставете саксията със семена на светло и топло място с 20 до 25° по Целзий и поддържайте почвата влажна, но не мокра. Обикновено отнема от три до шест седмици, за да покълне конопената палма. **Най-доброто местоположение:** Палмата палмето обича слънчеви и топли места. След зимен сън на закрито, първоначално трябва да престои на частична сянка в продължение на 14 дни, за да свикне с тежките UV лъчи. **Оптимална грижа:** Нуждата от вода на палмето е доста умерена. Най-добре е да поливате обилно с вода с възможно най-ниско съдържание на вар, но избягвайте преовлажняване - например поради остатъчна вода в чинийката - и оставете почвата да изсъхне на повърхността до следващото поливане. Трябва да наторявате между април и септември с течен тор за палми или контейнерни растения на всеки две до три седмици. **През зимата:** По-старите палмети палми понасят температури до -10° по Целзий през зимата и могат също да спят зимен сън навън, ако има лек студ. Въпреки това, светла и хладна стая с 5° до 15° по Целзий е по-безопасна.



Palmetto palme

Sabal palmetto

Palme skønhed fra Florida

Den stærke grå stamme af palmetto palmetto ser flettet ud gennem årene, efterhånden som de flækkede og forfaldne rester af bladstilkene i stigende grad dækker den. Dens smukke blågrønne til grønne farvede cirkulære vifteblade er skåret næsten til bladstilk og foldet ind langs midterribben. Palmetræet, der er lidt krævende i forhold til jorden, vokser lige så godt i sumpede områder som på sandede jorder nær kysten og er let frosttolerant. Den danner normalt en til tre nye bladringe om året. **Naturlig beliggenhed:** Sabal palmetto er hjemmehørende i den sydøstlige del af USA, betragtes som et symbol på Florida, men er også udbredt i de amerikanske stater North Carolina, Missouri, Louisiana og Texas samt Bahamas. **Succesfuld dyrkning:** Dyrkning fra frø indendørs er muligt hele året rundt. Læg først frøene i en beholder med stuevarmt vand i tolv timer for at opnå hævelse og dermed forbedret spiring. Først derefter placerer du den cirka en centimeter dybt i fugtig vækstjord og dækker frøene med vækstsubstratet. Stræk husholdningsfilm over vækstbeholderen og prik et par huller i filmen. Dette beskytter jorden mod udtørring. Du bør fjerne folien i 2 timer hver anden til tredje dag. Dette forhindrer mug i at dannes på den voksende jord. Stil frøpotten et let og varmt sted med 20 til 25° Celsius og hold pottējorden fugtig, men ikke våd. Det tager normalt tre til seks uger for hampepalmen at spire. **Den bedste beliggenhed:** Palmettopalmen elsker solrige og varme steder. Efter at have gået i dvale indendørs skal den i første omgang stå i halvskygge i 14 dage for at vænne sig til de skrappe UV-stråler. **Optimal pleje:** Vandbehovet for palmettopalmen er ret moderat. Det er bedst at vande grundigt med vand, der er så lavt i kalk som muligt, men undgå vandfyldning - for eksempel på grund af restvand i underkoppen - og lad jorden tørre på overfladen indtil næste vanding. Du bør gøde mellem april og september med flydende palme- eller containerplantegødning hver anden til tredje uge. **Om vinteren:** Ældre palmettopalmer tåler temperaturer ned til -10° Celsius om vinteren og kan også gå i dvale udenfor, hvis der er lidt frost. Et lyst og køligt rum med 5° til 15° Celsius er dog mere sikkert.



Palmettopalme

Sabal palmetto

Palmenschönheit aus Florida

Der kräftige graue Stamm der Palmettopalme sieht mit den Jahren wie geflochten aus, wenn die aufgespaltenen und mit dem Alter abfallenden Reste der Blattstiele ihn zunehmend bedecken. Seine schönen blaugrün bis grün gefärbten kreisrunden Fächerwedel sind fast bis zum Blattstiel eingeschnitten und entlang der Mittelrippe eingeklappt. Die in Bezug auf den Boden anspruchslose Palme wächst in Sumpfgewässern genau so gut wie auf Sandböden in Küstennähe und ist leicht frostverträglich. Dabei bildet sie normalerweise ein bis drei neue Blattkränze im Jahr aus. **Naturstandort:** Die Sabal palmetto ist im Südosten der USA beheimatet, gilt als Wahrzeichen Floridas, ist aber auch in den US-Bundesstaaten North Carolina, Missouri, Louisiana und Texas sowie auf den Bahamas stark verbreitet. **Anzucht:** Im Haus ist die Anzucht aus Samen das ganze Jahr über möglich. Legen Sie die Samen zunächst für zwölf Stunden in ein Gefäß mit raumwarmem Wasser, um ein Aufquellen und damit eine verbesserter Keimfähigkeit zu erreichen. Erst dann setzen Sie ihn circa einen Zentimeter tief in feuchte Anzuchterde und bedecken die Samen mit dem Anzuchtsubstrat. Spannen Sie Klarsichtfolie über das Anzuchtgefäß und stechen Sie einige Löcher in die Folie. So ist die Erde vor Austrocknung geschützt. Alle zwei bis drei Tage sollten Sie die Folie für 2 Stunden entfernen. Das beugt einer Schimmelbildung auf der Anzuchterde vor. Stellen Sie das Anzuchtgefäß an einen hellen und warmen Ort mit 20 bis 25° Celsius und halten Sie die Anzuchterde feucht, aber nicht nass. Bis zur Keimung der Hanfpalme dauert es normalerweise drei bis sechs Wochen. **Standort:** Die Palmettopalme liebt sonnige und warme Standorte. Nach Überwinterung im Haus sollte sie zunächst für 14 Tage halbschattig stehen, um sich an die harten UV-Strahlen gewöhnen zu können. **Pflege:** Der Wasserbedarf ist der Palmettopalme ist eher mäßig. Wässern Sie am besten durchdringend mit möglichst kalkarmem Wasser, aber vermeiden Sie Staunässe - zum Beispiel durch Restwasser im Untersetzer - und lassen Sie die Erde bis zum nächsten Gießen an der Oberfläche zunächst antrocknen. Düngen sollten Sie im Zeitraum von April bis September mit flüssigem Palmen- oder Kübelpflanzendünger im Abstand von zwei bis drei Wochen. **Im Winter:** Ältere Palmettopalmen tolerieren im Winter auch Temperaturen bis -10° Celsius und können bei schwachem Frost geschützt auch draußen überwintern. Sicherer ist aber ein heller und kühler Raum mit 5° bis 15° Celsius.



Palmetto Palm

Sabal palmetto

Palm Tree beauty from Florida

The massive grey trunk of the Palmetto Palm gets a somewhat braided look over the years when the dying rests of the falling leave stalks covering it. Its beautiful blue-green to green coloured circular fan leaves are deeply and almost until the leaf stalk cut in, and are collapsed along the middle rib. In terms of soil the Palmetto Palm is rather modest and grows in swamp areas as same as in sandy soils near the coast and can be labeled slightly frost-resistant as well. Usually it grows one to three new wreath of leaves during one year. **Natural location:** The Sabal palmetto has its origin in the Southeast of the USA and is considered a landmark of Florida. However, it is also widely spread in the US states of North Carolina, Missouri, Louisiana and Texas, as well as on the Bahamas. **Successful cultivation:** Seed propagation indoors is possible throughout the year. To increase the germinability, you can place the seeds for about 12 hours in warm water for priming. Plant the seeds about 1 cm deep in moist potting compost, put some compost earth on top, and cover the seed container with clear film. Don't forget to make some holes in the clear film and take it every second or third day completely off for about 2 hours. That way you avoid mold formation on your potting compost. Place the seed container somewhere bright and warm with a temperature between 20°C and 25°C and keep the earth moist, but not wet. Usually it takes three to six weeks until germination. **The best location:** The Palmetto Palm likes a warm and sunny spot. After hibernation, you should keep it initially in a half-shaded place for two weeks, so it can slowly adjust to the UV radiation. **Optimal care:** The Palmetto Palm is rather modest in its water needs. It is best to water penetratingly with lime-deficient water and see that you avoid waterlogging, especially in the saucer. Let the upper layer of the soil dry out before you start watering the plant again. From April until September you should also give fluid fertilizer for tub plants or palm trees every two to three weeks. **In the winter:** An older Palmetto Palm can tolerate even temperatures until -10° Celsius, and can therefore - in areas with little frost - be kept protected outside during hibernation. However, it is always more save to keep the plant in a bright and cool room with temperatures between 5° and 15° Celsius.



Palmetto palm Sabal palmetto Palmi kaunitar Floridast

Palmetto palmetto tugev hall tüvi näib aastate jooksul põimituna, kuna lehevarte lõhenenud ja lagunevad jäänused seda üha enam katavad. Selle kaunid sinakasrohelised kuni rohelised ümmargused lehvikeled on lõigatud peaaegu leherootseni ja volditud piki keskriba. Mullastiku suhtes vähendalik palm kasvab nii soistel aladel kui ka rannikulähedasel liivasel pinnasel ja on kergesti külmakindel. Tavaliselt moodustab see aastast ühe kuni kolm uut leherõngast. **Looduslik asukoht:** Sabal palmetto on pärit USA kaguosast, seda peetakse Florida sümboliks, kuid on laialt levinud ka USA Põhja-Carolina, Missouri, Louisiana ja Texase osariikides ning Bahama saartel. **Edukas kasvatamine:** Seemnetest siseruumides kasvatamine on võimalik aastaringelt. Esmalt asetage seemned kaheteistkümneks tunniks toasooja veega anumasseturse saavutamiseks ja seeläbi paranenud idanemiseks. Alles siis asetad umbes sentimeetri sügavusele niiskesse kasvumuld ja katad seemned kasvusubstraadiga. Kasvuandumale venitad toidukile ja torkad kilesse mõned augud. See kaitseb mulda kuivamise eest. Peaksite fooliumi eemaldama 2 tunniks iga kahe kuni kolme päeva järel. See takistab hallituse teket kasvupinnal. Asetage külvipott valgusküllasesse ja sooja kohta, mille temperatuur on 20–25 ° C, ning hoidke istutusmuld niiskena, kuid mitte märjana. Tavaliselt kulub kanepipalmi idanemiseks kolm kuni kuus nädalat. **Parim asukoht:** Palmetto palm armastab päikesepaistelisi ja sooja kohti. Pärast siseruumides talveunne jäämist peaks see karmide UV-kiirtega harjumiseks esialgu 14 päeva poolvarjus seisma. **Optimaalne hooldus:** Palmettopalmi veevajadus on üsna mõõdukas. Kõige parem on kasta põhjalikult võimalikult lubjasisaldusega veega, kuid vältida vettimist – näiteks alustassi jääkvee tõttu – ja lasta mullal kuni järgmise kastmiseni pinnal kuivada. Vätada tuleks aprillist septembrini vedela palmi- või konteinerväetisega iga kahe kuni kolme nädala järel. **Talvel:** Vanemad palmettpalmid taluvad talvel külma kuni -10 ° C ja võivad ka väljas talveunne jääda, kui on väike pakane. Turvalisem on aga valgusküllane ja jahe ruum, mille temperatuur on 5° kuni 15° Celsiuse järgi.



Palmetto palmu Sabal palmetto Palmujen kaunotar Floridasta

Palmettopalmeton vahva harmaa runko näyttää vuosien myötä palmikoidulta, kun lehtivarren halkeilevat ja rappeutuvat jäänökset peittävät sitä yhä enemmän. Sen kauniit sinivihreän tai vihreän väriset pyöreät viuhkaleipälehdet on leikattu melkein varrelle ja taitettu sisään keskiribaa pitkin. Maaperän suhteen vaatimaton palmu kasvaa yhtä hyvin suoissa alueilla kuin rannikon lähellä olevilla hiekkamailla ja on helposti pakkasenkestävä. Se muodostaa tavallisesti yhdestä kolmeen uutta lehtirengasta vuodessa. **Luonnollinen sijainti:** Sabal palmetto on kotoisin USA:n kaakkoisosasta, sitä pidetään Floridan symbolina, mutta se on myös laajalle levinnyt Yhdysvalloissa Pohjois-Carolinan, Missourin, Louisianan ja Texasin osavaltioissa sekä Bahamalla. **Onnistunut viljely:** Kasvatus siemenistä sisätiloissa on mahdollista ympäri vuoden. Aseta siemenet ensin huoneenlämpöiseen veteen astiaan 12 tunniksisaavuttaa turvotusta ja siten parantaa itävyyttä. Vasta sen jälkeen laita se noin sentin syvyyteen kosteaan kasvumaahan ja peitä siemenet kasvualustalla. Vedä kasvatusastian päälle kelmu ja pistele kalvoon muutama reikä. Tämä suoja maaperää kuivumiselta. Poista folio 2 tunnin ajaksi kahden tai kolmen päivän välein. Tämä estää homeen muodostumisen kasvumaahan. Aseta siemenruukku valoisaa ja lämpimään paikkaan, jonka lämpötila on 20–25 ° C, ja pidä istutusmaa kosteana, mutta ei märkänä. Hampupalmon itäminen kestää yleensä kolmesta kuuteen viikkoa. **Paras sijainti:** Palmettopalmu rakastaa aurinkoisia ja lämpimiä paikkoja. Sisätiloissa lepotilan jälkeen sen tulisi aluksi seistä osittain varjossa 14 päivää tottuakseen ankariin UV-säteisiin. **Optimaalinen hoito:** Palmettopalmon vedentarve on kohtalainen. On parasta kastella perusteellisesti vedellä, jossa on mahdollisimman vähän kalkkia, mutta välttää kastelua - esimerkiksi lautasessa olevan jäänösveden vuoksi - ja antaa maan kuivua pinnalla seuraavaan kasteluun asti. Sinun tulisi lannoittaa huhti-syyskuussa nestemäisellä palmu- tai konttilannoitteella kahden tai kolmen viikon välein. **Talvella:** Vanhemmat palmettopalmut kestävät jopa -10 asteen lämpötiloja talvella ja voivat myös talvehtia ulkona, jos on vähän pakkasta. Valoisa ja viileä huone, jonka lämpötila on 5–15 ° C, on kuitenkin turvallisempi.



Chou palmiste Sabal palmetto Beauté palmière de Floride

Le puissant tronc gris du palmetto a l'air tressé au fil des années quand les restes séparés de la pétiole qui tombent avec l'âge le couvrent progressivement. Ses jolies plumes éventails bleu-vert à vertes rondes sont entaillées jusqu'à la pétiole et repliées le long de la nervure centrale. Le palmier peu exigeant par rapport au sol pousse aussi bien dans les marais que sur des sols sableux près de la côte et est peu résistant au gel. Normalement, il forme une à trois nouvelles couronnes de feuilles dans l'année. **Emplacement naturel:** Le palmetto est hébergé au sud-est des Etats-Unis, est considéré comme symbole de la Floride, mais se trouve aussi en Caroline du Nord, Missouri, Louisiane, et en Texas, ainsi qu'aux Bahamas, où il est très répandu. **Culture réussie:** La culture des graines à la maison est possible tout au long de l'année. D'abord, mettez les graines dans un récipient avec de l'eau à température ambiante pendant douze heures, afin d'avoir un gonflement et, par conséquent, une meilleure faculté germinative. Ensuite, mettez les graines dans du terreau humide à environ un centimètre de profondeur et recouvrez-les avec le substrat. Couvrez le récipient avec une feuille transparente dans laquelle vous faites des trous. Comme ça, le terreau est protégé du dessèchement. Vous devez enlever la feuille pendant deux heures tous les deux ou trois jours. Ceci prévient la formation de moisissures dans le terreau. Mettez le récipient dans un endroit lumineux et chaud de 20° à 25° Celsius et gardez le terreau humide, mais pas mouillé. Normalement, la germination a lieu après trois à six semaines. **Le meilleur emplacement:** Le palmetto aime les emplacements ensoleillés et chauds. Ils doivent rester dans la maison pendant 14 jours après l'hivernage pour pouvoir s'habituer aux rayonnements ultraviolets intenses. **Soins optimaux:** Le besoin en eau du palmetto est plutôt modéré. Arrosez bien le palmetto avec de l'eau le moins calcaire possible pour que l'eau pénètre dans le sol, mais évitez l'eau stagnante - comme l'eau résiduelle dans la soucoupe, par exemple - et laissez la couche supérieure du sol se dessécher avant le prochain arrosage. Vous devez engraisser le palmetto toutes les deux à trois semaines entre avril et septembre avec de l'engrais liquide pour palmiers ou plantes en pot. **En hiver:** Les palmettos plus anciens supportent des températures jusqu'à -10° Celsius pendant l'hiver et peuvent aussi hiverner dehors s'ils sont protégés des gels légers. Cependant, il est mieux de les mettre dans une salle froide et lumineuse à 5° à 15° Celsius.



Palmetto palm Sabal palmetto Ομορφιά φοίνικα από τη Φλόριντα

Ο δυνατός γκρι κορμός του palmetto palmetto φαίνεται πλεκτός με τα χρόνια καθώς τα σπασμένα και αποσυντιθέμενα υπολείμματα των μίσχων των φύλλων τον καλύπτουν όλο και περισσότερο. Τα πανέμορφα μπλε-πράσινα έως πράσινα κυκλικά φύλλα βεντάλιας κόβονται σχεδόν μέχρι τον μίσχο και διπλώνονται κατά μήκος του μεσαίου τμήματος. Ο φοίνικας, μη απαιτητικός ως προς το έδαφος, αναπτύσσεται εξίσου καλά σε βαλτώδεις περιοχές όπως και σε αμμώδη εδάφη κοντά στην ακτή και είναι εύκολα ανθεκτικός στον παγετό. Συνήθως σχηματίζει έναν έως τρεις νέους δακτυλίους φύλλων το χρόνο. **Φυσική τοποθεσία:** Το palmetto Sabal είναι εγγενές στα νοτιοανατολικά των ΗΠΑ, θεωρείται σύμβολο της Φλόριντα, αλλά είναι επίσης ευρέως διαδεδομένο στις πολιτείες των ΗΠΑ της Βόρειας Καρολίνας, του Μιζούρι, της Λουιζιάνα και του Τέξας καθώς και στις Μπαχάμες. **Επιτυχημένη καλλιέργεια:** Η καλλιέργεια από σπόρους σε εσωτερικούς χώρους είναι δυνατή όλο το χρόνο. Τοποθετήστε πρώτα τους σπόρους σε ένα δοχείο με ζεστό νερό για δώδεκα ώρες για να επιτευχθεί οίδημα και έτσι βελτιωμένη βλάστηση. Μόνο τότε το τοποθετείτε περίπου ένα εκατοστό βάθος σε υγρό έδαφος ανάπτυξης και σκεπάζετε τους σπόρους με το υπόστρωμα ανάπτυξης. Τεντώστε μεμβράνη πάνω από το δοχείο καλλιέργειας και ανοίξτε μερικές τρύπες στη μεμβράνη. Αυτό προστατεύει το έδαφος από το στεγνώμα. Θα πρέπει να αφαιρεθεί το αλουμινοχαρτό για 2 ώρες κάθε δύο έως τρεις ημέρες. Αυτό αποτρέπει τη δημιουργία μούχλας στο αναπτυσσόμενο έδαφος. Τοποθετήστε τη γλάστρα σε ένα ελαφρύ και ζεστό μέρος με θερμοκρασία 20 έως 25° Celsiού και διατηρήστε το χώμα της γλάστρας υγρό αλλά όχι υγρό. Συνήθως χρειάζονται τρεις έως έξι εβδομάδες για να βλαστήσει η παλάμη κάνναβης. **Η καλύτερη τοποθεσία:** Το palmetto palm λατρεύει τις ηλιόλουστες και ζεστές τοποθεσίες. Μετά την χειμερία νάρκη σε εσωτερικούς χώρους, θα πρέπει αρχικά να παραμείνει σε μερική σκιά για 14 ημέρες για να συνηθίσει στις σκληρές ακτίνες UV. **Βέλτιστη φροντίδα:** Η απαίτηση σε νερό της παλάμης palmetto είναι μάλλον μέτρια. Είναι καλύτερο να ποτίζετε καλά με νερό όσο το δυνατόν πιο χαμηλής περιεκτικότητας σε ασβέστη, αλλά αποφεύγετε την υπερχειλίση - για παράδειγμα λόγω υπολειπόμενου νερού στο πιατάκι - και αφήστε το χώμα να στεγνώσει στην επιφάνεια μέχρι το επόμενο πότισμα. Θα πρέπει να λιπάνετε από τον Απρίλιο έως τον Σεπτέμβριο με υγρό λίπασμα φοίνικα ή φυτό δοχείο κάθε δύο έως τρεις εβδομάδες. **Το χειμώνα:** Οι παλαιότεροι φοίνικες palmetto ανέχονται θερμοκρασίες έως -10° Celsiού το χειμώνα και μπορούν επίσης να αδρανοποιηθούν έξω εάν υπάρχει λίγος παγετός. Ωστόσο, ένα φωτεινό και δροσερό δωμάτιο με 5° έως 15° Celsiού είναι πιο ασφαλές.



Pailme pailme Sabal palmetto Áilleacht pailme ó Florida

Tá cuma ar an stoc láidir liath den palmetto palmetto thar na blianta de réir mar a chumhdaíonn iarsmaí scoilte agus meathlaithe na gais duille é. Gearrtar a fhrona fean ciorclach daite gorm-uaine go glas beagnach go dtí an petiole agus fillte isteach ar feadh an midrib. Fásann an crann pailme, nach bhfuil ag teastáil ó thaobh na hithreach, chomh maith céanna i limistéir luasach agus atá ar ithreacha gainimh in aice leis an gcósta agus is furasta an sioc a sheasamh. De ghnáth cruthaíonn sé aon nó trí fháinne duille nua in aghaidh na bliana. **Suíomh nádúrtha:** Tá an palmetto Sabal dúchasach in oirdheisceart na SA, meastar gur siombail de Florida é, ach tá sé go forleathan freisin i stáit SAM i Carolina Thuaidh, Missouri, Louisiana agus Texas chomh maith leis na Bahámaí. **Saothrú rathúil:** Is féidir fás ó shíolta taobh istigh ar feadh na bliana. Cuir na síolta ar dtús i gcoimeádán le huisce te seomra ar feadh dhá uair an chloigchun swelling a bhaint amach agus péacadh feabhsaithe dá réir. Is ansin a chuireann tú thart ar aon ceintiméadar ar doimhneacht in ithir tais atá ag fás agus clúdaíonn tú na síolta leis an tsubstáit atá ag fás, sin an scannán cumhdaithe thar an gcoimeádán atá ag fás agus cuir cúpla poll sa scannán. Cosnaíonn sé seo an ithir ó thriomú amach. Ba chóir duit an scragall a bhaint ar feadh 2 uair gach dhá nó trí lá. Cuireann sé seo cosc ar mhúnlá a fhoirmiú ar an ithir atá ag fás. Cuir an pota síolta in áit éadrom te ag 20 go 25 ° Celsius agus coinneigh an ithir potaithe tais ach ní fliuch. De ghnáth tógann sé trí nó sé seachtaine chun an pailme cnáib a phéacadh. **An suíomh is fearr:** Is breá leis an palmetto pailme áiteanna griannmhara agus te. Tar éis dó codladh geimhridh laistigh, ba chóir go seasfadh sé faoi scáth páirteach ar feadh 14 lá ar dtús chun dul i dtaithí ar ghhathanna crua UV. **Cúram is fearr is féidir:** Tá riachtanas uisce an pailme palmetto sách measartha. Is fearr uisce a chur go críochnúil le huisce atá chomh híseal agus is féidir in aol, ach seachain an t-uisciú - mar shampla mar gheall ar uisce iarmharach sa sár - agus lig don ithir tirim ar an dromchla go dtí an chéad uisce eile. Ba chóir duit toirchiú a dhéanamh idir Aibreán agus Meán Fómhair le leasachán planda pailme leachtach nó coimeádán gach dhá nó trí seachtaine. **Sa gheimhreadh:** Fulaingíonn bosa palmetto níos sine teochtaí síos go -10 ° Celsius sa gheimhreadh agus féadann siad codladh geimhridh lasmuigh freisin má bhíonn beagán sioc ann. Mar sin féin, tá seomra geal agus fionnuar le 5 ° go 15 ° Celsius níos sábháilte.



Palmetto lófa Sabal palmetto Palmfegurð frá Flórída

Sterkur grái stofninn á palmetto palmetto lítur út fyrir að vera fléttaður i gegnum árin þar sem klofnar og rotnandi leifar af laufstönglum þekja hann í auknum mæli. Hin fallegu blágrænu til grænu lituðu hringlaga víftublöð eru skorin næstum upp að blaðstilknum og brotin inn meðfram miðröndinni. Pálminn, sem er lítið krefjandi i jarðvegi, vex jafn vel á mýrlendi sem á sandjarðvegi við ströndina og þolir auðveldlega frost. Það myndar venjulega einn til þrjá nýja lauffringa á ári. **Náttúruleg staðsetning:** Sabal palmetto er upprunninn í suðausturlhuta Bandaríkjanna, er talinn tákn Flórída, en er einnig útbreiddur í ríkjum Norður-Karólínu, Missouri, Louisiana og Texas auk Bahamaeyja. **Árangursrík ræktun:** Ræktun úr fræjum innandyrar er mögulegt allt árið um kring. Settu fyrst fræin í flát með herbergisheitu vatni í tólf klukkustundirtil að ná fram bólgu og þar með bættri spírur. Aðeins þá seturðu það um eins sentímetra djúpt í rökum vaxtarjarðvegi og þekur fræin með undirlaginu fyrir ræktun. Teygðu matarfilmu yfir ræktunarlítið og stingdu nokkrum göt á filmuna. Þetta verndar jarðveginn gegn þurrkun. Þú ættir að fjarlægja álpappírinn í 2 klukkustundir á tveggja til þriggja daga fresti. Þetta kemur í veg fyrir að mygla myndist á vaxandi jarðvegi. Settu fræpottinn á léttan og heitan stað með 20 til 25° Celsius og haltu pottjarðveginum rökum en ekki blautum. Það tekur venjulega þrjár til sex vikur fyrir hampi lófann að spíra. **Besta staðsetningin:** Palmetto pálminn elskar sólrika og hlýja staði. Eftir að hafa legið í dvala innandyrar ætti hann að standa í hálfskugga í 14 daga til að venjast sterkum UV geislum. **Besta umönnun:** Vatnsþörf palmetto pálmans er frekar hófleg. Best er að vökva vel með vatni sem er eins lágt í kalki og hægt er, en forðast vatnsrennsli - til dæmis vegna afgangsvatns í undirskálinni - og láta jarðveginn þorna á yfirborðinu fram að næstu vökvun. Þú ættir að frjógva á milli apríl og september með fljótandi lófa- eða gámaplöntuáburði á tveggja til þriggja vikna fresti. **Á veturna:** Eldri palmetto pálmur þola hita niður í -10° á Celsius á veturna og geta líka legið í dvala úti ef það er smá frost. Hins vegar er bjart og svalt herbergi með 5° til 15° Celsius öruggara.



Palmetto Sabal palmetto La bellezza delle palme dalla Florida

Il tronco grigio e robusto del palmetto con il passare degli anni sembra come intrecciato, quando nel tempo i resti degli steli spaccati che cadono ricoprono il tronco. Le foglie palmate a ventaglio di forma circolare, di colore blu-verde fino a verde, sono incise quasi fino allo stelo e chiuse lungo la nervatura centrale. Questa palma non ha esigenze particolari rispetto al terreno, cresce bene nei pressi di paludi o in terreni sabbiosi vicino alla costa e sopporta il freddo leggero. Normalmente sviluppa da una a tre nuove corone di foglie all'anno. **Posizione naturale:** Il palmetto è nativo degli USA sud-orientali ed è un simbolo della Florida, ma negli USA è largamente diffuso anche in North Carolina, Missouri, Louisiana, Texas e Bahamas. **Coltivazione riuscita:** La coltivazione da semi in casa è possibile durante tutto l'anno. Lasciate i semi immersi per 12 ore in acqua a temperatura ambiente affinché si gonfino, per aumentare la germinabilità. Collocate i semi a circa un centimetro di profondità nella terra di coltivo umida e coprite con il substrato. Coprite il recipiente di coltivazione con pellicola trasparente, sulla quale praticare dei fori, in questo modo la terra eviterà di seccarsi. Ogni due o tre giorni rimuovete la pellicola per 2 ore, per prevenire la formazione di muffe sulla terra. Collocate il recipiente di coltivazione in un luogo luminoso e caldo, a una temperatura fra i 20° e i 25°C e mantenete la terra umida, ma non bagnata. La germinazione avverrà probabilmente da tre a sei settimane dopo. **La posizione migliore:** Il palmetto predilige i luoghi soleggiati e caldi. Dopo aver trascorso l'inverno in casa dovrebbe prima rimanere in un luogo a mezz'ombra per 14 giorni, per abituarsi di nuovo ai potenti raggi UV. **Cura ottimale:** Il fabbisogno d'acqua del palmetto è piuttosto modesto. Annaffiatelo in maniera profonda, con acqua il più possibile povera di calcare, evitando il ristagno idrico e facendo attenzione a non lasciare acqua in avanzo nel sottovaso. Prima dell'innaffiatura successiva aspettate che la terra in superficie si secchi. Nel periodo da aprile a settembre concimate la vostra palma ogni due o tre settimane con concime per palma liquido, oppure concime per piante da vaso. **In inverno:** Gli esemplari più adulti di palmetto in inverno tollerano anche temperature fino a -10° C e possono anche passare l'inverno all'esterno, se in contesti di gelo leggero e adeguatamente protetti. E' però più sicuro mantenerlo in un ambiente più luminoso e fresco, fra i 5° e i 15° C.



Palmetto palma Sabal palmetto Palmina ljepotica s Floride

Snažno sivo deblo palmetto palmetto izgleda ispletano tijekom godina dok ga rascijepljeni i raspadnuti ostaci lisnih peteljki sve više prekrivaju. Njegovi prekrasni okrugli lepezasti listovi plavo-zelene do zelene boje izrezani su gotovo do peteljke i presavijeni duž srednje žile. Palma, koja je nezahtjevna u pogledu tla, jednako dobro raste u močvarnim područjima kao i na pjeskovitim tlima u blizini obale i lako podnosi mraz. Obično formira jedan do tri nova lisna prstena godišnje. **Zemlja porijekla:** Sabal palmetto podrijetlom je s jugoistoka SAD-a, smatra se simbolom Floride, ali je rasprostranjena i u američkim saveznm državama Sjevernoj Karolini, Missouriju, Louisiani i Texasu te na Bahamima. **Uspješan uzgoj:** Uzgoj iz sjemena u zatvorenom prostoru moguć je tijekom cijele godine. Prvo stavite sjeme u posudu sa sobno toplom vodom na dvanaest satipostići bubrenje i time poboljšati klijavost. Tek tada ga stavite otprilike jedan centimetar duboko u vlažnu zemlju za uzgoj i pokrijte sjeme supstratom za uzgoj. Preko posude za uzgoj razvucite prozirnu foliju i probušite nekoliko rupica u foliji. To štiti tlo od isušivanja. Svaka dva do tri dana skinite foliju na 2 sata. Time se sprječava stvaranje plijesni na tlu za uzgoj. Stavite posudu za sjeme na svijetlo i toplo mjesto s 20 do 25° Celzija i održavajte tlo za saksije vlažnim, ali ne mokrim. Obično je potrebno tri do šest tjedana da konopljina palma proklija. **Najbolja lokacija:** Palmetto palma voli sunčane i tople položaje. Nakon hibernacije u zatvorenom prostoru, prvo bi trebao stajati u polusjeni 14 dana kako bi se naviknuo na jake UV zrake. **Optimalna njega:** Potreba palmetto palme za vodom prilično je umjerena. Najbolje je temeljito zalijevati vodom sa što manje vapna, ali izbjegavajte nataloženje - primjerice zbog zaostale vode u tanjuriću - i pustite da se zemlja osuši na površini do sljedećeg zalijevanja. Trebali biste gnojiti između travnja i rujna tekućim gnojivom za palme ili kontejnerske biljke svaka dva do tri tjedna. **U zimi:** Starije palme palme podnose temperature do -10°C zimi, a mogu i hibernirati vani ako je malo mraza. Međutim, sigurnija je svijetla i hladna prostorija s 5° do 15° Celzijusa.



Palmetto palma

Sabal palmetto

Palmu skaistums no Floridas

Spēcīgi pelēkais palmetto palmetto stumbrs gadu gaitā izskatās pīts, jo lapu kātu šķelšanās un trūdošās paliekas arvien vairāk pārklāj to. Tās skaistās zili zaļas līdz zaļas krāsas apalās vēdekļlappas ir nogrieztas gandrīz līdz kātiņam un ielocītas gar vidusribu. Augsnes ziņā mazprasīgā palma aug tikpat labi purvainās vietās, kā smilšainās augsnēs piekrastes tuvumā un ir viegli sala izturīga. Parasti tas veido vienu līdz trīs jaunus lapu gredzenus gadā. **Dabiska vieta:** Sabal palmetto dzimtene ir ASV dienvidaustrumi, tiek uzskatīta par Floridas simbolu, taču tā ir plaši izplatīta arī ASV Ziemeļkarolīnas, Misūri, Luiziānas un Teksasas štatos, kā arī Bahamu salās. **Veiksmīga audzēšana:** Audzēšana no sēklām telpās ir iespējama visu gadu. Vispirms ievietojiet sēklas traukā ar istabas siltu ūdeni uz divpadsmit stundām lai panāktu pietūkumu un tādējādi uzlabotu dīgtpēdju. Tikai pēc tam ievietojiet to apmēram viena centimetra dziļumā mitrā augšanas augsnē un pārklāiet sēklas ar augšanas substrātu.. Vīrs audzēšanas konteinera izstiepiet pārtikas plēvi un ieduriet plēvē dažus caurumus. Tas pasargā augsni no izžušanas.Jums vajadzētu noņemt foliju 2 stundas ik pēc divām līdz trim dienām. Tas novērš pelējuma veidošanos augošajā augsnē. Novietojiet sēklu podu gaišā un siltā vietā ar temperatūru 20 līdz 25 ° C un turiet augsni mitru, bet ne mitru. Parasti paiet trīs līdz sešas nedēļas, līdz kanepju palma uzdīgst. **Labākā atrašanās vieta:** Palmeto palmam patīk saulainas un siltas vietas. Pēc pārzīemošanas iekštelpās tai sākotnēji 14 dienas jāpāstāv daļēji ēnā, lai pierastu pie skarbjaiem UV stariem. **Optimāla aprūpe:** Palmeto palmas ūdens nepieciešamība ir diezgan mērena. Vislabāk ir kārtīgi laistīt ar ūdeni, kurā ir pēc iespējas mazāk kaļķa, taču izvairieties no aizsērēšanas, piemēram, ūdens atlikuma dēļ apakšstātē, un ļaujiet augsnei nožūt uz virsmas līdz nākamajai laistīšanai. No aprīļa līdz septembrim jums vajadzētu mēslot ar šķidru palmu vai konteineraugu mēslojumu ik pēc divām līdz trim nedēļām. **Ziemā:** Vecākas palmu palmas ziemā pacieš temperatūru līdz -10°C un var arī pārziemot ārā, ja ir neliels sals. Tomēr drošāka ir gaiša un vēsa telpa ar temperatūru no 5° līdz 15° pēc Celsija.



Palmeto delnas

Sabal palmetto

Palmių gražuolė iš Floridos

Tvīrtas pilkas palmetto palmetto kamienas bēgamt metams atrodo supintas, nes suskilinējusios ir pūvančios lapkočīų liekanos vis dažnāu jī dengia. Gražūs mēlynāi žāļios ar žāļios spalvos žiedīnāi vēduokliniai lapeliai nupjaujami beveik iki lapkočio ir sulenkiami īsilgai vidurio. Dirvožemīui nerekli palmē auga tiek pelkētose vietose, tiek prie kranto esančiose smēlio dirvose ir lengvai toleruoja šalčius. Paprastai per metus susidaro nuo vieno iki trijų naujų lapų žiedų. **Natūrali vieta:** Sabal palmetto yra kilęs iš JAV pietryčių, laikomas Floridos simboliu, bet yra plačiai paplitęs ir JAV Šiaurės Karolinos, Misūrio, Luizianos ir Teksaso valstijose bei Bahamų salose. **Sėkmingas auginimas:** Auginti iš sėklų patalpose galima ištisus metus. Pirmiausia įdėkite sėklas į indą su kambario šiltu vandeniu dvilika valandų pasiekti patinimą ir taip pagerinti daigumą. Tik tada įdėkite jį maždaug vieno centimetro gylyje į drėgną auginimo žemę ir uždenkite sėklas auginimo substratu. Ant auginimo talpyklos ištieskite maistinę plėvelę ir plėvelėje iškirskite kelias skylutes. Tai apsaugo dirvą nuo išdžiūvimo. Kas dvi ar tris dienas 2 valandas nuimkite foliją. Tai neleidžia augančioje dirvoje susidaryti pelėsiui. Sėklų vazoną pastatykite šviesioje ir šiltoje vietoje, kurios temperatūra yra 20–25 ° C, o vazono žemė turi būti drėgna, bet ne šlapia. Paprastai kanapių palmės sudygsa nuo trijų iki šešių savaičių. **Geriausia vieta:** Palmeto palmė mėgsta saulėtą ir šiltą vietą. Po žiemos miego patalpoje jis iš pradžių turėtų stovėti daliniame pavėsyje 14 dienų, kad priprastų prie atšiaurių UV spindulių. **Optimali priežiūra:** Palmeto palmių vandens poreikis yra gana vidutinis. Geriausia kruopščiai laistyti vandeniu, kuriame yra kuo mažiau kalkių, tačiau venkite užmirkimo – pavyzdžiui, dėl lėkštėje likusio vandens – ir leiskite žemei išdžiūti ant paviršiaus iki kito laistymo. Nuo balandžio iki rugsėjo turėtumėte tręšti skystomis palmių ar konteinerių augalų trąšomis kas dvi ar tris savaites. **Žiemą:** Senesnės palmių palmės žiemą toleruoja iki -10 ° C temperatūrą ir gali žiemoti lauke, jei yra nedidelis šalnas. Tačiau šviesioje ir vėsiąje patalpoje su 5°–15° Celsijaus temperatūra yra saugesnė.



Palmetto palm

Sabal palmetto

Sbuñjia tal-palm minn Florida

Iz-zokk grīž qawwi tal-palmett palmetto jidher immaljat matul is-snin hekk kif il-fdalijiet maqsumin u li qed jitmermru taż-zkuk tal-weraq ikopruh dejjem aktar. Il-frondi tal-fann ċirkolari ikkurluriti sbieħ tiegħu minn aħdar fl-aħdar għal aħdar huma maqtugħin kważi sal-petiole u mitwija tul il-midrib. Is-sigra tal-palm, li mhix impenjattiva f'termini ta' ħamrija, tikber daqstant tajjeb f'żoni swampy bħal fuq ħamrija ramlija hdejn il-kosta u hija faċilment tolleranti għall-ġlata. Normalment tifforma waħda sa tliet ċrieki tal-weraq ġodda fis-sena. **Post naturali:** Il-palmetto Sabal huwa indiġenu fix-Xlokk tal-Istati Uniti, huwa meqjus bħala simbolu ta' 'Florida, izda huwa mifruq ukoll fl-Istati Uniti ta' North Carolina, Missouri, Louisiana u Texas kif ukoll il-Bahamas. **Kultivazzjoni b'suċċess:** It-tkabbir miż-żrieragħ ġewwa huwa possibbli s-sena kollha. L-ewwel poġġi ż-żrieragħ f'kontenitur b'ilma shun tal-kamra għal tnaħ-il siegħbiex tinkiseb nefħa u b'hekk il-ġerminazzjoni mtejbja. Imbagħad biss tpoġġiha madwar centimetru fond f'ħamrija niedja li qed tikber u tkopri ż-żrieragħ bis-sottostrat li qed jikber. Iggēbbed film li jwaħħal fuq il-kontenitur li qed jikber u poka f'tit toqob fil-film. Dan jipproteġi l-ħamrija milli tinxf. Għandek tneħħi l-fojl għal sagħtejn kull jumejn jew tlett ijiem. Dan jipprevjeni l-iffurmar tal-moffa fuq il-ħamrija li qed tikber. Poġġi l-borma taż-żerriegħa f'post ħafif u shun b'20 sa 25 ° Celsius u żomm il-ħamrija tal-qasari niedja izda mhux imxarba. Normalment tiegħu tieta sa sitt ġimghat biex il-palm tal-qanneb jiggēmina. **L-aħjar post:** Il-palm tal-palmett iħobb postijiet xemxija u shan. Wara li tiberna ġewwa, inizjalment għandu joqgħod fid-dell parzjali għal 14-il jum biex jidraw ir-raġġi UV horox. **Kura ottimali:** Ir-rekwiżit tal-ilma tal-palmetto huwa pjuttost moderat. L-aħjar huwa li tisqija sewwa b'ilma li jkun baxx fil-ġir kemm jista' jkun, izda tevita li tissaq - per eżempju minħabba l-ilma residwu fil-saucer - u ħalli l-ħamrija tinxf fuq il-wiċċ sat-tisqija li jmiss. Għandek tiffertilizza bejn April u Settembru bil-palm likwidu jew fertilizzant tal-pjanti tal-kontenitur kull ġimghatejn jew tliet ġimghat. **Fix-xitwa:** Palmetto anzjani jittolleraw temperaturi sa -10 ° Celsius fix-xitwa u jistgħu wkoll ibernaw barra jekk ikun hemm ftit ġlata. Madankollu, kamra qawwija u friska b'5° sa 15° Celsius hija aktar sigura.



Palmetto Palm

Sabal palmetto

Palmschoonheid uit Florida

De stevige, grijze stam van de palmetto-palm ziet eruit alsof hij door de jaren heen is gevlochten, wanneer de gespleten overblijfselen van de bladstelen, die met de jaren afvallen, deze steeds meer bedekken. De prachtige blauwgroene tot groen gekleurde cirkelvormige waaierbladeren zijn bijna tot aan de bladsteel ingesneden en langs de hoofdnerf gevouwen. De palmboom, die niet veeleisend is qua bodem, groeit net zo goed in moerasgebieden als op zandgronden nabij de kust en is goed bestand tegen vorst. Het vormt gewoonlijk één tot drie nieuwe kransen per jaar. **Natuurlijke locatie:** De Sabal palmetto komt oorspronkelijk uit het zuidoosten van de VS, wordt beschouwd als een herkenningspunt in Florida, maar is ook wijdverspreid in de Amerikaanse staten North Carolina, Missouri, Louisiana en Texas, evenals op de Bahama's. **Succesvolle teelt:** Binnen kweeken uit zaden is het hele jaar mogelijk. Zet de zaden eerst twaalf uur in een bakje met kamervarm water om ze op te zwellen en zo hun kiemkracht te verbeteren. Plaats hem dan pas ongeveer een centimeter diep in vochtige potgrond en bedek de zaden met het kweeksubstraat. Rek huishoudfolie over de kweekbak en prik een paar gaatjes in de film. Dit beschermt de aarde tegen uitdroging. Om de twee tot drie dagen moet u de film gedurende 2 uur verwijderen. Dit voorkomt schimmelvorming op de teeltgrond. Zet de kweekbak op een lichte en warme plaats met 20 à 25 ° Celsius en houd de kweekgrond vochtig, maar niet nat. Het duurt meestal drie tot zes weken voordat de hennepalm ontkiemt. **De beste locatie:** De palmettopalm houdt van zonnige en warme locaties. Na overwintering in huis moet hij eerst 14 dagen in de halfschaduw staan om te kunnen wennen aan de harde uv-straling. **Optimale verzorging:** De waterbehoefte van de palmetto-palm is vrij matig. Het is het beste om grondig water te geven met zo min mogelijk kalk, maar vermijd wateroverlast - bijvoorbeeld door restwater in de schotel - en laat de grond op het oppervlak drogen tot de volgende watergift. Bemesten in de periode van april tot september met vloeibare palm- of kuipplantenmest met tussenpozen van twee tot drie weken. **In de winter:** Ook oudere palmettopalmen verdragen in de winter temperaturen tot -10 ° Celsius en kunnen bij zwakke vorst ook buiten overwinteren. Maar een lichte en koele kamer met 5 ° tot 15 ° Celsius is veiliger.



Palmetto palme

Sabal palmetto

Palm skjønnhet fra Florida

Den sterke grå stammen til palmetto palmetto ser flettet ut med årene ettersom de splittede og råtnende restene av bladstilkene i økende grad dekker den. Dens vakre blågrønne til grønnfargede sirkulære vifteblader er kuttet nesten til bladstilkens og brettet inn langs midtribben. Palmetreet, som er lite krevende med tanke på jordsmønn, vokser like godt i myrområder som på sandjord nær kysten og låter lett frost. Den danner normalt en til tre nye bladringer i året. **Naturlig beliggenhet:** Sabal palmetto er hjemmehørende sør-øst i USA, regnes som et symbol på Florida, men er også utbredt i de amerikanske delstatene North Carolina, Missouri, Louisiana og Texas samt Bahamas. **Vellykket dyrking:** Å dyrke fra frø innendørs er mulig hele året. Legg først frøene i en beholder med romvarmt vann i tolv timer for å oppnå hevelse og dermed forbedret spiring. Først da legger du den ca en centimeter dyp i fuktig vekstjord og dekker frøene med vekstsubstratet. Strekk matfilm over vekstholderen og stikk noen hull i filmen. Dette beskytter jorda mot å tørke ut. Du bør fjerne folien i 2 timer annenhver til tredje dag. Dette forhindrer at det dannes mugg på den voksende jorda. Plasser frøpotten på et lett og varmt sted med 20 til 25° Celsius og hold pottejorda fuktig, men ikke våt. Det tar vanligvis tre til seks uker for hamppalmen å spire. **Den beste beliggenheten:** Palmettopalmen elsker solrike og varme steder. Etter dvalemodus innendørs bør den i utgangspunktet stå i halvskygge i 14 dager for å venne seg til de harde UV-strålene. **Optimal omsorg:** Vannbehovet til palmettopalmen er ganske moderat. Det er best å vanne godt med vann som er minst mulig kalkfattig, men unngå vannmasser – for eksempel på grunn av restvann i tallerkenen – og la jorda tørke på overflaten til neste vanning. Du bør gjødsle mellom april og september med flytende palme- eller beholderplantegjødsel annenhver til tredje uke. **Om vinteren:** Eldre palmettopalmer tåler temperaturer ned til -10° Celsius om vinteren og kan også gå i dvale ute hvis det er litt frost. Et lyst og kjølig rom med 5° til 15° Celsius er imidlertid tryggest.



Palma Palmetto

Sabal palmetto

Piękno palm z Florydy

Masywny szary pień Palmetto Palm nabiera nieco splecionego wyglądu przez lata, kiedy umierające resztki pokrywających go opadających łodyg liści. Jego piękne, niebiesko-zielone do zielonego, okragłe liście w kształcie wachlarza są głęboko i prawie do momentu wcinania się łodygi liścia i zapadania się wzdłuż środkowego zebra. Pod względem gleby Palma Palmetto jest raczej skromna i rośnie na terenach podmokłych tak samo jak na piaszczystych glebach w pobliżu wybrzeża i można ją również określić jako lekko mrozoodporną. Zwykle rośnie od jednego do trzech nowych wieńców liści w ciągu jednego roku.

Naturalne położenie: Palmetto Sabal pochodzi z południowo-wschodniej części USA i jest uważana za symbol Florydy. Jednak jest również szeroko rozpowszechniona w stanach Karoliny Północnej, Missouri, Luizjanie i Teksasie, a także na Bahamach. **Udana uprawa:** Rozmnażanie nasion w pomieszczeniach jest możliwe przez cały rok. Aby zwiększyć zdolność kiełkowania, możesz umieścić nasiona na około 12 godzin w ciepłej wodzie w celu zagruntowania. Posadź nasiona na głębokość około 1 cm w wilgotnym kompoście doniczkowym, nałóż trochę ziemi kompostowej i przykryj pojemnik na nasiona przezroczystą folią. Nie zapomnij zrobić dziur w przezroczystej folii i zdejmować ją co drugi lub trzeci dzień na około 2 godziny. W ten sposób unikniesz tworzenia się pleśni na kompoście doniczkowym. Umieść pojemnik na nasiona w miejscu jasnym i ciepłym o temperaturze od 20 ° C do 25 ° C i utrzymuj ziemię wilgotną, ale nie mokrą. Zwykle kiełkowanie trwa od trzech do sześciu tygodni. **Najlepsza lokalizacja:** Palma Palmetto lubi ciepłe i słoneczne miejsce. Po hibernacji należy początkowo trzymać go w półcienistym miejscu przez dwa tygodnie, aby mógł powoli przystosować się do promieniowania UV. **Optymalna pielęgnacja:** Palma Palmetto ma raczej skromne zapotrzebowanie na wodę. Najlepiej jest podlewać głęboko wodą z niedoborem wapnia i uważać, aby uniknąć gromadzenia się wody, szczególnie w spodku. Pozostaw górną warstwę gleby do wyschnięcia, zanim ponownie zaczniesz podlewać roślinę. Od kwietnia do września co dwa do trzech tygodni należy również podawać płynny nawóz do roślin doniczkowych lub palm. **W zime:** Starsza Palma Palmetto może tolerować nawet temperatury do -10 ° Celsjusza i dlatego - na obszarach o niewielkim mrozie - może być chroniona na zewnątrz podczas hibernacji. Jednak zawsze bezpieczniej jest trzymać roślinę w jasnym i chłodnym pomieszczeniu o temperaturze od 5 ° do 15 ° Celsjusza.



Palmito palmito

Sabal palmetto

Palmeira da Flórida

O forte tronco cinza do palmetto palmetto parece trançado ao longo dos anos, à medida que os restos rachados e em decomposição dos caules das folhas o cobrem cada vez mais. Suas belas folhas circulares de verde-azulado a verde são cortadas quase até o pecíolo e dobradas ao longo da nervura central. A palmeira, pouco exigente em termos de solo, desenvolve-se tanto em zonas pantanosas como em solos arenosos junto à costa e é facilmente tolerante ao gelo. Normalmente forma de um a três novos anéis de folhas por ano. **Localização natural:** O sabal palmetto é nativo do sudeste dos EUA, é considerado um símbolo da Flórida, mas também é difundido nos estados americanos da Carolina do Norte, Missouri, Louisiana e Texas, bem como nas Bahamas. **Cultivo bem sucedido:** Cultivar a partir de sementes dentro de casa é possível durante todo o ano. Primeiro coloque as sementes em um recipiente com água morna por doze horas para atingir o inchaço e assim melhorar a germinação. Só então coloque-o cerca de um centímetro de profundidade no solo úmido e cubra as sementes com o substrato em crescimento, estique o filme plástico sobre o recipiente em crescimento e faça alguns furos no filme. Isso protege o solo de secar. Você deve remover o papel alumínio por 2 horas a cada dois ou três dias. Isso evita a formação de mofo no solo em crescimento. Coloque o vaso de sementes em um local claro e quente com 20 a 25 ° Celsius e mantenha o solo do vaso úmido, mas não molhado. Geralmente, leva de três a seis semanas para a palma do cânhamo germinar. **A melhor localização:** A palmeira palmetto adora locais ensolarados e quentes. Depois de hibernar dentro de casa, ele deve inicialmente ficar na sombra parcial por 14 dias para se acostumar com os fortes raios UV. **Cuidado ideal:** A necessidade de água da palmeira palmetto é bastante moderada. É melhor regar bem com água com o menor teor de cal possível, mas evitar o encharcamento - por exemplo, devido a água residual no pires - e deixar o solo secar na superfície até a próxima rega. Você deve fertilizar entre abril e setembro com palma líquida ou fertilizante para plantas de contêineres a cada duas a três semanas. **No inverno:** Palmettos mais velhos toleram temperaturas abaixo de -10° Celsius no inverno e também podem hibernar ao ar livre se houver um pouco de geada. No entanto, uma sala iluminada e fria com 5° a 15° Celsius é mais segura.



Palmetto Palmier

Sabal palmetto

Frumusețea palmelor din Florida

Trunchiul cenușiu robust al palmei palmetto pare că a fost împletit de-a lungul anilor, când rămășițele despicate și în descompunere ale tulpinilor frunzelor îl acoperă din ce în ce mai mult. Frunzele sale circulare frumose albastre-verzi până la verzi sunt incizate aproape până la tulpina frunzelor și pliate de-a lungul nervurii medii. Palmierul, care nu este exigent în ceea ce privește solul, crește la fel de bine în zonele mlăștinoase ca și pe solurile nisipoase din apropierea coastelor și este ușor tolerant la îngheț. De obicei formează una până la trei coroane noi pe an. **Locație naturală:** Sabal palmetto este originar din sud-estul Statelor Unite, este considerat un reper din Florida, dar este, de asemenea, răspândit în statele americane din Carolina de Nord, Missouri, Louisiana și Texas, precum și în Bahamas. **Cultivare de succes:** Cultivarea din semințe în interior este posibilă pe tot parcursul anului. Așezați mai întâi semințele într-un vas cu apă caldă în cameră timp de douăsprezece ore, pentru a se umfla și a-și îmbunătăți astfel capacitatea de germinare. Abia apoi așezați-l cu o adâncime de aproximativ un centimetru în sol umez de ghiveci și acoperiți semințele cu substratul în creștere. Acest lucru protejează pământul de uscare. La fiecare două până la trei zile ar trebui să îndepărtați filmul timp de 2 ore. Acest lucru previne formarea mușgaiului pe solul de cultivare. Așezați vasul de cultivare într-un loc luminos și cald, cu 20-25 ° Celsius și mențineți solul de cultivare umez, dar nu umez. De obicei, durează trei până la șase săptămâni până când palma de câneapă să germineze. **Cea mai bună locație:** Palma palmetto iubește locațiile însorite și calde. După iernarea în casă, ar trebui să fie inițial la umbră parțială timp de 14 zile pentru a se putea obișnui cu razele UV dure. **Îngrijire optimă:** Necesarul de apă al palmei palmetto este destul de moderat. Cel mai bine este să udați temeinic cu apă cât mai scăzută în var, dar evitați înmuirea - de exemplu din cauza apei reziduale din fărfurie - și lăsați solul să se usuce la suprafață până la următoarea udare. Ar trebui să fertilizați în perioada aprilie-septembrie cu palmier lichid sau îngrășământ pentru plante la intervale de două până la trei săptămâni. **În iarnă:** Palmierele mai vechi tolerează temperaturi de până la -10 ° Celsius în timpul iernii și pot, de asemenea, să hiberneze în exterior atunci când există îngheț slab. O cameră luminoasă și răcoroasă cu 5 ° până la 15 ° Celsius este mai sigură.



Palmetto Palm

Sabal palmetto

Palmskönhet från Florida

Den robusta, grå stammen på palmettpalmen ser ut som den har flätats genom åren, när de delade resterna av bladstammarna, som faller av med åldern, alltmer täcker den. Dess vackra blågröna till grönfärgade cirkulära fläktblad är snittade nästan till bladstammen och vikas längs mittribben. Palmen, som är obehaglig när det gäller jord, växer lika bra i träskområden som på sandjordar nära kusten och tål lätt frost. Det bildar vanligtvis en till tre nya kransar per år. **Naturligt läge:** Sabal palmetto är infödd i sydöstra USA, anses vara ett landmärke i Florida, men är också utbredd i USA: s delstater North Carolina, Missouri, Louisiana och Texas samt i Bahamas. **Framgångsrik odling:** Att växa från frön inomhus är möjligt året runt. Placera först fröna i ett kärl med rumsvarmt vatten i tolv timmar för att svälla och därmed förbättra deras förmåga att gro. Först sedan placera den ungefär en centimeter djupt i fuktig krukväxt och täck fröna med det växande substratet. Sträck häftfilmen över odlingsbehållaren och sticka några hål i filmen. Detta skyddar jorden från att torka ut. Varannan till var tredje dag ska du ta bort filmen i två timmar. Detta förhindrar att mögel bildas på odlingsjorden. Placera odlingskärl på en ljus och varm plats med 20 till 25 ° Celsius och håll odlingsjorden fuktig men inte våt. Det tar vanligtvis tre till sex veckor för hamppalmen att gro. **Den bästa platsen:** Palmetto-palmen älskar soliga och varma platser. Efter att ha övervintrat i huset bör det initialt vara i delvis skugga i 14 dagar för att kunna vänja sig vid de hårda UV-strålarna. **Optimal vård:** Vattenbehovet i palmettopalm är ganska måttligt. Det är bäst att vattna noggrant med så lite kalk som möjligt, men undvik vattentätning - till exempel på grund av kvarvarande vatten i fatet - och låt jorden torka på ytan tills nästa vattning. Du bör gödsla under perioden april till september med flytande palm- eller badkargödsel med mellanrum på två till tre veckor. **På vintern:** Äldre palmetto-palmer tål också temperaturer ner till -10 ° C på vintern och kan också vila ute när det är svag frost. Men ett ljöst och svaltt rum med 5 till 15 ° C är säkrare.



Palmetto palma

Sabal palmetto

Palmová kráska z Floridy

Silný sivý kmeň palmetto palmetto vyzerá rokmi spletený, pretože ho čoraz viac zakrývajú rozštiepené a rozkladajúce sa zvyšky stoniek listov. Jeho krásne modrozelené až zelené okružle vejárovité listy sú vyrezané takmer po stopku a zložené pozdĺž stredového rebra. Na pôdu nenáročná palma rastie rovnako dobre v bažinatých oblastiach ako na piesočnatých pôdach pri pobreží a ľahko znáša aj mrazy. Bežne tvorí jeden až tri nové listové krúžky ročne. **Prirodzená poloha:** Sabal palmetto pochádza z juhovýchodu USA, je považovaný za symbol Floridy, ale je rozšírený aj v amerických štátoch Severná Karolína, Missouri, Louisiana a Texas a tiež na Bahamách. **Úspešná kultivácia:** Pestovanie zo semien v interiéri je možné po celý rok. Najprv umiestnite semená do nádoby s izbovou teplou vodou na dvanásť hodín dosiahnutie opuchu a tým zlepšenia klíčivosti. Až potom ju umiestnite asi jeden centimeter hlboko do vlhkej pestovateľskej pôdy a semená zasypete pestovateľským substrátom. Na pestovateľskú nádobu natiahnite priľnavú fóliu a do fólie vypichnete niekoľko otvorov. To chráni pôdu pred vysychaním. Fóliu by ste mali odstraňovať na 2 hodiny každé dva až tri dni. To zabraňuje tvorbe plesní na rastúcej pôde. Črepník umiestnite na svetlé a teplé miesto s teplotou 20 až 25 ° C a udržiavajte pôdu v črepníku vlhkú, ale nie mokrá. Zvyčajne trvá tri až šesť týždňov, kým konopná palma vyklíči. **Najlepšie umiestnenie:** Palmetto palma miluje slnečné a teplé polohy. Po zimnom spánku v interiéri by mal spočiatku 14 dní stáť v polotieni, aby si zvykol na ostré UV žiarenie. **Optimálna starostlivosť:** Potreba vody palmy palmetto je pomerne mierna. Najlepšie je dôkladne zaliať vodou s čo najnižším obsahom vápna, vyvarujte sa však podmáčaniam – napríklad kvôli zvyškovej vode v tanieriku – a nechajte zemínu na povrchu vyschnúť až do ďalšej zálievky. V období od apríla do septembra by ste mali hnojiť tekutým hnojivom na palmy alebo kontajnerové rastliny každé dva až tri týždne. **V zime:** Staršie palmy palmetto znášajú v zime teploty do -10° Celzia a pri menšom mraze môžu prezimovať aj vonku. Bezpečnejšia je však svetlá a chladná miestnosť s 5° až 15° Celzia.



Palmeta palma

Sabal palmetto

Palma lepotica s Floride

Močno sivo deblo palmetto palmetto je z leti videti prepleteno, saj ga razcepljeni in razpadajoči ostanki pecljev vse bolj prekrivajo. Njeni lepi modro-zeleni do zeleno obarvani okrogli pahljačasti listi so prirezani skoraj do peclja in zapognjeni vzdolž srednje žilice. Palma, ki je glede tal nezahtevna, enako dobro uspeva na močvirnatih območjih kot na peščenih tleh ob obali in dobro prenaša zmrzal. Običajno oblikuje enega do tri nove listne obroče na leto. **Naravni habitat:** Sabalova palma je doma na jugovzhodu ZDA, velja za simbol Floride, razširjena pa je tudi v ameriških zveznih državah Severna Karolína, Missouri, Louisiana in Teksas ter na Bahamih. **Navodila za gojenje:** Gojenje iz semen v zaprtih prostorih je možno vse leto. Semena najprej ur postavite v posodo s sobno toplo vodo da dosežemo nabrekanje in s tem izboljšano kalitev. Šele nato ga položite približno en centimeter globoko v vlažno rastno zemljo in semena prekrijete z rastnim substratom. Čez rastno posodo napnete živilsko folijo in v folijo naredite nekaj lukenj. To ščiti tla pred izsušitvijo. Vsake dva do tri dni za 2 uri odstranite folijo. S tem preprečimo nastanek plesni na rastni zemlji. Lonček s semeni postavite na svetlo in toplo mesto s temperaturo od 20 do 25 °C, zemlja v lončku pa naj bo vlažna, vendar ne mokra. Običajno traja od tri do šest tednov, da konoplina palma vzklíje. **Najboljša lokacija:** Palma palma obožuje sončne in tople lege. Po zimskem spanju v zaprtih prostorih naj najprej 14 dni stoji v polsenci, da se navadi na močne UV žarke. **Optimalna nega:** Potreba palmetto po vodi je precej zmerna. Najbolje je, da temeljito zalivate z vodo s čim manj apnenca, vendar se izogibajte namakanju - na primer zaradi ostankov vode v posodi - in pustite, da se zemlja na površini posuši do naslednjega zalivanja. Med aprílom in septembrom morate gnojiti s tekočim gnojilom za palme ali rastline v posodi vsaka dva do tri tedne. **V zimskem času:** Starejše palme palme prenesejo pozimi temperature do -10° Celzija in lahko tudi prezimujejo zunaj, če je malo zmrzali. Varnejši pa je svetel in hladen prostor s 5° do 15° Celzija.



Palmito

Sabal palmetto

Bella palmera de Florida

El trono gris del palmito parece con los años trenzado cuando los restos desintegrados de los pecíolos lo cubren antes de caer. Las frondas abanicadas y redondas de color verde azulado tirando para verde, tienen unos cortes que llegan casi al pecíolo y a lo largo del raquis plegado. En relación al suelo, esta palmera es muy modesta y crece en marisma igual que en terreno arenoso en zonas costeras y aguanta pequeñas heladas. Por lo general desarrolla entre una y tres guirnaldas de hojas al año. **Ubicación natural:** El palmito es originariamente del sudeste de EEUU, se considera símbolo de Florida pero también está muy extendido en otros estados de EEUU como Carolina del Norte, Missouri, Luisiana y Texas al igual que en las Bahamas. **Cultivo exitoso:** La semilla se puede criar en interior durante todo el año. Mantenga las semillas durante doce horas en agua a temperatura ambiente para que se hidraten y se mejore la germinación de las mismas. Entierre las semillas en sustrato húmedo a un centímetro de profundidad y cubra las semillas con el mismo sustrato. Cubra el recipiente de cultivo con un film transparente y agüeréelo. Así protegerá la tierra de la desecación. Para evitar la putrefacción del sustrato retire el film cada dos o tres días durante 2 horas. Coloque el recipiente de cultivo en un lugar luminoso y cálido entre 20 y 25 grados y mantenga el sustrato húmedo, pero no mojado. La germinación se produce a las tres a seis semanas. **La mejor ubicación:** El palmito ama lugares soleados y cálidos. Después de permanecer durante el invierno en interior debe mantenerlo durante dos semanas en semi sombra, para acostumbrarse a la radiación ultravioleta. **Cuidado óptimo:** La necesidad de agua del Palmito es moderada. Riéguelo penetrantemente con agua pobre en cal, pero evite el anegamiento por ejemplo por agua residual en el platillo y deje que la tierra de la superficie se seque hasta el próximo riego. Cada dos a tres semanas de abril a septiembre, puede suministrarle fertilizante líquido para plantas en maceta o para parterales. **En el invierno:** Las Palmeras de Carolina más maduras toleran en invierno temperaturas hasta -10 grados y pueden permanecer con suaves heladas protegidas en exterior. Es más seguro mantenerlas en una habitación luminosa y fresca con temperaturas de entre 5 a 15 grados.



Palmetto palma Sabal palmetto Palmová kráska z Floridy

Silný šedý kmen palmetto palmetto vypadá v průběhu let jako spletený, jak jej rozštěpené a rozkládající se zbytky listových stopek stále více pokrývají. Jeho krásné modrozelené až zelené zbarvené kruhové vějířovité listy jsou vyřiznuty téměř k řápíku a složené podél střední žebra. Palma nenáročná na půdu roste stejně dobře v bažinatých oblastech jako na písčitých půdách poblíž pobřeží a snadno snáší mráz. Obvykle tvoří jeden až tři nové listové kroužky ročně. **Přirozená poloha:** Sabal palmetto pochází z jihovýchodu USA, je považován za symbol Floridy, ale je rozšířen také v amerických státech Severní Karolína, Missouri, Louisiana a Texas a také na Bahamách. **Úspěšné pěstování:** Pěstování ze semínek v interiéru je možné po celý rok. Nejprve umístíte semena na dvanáct hodin do nádoby s pokojově teplou vodou k dosažení bobtnání a tím zlepšení klíčení. Teprve potom ji umístíte asi jeden centimetr hluboko do vlhké pěstební zeminy a semena zasypete pěstebním substrátem, na pěstební nádobu natáhnete přínavou fólii a vyvrtáte do ní několik otvorů. To chrání půdu před vysycháním. Fólii byste měli odstraňovat na 2 hodiny každé dva až tři dny. Tím se zabrání tvorbě plísni na rostoucí půdě. Umístíte květináč na světlé a teplé místo s teplotou 20 až 25 °C a udržujte půdu v květináči vlhkou, ale ne mokrou. Obvykle trvá tři až šest týdnů, než konopná palma vyklíčí. **Nejlepší umístění:** Palmetto palmetto miluje slunná a teplá místa. Po zimním spánku v interiéru by měl zpočátku stát 14 dní v polostínu, aby si zvykl na ostré UV záření. **Optimální péče:** Potřeba vody palmetto palmy je spíše mírná. Zalévejte nejlépe důkladně vodou s co nejmenším obsahem vápna, vyvarujte se však přemokření – například kvůli zbytkové vodě v podšálku – a nechte zeminu na povrchu vyschnout až do další zálivky. Mezi dubnem a zářím byste měli hnojit tekutým hnojivem na palmy nebo kontejnerové rostliny každé dva až tři týdny. **V zimě:** Starší palmy palmetto snášejí v zimě teploty až -10° Celsia a při mírném mrazu mohou také přezimovat venku. Bezpečnější je však světlá a chladná místnost s 5° až 15° Celsia.



Palmiye hurması Sabal palmetto Florida'dan palmiye güzelliği

Palmetto palmetto'nun güçlü gri gövdesi, yaprak saplarının bölünmüş ve çürüyen kalıntıları onu giderek daha fazla kapladığından yıllar içinde kıvrımlı görünüyor. Güzel mavi-yeşilden yeşile renkli dairesel yelpaze yaprakları neredeyse yaprak sapına kadar kesilir ve orta damar boyunca katlanır. Toprak bakımından iddiasız olan hurma ağacı, kıyıya yakın kumlu topraklarda olduğu gibi bataklık bölgelerde de iyi yetişir ve dona karşı çok dayanıklıdır. Normalde yılda bir ila üç yeni yaprak halkası oluşturur. **Doğal konum:** Sabal palmetto, ABD'nin güney-doğusuna özgüdür, Florida'nın bir sembolü olarak kabul edilir, ancak ABD'nin Kuzey Karolína, Missouri, Louisiana ve Teksas eyaletlerinin yanı sıra Bahamalar'da da yaygındır. **Başarılı yetiştirme:** İç mekanlarda tohumlardan büyüme tüm yıl boyunca mümkündür. Önce tohumları oda sıcaklığında suyla dolu bir kaba on iki saat boyunca koyun. Şişme ve böylece geliştirilmiş çimlenme elde etmek için. Ancak o zaman onu nemli büyüyen toprağın yaklaşık bir santimetre derinliğine yerleştirin ve tohumları büyüyen alt tabaka ile kaplayın. Büyüyen kabin üzerine streç film çekin ve filmde birkaç delik açın. Bu, toprağın kurumasını önler. Folyoyu her iki ila üç günde bir 2 saat çıkarmalısınız. Bu, büyüyen toprakta küf oluşumunu önler. Tohum sakısını 20 ila 25°C sıcaklıkta hafif ve sıcak bir yere koyun ve sakı toprağını nemli tutun ama ıslak değil. Kenevir hurmasının çimlenmesi genellikle üç ila altı hafta sürer. **En iyi konum:** Palmetto hurması güneşli ve sıcak yerleri sever. İçeride kış uykusuna yattıktan sonra, sert UV ışınlarına alışması için başlangıçta 14 gün kısmi gölgede durması gerekir. **Optimum bakım:** Palmetto palmiyesinin su ihtiyacı oldukça orta düzeydedir. Mümkün olduğu kadar az kireç içeren suyla iyice sulama yapmak en iyisidir, ancak - örneğin tabakta kalan su nedeniyle - su birikmesini önleyin ve bir sonraki sulamaya kadar toprağın yüzeyde kurumasını bekleyin. Nisan ve Eylül ayları arasında iki ila üç haftada bir sıvı hurma veya kap bitki gübresi ile gübrelemelisiniz. **Kışın:** Daha yaşlı palmetto palmiyeleri, kışın -10°C'ye kadar düşen sıcaklıkları tolere eder ve biraz don olursa dışarıda da kış uykusuna yatabilir. Ancak, 5° ila 15° Santigrat ile aydınlık ve serin bir oda daha güvenlidir.



Palmetto pálma Sabal palmetto Pálma szépség Floridából

A palmetto palmetto erős szürke törzsre az évek során fonottnak tűnik, ahogy a levélszárak hasadt és pusztuló maradványai egyre inkább beborítják. Gyönyörű kék-zöldtől zöldig terjedő körkörös legyezőlevelei szinte a levélnyelégig vannak levágva, és a középső borda mentén behajtvá. A talajigénytelen pálma ugyanolyan jól megterem a mocsaras területeken, mint a partközeli homokos talajokon, és könnyen fagyűrő. Általában évente egy-három új levélgyűrűt alkot. **Természetes elhelyezkedés:** A Sabal palmetto az USA délkeleti részén honos, Florida szimbólumának számít, de elterjedt az Egyesült Államok Észak-Karolína, Missouri, Louisiana és Texas államaiban, valamint a Bahamákon is. **Sikeres termesztés:** A beltéri magvak termesztése egész évben lehetséges. Először helyezze a magokat egy edénybe szobameleg vízzel tizenkét órás áztatással és ezáltal jobb csírázás elérése érdekében. Csak ezután helyezze kb. egy centiméter mélyre nedves termőtalajba, és fedje be a magokat a termesztő aljzattal. A termesztőedényre feszítse ki a fóliát, és szúrjon ki néhány lyukat a fóliába. Ez megvédi a talajt a kiszáradástól. A fóliát két-három naponta 2 órára le kell venni. Ez megakadályozza a penészképződést a növekvő talajon. Helyezze a magcserepet világos és meleg helyre, ahol a hőmérséklet 20-25°C, és a virágföldet tartsa nedvesen, de ne nedvesen. Általában három-hat hétbe telik, mire a kenderpálma kicsírázik. **A legjobb hely:** A pálmapálma szereti a napos és meleg helyeket. Beltéri hibernálás után először 14 napig félárnyékban kell állnia, hogy megszokja a durva UV-sugárzást. **Optimális gondozás:** A pálmapálma vízigénye meglehetősen mérsékelt. A legjobb, ha a lehető legmérszégényebb vízzel alaposan öntözi, de kerülje a vízesedést - például a csészealjban visszamaradt víz miatt -, és hagyja, hogy a talaj megszáradjon a felszínen a következő öntözésig. Április és szeptember között folyékony pálma- vagy tartályos műtrágyával kell trágyázni két-három hetente. **Télen:** Az idősebb pálmapálmák télen akár -10 Celsius fokig is elviselik a hőmérsékletet, és egy kis fagy esetén a szabadban is áttelhetnek. Azonban egy világos és hűvös szoba 5°C és 15°C között biztonságosabb.

: : : : :



パルメットヤシ

Sabal palmetto

フロリダ生まれの美しいヤシ

巨大な灰色の幹は、時間の経過とともに枯れた葉で編み込まれたようになります。その美しい青緑色から緑色の円形扇状の葉は茎に深く、そしてほぼ中央の軸に向かって切れ込んだ状態になっています。土壌に関しては、特別必要なものではありません。ヤシは海岸近くの砂質土壌と同じような沼地で生育し、わずかでしただに霜にも耐えられます。通常、1年間に1〜3つの新しい葉の花冠を形成します。

自然な場所:

アメリカ南東部が由来でフロリダの象徴になっています。そしてまた、ノースカロライナ州、ミズーリ州、ルイジアナ州、テキサス州、ならびにバハマ諸島などアメリカの多くの州に広がっています。

栽培成功:

種子繁殖は室内で年間を通して可能です。発芽率を上げる方法として、種を温水に12時間浸すことができます。湿った培養土の深さ約1cmに種を植え、サランラップなどの透明フィルムで鉢をカバーします。透明フィルムには空気穴をいくつかあけ、2〜3日に1回は約2時間、完全にフィルムを鉢から外します。そうすることで、カビの発生を防ぎます。20°C〜25°Cの明るく暖かい場所に置き、用土は湿った状態に保ちます。通常は3〜6週間で発芽します。

最高のロケーション:

日当たりのよい温かい場所を好みます。冬籠りの後は、半日陰に2週間保管しゆっくりと紫外線に慣らしていきます。それにより葉が焼けるのを防ぎます。

最適なケア:

水やりは控えめにします。石灰含有量の少ない水を与え水浸しにならないように注意します。特に受け皿に水が溜まるのを避けます。土壌の表面が乾いてから次の水やりを行うようにします。4月〜9月の間はヤシ用の液体肥料を2週間ごとに与えます。

冬に:

成長した樹木はマイナス10°Cまで耐えることができるため、凍結の少ない地域では屋外での冬籠りも可能です。しかし、5°Cから15°Cの明るく涼しい場所に植物を保管するのが理想的です。

SKU: 12502 / Palmettopalme