

RES

Reasonable Ecological Stimulators

GumiSil-D

ROŚLINY SADOWNICZE

FORMA
STOSOWANIAOPRYSK DOLISTNY
LUB DOGLEBOWY

| Termin | Dawka | Efekty |
|---|--|--|
| Zabiegi doglebowe (podlewanie) | 300-500 ml / 100 l wody | <ul style="list-style-type: none"> ✓ Wpływa na przyrost latorośli ✓ Zwiększa zawartość chlorofilu ✓ Wpływa na jakość towaru handlowego ✓ Redukuje azotany ✓ Można stosować na glebę przed jej uprawą ✓ Zwiększa zawartość cukrów ✓ Redukuje stres termiczny i po zabiegach SOR ✓ Zwiększa wytrzymałość pąków kwiatowych i poprawia zdolności regeneracyjne ✓ Zawiera mikro i makroskładniki dla odpowiedniego odżywiania, oraz wpływu gospodarki wodnej na roślinę ✓ Zawiera Krzem i Bor niezbędne do pobierania przez roślinę składników pokarmowych z gleby ✓ Zwiększa odporności roślin na infekcje ✓ Zwiększa liczbę zawiązanych owoców ✓ Nadaje się do fertygacji ✓ Obniża koszty produkcji ✓ Obniża wchłanianie metali ciężkich ✓ Dobrze rozpuszczalny w cieczy roboczej ✓ Uaktywnia absorpcję substancji odżywczych ✓ Poprawia działanie mikroflory glebowej ✓ Stymuluje wzrost i rozwój roślin ✓ Przyspiesza ukorzenienie i dojrzewanie ✓ Zmniejszenie kosztów produkcji (poprzez zmniejszenie zapotrzebowania na dotychczas stosowane tradycyjne nawozy) |
| Owoce (jabłoni, grusza, wiśnia, śliwa, pigwa, brzoskwinia, morela) | | |
| Moczenie korzeni sadzonek jabłoni przed sadzeniem | 350 ml / 100 l wody | |
| I zabieg (oprysk): okres zawiązywania pąków kwiatowych | 300 ml / 100 l wody | |
| II zabieg (oprysk): 5-7 dni po kwitnieniu | 300 ml / 100 l wody | |
| III zabieg (oprysk): na początku fizjologicznego opadania zawiązków | 300 ml / 100 l wody | |
| IV zabieg (oprysk): w okresie intensywnego rozwoju owoców | 300 ml / 100 l wody | |
| WAŻNE: Przy dobrym zabezpieczeniu roślin składnikami odżywczymi trzeciego i czwartego zabiegu można nie przeprowadzać. | | |
| Borówka, Winorośl, Truskawki, maliny | | |
| Zaprawianie sadzonek | Moczenie korzeni sadzonek przed sadzeniem na 1/3 powierzchni 500-600 ml / 100 l wody | |
| Zastosowanie doglebowe lub oprysk gleby przed sadzeniem | 300-500 ml / 100 l wody | |
| I zabieg (oprysk): 2 tygodnie przed kwitnieniem | 2-2,5 l / 500-600 l wody / ha | |
| II zabieg (oprysk): na początku kwitnienia | 2-2,5 l / 500-600 l wody / ha | |
| III zabieg (oprysk): 2 tygodnie po opadnięciu płatków kwiatowych | 2-2,5 l / 500-600 l wody / ha | |
| Rośliny ozdobne | | |
| Przy przygotowaniu rozsady do wysadzenia | 200-300 ml / 100 l wody | |
| I zabieg (oprysk): 3-7 dni po wysadzeniu do gruntu | 1 l / 200-300 l wody / ha | |

* Na podstawie badań przeprowadzonych w Państwowym Instytucie Badawczym.

GumiSil to linia wysokowydajnych, organiczno-mineralnych stymulatorów wzrostu roślin, bogatych w substancje odżywcze. Wytwarzane są z naturalnego torfu metodami zapewniającymi długotrwałą stabilność ich parametrów.

Nasze stymulatory zawierają bogactwo składników, które przyczyniają się do intensywnego wzrostu i rozwoju roślin, oraz wzrostu ich odporności na czynniki stresowe m.in. susza, niskie temperatury, działanie środków ochrony roślin. Zwiększają plony roślin uprawnych przy jednoczesnej możliwości zmniejszenia dawek nawozów mineralnych. Wygodne w użyciu dzięki płynnej formule. Mogą być stosowane w formie oprysków dolistnych i doglebowych np. na słomę, ściern lub inny rodzaj masy organicznej przed wymieszaniami jej z glebą lub na glebę przed jej uprawą.

Stymulator wzrostu roślin **GumiSil D** może być stosowany w uprawach polowych roślin ozdobnych, roślin sadowniczych i winorośli między innymi: jabłoń, grusza, śliwa, wiśnia, pigwa, brzoskwinia, borówka, winogrono, jagody, porzeczka.



NASZE PRODUKTY POSIADAJĄ ŚWIADECTWO KWALIFIKACJI DO STOSOWANIA W ROLNICTWIE EKOLOGICZNYM

GumiSil

ORGANICZNO-MINERALNE STYMULATORY WZROSTU ROŚLIN

wydajny
naturalny
ekstrakt
z torfu

| GumiSil D | |
|--|-------|
| Skład | g/l |
| Kwasy fulwowe | 7,0 |
| Kwasy huminowe | 32,0 |
| Azot (N) | 105,0 |
| Fosfor (P ₂ O ₅) | 55,0 |
| Potas (K ₂ O) | 110,0 |
| Magnez (MgO) | 0,9 |
| Siarka (SO ₃) | 13,0 |
| Krzem (Si) | 22,0 |
| Mangan (Mn) | 1,0 |
| Cynk (Zn) | 1,0 |
| Bor (B) | 0,8 |
| Miedź (Cu) | 0,6 |
| Molibden (Mo) | 0,5 |
| Kobalt (Co) | 0,3 |
| Grzyby z rodzaju Trichoderma | |
| L-aminokwasy (m.in. treonina, metionina, lizyna, cystyna) | |
| Witaminy: B ₁ , B ₂ , B ₃ , B ₆ , B ₁₂ , C, D, E, PP, prowitamina A, kwas foliowy | |
| Enzymy katalizujące reakcje oksydacyjne (kataliza i peroksydaza) | |
| Enzymy katalizujące reakcje hydrolizy (amylaza i ureaza) | |
| Białka, mono- i polisacharydy, pektyny | |
| Fitohormony | |