



Nawóz o wysokiej zawartości 17 przyswajalnych α -aminokwasów roślinnych.

Activ ProAmin

zawiera
chelaty

aminokwasy
roślinne

Biostymuluje produktywność roślin.



Wspieramy naturę
www.arkop.pl

Charakterystyka i zasada działania:

Activ ProAmin to w pełni rozpuszczalny nawóz o wysokiej zawartości 17 przyswajalnych α -aminokwasów roślinnych (w całości w bioaktywnej formie L) przeznaczony do pozakorzeniowego dokarmiania upraw rolniczych, roślin warzywniczych oraz upraw sadowniczych.

Activ ProAmin zawiera komplet 17 biogennych aminokwasów wytwarzanych na drodze zaawansowanej technologii hydrolizy. Dzięki ściśle ukierunkowanym procesom wytwarzania, aminokwasy zawarte w **Activ ProAmin** są przyswajane dla roślin w co najmniej 80%.

Stosowanie **Activ ProAmin** intensyfikuje produktywność roślin poprzez istotne przyspieszenie biosyntezy białek oraz powstanie wewnątrzkomórkowego zysku energetycznego. Energia zaoszczędzona w procesie biosyntezy białek aktywuje pozostałe procesy metaboliczne, co przekłada się na ogólną poprawę funkcjonowania roślin.

Instrukcja stosowania:

Stosowanie **Activ ProAmin** jest wyjątkowo efektywne w okresach krytycznego zapotrzebowania roślin na energię (faza intensywnego wzrostu) oraz w okresach stresowych (stres termiczny, świetlny, wodny, uszkodzenie roślin), w których dostarczanie łatwo przyswajalnych biogennych α -aminokwasów (w całości w bioaktywnej formie L) działa na rośliny biostymulująco. **Activ ProAmin** to biostymulacja produktywności roślin, funkcji życiowych roślin oraz intensyfikacja metabolizmu spowodowana istotnym przyspieszeniem biosyntezy białek. Nawóz przeznaczony jest do żywienia pozakorzeniowego w formie oprysku lub przez zraszanie systemów nawadniających.

Składniki pokarmowe % [m/m]

Produkt	MgO rozpuszczalny w wodzie	Cu rozpuszczalna w wodzie	Fe rozpuszczalne w wodzie	Mn rozpuszczalny w wodzie
Activ ProAmin	5,00	0,06	1,80	0,72

Activ ProAmin



Dawkowanie:

Uprawy	Termin zabiegu	Dawka [l/ha]
Zboża ozime	1 – Jesień faza widocznych 3-6 liści – 1 zabieg 2 – Początek fazy krzewienia 3 – Początek strzelania w źdźbło 4 – Otwarcie pochwy liścia flagowego	2,0-3,0
Zboża jare	1 – Pełnia krzewienia 2 – Początek strzelania w źdźbło 3 – Przed kłoszeniem	2,0-3,0
Rzepak	1 – Jesień faza 4-8 liści – 1 zabieg 2 – Formowanie pędów bocznych 3 – Faza intensywnego wzrostu 4 – Faza zielonego zwartego pąka	2,0-3,0
Kukurydza	1 – Faza 3-5 liści 2 – Faza 6-9 liści 3 – Faza rozwoju źdźbła	2,0-3,0
Burak	1 – Faza 4-8 liści właściwych 2 – Wzrost rozety liściowej	2,0-3,0
Strączkowe	1 – Intensywny wzrost, 2 – Rozwój pąków kwiatowych 3 – Rozwój strąków	1,0-3,0
Ziemniak	1 – Formowanie pędów 2 – Intensywny wzrost pędów	2,0-3,0

Zalecane stężenie cieczy roboczej: 200-300 litrów roztworu na hektar.

Rezultaty stosowania Activ ProAmin:

- Biostymuluje produktywność roślin.
- Intensyfikuje procesy fotosyntezy i metabolizmu.
- Błyskawicznie przyswajalny.

Sporządzanie roztworu roboczego:

stosować pojedynczo lub łącznie z Siarczanem Magnezu Jednowodnym MgO-23%, nawozem dolistnym lub środkiem ochrony roślin; bezpośrednio przed opryskiem napełnić zbiornik opryskiwacza wodą do 2/3 objętości i włączyć mieszało; dodawać kolejno Siarczan Magnezu Jednowodny MgO-23%, nawóz dolistny, **Activ ProAmin**, środek ochrony roślin według instrukcji stosowania (jeśli jest przewidziany i zalecany do mieszania przez producenta), adiuwant; dopełnić wodą i przystąpić do oprysku. Nie przekraczać zalecanych dawek **Activ ProAmin**.

Zawiera zestaw 17 naturalnych aminokwasów roślinnych: kwas asparaginowy, treoninę, serynę, kwas glutaminowy, prolinę, glicynę, alaninę, walinę, izoleucynę, leucynę, tyrozynę, fenyloalaninę, histydynę, lizynę, argininę, cystynę, metioninę.

Warzywa	Termin zabiegu	Dawka [l/ha]
Pomidor, Papryka	1 – Przed kwitnieniem, 1-2 zabiegi w dawce	1,0-2,0
Ogórek, Dynia	1 – 4-8 liści właściwych, 1-2 zabiegi 2 – Wiązanie owoców, 1 zabieg 3 – Okres wzrostu owoców/owocowanie, 1-3 zabiegi	1,0-2,0 1,0-2,0 2,0-3,0
Kapusta głowiasta (Biała, Czerwona, Włoska)	1 – 8-12 liści, 1 zabieg 2 – Rozrost główek, 2-3 zabiegi	1,0-2,0 2,0-4,0
Kapusta pekińska	1 – Rozwój liści 2 – Wiązanie główek 3 – Rozrost główek, 1-2 zabiegi	1,0-2,0 1,0-3,0 2,0-4,0
Kapusta brukselska	1 – Intensywny wzrost wegetatywny 2 – Wiązanie główek, 1-2 zabiegi	1,0-3,0 2,0-4,0
Kalafior, Brokuł	1 – Początek formowania róży, 1-2 zabiegi	1,0-2,0
Marchew, Pietruszka	1 – Początek grubienia korzenia 2 – Intensywne grubienie korzenia, 1-2 zabiegi	1,0-2,0 2,0-4,0
Burak ćwikłowy	1 – Początek grubienia korzenia	1,0-2,0
Seler korzeniowy	1 – Początek grubienia korzenia 2 – Intensywne grubienie korzenia	1,0-2,0 1,0-3,0
Cebula	1 – Początek wiązania cebuli	1,0-3,0
Fasola i Groch	1 – Kwitnienie i zawiązanie strąków 2 – Dorastanie strąków	1,0-3,0
Salata	1 – Początek zawiązywania główek 2 – Wyrastanie główek	1,0-2,0

Zalecane stężenie cieczy roboczej: 400-600 litrów roztworu na hektar.

Sady	Termin oprysku	Dawka [l/ha]
Jabłoń	Od różowego pąka do intensywnego wzrostu co 10-14 dni, 3-5 zabiegów	1,0-3,0
Grusza	Do białego pąka do intensywnego wzrostu co 10-14 dni, 3-5 zabiegów	1,0-3,0
Wiśnia	Do białego pąka do rozwoju owoców co 10-14 dni, 3-5 zabiegów	1,0-3,0
Czereśnia	Do białego pąka do rozwoju owoców co 10-14 dni, 3-5 zabiegów	1,0-3,0
Śliwa	Do białego pąka do dojrzewania owoców co 10-14 dni, 3-5 zabiegów	1,0-3,0
Truskawka	Od początku wegetacji do plonowania, 2-5 zabiegów Po zbiorach owoców, 1-2 zabiegi	1,0-2,0 1,0
Malina	Do początku wegetacji do wzrostu i rozwoju owoców, 2-5 zabiegów	2,0-4,0
Porzeczka	Do początku wegetacji do wzrostu i dojrzewania owoców, 2-4 zabiegi	1,0-2,0
Borówka amerykańska	Od początku kwitnienia do wzrostu i dojrzewania owoców, 2-4 zabiegi	1,0-3,0

Zalecane stężenie cieczy roboczej: 700-1000 litrów roztworu na hektar.



ARKOP Sp. z o.o.
32-332 Bukowno
ul. Kolejowa 34a
tel.: +48 32 649 44 51
arkop@arkop.pl | www.arkop.pl

Wspieramy naturę

