



SAFLAX®



Tips



© Sabine Laue - © Saflax

Spathodea campanulata

	 Български	BG	 2		 Malti	MT	 5
	 Dansk	DK	 2		 Nederlands	NL	 5
	 Deutsch	DE	 2		 Norsk	NO	 6
	 English	UK	 2		 Polski	PL	 6
	 Eesti	EE	 3		 Português	PT	 6
	 Suomalainen	FI	 3		 Românesc	RO	 6
	 Français	FR	 3		 Svenska	SE	 7
	 Ελληνική	GR	 3		 Slovensky	SK	 7
	 Gaeilge	IE	 4		 Slovenski	SI	 7
	 íslenskur	IS	 4		 Español	ES	 7
	 Italiano	IT	 4		 Český	CZ	 8
	 Hrvatski	HR	 4		 Türkçe	TR	 8
	 Latviešu	LV	 5		 Magyar	HU	 8
	 Lietuvių kalba	LT	 5		 日本語	JP	 9



Африканско лале дърво

Spathodea campanulata

В продължение на седмици винаги имаше нови цветя от всяка пъпка

Вечнозеленото африканско лале дърво е лесно за отглеждане и поддържа като контейнерно растение с височина до два метра. След няколко години съцветията излизат от покрива му от тъмнозелени перести листа на дълги дръжки. Ефектните цветове на Spathodea campanulata се отварят на партиди, така че всяко цветце се променя в продължение на седмици. Най-външният кръг от цветя се отваря първи и показва своите оранжеви до червени листа с вълнообразни и жълти ръбове. След всеки два дни крайните цветя изсъхват и следва следващият ред пъпки. Цъфтежът продължава седмици. Неотворените цветни пъпки на африканското лале изпускат струя вода при стискане, която растението използва, за да привлече прилепите в естественото си местообитание, за да го опрашат. **Естествено местоположение:** Естественят ареал на Spathodea campanulata е на африканския бряг на Атлантическия океан от Гана до Ангола и оттам до Судан и Уганда. Междувременно обаче е популярно декоративно растение и извън Африка и се е разпространило в Южна Америка. **Успешно отглеждане:** Отглеждането от семена на закрито е възможно през цялата година. Леките семена не изискват предварителна обработка и могат да се разпръснат директно върху влажна почва за отглеждане и само леко да се покрият с хранителната среда. Опънетите хранително фолио върху съда с култура и пробийте няколко дупки във фолиото. Това предпазва почвата от изсушаване. Трябва да отстранявате фолиото за 2 часа на всеки два до три дни. Това предотвратява образуването на мухъл върху растящата почва. Поставете саксията със семена на светло и топло място с 20 до 25° по Целзий и поддържайте почвата влажна, но не мокра. Обикновено покълването става след две до три седмици. **Най-доброто местоположение:** Като дете на тропиците, което се нуждае от топлина, африканското лале обича светло и слънчево място. През лятото можете, разбира се, да имате и защитено място за слънчеви бани на балкона или в градината. **Оптимална грижа:** Лалето обича богата на хранителни вещества и пропусклива почва с едрозърнести части като експандирана глина или чакъл. Той се нуждае от постоянно водоснабдяване, като трябва да се избягва преовлажняване поради остатъчна вода в чинийката. От април до октомври се препоръчва редовно торене с тор за вани на всеки 10 дни. Презасаждайте растението всяка година или две, но винаги избирайте следващата по-голяма саксия. **През зимата:** Вашето лале дърво не е устойчиво на замръзване и корените могат да се повредят при температури под 3° по Целзий. По-добре е светло и топло място с нормална стайна температура, тъй като цветята вече могат да се очакват през първите месеци на годината от третата година. Избягвайте обаче място в близост до отоплителна система.



Afrikansk tulipantræ

Spathodea campanulata

I ugevis var der altid nye blomster fra hver knop

Det stedsegrønne afrikanske tulipantræ er let at dyrke og vedligeholde som en containerplante med en højde på op til to meter. Efter et par år stikker blomsterstandene ud af dens baldakin af mørkegrønne fjerklædte blade på lange stilke. De spektakulære blomster af Spathodea campanulata åbnes i stød, så hver blomst skifter igen og igen i løbet af uger. Den yderste cirkel af blomster åbner sig først og viser sine orange til røde blade med bølgede og gule kanter. Efter hver anden dag visner randblomsterne, og næste række knopper følger. Blomstringen varer i uger. De uåbnede blomsterknopper af det afrikanske tulipantræ udsender en vandstråle, når de klemmes, som planten bruger til at tiltrække flagermus i sit oprindelige habitat til at bestøve den. **Naturlig beliggenhed:** Det naturlige udbredelsesområde for Spathodea campanulata er på den afrikanske atlantehavskyst fra Ghana til Angola og derfra til Sudan og Ugan­da. I mellemtiden er den dog også en populær prydp­lante uden for Afrika og har spredt sig til Sydamerika. **Succesfuld dyrkning:** Dyrkning fra frø indendørs er muligt hele året rundt. De lette frø kræver ingen forbehandling og kan spredes direkte på fugtig vækstjord og kun let dækkes med vækstmediet. Stræk husholdningsfilm over dyrkningskarret og prik et par huller i filmen. Dette beskytter jorden mod udtørring. Du bør fjerne folien i 2 timer hver anden til tredje dag. Dette forhindrer mug i at dannes på den voksende jord. Stil frøpotten et let og varmt sted med 20 til 25° Celsius og hold pottejorden fugtig, men ikke våd. Spiring sker normalt efter to til tre uger. **Den bedste beliggenhed:** Som et barn af troperne, der har brug for varme, sætter det afrikanske tulipantræ pris på et lyst og solrigt sted. Om sommeren kan du selvfølgelig også få en lun solbadeplads på altanen eller i haven. **Optimal pleje:** Tulipantræet elsker næringsrig og permeabel jord med grovkornede dele som ekspanderet ler eller grus. Han har brug for en konstant vandforsyning, hvorved vandsugning gennem resterende vand i underkoppen bør undgås. Fra april til oktober anbefales regelmæssig gødskning med baljeplantegødning hver 10. dag. Ompot planten hvert eller andet år, men vælg altid den næste større potte. **Om vinteren:** Dit tulipantræ er ikke frostdbestandigt, og rodskader kan opstå ved temperaturer under 3° Celsius. Et lyst og varmt sted med en normal stuetemperatur er bedre, da blomster allerede kan forventes i årets første måneder fra det tredje år. Undgå dog en placering i nærheden af et varmesystem.



Afrikanischer Tulpenbaum

Spathodea campanulata

Über Wochen immer neue Blüten aus jeder Knospe

Der immergrüne Afrikanische Tulpenbaum lässt sich gut als Kübelpflanze mit einer Höhe von bis zu zwei Metern ziehen und halten. Aus seinem Blätterdach aus dunkelgrünen Fiederblättern ragen nach einigen Jahren an langen Stielen die Blütenstände hervor. Die spektakulären Blüten des Spathodea campanulata öffnen sich in Schüben, so dass sich jede Blüte über Wochen immer wieder verändert. Zunächst öffnet sich der äußerste Blütenkreis und zeigt seine orange- bis rotfarbenen und an den Rändern gewellten und gelbfarbenen Blätter. Nach jeweils zwei Tagen welken die Randblüten und die nächste Knospenreihe schiebt nach. So hält die Blüte über Wochen an. Die ungeöffneten Blütenknospen des Afrikanischen Tulpenbaums geben bei Druck einen Wasserstrahl ab. Damit lockt die Pflanze in ihrer Heimat Fledermäuse an, um sie zu bestäuben. **Naturstandort:** Das natürliche Verbreitungsgebiet der Spathodea campanulata liegt an der afrikanischen Atlantikküste von Ghana bis Angola und von dort bis Sudan und Uganda. Mittlerweile ist sie aber auch außerhalb Afrikas eine beliebte Zierpflanze und hat sich bis nach Südamerika verbreitet. **Anzucht:** Im Haus ist die Anzucht aus Samen das ganze Jahr über möglich. Die leichten Samen benötigen keine Vorbehandlung und können direkt auf feuchte Anzuchterde verteilt und nur leicht mit dem Anzuchtsubstrat bedeckt werden. Spannen Sie Klarsichtfolie über das Anzuchtgefäß und stechen Sie einige Löcher in die Folie. So ist die Erde vor Austrocknung geschützt. Alle zwei bis drei Tage sollten Sie die Folie für 2 Stunden entfernen. Das beugt einer Schimmelbildung auf der Anzuchterde vor. Stellen Sie das Anzuchtgefäß an einen hellen und warmen Ort mit 20 bis 25° Celsius und halten Sie die Anzuchterde feucht, aber nicht nass. Die Keimung erfolgt in der Regel nach zwei bis drei Wochen. **Standort:** Als wärmebedürftiges Tropenkind schätzt der Afrikanische Tulpenbaum einen lichtreichen und sonnigen Platz. Im Sommer ist ein windgeschützter Sonnenplatz natürlich auch auf dem Balkon oder im Garten möglich. **Pflege:** Der Tulpenbaum liebt nährstoffreiche und durchlässige Erde mit grobkörnigen Anteilen wie Blähton oder Kies. Er braucht eine konstante Wasserversorgung, wobei Staunässe durch Restwasser im Untersetzer vermieden werden sollte. Von April bis Oktober empfiehlt sich eine regelmäßige Düngung mit Kübelpflanzendünger im Abstand von 10 Tagen. Topfen Sie die Pflanze alle ein bis zwei Jahre um, aber wählen Sie dabei immer nur den nächstgrößeren Topf. **Im Winter:** Ihr Tulpenbaum ist nicht frostfest und bei Temperaturen unter 3° Celsius kann es zu Wurzelschädigungen kommen. Besser ist ein heller und warmer Standort mit normaler Raumtemperatur, da ab dem dritten Jahr in den ersten Monaten des Jahres bereits mit Blüten zu rechnen ist. Vermeiden Sie aber einen Standort in Heizungs­nähe.



African Tulip Tree

Spathodea campanulata

For weeks abundant flowers out of every bud

The evergreen African Tulip Tree grows up to two meters and can easily be cultivated as a tub plant. After a few years, the on long stalks sitting inflorescences stand out of the canopy of dark-green coloured pinnate leaves. The spectacular flowers of the Spathodea campanulata open up in batches, so every blossom is changing constantly over a couple of weeks. Initially the outer blossom rings will open up with orange and red painted and on the edges curly yellow coloured leaves. Each time the ray florets wither after two days and the next batch of buds pushes forward. This way the blossoming is going on for many weeks. The unopened flower buds of the African Tulip Tree spill a fountain of water when pressed, and by doing so, attracts in its natural habitat bats as pollinators. **Natural location:** The natural habitat of the Spathodea campanulata is along the African Atlantic Coast from Ghana until Angola and even further into Sudan and Uganda. Nowadays the African Tulip Tree is also being cultivated as a decorative plant outside of Africa and can even be found in South America. **Successful cultivation:** Seed propagation indoors is possible throughout the year. The fine seeds of the African Tulip Tree don't need any initial treatment and can just be spread onto moist potting compost and covered with a thin layer of compost earth. Then, cover the seed container with clear film to prevent the earth from drying out, but don't forget to make some holes in the clear film and take it every second or third day completely off for about 2 hours. That way you avoid mold formation on your potting compost. Place the seed container somewhere bright and warm with a temperature between 20°C and 25° Celsius and keep the earth moist, but not wet. Usually it takes two to three weeks until germination. **The best location:** As a tropical plant the African Tulip Tree appreciates a very bright and sunny place. During summer it can be kept in a wind-protected sunny spot outdoors on your balcony or in the garden. **Optimal care:** The African Tulip Tree prefers nutritious and permeable soil containing a fair part of expanded clay or gravel. It needs steady and sufficient watering, but avoid waterlogging in the saucer. From April until October it is recommended to give fertilizer for tub plants on a regular basis, about every 10 days. The plant should be shifted every two to three years to the next bigger sized pot. **In the winter:** The African Tulip Tree is not frost-resistant and its roots will take damage when kept at temperatures below 3° Celsius. During winter it is best to keep the plant in a bright and warm spot under room temperature, but avoid placing it next to a heater. Starting from the third year, the tree will produce the first flowers already in the first months of the year.



Aafrika tulbipuu

Spathodea campanulata

Nädalaid oli igast pungast alati uusi õisi

Igihaljas Aafrika tulbipuud on kuni kahe meetri kõrguse konteinentaimena lihtne kasvatada ja hooldada. Mõne aasta pärast ulatuvad õisikud selle pikkadel vartel tumeroheliste suleliste lehtede võrast välja. Spathodea campanulata suurejoonelised õiedavanevad puhkedes, nii et iga õis muutub nädalate jooksul ikka ja jälle. Kõige välimine õiesing avaneb esimesena ja näitab oma oranži kuni punase värvi lehti, millel on lainelised ja kollased servad. Iga kahe päeva järel närbumad ääreõied ja järgneb järgmine pungade rida. Õitsemine kestab nädalaid. Aafrika tulbipuu avanemata õiepungad eraldavad pigistamisel veejoa, mida taim kasutab oma kodukohas nahkhiirte tolmeldamiseks ligi. **Looduslik asukoht:** Spathodea campanulata looduslik levila on Atlandi ookeani Aafrika rannikul Ghanast Angolani ning sealt edasi Sudaani ja Ugandani. Vahepeal on see aga populaarne ilutaim ka väljaspool Aafrikat ja levinud Lõuna-Ameerikasse. **Edukas kasvatamine:** Seemnetest siseruumides kasvatamine on võimalik aastaringset. Heledad seemned ei vaja eeltötlust ja neid võib laotada otse niiskele kasvupinnasele ning katta vaid kergelt kasvusubstraadiga. Venitage kultuurianuma kohale toudikule ja torkake kilesse mõned augud. See kaitseb mulda kuivamise eest. Peaksite fooliumi eemaldama 2 tunniks iga kahe kuni kolme päeva järel. See takistab hallituse teket kasvupinnal. Asetage külvipott valgusküllasesse ja sooja kohta, mille temperatuur on 20–25 °C, ning hoidke istutusmuld niiskena, kuid mitte märjana. Idanemine toimub tavaliselt kahe kuni kolme nädala pärast. **Parim asukoht:** Soojust vajava troopika lapsena hindab Aafrika tulbipuu valgusküllast ja päikeselist kasvukohta. Suvel saab loomulikult ka varjulise päikesevõtukoha rõdul või aias. **Optimaalne hooldus:** Tulbipuu armastab toitainerikast ja vett läbilaskvat mulda, millel on jämedateralised osad nagu paisutatud savi või kruus. Ta vajab pidevat veevarustust, mistõttu tuleks vältida alustassis oleva jääkvee ummistumist. Aprillist oktoobrini on soovitatav regulaarselt väetada vannitaimede väetisega iga 10 päeva järel. Istuta taim ümber iga aasta või kahe järel, kuid vali alati järgmine suurem pott. **Talvel:** Teie tulbipuu ei ole külmakindel ja juurekahjustused võivad tekkida temperatuuril alla 3 °C. Parem on valgusküllane ja soe, normaalse toatemperatuuriga asukoht, sest alates kolmandast aastast on õisi oodata juba aasta esimestel kuudel. Vältige aga asukohta küttesüsteemi läheduses.



Afrikkalainen tulppaanipuu

Spathodea campanulata

Viikkojen ajan jokaisesta silmusta tuli aina uusia kukkia

Ikivihreä afrikkalainen tulppaanipuu on helppo kasvattaa ja ylläpitää jopa kahden metrin korkuisena konttikasvina. Muutaman vuoden kuluttua kukinnot ulkonevat sen katosta, jossa on tummanvihreitä höyhenlehtiä pitkällä varreilla. Spathodea campanulatan upeat kukatavautuvat räjähdysmäisesti, niin että jokainen kukka vaihtuu uudestaan ja uudestaan viikkojen aikana. Uloin kukkaympyrä avautuu ensin ja näyttää oranssista punaiseen värilliset lehdet aaltoilevilla ja keltaisilla reunoilla. Kahden päivän välein reunakukat kuihtuvat ja seuraava silmurivi seuraa perässä. Kukinta kestää viikkoja. Afrikkalaisen tulppaanipuun avautumattomista kukkanupuista vapautuu puristettaessa vesisuihkua, jonka avulla kasvi houkuttelee lepakoita luontaiseen elinympäristöönsä pölyttämään sitä. **Luonnollinen sijainti:** Spathodea campanulatan luonnollinen levinneisyysalue on Afrikan Atlantin rannikolla Ghanasta Angolaan ja sieltä Sudaniin ja Ugandaan. Sillä välin se on kuitenkin myös suosittu koristekasvi Afrikan ulkopuolella ja on levinnyt Etelä-Amerikkaan. **Onnistunut viljely:** Kasvatus siemenistä sisätiloissa on mahdollista ympäri vuoden. Kevyet siemenet eivät vaadi esikäsittelyä ja ne voidaan levittää suoraan kostealle kasvumaalle ja vain kevyesti peitettynä kasvualustalla. Venytä elintarvikekalvo viljelyastian päälle ja pistele kalvoon muutamia reikiä. Tämä suojaaa maaperää kuivumiselta. Poista folio 2 tunnin ajaksi kahden tai kolmen päivän välein. Tämä estää homeen muodostumisen kasvumaahan. Aseta siemenruukku valoisaa ja lämpimään paikkaan, jonka lämpötila on 20–25 °C, ja pidä istutusmaa kosteana, mutta ei märkänä. Itäminen tapahtuu yleensä kahden tai kolmen viikon kuluttua. **Paras sijainti:** Lämpöä tarvitsevana tropiikin lapsena afrikkalainen tulppaanipuu arvostaa valoisaa ja aurinkoista paikkaa. Kesällä voit tietysti saada myös suojaan auringonottoaikan parvekkeelle tai puutarhaan. **Optimaalinen hoito:** Tulppaanipuu rakastaa ravinnerikasta ja läpäisevää maaperää, jossa on karkearakeisia osia, kuten paisutettua savea tai soraa. Hän tarvitsee jatkuvan vedensyötön, jolloin lautasessa olevan jäännösveden kastumista tulee välttää. Huhtikuusta lokakuuhun suositellaan säännöllistä lannoitusta kylpykasvien lannoitteella 10 päivän välein. Istuta kasvi uudelleen vuoden tai kahden välein, mutta valitse aina seuraava suurempi ruukku. **Talvella:** Tulppaanipuusi ei ole pakkasenkestävä ja juuret voivat vaurioitua alle 3 celsiustasteen lämpötiloissa. Valoisa ja lämmin sijainti normaalilla huonelämpötilalla on parempi, koska kukkia voidaan odottaa jo vuoden ensimmäisinä kuukausina kolmannelta vuodelta alkaen. Vältä kuitenkin sijaintia lämmitysjärjestelmän lähellä.



Tulipier du Gabon

Spathodea campanulata

De nouvelles fleurs de chaque bourgeon pendant quelques semaines

Le tulipier du Gabon sempervirent croît bien dans un pot et atteint une hauteur maximale de deux mètres. Les fleurs apparaissent après quelques années sur de longues tiges qui se trouvent sur sa canopée de feuilles vert foncé. Les fleurs spectaculaires du tulipier du Gabon s'ouvrent par poussées pour que chaque floraison est différente pendant quelques semaines. Le cercle de fleurs la plus externe s'ouvre en premier et montre ses feuilles oranges à rouges qui sont ondulées et jaunes au bord. Tous les deux jours suivants, les fleurs flétrissent et le prochain rang de bourgeons apparaissent. L'inflorescence continue comme ça pendant quelques semaines. Les bourgeons fermés du tulipier du Gabon émettent un jet d'eau sous pression pour attirer les chauves-souris dans son habitation, afin qu'elles les pollinisent. **Emplacement naturel:** L'aire de répartition naturelle du tulipier du Gabon se situe sur la côte atlantique africaine de Ghana à Angola et de là jusqu'au Soudan et à l'Ouganda. Il est désormais une plante aimée en dehors d'Afrique et s'est répandue en Amérique du Sud. **Culture réussie:** La culture des graines à la maison est possible tout au long de l'année. Les graines légères n'ont besoin d'aucun traitement préliminaire et peuvent être mises directement dans du terreau humide et légèrement recouvertes par le substrat. Couvrez le récipient avec une feuille transparente dans laquelle vous faites des trous. Comme ça, le terreau est protégé du dessèchement. Vous devez enlever la feuille pendant deux heures tous les deux ou trois jours. Ceci prévient la formation de moisissures dans le terreau. Mettez le récipient dans un endroit lumineux et chaud de 20° à 25° Celsius et gardez le terreau humide, mais pas mouillé. Normalement, la germination a lieu après deux à trois semaines. **Le meilleur emplacement:** Comme le tulipier du Gabon est un arbre tropical qui a besoin de chaleur, il doit être dans un endroit lumineux et ensoleillé. En été, vous pouvez bien sûr le mettre dans un endroit au soleil sur le balcon ou dans le jardin. **Soins optimaux:** Le tulipier aime les terres perméables et riches en nutriments avec des éléments grossiers, comme l'argile expansée ou le gravier. Il a besoin d'une alimentation constante en eau, tout en évitant l'eau stagnante par l'eau résiduelle dans la soucoupe. Il est conseillé d'engraisser la plante tous les dix jours d'avril à octobre avec de l'engrais pour plantes en pot. Rempotez la plante tous les un à deux ans, mais choisissez toujours la taille supérieure. **En hiver:** Votre tulipier n'est résistant au gel et les températures en-dessous de 3° Celsius peuvent endommager les racines. Il est préférable de le mettre dans un emplacement lumineux et chaud à température ambiante, car les fleurs apparaissent déjà à partir des premiers mois de la troisième année. Par contre, évitez un emplacement près du chauffage.



Αφρικανική τουλίπα

Spathodea campanulata

Για εβδομάδες υπήρχαν πάντα νέα λουλούδια από κάθε μπουμπούκι

Το αειθαλές αφρικανικό δέντρο τουλίπας είναι εύκολο να αναπτυχθεί και να διατηρηθεί ως φυτό δοχείου με ύψος έως και δύο μέτρα. Μετά από μερικά χρόνια, οι ταξιανθίες προσέχουν από τον θάλο του με σκούρα πράσινα φτερωτά φύλλα σε μακριά κοτσάνια. Τα εντυπωσιακά λουλούδια του Spathodea campanulata ανοίγει σε εκρήξεις, έτσι ώστε κάθε λουλούδι να αλλάξει χρώμα και χανά κατά τη διάρκεια των εβδομάδων. Ο εξωτερικός κύκλος των λουλουδιών ανοίγει πρώτος και δείχνει τα πορτοκαλί έως κόκκινα φύλλα του με κυματιστές και κίτρινες άκρες. Μετά από κάθε δύο μέρες, τα περιθωριακά άνθη μαραίνονται και ακολουθεί η επόμενη σειρά μπουμπούκων. Η ανθοφορία διαρκεί για εβδομάδες. Οι μπουμπούκια ανέχονται τον ξηρό κλίμα των αφρικανικών τουλίπας που δεν έχουν ανοιχτεί εκτέμνουν έναν πίδακα νερού όταν συμπιέζονται, τον οποίο το φυτό χρησιμοποιεί για να προσελκύσει νυχτερίδες στον γεινική βιότοπο του για να το επικονιάσει. **Φυσική τοποθεσία:** Η φυσική περιοχή του Spathodea campanulata βρίσκεται στις ακτές του Αφρικανικού Ατλαντικού από την Γκάνα έως την Αγκόλα και από εκεί στο Σουδάν και την Ουγκάντα. Στο μεταξύ, όμως, είναι επίσης ένα δημοφιλές καλλωπιστικό φυτό εκτός Αφρικής και έχει εξαπλωθεί στη Νότια Αμερική. **Επιτυχημένη καλλιέργεια:** Η καλλιέργεια σε εσωτερικούς χώρους είναι δυνατή όλο το χρόνο. Οι ελαφροί σπόροι δεν απαιτούν καμία προεπεξεργασία και μπορούν να απλωθούν απευθείας σε υγρό έδαφος ανάπτυξης και να καλυφθούν μόνο ελαφρά με το καλλιεργητικό μέσο. Τεντώστε μεμβράνη πάνω από το δοχείο καλλιέργειας και ανοίξτε μερικές τρύπες στη μεμβράνη. Αυτό προστατεύει το έδαφος από το στέγνωμα. Θα πρέπει να αφαιρεθεί το αλουμινοχαρτό για 2 ώρες κάθε δύο έως τρεις ημέρες. Αυτό αποτρέπει τη δημιουργία μούχλας στο αναπτυσσόμενο έδαφος. Τοποθετήστε τη γλάστρα σε ένα ελαφρύ και ζεστό μέρος με θερμοκρασία 20 έως 25° Κελσίου και διατηρήστε το χώμα της γλάστρας υγρό αλλά όχι υγρό. Η βλάστηση εμφανίζεται συνήθως μετά από δύο έως τρεις εβδομάδες. **Η καλύτερη τοποθεσία:** Ως παιδί των τροπικών περιοχών που χρειάζεται ζεστασιά, η αφρικανική τουλίπα εκτιμά ένα φωτεινό και ηλιόλουστο μέρος. Το καλοκαίρι, μπορείτε φυσικά να έχετε και ένα προστατευμένο σημείο ηλιοθεραπείας στο μπαλκόνι ή στον κήπο. **Βέλτιστη φροντίδα:** Το δέντρο της τουλίπας αγαπά το πλούσιο σε θρεπτικά συστατικά και διαπερατό έδαφος με χονδρόκοκκα μέρη όπως ο διογκωμένος άργιλος ή το χαλίκι. Χρειάζεται μια συνεχή παροχή νερού, οπότε θα πρέπει να αποφεύγεται η υπερχείλιση μέσω του υπολειπόμενου νερού στο πατάκι. Από τον Απρίλιο έως τον Οκτώβριο, συνιστάται η τακτική λίπανση με λίπασμα φυτών μπιανέρας κάθε 10 ημέρες. Επανατοποθετείτε το φυτό κάθε ή δύο χρόνια, αλλά πάντα επιλέγεται την επόμενη μεγαλύτερη γλάστρα. **Το χειμώνα:** Το δέντρο της τουλίπας δεν είναι ανθεκτικό στον παγετό και μπορεί να προκληθεί ζημιά στις ρίζες σε θερμοκρασίες κάτω των 3° Κελσίου. Μια φωτεινή και ζεστή τοποθεσία με κανονική θερμοκρασία δωματίου είναι καλύτερη, αφού τα λουλούδια μπορούν ήδη να αναμένονται τους πρώτους μήνες του έτους από το τρίτο έτος. Ωστόσο, αποφεύγετε μια τοποθεσία κοντά σε σύστημα θέρμανσης.



Crann tiúilíipí hAfraice

Spathodea campanulata

Ar feadh seachtainí bhí bláthanna nua ó gach bachlóg i gcónaí

Is furasta an Crann tiúilíipí Afraiceach síorghlas a fhás agus a chothabháil mar phlanda coimeádán le airde suas le dhá mhéadar. Tar éis cúpla bliain, tagann na inflorescences as a cheannbhrat de dhuilleoga dorcha glasa cleiteacha ar gheasaí fada. Bláthanna iontach a Spathodea campanulataoscailte i bpléascanna, ionas go n-athraíonn gach bláth arís agus arís eile thar thréimhe seachtainí. Osclaíonn an ciorcal bláthanna is forimeallaí ar dtús agus taispeánann sé a dhuilleoga daite ó oráiste go dearg le himill daite wavy agus buí. Tar éis gach dhá lá, feannadh na bláthanna imeallacha agus leanann an chéad sraith eile de bachlóga. Maireann an bláthanna ar feadh seachtainí. Scaoileann bachlóga bláthanna neamhoscailte an chrainn tiúilíipí Afracach scaird uisce nuair a bhrúitear é, a úsáideann an planda chun ialtoga a mhealladh ina ghnáthóg dhúchais chun é a phailniú. **Suíomh nádúrtha:** Tá raon nádúrtha Spathodea campanulata ar chósta Atlantach na hAfraice ó Gána go Angóla agus as sin go dtí an tSúdáin agus Uganda. Idir an dá linn, áfach, is planda ornáideach coitianta é lasmuigh den Afraic agus tá sé scaipthe go Meiriceá Theas. **Saothrú rathúil:** Is féidir fás ó shíolta taobh istigh ar feadh na bliana. Ní éilíonn na síolta éadroma aon réamhchóireáil agus is féidir iad a scaipeadh go díreach ar ithir tais atá ag fás agus gan ach clúdaithe go héadrom leis an meán fáis. Sin an scannán cumhdaithe thar an soitheach cultúir agus cuir cúpla poll sa scannán. Cosnaíonn sé seo an ithir ó thriomú amach. Ba chóir duit an scragall a bhaint ar feadh 2 uair gach dhá nó trí lá. Cuireann sé seo cosc ar mhúlna a fhoirmiú ar an ithir atá ag fás. Cuir an pota síolta in áit éadrom te ag 20 go 25 ° Celsius agus coinnigh an ithir potaithe tais ach ní fliuch. Tarlaíonn péacadh de ghnáth tar éis dhá nó trí seachtaine. **An suíomh is fearr:** Mar leanbh de na trópaic a dteastaíonn teas uathu, tá meas ag crann tiúilíipí na hAfraice ar áit gheal agus ghrianmhar. Sa samhradh, is féidir leat, ar ndóigh, áit dhídeanach grianghortha a bheith agat ar an mbalcóin nó sa ghairdín. **Cúram is fearr is féidir:** Is breá leis an gcrann tiúilíipí ithir tréscailteach agus cothaitheach le codanna garbh-ghráin mar chré leathnaithe nó gairbhéal. Teastaíonn soláthar leanúnach uisce uaidh, agus mar sin ba cheart uisce dhroim trí uisce iarmharach sa shár a sheachaint. Ó Aibreán go Deireadh Fómhair, moltar toirchiú rialta le leasachán plandaí tub gach 10 lá. Déan an gléasra a athchur gach bliain nó dhó, ach roghnaigh an chéad phota eile níos mó i gcónaí. **Sa gheimhreadh:** Níl do chrann tiúilípe-resistant sioc agus is féidir damáiste fréamhacha tarlú ag teocht faoi bhun 3 ° Celsius. Is fearr suíomh geal agus te le gnáth-theocht an tseomra, mar is féidir a bheith ag súil le bláthanna cheana féin sna chéad mhí den bhliain ón tríú bliain. Mar sin féin, suíomh in aice le córas teasa a sheachaint.



Afrískt túlpanatré

Spathodea campanulata

I margar vikur voru alltaf ný blóm úr hverjum brum

Sígræna afríska túlpanatréð er auðvelt að rækta og viðhalda sem gámaplöntu sem er allt að tveggja metra hæð. Eftir nokkur ár standa blómblöðin út úr tjaldhimninum af dökkgrænum fjadruðum laufum á löngum stönglum. Stórbrotin blóm Spathodea campanulataopnast í stökkum, þannig að hvert blóm breytist aftur og aftur á vikum. Ysti hringur blómanna opnast fyrst og sýnir appelsínugul til rauð blöð með bylgjuðum og gulum brúnum. Eftir tveggja daga fresti visna jafarblómin og næsta röð af brum kemur á eftir. Blómstrandi stendur í margar vikur. Öppnaðir blómknappar afríska túlpanatrésins gefa frá sér vatnsstrauma þegar þeir eru kreistir, sem plöntan notar til að laða að leðurblökur í heimabyggð sinni til að fræva hana. **Náttúruleg staðsetning:** Náttúrulegt útbreiðslusvæði Spathodea campanulata er á Atlantshafsströnd Afríku frá Gána til Angóla og þaðan til Súdan og Úganda. Í millitiðinni er hún hins vegar einnig vinsæl skrautplanta utan Afríku og hefur breiðst út til Suður-Ameríku. **Árangursrík ræktun:** Ræktun úr fræjum innandyrá er mögulegt allt árið um kring. Léttu fræin krefjast engar formeðferðar og má dreifa þeim beint á rakan vaxtarjarð og aðeins hylja þau með vaxtarmiðlinum. Teygðu matarfilmu yfir ræktunarlátið og stingdu nokkrum göt á filmuna. Þetta verndar jarðveginn gegn þurrkun. Þú ættir að fjarlægja álpappírinn í 2 klukkustundir á tveggja til þriggja daga fresti. Þetta kemur í veg fyrir að mygla myndist á vaxandi jarðvegi. Settu fræpottinn á léttan og heitan stað með 20 til 25 ° Celsius og haltu pottajarðveginum rökum en ekki blautum. Spírun á sér venjulega stað eftir tvær til þrjár vikur. **Besta staðsetningin:** Sem barn hitabeltisins sem þarfnast hlýju, kann afríska túlpanatréð að meta bjartan og sólríkan stað. Á sumrin er auðvitað líka hægt að hafa skjólgoðan sólbaðsstað á svölum eða í garðinum. **Besta umönnun:** Túlpanatréð elskar næringarríkan og gegndræpan jarðveg með grófkorna hlutum eins og stækkuðum leir eða mól. Hann þarf stöðuga vatnsveitu, þannig að forðast ætti vatnslosun í gegnum afgangsvatn í undirskálinni. Frá apríl til október er mælt með reglulegri frjógvun með pottaplöntuáburði á 10 daga fresti. Endurpottaðu plöntuna annað hvort ár, en veldu alltaf næsta stærri pott. **Á veturna:** Túlpanatréð þitt er ekki frostþolið og rótskemmdir geta orðið við hitastig undir 3 ° á Celsius. Björt og hlý staðsetning með venjulegum stofuhita er betri, þar sem þegar má búast við blómum á fyrstu mánuðum ársins frá þriðja ári. Forðastu þó staðsetningu nálægt hitakerfi.



Albero dei tulipani

Spathodea campanulata

Per settimane fiori sempre nuovi da ogni bocciolo

L'albero dei tulipani sempreverde si lascia ben coltivare in vaso e può raggiungere un'altezza fino a due metri. Dopo alcuni anni di età, dal suo tetto di foglie composte color verde scuro le infiorescenze pendono da lunghi piccioli. Gli spettacolari fiori della Spathodea campanulata si aprono a ondate, così che ogni fiore si trasforma nel corso di settimane. Per prima cosa si apre la corolla, mostrando i petali di colore rosso-arancio vivo, con i margini increspatis e gialli. Dopo circa due giorni appassiscono i fiori marginali e si aggiungono i boccioli successivi. In questo modo la fioritura dura per settimane. I boccioli non dischiudono l'albero dei tulipani contengono del liquido che può schizzare fuori se pressati, in questo modo la pianta nel suo habitat attira i pipistrelli per l'impollinazione. **Posizione naturale:** L'habitat naturale della Spathodea campanulata si trova sulle coste atlantiche africane dal Ghana all'Angola e poi dal Sudan all'Uganda. In seguito si è diffusa anche fuori dall'Africa come pianta ornamentale molto apprezzata, arrivando fino al Sudamerica. **Coltivazione riuscita:** La coltivazione da semi in casa è possibile durante tutto l'anno. I semi leggeri non necessitano di alcun trattamento prima di essere messi a dimora, possono essere direttamente collocati sulla terra di coltivo umida e coperti solo leggermente con il substrato. Coprite il recipiente di coltivazione con pellicola trasparente, sulla quale praticherete dei fori, in questo modo la terra eviterà di seccarsi. Ogni due o tre giorni rimuovete la pellicola per 2 ore, per prevenire la formazione di muffe sulla terra. Collocate il recipiente di coltivazione in un luogo luminoso e caldo, a una temperatura fra i 20° e i 25°C e mantenete la terra umida, ma non bagnata. La germinazione avverrà probabilmente da due a tre settimane dopo. **La posizione migliore:** Come specie tropicale che ha bisogno di calore, l'albero dei tulipani predilige un luogo ricco di luce e soleggiato. In estate è possibile naturalmente collocarla sul balcone o in giardino, in un punto esposto al sole e al riparo dal vento. **Cura ottimale:** L'albero del tulipano necessita di un terreno traspirante e ricco di sostanze nutritive, con componenti a grana grossa come l'argilla espansa o la ghiaia. Ha bisogno di un'irrigazione costante, evitando sempre il ristagno idrico mediante l'acqua rimanente nel sottovaso. Da aprile a ottobre si consiglia di concimare regolarmente ogni 10 giorni con fertilizzante per piante da vaso. Trapiantate la pianta ogni due o tre anni, scegliendo un vaso che sia di volta in volta solo un po' più grande. **In inverno:** Il vostro albero del tulipano non è resistente al gelo e, se esposto a temperature sotto i 3° C può subire danni alle radici. E' preferibile scegliere un luogo luminoso e caldo a temperatura ambiente, poiché a partire dal terzo anno, nei primi mesi dell'anno compariranno i fiori. Evitate però un luogo vicino a fonti di riscaldamento.



Afričko drvo tulipana

Spathodea campanulata

Tjednima je uvijek bilo novih cvjetova iz svakog pupoljka

Zimzeleno afričko drvo tulipana lako je uzgajati i održavati kao kontejnersku biljku visine do dva metra. Nakon nekoliko godina iz njegove krošnje tamnozelenih perastih listova na dugim peteljka vire cvatovi. Spektakularni cvjetovi Spathodea campanulataotvorene u naletima, tako da se svaki cvijet mijenja iznova i iznova tijekom tjedana. Krajnji krug cvjetova otvara se prvi i pokazuje svoje narančaste do crvene listove s valovitim i žuto obojenim rubovima. Nakon svaka dva dana, rubni cvjetovi uvenu i slijedi sljedeći red pupova. Cvatnja traje tjednima. Neotvoreni cvjetni pupoljci afričkog tulipana ispuštaju mlaz vode kada se stisnu, što biljka koristi da privuče šišmiše u svoje izvorno stanište da je opraš. **Zemlja porijekla:** Prirodno područje rasprostranjenja Spathodea campanulata je na afričkoj atlantskoj obali od Gane do Angole i odatle do Sudana i Ugande. Međutim, u međuvremenu je također popularna ukrasna biljka izvan Afrike te se proširila u Južnu Ameriku. **Uspješan uzgoj:** Uzgoj iz sjemena u zatvorenom prostoru moguć je tijekom cijele godine. Lagano sjeme ne zahtijeva nikakvu prethodnu obradu i može se posipati izravno na vlažno tlo za uzgoj i samo lagano prekriti supstratom. Razvucite prozirnu foliju preko posude s kulturom i probušite nekoliko rupa u foliji. To štiti tlo od isušivanja. Svaka dva do tri dana skinite foliju na 2 sata. Time se sprječava stvaranje plijesni na tlu za uzgoj. Stavite posudu za sjeme na svijetlo i toplo mjesto s 20 do 25° Celzija i održavajte tlo za saksije vlažnim, ali ne mokrim. Kljanje obično nastupa nakon dva do tri tjedna. **Najbolja lokacija:** Kao dijete tropskih krajeva kojem je potrebna toplina, afrički tulipanovo drvo cijeni svijetlo i sunčano mjesto. Ljeti, naravno, možete imati i zaštićeno mjesto za sunčanje na balkonu ili u vrtu. **Optimalna njega:** Drvo tulipana voli hranjivo bogato i propusno tlo s krupnozrnatim dijelovima poput ekspanzirane gline ili šljunka. Potrebna mu je stalna opskrba vodom, pri čemu treba izbjegavati nakupljanje vode zbog zaostale vode u tanjuriću. Od travnja do listopada preporučuje se redovita gnojidba gnojivom za kade svakih 10 dana. Presadite biljku svake godine ili dvije, ali uvijek odaberite sljedeću veću posudu. **U zimi:** Vaše stablo tulipana nije otporno na mraz i može doći do oštećenja korijena na temperaturama nižim od 3°C. Bolje je svijetlo i toplo mjesto s normalnom sobnom temperaturom, budući da se cvjetovi mogu očekivati već u prvim mjesecima godine od treće godine. Međutim, izbjegavajte mjesto blizu sustava grijanja.



Āfrikas tulpju koks

Spathodea campanulata

Nedēļām no katra pumpura vienmēr bija jauni ziedi

Mūžzaļo Āfrikas tulpju koku ir viegli audzēt un uzturēt kā konteineraugu ar augstumu līdz diviem metriem. Pēc dažiem gadiem ziedkopas izvirzās no tās tumši zaļo spalvu lapu vainaga uz gariem kātiem. Iespaidīgās Spathodea campanulata ziediatveras, lai katrs zieds nedēļu laikā mainītos atkal un atkal. Vistālākais ziedu aplis atveras pirmās un pārda oranžas līdz sarkanās krāsas lapas ar viļņotām un dzeltenām malām. Ik pēc divām dienām malējie ziedi nokalst un seko nākamā pumpuru rinda. Ziedēšana ilgst nedēļas. Āfrikas tulpju koka neatvērtie ziedu pumpuri, tos saspiežot, izdala ūdens strūklu, ko augs izmanto, lai savā dzimtajā dzīvotnē piesaistītu sikspārņus, lai to apputeksnetu. **Dabiska vieta:** Spathodea campanulata dabiskais areāls atrodas Āfrikas Atlantijas okeāna piekrastē no Ganas līdz Angolai un no turienes līdz Sudānai un Ugandai. Tomēr tikmēr tas ir arī populārs dekoratīvs augs ārpus Āfrikas un ir izplatījies Dienvidamerikā. **Veiksmīga audzēšana:** Audzēšana no sēklām telpās ir iespējama visu gadu. Viegļajām sēklām nav nepieciešama iepriekšēja apstrāde, un tās var izkaisīt tieši uz mitras augšanas augsnes un tikai nelielu daudzumu pārklāt ar augšanas vidi. Izstiepiet pārtikas plēvi virs kultivēšanas trauka un ieduriet plēvē dažus caurumus. Tas pasargā augsni no izžūšanas. Jums vajadzētu nopemt foliju 2 stundas ik pēc divām līdz trim dienām. Tas novērš pelējuma veidošanos augošajā augsnē. Novietojiet sēklu podu gaišā un siltā vietā ar temperatūru 20 līdz 25 °C un turiet augsni mitru, bet ne mitru. Digšana parasti notiek pēc divām līdz trim nedēļām. **Labākā atrašanās vieta:** Kā tropu bērns, kam vajadzīgs siltums, Āfrikas tulpju koks novērtē gaišu un saulainu vietu. Vasarā, protams, var būt arī nojumta saulsaules vieta uz balkona vai dārzā. **Optimāla aprūpe:** Tulpju kokam patīk barības vielām bagātā un caurlaidīgā augsne ar rupjgraudainām daļām, piemēram, keramzītu vai granti. Viņam ir nepieciešama pastāvīga ūdens padeve, tādējādi ir jāizvairās no ūdens aizsērēšanas, jo apakšstiebt paliek ūdens. No aprīļa līdz oktobrim ieteicams regulāri mēslot ar vannu augu mēslojumu ik pēc 10 dienām. Pārstādiet augu reizi divos gados, bet vienmēr izvēlieties nākamo lielāko podu. **Ziemā:** Jūsu tulpju koks nav salizturīgs, un sakņu bojājumi var rasties temperatūrā, kas zemāka par 3°C. Labāka ir gaiša un silta vieta ar normālu istabas temperatūru, jo ziedus var sagaidīt jau gada pirmajos mēnešos no trešā gada. Tomēr izvairieties no atrašanās vietas apkures sistēmas tuvumā.



Afrikos tulpiju medis

Spathodea campanulata

Ištīsa savaites nuo kiekvieno pumpuro visada buvo naujų gėlių

Visžalī Āfrikos tulpiju medī lengva auginti ir prižiūrēti kaip konteinerinį augalą, kurio aukštis iki dviejų metrų. Po kelerių metų žiedynai išsikiša iš jo tamsiai žalių plunksnuotų lapų vainiko ant ilgų stiebelių. Įspūdingos Spathodea campanulata gėlėsatsidaro pliusniais, kad kiekviena gelė per kelias savaites vėl ir vėl keistųsi. Pirmiausia atsidaro atokiausias žiedų ratas ir rodomi nuo oranžinės iki raudonos spalvos lapai banguotais ir geltonais kraštais. Kas dvi dienas kraštiniai žiedai nuvyta ir seka kita pumpurų eilė. Žydėjimas trunka savaites. Neatsiskleidę afrikinio tulpmedžio žiedpumpuriai, juos suspaudę, išskiria vandens srovę, kurią augalas naudoja priviliodamas šikšnosparnius savo gimtojoje buveinėje, kad jį apdulintų. **Natūrali vieta:** Natūralus Spathodea campanulata arealas yra Afrikos Atlanto vandenyno pakrantėje nuo Ganos iki Angolos ir iš ten iki Sudano ir Ugandos. Tačiau tuo tarpu tai taip pat populiarus dekoratyvinis augalas už Afrikos ribų ir paplito Pietų Amerikoje. **Sėkmingas auginimas:** Auginti iš sėklų patalpose galima ištīsa metus. Šviesios sėklos nereikalauja jokio išankstinio apdorojimo ir gali būti išbarstytos tiesiai ant drėgnos auginimo dirvos ir tik šiek tiek padengtos auginimo terpe. Ant kultivavimo indo užtieskite maistinę plėvelę ir įdarykite kelias skylutes. Tai apsaugo dirvą nuo išdžiūvimo. Kas dvi ar tris dienas 2 valandas nuimkite foliją. Tai neleidžia augančioje dirvoje susidaryti pelėsiui. Sėklų vazoną pastatykite šviesioje ir šiltoje vietoje, kurios temperatūra yra 20–25 °C, o vazono žemė turi būti drėgna, bet ne šlapia. Paprastai sudygsa po dviejų ar trijų savaičių. **Geriausia vieta:** Kaip tropikų vaikas, kuriam reikia šilumos, afrikinis tulpmedis vertina šviesią ir saulėtą vietą. Vasarą, žinoma, balkone ar sode galite turėti ir augsugotą saulės vonią. **Optimali priežiūra:** Tulpmedis mėgsta maistinių medžiagų turtingą ir laidžią dirvą su stambiagrūdėmis dalimis, tokiomis kaip keramzitas ar žvyras. Jam reikalingas nuolatinis vandens tiekimas, todėl reikia vengti vandens užmirkimo per lėkštėje likusį vandenį. Nuo balandžio iki spalio rekomenduojama reguliariai tręšti kubilinių augalų trąšomis kas 10 dienų. Persodinkite augalą kas metus ar dvejus, bet visada rinkitės kitą didesnį vazoną. **Ziemą:** Jūsų tulpmedis nėra atsparus šalčiui, o šaknys gali būti pažeistos esant žemesnei nei 3 °C temperatūrai. Šviesi ir šilta vieta su normalia kambario temperatūra yra geresnė, nes gėlių jau galima tikėtis pirmaisiais metų mėnesiais nuo trečiųjų metų. Tačiau venkite vietos šalia šildymo sistemos.



Sigra tat-tulipani Afrikani

Spathodea campanulata

Għal ġimghat dejjem kien hemm fjuri ġodda minn kull bud

Is-Sigra tat-Tulippi Afrikani Evergreen hija faċli biex tikber u tinzamm bħala pjanta tal-kontenitur b'għoli sa żewġ metri. Wara ftit snin, il-fjoritur tal-fjuri johorġu mill-kanupew tiegħu ta' weraq tar-rix aħdar skur fuq żuk w'al. Il-fjuri spettakolari tal-Spathodea campanulatamiftuħa f'tifqigh, sabiex kull fjura tinbidel għal darb'ohra u għal darb'ohra matul il-ġimghat. Iċ-ċirku ta' barra tal-fjuri jinfetħa l-ewwel u juri l-weraq ta' kulur oranġjo għal aħmar bi truf imwewġin u isfar. Wara kull jumejn, il-fjuri marginali jinfexxu u ssewgi r-riġiela ta' blanzuni li jmiss. Il-fjoritura ddum ġimghat. Il-blanzuni tal-fjuri mħux miftuħa tas-sigra tat-tulipani Afrikani jarmu ġett ta' ilma meta jingħafsu, li l-impjant juża biex jattira friefet il-lejl fl-abitat nattiv tiegħu biex jippollinawh. **Post naturali:** Il-firxa naturali ta' Spathodea campanulata tinsab fuq il-kosta Atlantika Afrikana mill-Gana sal-Angola u minn hemm lejn is-Sudan u l-Uganda. Sadanittant, madankollu, hija wkoll pjanta ornamentali popolari barra mill-Afrika u nfixxet fl-Amerika t'Isfel. **Kultivazzjoni b'suċċess:** It-tkabbir miż-żrieragħ ġewwa huwa possibbli s-sena kollha. Iż-żrieragħ ħfief ma jeħtieġu ebda trattament minn qabel u jistgħu jinfirxu direttament fuq ħamrija niedja li qed tikber u mghottija biss ħafif bil-mezz tat-tkabbir. Stretch cling film fuq il-bastiment tal-kultura u poke ftit toqob fil-film. Dan jipproteġi l-ħamrija milli tinxf. Għandek tneħħi l-fojl għal sagħtejn kull jumejn jew tlett ijiem. Dan jipprevjeni l-iffurmar tal-moffa fuq il-ħamrija li qed tikber. Poġġi l-borma taż-żerriegħa f'post ħafif u shun b'20 sa 25 ° Celsius u zomm il-ħamrija tal-qasri niedja iżda mħux imxarrba. Germinazzjoni generalment isseħħ wara ġimghatejn sa tliet ġimghat. **L-aħjar post:** Bħala wild tat-tropiċi li teħtieġ shana, is-sigra tat-tulipani Afrikani tapprezza post qawwi u xemxi. Fis-sajf, tista' u, ovvjament, ikollok ukoll post protett għat-tixmix fuq il-gallarija jew fil-ġnien. **Kura ottimali:** Is-sigra tat-tulipani thobb ħamrija b'ħafna nutrjenti u permeabbli b'partijiet ta' qamħ oħxon bħal tafal estiż jew żrar. Huwa jeħtieġ provvista ta' ilma kostanti, li biha l-ilma permezz ta' ilma residwu fil-saucer għandu jġi evitat. Minn April sa Ottubru, hija rakkomandata fertilizzazzjoni regolari b'fertilizzant tal-pjanti tat-tub kull 10 ijiem. Repot l-impjant kull sena jew tnejn, imma dejjem aghzel il-borma akbar li jmiss. **Fix-xitwa:** Is-sigra tat-tulipani tiegħek mħix rezistenti għall-ġlata u l-hsara fl-għerqu tista' sseħħ f'temperaturi taħt it-3° Celsius. Post qawwi u shun b'temperatura normali tal-kamra huwa aħjar, peress li l-fjuri diġà jistgħu jkun mistennja fl-ewwel xhur tas-sena mit-tliet sena. Madankollu, evita post hdejn sistema ta' tishin.



Afrikaanse Tulpenboom

Spathodea campanulata

Nieuwe bloemen van elke knop, keer op keer

De groenblijvende Afrikaanse tulpenboom kan goed worden gekweekt en gehouden als kuipplant met een hoogte van maximaal twee meter. Na een paar jaar steken de bloeiwijzen aan lange stelen uit het bladerdak van donkergroene geveerde bladeren. De spectaculaire bloemen van de Spathodea campanulata gaan in uitbarstingen open, zodat elke bloem gedurende een periode van weken keer op keer verandert. Allereerst gaat de buitenste bloemencirkel open en toont de oranje tot rood gekleurde bladeren met golvende en geel gekleurde randen. De marginale bloemen verwelken na twee dagen en de volgende rij knoppen volgt. De bloei duurt weken. De ongeopende bloemknoppen van de Afrikaanse tulpenboom stoten onder druk een waterstraal uit en de plant trekt in zijn thuisland vleermuizen aan om ze te bestuiven. **Natuurlijke locatie:** Het natuurlijke verspreidingsgebied van de Spathodea campanulata ligt aan de Afrikaanse Atlantische kust van Ghana tot Angola en van daaruit naar Soedan en Oeganda. Inmiddels is het ook buiten Afrika een populaire sierplant geworden en heeft het zich verspreid naar Zuid-Amerika. **Succesvolle teelt:** Binnen kweken uit zaden is het hele jaar mogelijk. De lichte zaden hebben geen voorbehandeling nodig en kunnen direct op vochtige potgrond worden gestrooid en slechts licht worden bedekt met het groeisubstraat. Rek vershoudfolie over de kweekbak en prik een paar gaatjes in de folie. Dit beschermt de aarde tegen uitdroging. Om de twee tot drie dagen moet u de film gedurende 2 uur verwijderen. Dit voorkomt schimmelvorming op de teeltgrond. Zet de kweekbak op een lichte en warme plaats met 20 à 25 ° Celsius en houd de kweekgrond vochtig, maar niet nat. Kieming vindt meestal plaats na twee tot drie weken. **De beste locatie:** Als warm tropisch kind waardeert de Afrikaanse tulpenboom een lichte en zonnige plek. In de zomer is een beschutte zonplek natuurlijk ook mogelijk op het balkon of in de tuin. **Optimale verzorging:** De tulpenboom houdt van voedselrijke en doorlatende grond met grofkorrelige delen zoals geëxpandeerde klei of grind. Hij heeft een constante watertoevoer nodig, waarbij wateroverlast door restwater in de schotel moet worden vermeden. Van april tot oktober adviseren wij regelmatig bemesten met tussenpozen van 10 dagen. Verpot de plant eens in de één à twee jaar, maar kies altijd de op één na grootste pot. **In de winter:** Uw tulpenboom is niet vorstbestendig en bij temperaturen onder de 3 ° Celsius kunnen wortels beschadigd raken. Een lichte en warme standplaats met een normale kamertemperatuur is beter, aangezien bloemen kunnen worden verwacht vanaf het derde jaar in de eerste maanden van het jaar. Vermijd echter een locatie in de buurt van de verwarming.



Afrikansk Tulipan Tre Spathodea campanulata

I flere uker var det alltid nye blomster fra hver knopp

Det eviggrønne afrikanske tulipantreet er lett å dyrke og vedlikeholde som en containerplante med en høyde på opptil to meter. Etter noen år stikker blomsterstandene ut av kronetaket av mørkegrønne fjærkleddede blader på lange stilker. De spektakulære blomstene til Spathodea campanulata åpner i stot, slik at hver blomst skifter igjen og igjen i løpet av uker. Den ytterste sirkelen av blomster åpner seg først og viser sine oransje til røde blader med bølgete og gule kanter. Etter annenhver dag visner randblomstene og neste rad med knopper følger. Blomstringen varer i flere uker. De uåpnede blomsterknoppene til det afrikanske tulipantreet avgir en vannstråle når de klemmes, som planten bruker for å tiltrekke flaggermus i sitt opprinnelige habitat for å bestøve den. **Naturlig beliggenhet:** Det naturlige området til Spathodea campanulata er på den afrikanske Atlanterhavskysten fra Ghana til Angola og derfra til Sudan og Uganda. I mellomtiden er den imidlertid også en populær prydplante utenfor Afrika og har spredt seg til Sør-Amerika. **Vellykket dyrking:** Å dyrke fra frø innendørs er mulig hele året. De lette frøene krever ingen forbehandling og kan spres direkte på fuktig vekstjord og kun lett dekket med vekstmediet. Strekk matfilm over kulturkaret og stikk noen hull i filmen. Dette beskytter jorda mot å tørke ut. Du bør fjerne folien i 2 timer annenhver til tredje dag. Dette forhindrer at det dannes mugg på den voksende jorda. Plasser frøpotten på et lett og varmt sted med 20 til 25° Celsius og hold pottejorda fuktig, men ikke våt. Spiring skjer vanligvis etter to til tre uker. **Den beste beliggenheten:** Som et barn av tropene som trenger varme, setter det afrikanske tulipantreet pris på et lyst og solrikt sted. Om sommeren kan du selvfølgelig også ha en lun solplass på balkongen eller i hagen. **Optimal omsorg:** Tulipantreet elsker næringsrik og permeabel jord med grovkornede deler som ekspandert leire eller grus. Han trenger en konstant vannforsyning, slik at vannlogging gjennom gjenværende vann i tallerkenen bør unngås. Fra april til oktober anbefales regelmessig gjødsling med karplantegjødsel hver 10. dag. Potter planten om hvert eller annet år, men velg alltid den neste større potten. **Om vinteren:** Tulipantreet ditt er ikke frostbestandig og rotskader kan oppstå ved temperaturer under 3° Celsius. Et lyst og varmt sted med normal romtemperatur er bedre, siden blomster allerede kan forventes i de første månedene av året fra det tredje året. Unngå imidlertid en plassering i nærheten av et varmesystem.



Afrykański Tulipanowiec Spathodea campanulata

Nowe kwiaty z każdego pąka w kółko

Wечно zielone afrykańskie tulipany dorastają do dwóch metrów i można je z łatwością uprawiać jako rośliny doniczkowe. Po kilku latach osadzone na długich szypułkach kwiatostany wyłaniają się z okapaju ciemnozielonych pierzastych liści. Spektakularne kwiaty Spathodea campanulata otwierają się partiami, więc każdy kwiat zmienia się nieustannie przez kilka tygodni. Początkowo zewnętrzne słoje kwiatowe otwierają się, a liście są pomalowane na pomarańczowo i czerwono, a na krawędziach pojawiają się kręcone żółte liście. Za każdym razem różyczki więdną po dwóch dniach, a następna partia pąków przepycha się do przodu. W ten sposób kwitnienie trwa wiele tygodni. Nieotwarte pąki kwiatowe afrykańskiego tulipanowca wylewają po naciśnięciu fontannę wody i w ten sposób przyciągają w swoim naturalnym środowisku nietoperze jako zapylacze. **Naturalne położenie:** Naturalne siedlisko Spathodea campanulata znajduje się wzdłuż afrykańskiego wybrzeża Atlantyku od Ghany po Angole, a nawet dalej w Sudanie i Ugandzie. Obecnie afrykański tulipanowiec jest również uprawiany jako roślina ozdobna poza Afryką, a nawet można go znaleźć w Ameryce Południowej. **Udana uprawa:** Rozmnażanie nasion w pomieszczeniach jest możliwe przez cały rok. Drobne nasiona afrykańskiego tulipanowca nie wymagają żadnej wstępnej obróbki i można je po prostu rozproszyc na wilgotnym kompoście doniczkowym i przykryć cienką warstwą ziemi kompostowej. Następnie przykryj pojemnik na nasiona przezroczystą folią, aby ziemia nie wyschła, ale nie zapomnij zrobić otworów w przezroczystej folii i zdejmować ją co drugi lub trzeci dzień na około 2 godziny. W ten sposób unikniesz tworzenia się pleśni na kompoście doniczkowym. Umieść pojemnik na nasiona w miejscu jasnym i ciepłym o temperaturze od 20 ° C do 25 ° Celsjusza i utrzymuj ziemię wilgotną, ale nie mokrą. Zazwyczaj kiełkowanie trwa od dwóch do trzech tygodni. **Najlepsza lokalizacja:** Jako roślina tropikalna, afrykański tulipanowiec ceni bardzo jasne i słoneczne miejsce. Latem można go przechowywać w osłoniętym od wiatru słonecznym miejscu na balkonie lub w ogrodzie. **Optymalna pielęgnacja:** Afrykański tulipanowiec preferuje żyzną i przepuszczalną glebę zawierającą sporą część keramzytu lub żwiru. Wymaga stałego i wystarczającego podlewania, ale unikaj zalania podk. Od kwietnia do października zaleca się regularne podawanie nawozu pod rośliny doniczkowe, co około 10 dni. Roślinę należy przesunąć co dwa do trzech lat do kolejnej, większej doniczki. **W zimę:** Afrykański tulipanowiec nie jest odporny na mróz, a jego korzenie ulegną uszkodzeniu, gdy będzie przechowywany w temperaturze poniżej 3 ° Celsjusza. Zimą najlepiej trzymać roślinę w jasnym i ciepłym miejscu w temperaturze pokojowej, ale unikaj umieszczania jej obok grzejnika. Od trzeciego roku drzewo zakwitnie już w pierwszych miesiącach roku.



Tulipa Africana Spathodea campanulata

Durante semanas sempre houve novas flores de cada botão

A perene Tulipa Africana é fácil de cultivar e manter como uma planta de contêiner com uma altura de até dois metros. Depois de alguns anos, as inflorescências se projetam de seu dossel de folhas verde-escuras emplumadas em longos caules. As espetaculares flores da Spathodea campanulata abrem em rajadas, de modo que cada flor mude repetidamente ao longo das semanas. O círculo externo de flores abre primeiro e mostra suas folhas de cor laranja a vermelha com bordas onduladas e amarelas. A cada dois dias, as flores marginais murcham e a próxima fileira de botões segue. A floração dura semanas. Os botões de flores fechados da tulipeira africana emitem um jato de água quando espremidos, que a planta usa para atrair morcegos em seu habitat nativo para polinizá-lo. **Localização natural:** A distribuição natural de Spathodea campanulata situa-se na costa atlântica africana, desde o Gana até Angola e daí até ao Sudão e ao Uganda. Nesse interim, no entanto, também é uma planta ornamental popular fora da África e se espalhou para a América do Sul. **Cultivo bem sucedido:** Cultivar a partir de sementes dentro de casa é possível durante todo o ano. As sementes leves não requerem nenhum pré-tratamento e podem ser espalhadas diretamente no solo úmido e apenas levemente cobertas com o meio de cultivo. Estique o filme plástico sobre o recipiente de cultura e faça alguns furos no filme. Isso protege o solo de secar. Você deve remover o papel alumínio por 2 horas a cada dois ou três dias. Isso evita a formação de mofo no solo em crescimento. Coloque o vaso de sementes em um local claro e quente com 20 a 25 ° Celsius e mantenha o solo do vaso úmido, mas não molhado. A germinação geralmente ocorre após duas a três semanas. **A melhor localização:** Como uma filha dos trópicos que precisa de calor, a tulipeira africana aprecia um lugar claro e ensolarado. No verão, é claro, você também pode tomar um banho de sol protegido na varanda ou no jardim. **Cuidado ideal:** A árvore de tulipa adora solo rico em nutrientes e permeável com partes de granulação grossa, como argila expandida ou cascalho. Ele precisa de um abastecimento constante de água, pelo que deve ser evitado o encharcamento através da água residual no pires. De abril a outubro, recomenda-se adubação regular com fertilizante para plantas de banheira a cada 10 dias. Repot a planta a cada um ou dois anos, mas sempre escolha o próximo vaso maior. **No inverno:** Sua árvore de tulipa não é resistente ao gelo e danos às raízes podem ocorrer em temperaturas abaixo de 3° Celsius. Um local claro e quente com temperatura ambiente normal é melhor, pois as flores já podem ser esperadas nos primeiros meses do ano a partir do terceiro ano. No entanto, evite um local próximo a um sistema de aquecimento.



Lalea Spathodea campanulata

Flori noi din fiecare mugur, iar și iar

Lalea africană veșnic verde poate fi cultivată și păstrată bine ca plantă container cu o înălțime de până la doi metri. Din baldachinul său de frunze pennate de culoare verde închis, inflorescențele ies pe tulpini lungi după câțiva ani. Florile spectaculoase ale Spathodea campanulata se deschid în rafale, astfel încât fiecare floare se schimbă din nou și din nou pe parcursul unei săptămâni. În primul rând, cercul exterior de flori se deschide și arată frunzele sale de culoare portocalie până la roșu, cu margini ondulate și de culoare galbenă. Florile marginale se ofilesc după două zile și urmează următorul rând de muguri. Înflorirea durează săptămâni. Mugurii de flori nedeschisi ai lalelei africane emit un jet de apă atunci când se aplică presiune. Planta atrage lilieci în patria sa pentru a le poleniza. **Localitate naturală:** Gama naturală a Spathodea campanulata se află pe coasta atlantică africană de la Ghana la Angola și de acolo la Sudan și Uganda. Între timp, a devenit și o plantă ornamentală populară în afara Africii și s-a răspândit în America de Sud. **Cultivare de succes:** Cultivarea din semințe în interior este posibilă pe tot parcursul anului. Semințele ușoare nu necesită nici un tratament prealabil și pot fi răspândite direct pe solul de ghevi umed și acoperite doar ușor cu substratul în creștere. Întindeți folia alimentară peste recipientul de cultivare și introduceți câteva găuri în film. Acest lucru protejează pământul de uscare. La fiecare două până la trei zile ar trebui să îndepărtați filmul timp de 2 ore. Acest lucru previne formarea mușgaiului pe solul de cultivare. Așezați vasul de cultivare într-un loc luminos și cald, cu 20-25 ° Celsius și mențineți solul de cultivare umed, dar nu umed. Germinarea are loc de obicei după două-trei săptămâni. **Cea mai bună localitate:** Ca un copil tropical cald, laleaua africană apreciază un loc luminos și însorit. Vara, un loc protejat pentru soare este, desigur, posibil și pe balcon sau în grădină. **Îngrijire optimă:** Lalea iubeste solul bogat în nutrienți și permeabil, cu părți cu granulație grosieră, cum ar fi argila expandată sau pietrișul. El are nevoie de o alimentare constantă cu apă, prin care ar trebui evitată apariția apei reziduale din farfurie. Din aprilie până în octombrie, recomandăm fertilizarea regulată cu îngrășământ pentru plante în ghiveci la fiecare 10 zile. Repopulați planta la fiecare un-doi ani, dar alegeți întotdeauna următoarea cea mai mare oală. **În iarnă:** Laleaua dvs. nu este rezistentă la îngheț și rădăcinile pot fi deteriorate la temperaturi sub 3 ° Celsius. O localitate luminoasă și caldă cu temperatura normală a camerei este mai bună, deoarece florile pot fi așteptate începând cu al treilea an în primele luni ale anului. Cu toate acestea, evitați o localitate lângă încălzire.



Afrikanskt Tulpan

Spathodea campanulata

Nya blommor från varje knopp under veckorna

Det vintergröna afrikanska tulpanträdet kan odlas och hållas bra som en containerväxt med en höjd på upp till två meter. Från dess baldakin av mörkgröna pinnat löv sticker blommorna ut på långa stjälkar efter några år. De spektakulära blommorna i Spathodea campanulata öppnas i skurar, så att varje blomma förändras om och om igen under en period av veckor. Först öppnas den yttersta cirkeln av blommor och visar sina orange till röda blad med vågiga och gula kanter. Marginalblommorna vissnar efter två dagar och nästa rad med knoppar följer. Blomningen varar i veckor. De öppnade blomknopparna från det afrikanska tulpanträdet avger en vattenstråle när trycket appliceras. Växten lockar fladdermöss i sitt hemland för att pollinera dem. **Naturligt läge:** Det naturliga utbudet av Spathodea campanulata ligger vid den afrikanska atlantkusten från Ghana till Angola och därifrån till Sudan och Uganda. Under tiden har det också blivit en populär prydnadsväxt utanför Afrika och har spridit sig till Sydamerika.

Framgångsrik odling: Att odla från frön inomhus är möjligt året runt. De lätta frön kräver ingen förbehandling och kan spridas direkt på fuktig krukväxt och endast täckas lätt med det växande substratet. Sträck folie över odlingsbehållaren och sticka några hål i filmen. Detta skyddar jorden från att torka ut. Varannan till var tredje dag ska du ta bort filmen i två timmar. Detta förhindrar att mögel bildas på odlingsjorden. Placera odlingskärlet på en ljus och varm plats med 20 till 25 ° Celsius och håll odlingsjorden fuktig men inte våt. Spiring sker vanligtvis efter två till tre veckor. **Den bästa platsen:** Som ett varmt tropiskt barn uppskattar det afrikanska tulpanträdet en ljus och solig plats. På sommaren är naturligtvis en skyddad plats i solen också möjlig på balkongen eller i trädgården. **Optimal vård:** Tulpanet älskar näringsrik och permeabel jord med grovkorniga delar som expanderad lera eller grus. Han behöver en konstant vattenförsörjning, varigenom vattentätning på grund av kvarvarande vatten i fatet bör undvikas. Från april till oktober rekommenderar vi regelbunden gödning med krukväxtgödsel med 10 dagars mellanrum. Omplantera växten vartannat år, men välj alltid nästa största kruka. **På vintern:** Ditt tulpanträd är inte frostskyddat och rötterna kan skadas vid temperaturer under 3 ° Celsius. En ljus och varm plats med normal rumstemperatur är bättre eftersom blommor kan förväntas från det tredje året under årets första månader. Undvik dock en plats nära värmaren.



Africký tulipánový strom

Spathodea campanulata

Celé týždne boli vždy nové kvety z každého púčika

Vždyzelený africký tulipánový strom sa ľahko pestuje a udržiava ako nádoba s výškou do dvoch metrov. Po niekoľkých rokoch súkvetia vyčnievajú z jeho baldachýnu tmavozelených plstnatých listov na dlhých stopkách. Veľkolepé kvety Spathodea campanulataotvárajú sa nárazovo, takže každý kvet sa v priebehu týždňov znova a znova mení. Vonkajší kruh kvetov sa otvára ako prvý a ukazuje svoje oranžové až červené listy s vlnitými a žltými okrajmi. Po každých dvoch dňoch okrajové kvety zvädnú a nasleduje ďalší rad pukov. Kvitnutie trvá týždne. Neotvorené puky afrického tulipánovníka vyžarujú po stlačení prúd vody, ktorý rastlina využíva na prilákanie netopierov vo svojom pôvodnom prostredí, aby ju opelili. **Prirodzená poloha:** Prirodzený areál Spathodea campanulata sa nachádza na africkom pobreží Atlantiku od Ghany po Angolu a odtiaľ po Sudán a Ugandu. Medzičasom je však obľúbenou okrasnou rastlinou aj mimo Afriky a rozšírila sa aj do Južnej Ameriky. **Úspešná kultivácia:** Pestovanie zo semien v interiéri je možné po celý rok. Svetlé semená nevyžadujú žiadnu predúpravu a môžu sa rozprestierať priamo na vlhkú pôdu a len zľahka zasypať pestovateľským substrátom. Natiahnite priľnavú fóliu na nádobu s kultúrou a urobte do nej niekoľko otvorov. To chráni pôdu pred vysychaním. Fóliu by ste mali odstraňovať na 2 hodiny každé dva až tri dni. To zabráňuje tvorbe plesní na rastúcej pôde. Črepník umiestnite na svetlé a teplé miesto s teplotou 20 až 25 ° C a udržiajte pôdu v črepníku vlhkú, ale nie mokrá. Klíčenie zvyčajne nastáva po dvoch až troch týždňoch. **Najlepšie umiestnenie:** Ako dieťa z trópov, ktoré potrebuje teplo, africký tulipán oceňuje svetlé a slnečné miesto. V lete môžete mať, samozrejme, aj chránené miesto na opaľovanie na balkóne alebo v záhrade. **Optimálna starostlivosť:** Tulipán miluje na živiny bohatú a priepustnú pôdu s hrubozrnnými časťami ako keramzit alebo štrk. Potrebuje stály prísun vody, čím by sa malo zabrániť podmäčaniu zvyškov vody v tanieriku. Od apríla do októbra sa odporúča pravidelné prihnojovanie hnojivom na vaňové rastliny každých 10 dní. Presádzajte rastlinu každý rok alebo dva, ale vždy si vyberte najbližší väčší kvetináč. **V zime:** Vaš tulipán nie je mrazuvzdorný a pri teplotách pod 3 ° Celzia môže dôjsť k poškodeniu koreňov. Lepšie je svetlé a teplé stanovište s bežnou izbovou teplotou, keďže kvety možno očakávať už v prvých mesiacoch roka od tretieho roku. Vyhnite sa však umiestneniu v blízkosti vykurovacieho systému.



Afriško tulipanovo drevo

Spathodea campanulata

Tedne so iz vsakega popka vedno nove rože

Zimzelení afriški tulipanovec je enostaven za gojenje in vzdrževanje kot rastlino v posodi z višino do dveh metrov. Po nekaj letih iz njegove krošnje temnozelenih pernatih listov na dolgih pecljih poženejo socvetja. Spektakularni cvetovi Spathodea campanulataodpirajo v rafalih, tako da se vsaka roža čez tedne vedno znova spreminja. Najprej se odpre skrajni krog cvetov in pokaže svoje oranžne do rdeče obarvane liste z valovitimi in rumenimi robovi. Vsaka dva dni obrobni cvetovi ovenijo in sledijo naslednje vrstice popkov. Cvetenje traja več tednov. Neodprti cvetni popki afriškega tulipanovca ob stiskanju oddajajo vodni curek, ki ga rastlina uporabi za privabljanje netopirjev v svoj domači habitat, da jo oprašijo. **Naravni habitat:** Naravno območje razširjenosti Spathodea campanulata je na afriški atlantski obali od Gane do Angole in od tam do Sudana in Ugande. Vmes pa je priljubljena okrasna rastlina tudi izven Afrike in se je razširila v Južno Ameriko. **Navodila za gojenje:** Gojenje iz semen v zaprtih prostorih je možno vse leto. Lahka semena ne zahtevajo predhodne obdelave in jih je mogoče raztrositi neposredno na vlažna rastna tla in le rahlo prekriti z rastnim substratom. Preko posode s kulturo napnite živilsko folijo in v folijo prebodite nekaj lukenj. To ščiti tla pred izsušitvijo. Vsake dva do tri dni za 2 uri odstranite folijo. S tem preprečimo nastanek plesni na rastni zemlji. Lonček s semeni postavite na svetlo in toplo mesto s temperaturo od 20 do 25 ° C, zemlja v lončku pa naj bo vlažna, vendar ne mokra. Kaljenje običajno nastopi po dveh do treh tednih. **Najboljša lokacija:** Kot otrok tropske, ki potrebuje toploto, afriški tulipanovec ceni svetel in sončen prostor. Poleti pa si seveda lahko zagotovite tudi zaščitni kotiček za sončenje na balkonu ali vrtu. **Optimalna nega:** Tulipanovec obožuje s hranili bogata in prepustna tla z grobozrnatimi deli, kot sta ekspandirana glina ali gramoz. Potrebuje stalno oskrbo z vodo, pri čemer se je treba izogibati namakanju zaradi ostankov vode v krožniku. Od aprila do oktobra je priporočljivo redno gnojenje z gnojilom za gobe vsakih 10 dni. Rastlino presadite vsako leto ali dve, vendar vedno izberite naslednji večji lonček. **V zimskem času:** Vaš tulipanovec ni odporen proti zmrzali in pri temperaturah pod 3 ° C lahko pride do poškodb korenin. Boljša je svetla in topla lokacija z normalno sobno temperaturo, saj lahko od tretjega leta cvetenje pričakujemo že v prvih mesecih leta. Vendar se izogibajte lokaciji v bližini ogrevalnega sistema.



Tulipán africano

Spathodea campanulata

Durante semanas brotan nuevas flores de cada capullo

El tulipanero africano siempre verde, se puede cultivar muy bien en maceta y alcanza una altura de hasta dos metros. De la corona de hojas pinnadas de color verde oscuro sobresalen con los años en tallos largos la inflorescencia. Las espectaculares flores del Spathodea campanulata se abren poco a poco, así las flores son diferentes durante semanas. Primero se abre el aro de flores exterior y muestra sus hojas de color naranja tirando a rojo y los bordes ondulados de color amarillo. A los dos días se marchitan las flores del borde y la siguiente fila de capullos brota. Así se mantiene la inflorescencia durante semanas. Los capullos cerrados expulsan un chorro de agua al presionarlos. En su hábitat natural lo hace para atraer a los murciélagos para que los polinicen. **Ubicación natural:** El hábitat natural de extensión de la Spathodea campanulata se sitúa en la costa atlántica de África, desde Ghana hasta Angola y desde ahí a Sudán y Uganda. Se encuentra también fuera de África, como planta ornamental popular y se ha extendido hasta América del sur. **Cultivo exitoso:** La semilla se puede criar en interior durante todo el año. Las semillas no precisan de ningún tratamiento previo y se pueden esparcir sobre sustrato húmedo y cubrirlas con el mismo ligeramente. Cubre el recipiente de cultivo con un film transparente y agujeréelo. Así protegerá la tierra de la desecación. Para evitar la putrefacción del sustrato retire el film cada dos o tres días durante 2 horas. Coloque el recipiente de cultivo en un lugar luminoso y cálido entre 20 y 25 grados y mantenga el sustrato húmedo, pero no mojado. La germinación tarda en producirse entre dos a tres semanas. **La mejor ubicación:** El tulipanero africano, como planta tropical, necesita un lugar luminoso y soleado. En verano puede ser un sitio en exterior protegido del viento, como una terraza o jardín. **Cuidado óptimo:** El tulipanero prefiere una tierra rica en nutrientes y permeable, con una parte de arcilla o grava. Precisa de un suministro de agua constante, pero debe evitar el anegamiento por ejemplo del agua residual en el platillo. Cada 10 días, de abril a octubre, puede suministrarle fertilizante para plantas en maceta. Trasplante el tulipanero cada año o dos años y elija para ello un macetero del siguiente tamaño. **En el invierno:** El tulipanero no es resistente a heladas y con temperaturas por debajo de los 3 grados pueden producirse daños en las raíces. Lo mejor es mantenerlo en un lugar luminoso y cálido con temperaturas normales de interior, ya que a partir del tercer año se puede contar con las primeras flores durante los primeros meses del año. Evite un sitio cerca de radiadores o calefacción.



Africký tulipánový strom

Spathodea campanulata

Týdny byly vždy nové květy z každého poupěte

Stálezelený africký tulipán se snadno pěstuje a udržuje jako kontejnerová rostlina s výškou až dva metry. Květenství po pár letech vyčnívají z jeho baldachýnu tmavě zelených plstnatých listů na dlouhých stopkách. Velkolepé květy Spathodea campanulata otevírají se nárazově, takže každý květ se v průběhu týdnu znovu a znovu mění. Vnější kruh květů se otevírá jako první a ukazuje své oranžové až červené listy se žlutými okraji. Po každých dvou dnech okrajové květy zavadnou a následuje další řada poupět. Kvetení trvá týdny. Neotevřená poupata afrického tulipánovníku vydávají po zmáčknutí proud vody, který rostlina využívá k přilákání netopýrů ve svém přirozeném prostředí k opylení. **Přirozená poloha:** Přirozený areál výskytu Spathodea campanulata je na africkém pobřeží Atlantiku od Ghany po Angolu a odtud po Súdán a Ugandu. Mezitím je však oblíbenou okrasnou rostlinou i mimo Afriku a rozšířila se do Jižní Ameriky. **Úspěšné pěstování:** Pěstování ze semínek v interiéru je možné po celý rok. Světla semena nevyžadují žádnou předúpravu a lze je rozprostírat přímo na vlhkou pěstební půdu a pouze lehce zasypat pěstebním substrátem. Natáhněte přilnavou fólii přes kultivační nádobu a propíchněte do fólie několik otvorů. To chrání půdu před vysycháním. Fólii byste měli odstraňovat na 2 hodiny každé dva až tři dny. Tím se zabrání tvorbě plísní na rostoucí půdě. Umístěte květináč na světlé a teplé místo s teplotou 20 až 25 °C a udržujte půdu v květináči vlhkou, ale ne mokrou. Klíčení obvykle nastává po dvou až třech týdnech. **Nelepší umístění:** Jako dítě tropů, které potřebuje teplo, africký tulipán ocení světlé a slunné místo. V létě můžete mít samozřejmě i chráněné místo na opalování na balkóně nebo na zahradě. **Optimální péče:** Tulipán miluje na živiny bohatou a propustnou půdu s hrubozrnnými částmi, jako je keramzit nebo štěrk. Potřebuje stálý přísun vody, čímž by se mělo zabránit zamokření zbytkovou vodou v podšálku. Od dubna do října se doporučuje pravidelné přihnojování hnojivem pro vanové rostliny každých 10 dní. Rostlinu přesazujte každý rok nebo dva, ale vždy zvolte další větší květináč. **V zimě:** Váš tulipán není mrazuvzdorný a při teplotách pod 3 °C Celsia může dojít k poškození kořenů. Lepší je světlé a teplé stanoviště s běžnou pokojovou teplotou, protože květy lze očekávat již v prvních měsících roku od třetího roku. Vyhněte se však umístění v blízkosti topného systému.



Afrika Lale Ağacı

Spathodea campanulata

Haftalarca her tomurcuktan yeni çiçekler çıktı

Yaprak dökmeyen Afrika Lale Ağacı, iki metreye kadar yüksekliğe sahip bir saksı bitkisi olarak büyümesi ve bakımı kolaydır. Birkaç yıl sonra çiçek salımları, uzun saplar üzerindeki koyu yeşil tüylü yapraklardan oluşan gölgelikten dışarı çıkar. Spathodea campanulata'nın muhteşem çiçekleripatlamalar halinde açın, böylece her çiçek haftalar boyunca tekrar tekrar değişir. Çiçeklerin en dıştaki çemberi önce açılır ve dalgalı ve sarı renkli kenarları olan turuncudan kırmızıya renkli yapraklarını gösterir. Her iki günde bir, marjinal çiçekler kurur ve bir sonraki tomurcuk sırası onu takip eder. Çiçeklenme haftalarca sürer. Afrika lale ağacının açılmamış çiçek tomurcukları, sıklıkla bir su jeti yayar ve bitki bunu tozlaşmak için yarasaları doğal ortamlarına çekmek için kullanır. **Doğal konum:** Spathodea campanulata'nın doğal yayılış alanı Gana'dan Angola'ya ve oradan da Sudan ve Uganda'ya kadar Afrika Atlantik kıyısında. Ancak bu arada Afrika dışında da popüler bir süs bitkisi ve Güney Amerika'ya yayılmıştır. **Başarılı yetiştirme:** İç mekanlarda tohumlardan büyüme tüm yıl boyunca mümkündür. Hafif tohumlar herhangi bir ön işlem gerektirmez ve doğrudan nemli büyüyen toprağa yayılabilir ve yetiştirme ortamı ile sadece hafifçe kaplanabilir. Kültür kabinin üzerine streç film çekin ve filmde birkaç delik açın. Bu, toprağın kurumasını önler. Folyoyu her iki ila üç günde bir 2 saat çıkarmalısınız. Bu, büyüyen toprakta küf oluşumunu önler. Tohum saksısını 20 ila 25 °C sıcaklıkta hafif ve sıcak bir yere koyun ve saksı toprağını nemli tutun ama ıslak değil. Çimlenme genellikle iki ila üç hafta sonra gerçekleşir. **En iyi konum:** Sıcaklığa ihtiyaç duyan tropik bir çocuk olarak, Afrika lale ağacı parlak ve güneşli bir yeri takdir eder. Yaz aylarında elbette balkonda veya bahçede korunaklı bir güneşlenme alanınız da olabilir. **Optimum bakım:** Lale ağacı, genişletilmiş kil veya çakıl gibi iri taneli kısımları olan besin açısından zengin ve geçirgen toprakları sever. Sürekli bir su kaynağına ihtiyacı var, bu sayede tabakta kalan sudan su basması önlenmelidir. Nisan-Ekim ayları arasında 10 günde bir kuvvet bitki gübresi ile düzenli gübreleme yapılması önerilir. Bitkiyi bir veya iki yılda bir tekrarlayın, ancak her zaman bir sonraki daha büyük saksıyı seçin. **Kışın:** Lale ağacınız dona dayanıklı değildir ve 3 °C'nin altındaki sıcaklıklarda kök hasarı meydana gelebilir. Normal oda sıcaklığına sahip aydınlık ve sıcak bir yer daha iyidir, çünkü üçüncü yıldan itibaren yılın ilk aylarında çiçekler beklenebilir. Ancak, bir ısıtma sistemine yakın bir konumdan kaçın.



Afrikai tulipánfa

Spathodea campanulata

Hetekig mindig új virágok voltak minden rügyből

Az örökzöld afrikai tulipánfa könnyen termesztethető és karbantartható akár két méteres konténernövényként is. Sötétzöld tollas leveleiből álló lombkoronájából néhány év elteltével hosszú száron kiemelkednek a virágzatok. A Spathodea campanulata látványos virágaitörve nyílnak ki, így minden virág újra és újra változik a hetek folyamán. A legkülső virágkör nyílik meg először, és narancssárga-piros színű levelei láthatók hullámos és sárga színű szélekkel. Kétnaponta a szélső virágok elszáradnak, és a következő rügyosz következik. A virágzás hetekig tart. Az afrikai tulipánfa ki nem bontott virágbimbói ésszenyomva vízsugarat bocsátanak ki, amellyel a növény denevéreket vonz be őshonos élőhelyére, hogy beporozzák. **Természetes elhelyezkedés:** A Spathodea campanulata természetes elterjedési terület az Atlanti-óceán afrikai partvidékén található Ghánától Angoláig, majd onnan Szudánig és Ugandáig. Időközben azonban Afrikán kívül is népszerű dísznövény, és Dél-Amerikában is elterjedt. **Sikerés termesztés:** A beltéri magvak termesztése egész évben lehetséges. A világos magvak nem igényelnek előkezelést, közvetlenül a nedves termőtalajra szórhatók, a természetközeggel csak enyhén takarva. Nyújtson ragasztófóliát a tenyészedényre, és szúrjon ki néhány lyukat a fóliába. Ez megvédi a talajt a kiszáradástól. A fóliát két-három naponta 2 órára le kell venni. Ez megakadályozza a penészképződést a növekvő talajon. Helyezze a magcserepet világos és meleg helyre, ahol a hőmérséklet 20-25 °C, és a virágföldet tartsa nedvesen, de ne nedvesen. A csírázás általában két-három hét után következik be. **A legjobb hely:** A meleget igénylő trópusok gyermekeként az afrikai tulipánfa nagyra értékeli a világos és napos helyet. Nyáron természetesen az erkélyen vagy a kertben is van egy védett napozóhely. **Optimális gondozás:** A tulipánfa szereti a tápanyagban gazdag és vízáteresztő talajt durva szemcsés részekkel, mint például duzzasztott agyag vagy kavics. Folyamatos vízellátásra van szüksége, így el kell kerülni a csészetalajban lévő maradék víz eltömődését. Áprilistól októberig rendszeres, 10 naponkénti kádas növényi műtrágyával történő trágyázás javasolt. A növényt évente-kétévente ültessük át, de mindig válasszuk a következő nagyobb cserepet. **Télen:** Tulipánfája nem fagyálló, és 3 Celsius fok alatti hőmérsékleten a gyökér károsodása következhet be. A normál szobahőmérsékletű, világos és meleg hely jobb, mivel a harmadik évtől már az év első hónapjaiban virágzás várható. Kerülje azonban a fűtési rendszer közelében lévő helyet.

: : : : :



カエンボク

Spathodea campanulata

数週間、豊かな花が楽しめる

常緑のこの植物は2mの高さまで成長し、鉢植え植物として簡単に栽培することができます。植えて数年後には、花序が付いている長い茎の上に、濃い緑色の羽状複葉の林冠が目立ってきます。見事な花は一群ごとに開花し、この花は数週間にわたって絶えず変化します。花の外側の縁はオレンジと赤、カールした葉の縁は黄色に彩られます。咲いて2日後に小花は枯れ、次の花を咲かせる芽の一群が枯れた花を前方に押し出します。このようにして、何週間にも渡って花を咲かせます。開花していない芽を押すと噴水のように水を出します。これがコウモリを受粉者として引き付けます。

自然な場所:

生息地はガーナ、アンゴラ、さらにはスーダン、ウガンダのアフリカ大西洋沿岸に分布しています。現在ではアフリカ以外でも観葉植物として栽培されており、南米でも見られます。

栽培成功:

種子繁殖は室内で年間を通して可能です。種の初期処理は必要ありません。湿った用土に種を広げ、それに少量の用土を被せます。サランラップなどの透明フィルムで鉢をカバーします。透明フィルムには空気穴をいくつかあけ、2~3日に1回は約2時間、完全にフィルムを鉢から外します。そうすることで、カビの発生を防ぎます。20°C~25°Cの明るく暖かい場所に置き、用土は湿った状態に保ちます。通常2~3週間で発芽します。

最高のロケーション:

熱帯植物ですので、明るく日当たりの良い場所を好みます。夏季は、ベランダや庭の風の当たらない場所に置くことも可能です。

最適なケア:

栄養豊富でエキスパンド粘土や砂利のような浸透性の良い土壌を好みます。十分な水やりを行います。受皿に水が溜まるのを避けます。4月~10月の間は鉢植え植物用の肥料を10日ごとに与えます。2~3年ごとに大きなサイズの鉢に植え替えをします。

冬に:

霜に弱いので、気温3°C以下の環境に置くと根を痛めます。冬の間は、室温の明るく暖かい場所に保つことが最適ですが、ヒーターの隣には置かないようにします。植えて3年目の最初の月には芽が形成されます。

SKU: 12908 / Afrikanischer Tulpenbaum