



## Dawkowanie Deltam:

### → Ziemniak:

✗ larwy stonki ziemniaczanej

Maksymalna dawka dla jednorazowego zastosowania: **5 ml/100 m<sup>2</sup>**

Zalecana dawka dla jednorazowego zastosowania: **4-5 ml/100 m<sup>2</sup>**

Wyższą z zalecanych dawek stosować do zwalczania chrząszczy oraz w przypadku bujnej naci ziemniaczanej.

**Termin stosowania:** opryskiwać po wystąpieniu szkodnika

**Maksymalna liczba zabiegów w sezonie wegetacyjnym:** 1

**Zalecana ilość wody:** 1,5-4 l/100 m<sup>2</sup>

### → Jabłoń:

✗ kwieciek jabłkowiec

Maksymalna/zalecana dawka dla jednorazowego zastosowania: **7,5 ml/100 m<sup>2</sup>**

**Termin stosowania:** opryskiwać tuż przed pękaniem lub w czasie pękania pąków kwiatowych jabłoni. Zabieg wykonywać w dni słoneczne przy temperaturze co najmniej 12°C.

**Maksymalna liczba zabiegów w sezonie wegetacyjnym:** 2

**Odstęp pomiędzy zabiegami:** co najmniej 14 dni

**Zalecana ilość wody:** 7 l/100 m<sup>2</sup>

### → Truskawka:

✗ kwieciek malinowiec

Maksymalna dawka dla jednorazowego zastosowania: **8 ml/100 m<sup>2</sup>**

Zalecana dawka dla jednorazowego zastosowania: **6-8 ml/100 m<sup>2</sup>**

**Termin stosowania:** opryskiwać bezpośrednio po zaobserwowaniu szkodnika

**Maksymalna liczba zabiegów w sezonie wegetacyjnym:** 2

**Odstęp pomiędzy zabiegami:** co najmniej 14 dni

**Zalecana ilość wody:** 7 l/100 m<sup>2</sup>

➡ **Kapusta głowiasta biała:**

✗ bielinek kapustnik, bielinek rzepnik

Maksymalna dawka dla jednorazowego zastosowania: **5 ml/100 m<sup>2</sup>**

Zalecana dawka dla jednorazowego zastosowania: **4-5 ml/100 m<sup>2</sup>**

**Termin stosowania:** opryskiwać bezpośrednio po zaobserwowaniu gąsienic motyli

**Maksymalna liczba zabiegów w sezonie wegetacyjnym:** 2

**Odstęp pomiędzy zabiegami:** co najmniej 14 dni

**Zalecana ilość wody:** 6 l/100 m<sup>2</sup>

➡ **Pomidor:**

✗ stonka ziemniaczana

Maksymalna dawka dla jednorazowego zastosowania: **5 ml/100 m<sup>2</sup>**

Zalecana dawka dla jednorazowego zastosowania: **4-5 ml/100 m<sup>2</sup>**

**Termin stosowania:** opryskiwać bezpośrednio po zaobserwowaniu pierwszych larw stonki ziemniaczanej

**Maksymalna liczba zabiegów w sezonie wegetacyjnym:** 1

**Zalecana ilość wody:** 6 l/100 m<sup>2</sup>

➡ **Kocimiętka faassena (uprawa pod osłonami):**

✗ skoczek melisowy

Maksymalne/zalecane stężenie dla jednorazowego zastosowania: **0,075% (7,5 ml środka/10 l wody)**

**Termin stosowania:** opryskiwać po wystąpieniu szkodnika

**Maksymalna liczba zabiegów w sezonie wegetacyjnym:** 2

**Odstęp pomiędzy zabiegami:** co najmniej 14 dni

**Zalecana ilość cieczy użytkowej:** 7 l/100 m<sup>2</sup>

➔ **Aster chiński (uprawa w gruncie):**

✗ porazik kocankowy

Maksymalne/zalecane stężenie dla jednorazowego zastosowania: **0,075% (7,5 ml środka/10 l wody)**

**Termin stosowania:** opryskiwać po wystąpieniu szkodnika

**Maksymalna liczba zabiegów w sezonie wegetacyjnym:** 2

**Odstęp pomiędzy zabiegami:** co najmniej 14 dni

**Zalecana ilość cieczy użytkowej:** 10 l/100 m<sup>2</sup>

➔ **Róża (uprawa w gruncie):**

✗ mszyce, skoczek różany

Maksymalne/zalecane stężenie dla jednorazowego zastosowania: **0,075% (7,5 ml środka/10 l wody)**

**Termin stosowania:** opryskiwać po wystąpieniu szkodnika

**Maksymalna liczba zabiegów w sezonie wegetacyjnym:** 2

**Odstęp pomiędzy zabiegami:** co najmniej 14 dni

**Zalecana ilość cieczy użytkowej:** 7 l/100 m<sup>2</sup>