



SAFLAX®



Tips



© Cliff - CC-BY-2.0

Cedrus deodara

	 Български	BG		2		 Malti	MT		5
	 Dansk	DK		2		 Nederlands	NL		5
	 Deutsch	DE		2		 Norsk	NO		6
	 English	UK		2		 Polski	PL		6
	 Eesti	EE		3		 Português	PT		6
	 Suomalainen	FI		3		 Românesc	RO		6
	 Français	FR		3		 Svenska	SE		7
	 Ελληνική	GR		3		 Slovensky	SK		7
	 Gaeilge	IE		4		 Slovenski	SI		7
	 íslenskur	IS		4		 Español	ES		7
	 Italiano	IT		4		 Český	CZ		8
	 Hrvatski	HR		4		 Türkçe	TR		8
	 Latviešu	LV		5		 Magyar	HU		8
	 Lietuvių kalba	LT		5		 日本語	JP		9



Хималайски кедрър

Cedrus deodara

Планинска красота от Непал - бонсай на закрито / бонсай на открито

Уникалната форма на растеж на хималайския кедрър също го прави незабавно разпознаваем за неспециалистите, тъй като вечнозеленото иглолистно дърво забива основните си клонове с висящите върхове хоризонтално от ствола и по този начин расте почти повече на ширина, отколкото на височина. Неговите синьо-зелени до сиво-сини, меки иглички стоят на гроздове по късите издънки и по-спорадично по дългите издънки. С дължина от четири до пет сантиметра те са сред най-дългите от всички видове кедрър. След есенния цъфтеж, дългите осем сантиметра шишарки на Cedrus deodara стоят доста изправени по клоните. **Естествено местоположение:** Районът от западен Непал до източен Афганистан е естественото местообитание на хималайския кедрър и той расте там на надморска височина от 1000 до 3000 метра. **Успешно отглеждане:** Отглеждането е възможно цялостно. Първо поставете семената в хладилника (стратификация) за една седмица, за да насърчите семената да покълнат. След това поставете семената на около един сантиметър дълбочина във влажен субстрат за отглеждане или пясъчна почва за бонсай. Покрийте съда с култура с домакинско фолио, което сте осигурили с дупки. Това предпазва почвата от изсушаване. Трябва да отстранявате фолиото за 2 часа на всеки два до три дни. Това предотвратява образуването на мухъл върху растящата почва. Поставете саксията със семена на светло и топло място с около 20° по Целзий и поддържайте почвата влажна, но не мокра. Периодът на покълване е от четири до десет седмици. **Най-доброто местоположение:** Изберете място с пълно слънце. **Оптимална грижа:** Осигурете адекватно и равномерно поливане, но избягвайте преовлажняване. Торете на всеки 3 седмици от май до септември със специален течен тор за бонсай. По време на фазата на растеж е препоръчително редовно да издърпвате новите издънки. По-дебелите издънки и клонки се режат само през зимата, за да се ограничи загубата на смола по границите до периода до растеж. Така че вашият бонсай не трябва да мобилизира допълнителни сили. Презасаждайте кедръра на всеки три до пет години през пролетта (март), но не отстранявайте почвата напълно или не правете драстични подрязвания на корените. **През зимата:** Хималайският кедрър е условно издръжлив до -10° по Целзий. Въпреки това зимува най-добре при ярка светлина от 10° до 15°. Въпреки това, кедрърът има невероятна способност да се регенерира, ако се появят признаци на измръзване по време на тежки зими.



Himalaya cedertræ

Cedrus deodara

Bjergskønhed fra Nepal - indendørs bonsai / udendørs bonsai

Himalayacederens unikke vækstform gør den også umiddelbart genkendelig for lægmanden, fordi det stedsegrønne nåletræ driver sine hovedgrene med de hængende spidser vandret fra stammen og vokser dermed næsten mere i bredden end i højden. Dens blågrønne til gråblå, bløde nåle står i klynger på de korte skud og mere sporadisk på de lange skud. Med en længde på fire til fem centimeter er de blandt de længste af alle cederarter. Efter efterårsblomstringen står de otte centimeter lange kogler af Cedrus deodara ret oprejst på grenene. **Naturlig beliggenhed:** Regionen fra det vestlige Nepal til det østlige Afghanistan er det naturlige habitat for Himalaya-cederen, og den vokser der i højder på 1.000 til 3.000 meter. **Succesfuld dyrkning:** Dyrkning er mulig hele året rundt. Stil først frøene i køleskabet (stratificer) i en uge for at få frøene til at spire. Put denSås derefter cirka en centimeter dybt i fugtigt voksende substrat eller sandet bonsaijord. Dæk dyrkningskarret til med husholdningsfilm, som du forsyner med huller. Dette beskytter jorden mod udtørring. Du bør fjerne folien i 2 timer hver anden til tredje dag. Dette forhindrer mug i at dannes på den voksende jord. Stil frøpotten et let og varmt sted med omkring 20° Celsius og hold pottejorden fugtig, men ikke våd. **Spiringsperioden** er fire til ti uger. **Den bedste beliggenhed:** Vælg en fuld sol placering. **Optimal pleje:** Sørg for tilstrækkelig og jævn vanding, men undgå vandfyldning. Gød hver 3. uge fra maj til september med en speciel bonsai flydende gødning. I vækstfasen er det tilrådeligt at trække de nye skud ud regelmæssigt. Tykkere skud og kviste skæres kun om vinteren for at begrænse tabet af harpiks ved grænsefladerne til den vækstfri periode. Så din bonsai behøver ikke at mobilisere yderligere kræfter. I vækstfasen er det tilrådeligt at trække de nye skud ud regelmæssigt. Tykkere skud og kviste skæres kun om vinteren for at begrænse tabet af harpiks ved grænsefladerne til den vækstfri periode. Så din bonsai behøver ikke at mobilisere yderligere kræfter. Genpot cederen hvert tredje til femte år i foråret (marts), men fjern ikke jorden helt eller lav drastiske rodafsæringer. **Om vinteren:** Himalaya-cederen er betinget hårdfør til -10° Celsius. Den går dog bedst i dvale i stærkt lys ved 10° til 15°. Cederen har dog en fantastisk evne til at regenerere, hvis der skulle opstå tegn på forfrysninger under strenge vintre.



Himalaya Zeder

Cedrus deodara

Bergschönheit aus Nepal - Zimmer-Bonsai / Freiland-Bonsai

Die einzigartige Wuchsform der Himalaya Zeder macht sie auch für den Laien sofort erkennbar, denn die immergrüne Konifere treibt ihre Hauptäste mit den hängenden Spitzen waagrecht vom Stamm und wächst so fast mehr in die Breite als in die Höhe. Ihre blaugrünen bis graublauen weichen Nadeln stehen in Büscheln an den Kurz- und eher vereinzelt an den Langtrieben. Sie zählen mit einer Länge von vier bis fünf Zentimetern zu den längsten aller Zedernarten. Nach der Herbstblüte stehen die acht Zentimeter langen Zapfen der Cedrus deodara hübsch aufrecht an den Zweigen. **Naturstandort:** Die Region vom Westen Nepals bis zum Osten Afghanistans bildet den Naturstandort der Himalaya Zeder und sie wächst dort in Höhenlagen von 1.000 bis 3.000 Metern. **Anzucht:** Die Anzucht ist das ganze Jahr über möglich. Legen Sie die Samen zunächst für eine Woche in den Kühlschrank (stratifizieren), um die Keimfähigkeit der Samen anzuregen. Setzen Sie die Samen dann circa einen Zentimeter tief in feuchtes Anzuchtsubstrat oder sandige Bonsaierde. Decken Sie das Anzuchtgefäß mit Klarsichtfolie ab, die Sie mit Löchern versehen. So ist die Erde vor Austrocknung geschützt. Alle zwei bis drei Tage sollten Sie die Folie für 2 Stunden entfernen. Das beugt einer Schimmelbildung auf der Anzuchterde vor. Stellen Sie das Anzuchtgefäß an einen hellen und warmen Ort mit etwa 20° Celsius und halten Sie die Anzuchterde feucht, aber nicht nass. Die Keimdauer beträgt vier bis zehn Wochen. **Standort:** Wählen Sie einen vollsonnigen Standort. **Pflege:** Sorgen Sie für eine ausreichende und gleichmäßige Bewässerung, aber vermeiden Sie Staunässe. Düngen Sie im Zeitraum von Mai bis September im Abstand von 3 Wochen mit einem speziellen Bonsai-Flüssigdünger. Während der Wachstumsphase empfiehlt es sich, die Neuaustriebe regelmäßig auszupfzen. Dickere Triebe und Zweige schneidet man erst im Winter, um den Harzverlust an den Schnittstellen auf die wachstumsfreie Zeit zu beschränken. So muss Ihr Bonsai keine Zusatzkräfte mobilisieren. Während der Wachstumsphase empfiehlt es sich, die Neuaustriebe regelmäßig auszupfzen. Dickere Triebe und Zweige schneidet man erst im Winter, um den Harzverlust an den Schnittstellen auf die wachstumsfreie Zeit zu beschränken. So muss Ihr Bonsai keine Zusatzkräfte mobilisieren. Topfen Sie die Zeder alle drei bis fünf Jahre im Frühjahr (März) um, aber entfernen Sie die Erde nicht vollständig und nehmen Sie auch keine drastischen Wurzelschnitte vor. **Im Winter:** Die Himalaya Zeder ist bis -10° Celsius bedingt winterhart. Am besten überwintert sie aber hell bei 10° bis 15°. Allerdings verfügt die Zeder über eine erstaunliche Fähigkeit zur Regeneration, falls in strengeren Wintern doch Erfrierungserscheinungen auftreten sollten.



Bonsai - Indian Cedar

Cedrus deodara

Mountain-beauty from Nepal - Indoor or Outdoor Bonsai

The Indian Cedar is with its unique growth form for everyone easy to make out. The evergreen conifer tree develops its main branches with hanging tips horizontally and grows this way almost more wide than high. Its blue-green or grey-blue coloured soft needle tussocks are mostly seated on the short sprouts and only randomly found on the longer shoots. The needles with 4 to 5 cm length are considered one of the longest of all cedar species. After blossoming in autumn, the Indian Cedar produces up to 8 cm long cones that neatly stand upright on the branches. **Natural location:** The natural habitat of the Indian Cedar reaches from West Nepal until eastern Afghanistan, where it grows in heights between 1.000 and 3.000 meters above sea level. **Successful cultivation:** Seed propagation indoors is possible throughout the year. To increase the germinability, you should keep the seeds sealed in a plastic bag in the regular refrigerator for about a week. After that, plant the seeds about 1 cm deep into moist potting compost or sandy bonsai earth and cover the seed container with clear film to prevent the earth from drying out. Don't forget to make some holes in the clear film and take it every second or third day completely off for about 2 hours. That way you avoid mold formation on your potting compost. Place the seed container somewhere bright and warm with a temperature around 20° Celsius and keep the earth moist, but not wet. The germination takes about four to ten weeks. **The best location:** The Indian Cedar prefers to be kept in a full sunny spot. **Optimal care:** Water the plant sufficiently and consistently, but without waterlogging. From May until September you may give special fluid fertilizer for bonsai plants every three weeks. During the growth period, it is advisable to pluck out the new sprouts regularly. Stronger branches and twigs are only be cut towards the winter season, to limit the loss of resin through the fresh cuts to the non-growing time of the year. That way, your bonsai doesn't need to mobilize extra strength for proper development. Every three to five years, you should repot your Indian Cedar during spring, preferably in March, but don't take off the whole earth and don't cut the roots dramatically. **In the winter:** The Indian Cedar is limited frost-hard until -10° Celsius, but for hibernation the plant is best be kept in a bright place with temperatures around 10° to 15° Celsius. However, the Indian Cedar has a remarkable ability to regenerate in case a strong winter left its mark on the plant.



Himaalaja seeder

Cedrus deodara

Mägikaunitar Nepalist - sise-/välibonsai

Himaalaja seetri ainulaadne kasvuvorm teeb ta ka võhiku jaoks kohe äratuntavaks, sest igihaljas okaspuu ajab oma põhioksad rippuvate otstega tüvest horisontaalselt ja kasvab seega pea rohkem laiusse kui kõrgusele. Selle sinakasrohelist kuni hallikassinised pehmed okkad seisavad kobarates lühikestel võrsetel ja harvemini pikkadel võrsetel. Nelja kuni viie sentimeetri pikkusega on nad seedrilliikide seas pikimad. Pärast sügisest õitsemist seisavad Cedrus deodara kaheksa sentimeetri pikkused kähkid okstel päris püsti. **Looduslik asukoht:** Piirkond Lääne-Nepalist Ida-Afganistani on Himaalaja seetri looduslik elupaik ja see kasvab seal 1000–3000 meetri kõrgusel. **Edukas kasvatamine:** Kasvatamine on võimalik aastaringiselt. Esmalt asetage seemned nädalaks külmikusse (khihistage), et soodustada seemnete idanemist. PannaSeejärel külvake umbes ühe sentimeetri sügavusele niiskesse kasvusubstraati või liivasesse bonsaimulda. Kata kultuurianum toidukilega, mille varustad aukudega. See kaitseb mulda kuivamise eest. Peaksite fooliumi eemaldama 2 tunniks iga kahe kuni kolme päeva järel. See takistab hallituse teket kasvupinnal. Asetage seemnepott valgusküllasesse ja sooja kohta, mille temperatuur on umbes 20 °C, ning hoidke istutusmuld niiske, kuid mitte märjana. Idanemisperiood on neli kuni kümme nädalat. **Parim asukoht:** Valige täispäikeseline koht. **Optimaalne hooldus:** Kastke piisavat ja ühtlast, kuid vältige vettimist. Väetage maist septembrini iga 3 nädala tagant spetsiaalse bonsai vedelväetisega. Kasvufaasis on soovitatav uued võrsed regulaarselt välja tõmmata. Paksemaid võrseid ja oksa lõigatakse ainult talvel, et piirata vaigu kadu piirpindadel kasvuvaba perioodini. Seega ei pea teie bonsai lisajõude mobiliseerima. Kasvufaasis on soovitatav uued võrsed regulaarselt välja tõmmata. Paksemaid võrseid ja oksa lõigatakse ainult talvel, et piirata vaigu kadu piirpindadel kasvuvaba perioodini. Seega ei pea teie bonsai lisajõude mobiliseerima. Istutage seeder ümber iga kolme kuni viie aasta tagant kevadel (märtsis), kuid ärge eemaldage mulda täielikult ega tehke drastilisi juurelõikusi. **Talvel:** Himaalaja seeder on tinglikult vastupidav kuni -10 °C. Siiski talvitub see kõige paremini eredas valguses temperatuuril 10° kuni 15°. Seedril on aga hämmastav taastumisvõime, kui karmidel talvedel tekivad külmumisnähud.



Himalajan setri

Cedrus deodara

Vuoristokaune Nepalista - sisäbonsai / ulkobonsai

Himalajan setrin ainutlaatuinen kasvumuoto tekee sen myös välittömästi tunnistettavaksi maallikolle, sillä ikivihreä havupuu ajaa pääoksansa riippuvilla kärjillä vaakasuoraan rungosta ja kasvaa siten lähes leveämmäksi kuin korkeuteen. Sen sinivihreät tai harmaansiniset pehmeät neulat seisovat ryhmissä lyhyillä versoilla ja satunnaisesti pitkällä versolla. Neljästä viiteen senttimetriä pituudellaan ne ovat pisimpiä setrilajeista. Syyskuukinnan jälkeen Cedrus deodaran kahdeksan senttimetriä pitkät käpyt seisovat melko pystyssä oksilla. **Luonnollinen sijainti:** Alue Länsi-Nepalista Itä-Afganistaniin on Himalajan setrin luonnollinen elinympäristö ja se kasvaa siellä 1 000 - 3 000 metrin korkeudessa. **Onnistunut viljely:** Viljely on mahdollista ympäri vuoden. Aseta siemenet ensin jääkaappiin (kerrostumaan) viikoksi, jotta siemenet itävät. LaittaaKylvä sitten noin sentin syvyyteen kosteaan kasvualustaan tai hiekkaiseen bonsai-maahan. Peitä viljelyastia kelmulla, johon on tehty reikiä. Tämä suojaa maaperää kuivumiselta. Poista folio 2 tunnin ajaksi kahden tai kolmen päivän välein. Tämä estää homeen muodostumisen kasvumaahan. Aseta siemenruukku valoisaan ja lämpimään paikkaan, jonka lämpötila on noin 20 °C, ja pidä istutusmaa kosteana, mutta ei märkänä. Itämisaika on neljästä kymmeneen viikkoa. **Paras sijainti:** Valitse aurinkoinen paikka. **Optimaalinen hoito:** Kastele riittävästi ja tasaisesti, mutta välttä kastumista. Lannoita 3 viikon välein toukokuusta syyskuuhun erityisellä nestemäisellä bonsai-lannoitteella. Kasvuvaiheessa on suositeltavaa vetää uudet versot säännöllisesti pois. Paksumpia versoja ja oksia leikataan vain talvella, jotta hartsin hävikki rajapinnoilla rajoitetaan kasvuvapaaseen aikaan. Bonsai ei siis tarvitse mobilisoida lisävoimia. Kasvuvaiheessa on suositeltavaa vetää uudet versot säännöllisesti pois. Paksumpia versoja ja oksia leikataan vain talvella, jotta hartsin hävikki rajapinnoilla rajoitetaan kasvuvapaaseen aikaan. Bonsai ei siis tarvitse mobilisoida lisävoimia. Istuta setri uudelleen kolmen tai viiden vuoden välein keväällä (maaliskuussa), mutta älä poista maaperää kokonaan tai tee rajuja juurileikkauksia. **Talvella:** Himalajan setri kestää ehdollisesti -10 astetta. Se kuitenkin lepotilassa parhaiten kirkkaassa valossa 10° - 15°. Setrillä on kuitenkin hämmästyttävä kyky uusiutua, jos merkkejä palautumasta ilmenee ankarien talvien aikana.



Cèdre de l'Himalaya

Cedrus deodara

Beauté des montagnes de Népal - Bonsai pour la chambre ou le jardin

La forme de croissance unique du cèdre de l'Himalaya fait de lui un arbre pour les laïcs, car le conifère sempervirent pousse ses branches primaires avec les bouts pendants perpendiculairement au tronc et croît presque plus en largeur qu'en hauteur. Ses aiguilles douces vert clair à gris-bleu sont réunies en bouquets sur les petits rameaux et plutôt isolées sur les rameaux longs. Avec une longueur de quatre à cinq centimètres, elles comptent parmi les aiguilles les plus longues de tous les cèdres. Les beaux pommes de pin du cèdre de l'Himalaya de huit centimètres de long se tiennent droites sur les rameaux après la floraison en automne. **Emplacement naturel:** L'aire de distribution du cèdre de l'Himalaya s'étend de l'ouest du Népal à l'est de l'Afghanistan. Là-bas, il croît à des altitudes de 1 000 à 3 000 mètres. **Culture réussie:** La culture des graines est possible tout au long de l'année. Pour améliorer la faculté germinative des graines, vous devez d'abord mettre les graines dans le réfrigérateur pendant une semaine (stratifier). Ensuite, mettez les graines dans du substrat humide ou dans du terreau bonsai sableux à environ un centimètre de profondeur. Couvrez le récipient avec une feuille transparente dans laquelle vous faites des trous. Comme ça, le terreau est protégé du dessèchement. Vous devez enlever la feuille pendant deux heures tous les deux ou trois jours. Ceci prévient la formation de moisissures dans le terreau. Mettez le récipient dans un endroit lumineux et chaud à environ 20° Celsius et gardez le terreau humide, mais pas mouillé. La germination dure quatre à dix semaines. **Le meilleur emplacement:** Choisissez un emplacement en plein soleil. **Soins optimaux:** Arrosez la plante régulièrement et suffisamment, mais évitez l'eau stagnante. Engraissez-la toutes les trois semaines de mai à septembre avec de l'engrais liquide spécial pour bonsai. Il est conseillé de tailler les nouvelles pousses régulièrement pendant la phase de croissance. Les rameaux plus denses ne sont coupés qu'en hiver, afin de limiter la perte de résine pendant la période sans croissance. Votre bonsai ne doit pas exercer d'énergie supplémentaire. Rempotez le cèdre tous les trois à cinq ans en printemps (mars), mais n'enlevez pas la terre totalement et ne taillez pas les racines drastiquement. **En hiver:** Le cèdre de l'Himalaya est totalement rustique jusqu'à -10° Celsius. Il hiverne le mieux dans un endroit lumineux entre 10° et 15° Celsius. Cependant, le cèdre dispose d'une capacité étonnante à se régénérer, au cas où des gelures apparaissent pendant les hivers plus sévères.



Κέδρος Ιμαλαΐων

Cedrus deodara

Ορεινή ομορφιά από το Νεπάλ - μπονσάι εσωτερικού χώρου / μπονσάι εξωτερικού χώρου

Η μοναδική μορφή ανάπτυξης του κέδρου των Ιμαλαΐων τον καθιστά επίσης άμεσα αναγνωρίσιμο για τους απλούς, επειδή το αειθαλές κωνοφόρο οδηγεί τα κύρια κλαδιά του με τις κρεμαστές άκρες οριζόντια από τον κορμό και έτσι μεγαλώνει σχεδόν περισσότερο σε πλάτος παρά σε ύψος. Οι γαλαζοπράσινες έως γκρι-μπλε, μαλακές βελόνες του στέκονται σε ομάδες στους κοντές βλαστούς και πιο σποραδικά στους μακριούς βλαστούς. Με μήκος από τέσσερα έως πέντε εκατοστά, είναι από τα μεγαλύτερα από όλα τα είδη κέδρου. Μετά τη φθινοπωρινή ανθοφορία, οι κώνοι μήκους οκτώ εκατοστών του Cedrus deodara στέκονται αρκετά όρθιοι στα κλαδιά. **Φυσική τοποθεσία:** Η περιοχή από το δυτικό Νεπάλ έως το ανατολικό Αφγανιστάν είναι ο φυσικός βιότοπος του κέδρου των Ιμαλαΐων και φύεται εκεί σε υψόμετρα από 1.000 έως 3.000 μέτρα. **Επιτυχημένη καλλιέργεια:** Η καλλιέργεια είναι δυνατή όλο το χρόνο. Τοποθετήστε πρώτα τους σπόρους στο ψυγείο (στρωματοποιήστε) για μια εβδομάδα για να ενθαρρύνετε τους σπόρους να βλαστήσουν. Βάλε τα στη συνέχεια, σπόροι σε βάθος περίπου ενός εκατοστού σε υγρό υπόστρωμα ανάπτυξης ή αμμόδες έδαφος μπονσάι. Καλύψτε το δοχείο καλλιέργειας με μεμβράνη, την οποία ανοίγετε με τρύπες. Αυτό προστατεύει το έδαφος από το στέγνωμα. Θα πρέπει να αφαιρείτε το αλουμινοχαρτό για 2 ώρες κάθε δύο έως τρεις ημέρες. Αυτό αποτρέπει τη δημιουργία μούχλας στο αναπτυσσόμενο έδαφος. Τοποθετήστε τη γλάστρα σε ένα ελαφρύ και ζεστό μέρος με θερμοκρασία περίπου 20° Κελσίου και διατηρήστε το χώμα της γλάστρας υγρό αλλά όχι υγρό. Η περίοδος βλάστησης είναι τέσσερις έως δέκα εβδομάδες. **Η καλύτερη τοποθεσία:** Επιλέξτε μια τοποθεσία με πλήρη ηλιοφάνεια. **Βέλτιστη φροντίδα:** Παρέχετε επαρκές και ομοιόμορφο πότισμα, αλλά αποφύγετε το πότισμα. Λιπάνετε κάθε 3 εβδομάδες από Μάιο έως Σεπτέμβριο με ειδικό υγρό λίπασμα μπονσάι. Κατά τη φάση της ανάπτυξης, συνιστάται να βγάζετε τακτικά τους νέους βλαστούς. Οι παχύτεροι βλαστοί και τα κλαδιά κόβονται μόνο το χειμώνα για να περιοριστεί η απώλεια ρητίνης στις διαεπαφές στην περίοδο χωρίς ανάπτυξη. Έτσι το μπονσάι σας δεν χρειάζεται να κινητοποιήσει πρόσθετες δυνάμεις. Επανατοποθετείτε τον κέδρο κάθε τρία έως πέντε χρόνια την άνοιξη (Μάρτιο), αλλά μην αφαιρέσετε τελείως το χώμα ή μην κάνετε δραστηκ κοψίματα ριζας. **Το χειμώνα:** Ο κέδρος των Ιμαλαΐων είναι υπό όρους ανθεκτικός στους -10° Κελσίου. Ωστόσο, αδρανοποιεί καλύτερα σε έντονο φως στις 10° έως 15°. Ωστόσο, ο κέδρος έχει μια εκπληκτική ικανότητα να αναγεννάται εάν εμφανιστούν σημάδια κρουπαγιάματος κατά τη διάρκεια των έντονων χειμώνων.



Cedar Himalayan

Cedrus deodara

Áilleacht sléibhe ó Neipeal - bonsai laistigh / bonsai lasmuigh

Mar gheall ar fhoirm fáis uathúil an cedar Himalayan freisin tá sé inaitheanta láithreach don duine tuata, toisc go dtiomáineann an bhuaircínéach síorghlas a phríomh-bhrainsí leis na leideanna crochta go cothrománach ón stoc agus mar sin fásann sé beagnach níos mó ar leithead ná mar a airde. Seasann a shnáthaidí boga ó ghorm-uaine go liathghorm i mbraislí ar na heitleoga gearra agus níos minicí ar na prácháin fhada. Le fad idir ceithre agus cúig ceintiméadar, tá siad i measc na speiceas cedar is faide. Tar éis bhláth an fhómhair, seasann na cóin ocht ceintiméadar ar fad den Cedrus deodara ina seasamh go leor ar na brainsí. **Suíomh nádúrtha:** Is é an réigiún ó iarthar Neipeal go dtí oirthear na hAfganastáine gnáthóg nádúrtha an Céadar Himalayan agus fásann sé ann ag airde 1,000 go 3,000 méadar. **Saothrú rathúil:** Is féidir saothrú ar feadh na bliana. Cuir na síolta sa chuisneoir ar dtús (srathú) ar feadh seachtaine chun na síolta a spreagadh chun péacadh. Cuir anAnsin síol timpeall ceintiméadar ar doimhneacht i bhfoshraith tais atá ag fás nó in ithir bonsai ghainmheach. Clúdaigh an soitheach cultúir le scannán cling, a sholáthraíonn tú le poill. Cosnaíonn sé seo an ithir ó thriomú amach. Ba chóir duit an scragall a bhaint ar feadh 2 uair gach dhá nó trí lá. Cuireann sé seo cosc ar mhúnlú a fhoirmiú ar an ithir atá ag fás. Cuir an pota síolta in áit éadrom te thart ar 20° Celsius agus coinnigh an ithir potaithe tais ach ná bíodh sé fliuch. Is é an tréimhse péacadh ná ceithre go deich seachtaine. **An suíomh is fearr:** Roghnaigh suíomh gréine iomlán. **Cúram is fearr is féidir:** Cuir uisce leordhóthanach agus cothrom ar fáil, ach seachain uiscedhath. Fertilize gach 3 seachtaine ó Bhealtaine go Meán Fómhair le leasachán speisialta bonsai leachtach. Le linn na céime fáis, tá sé innmholtu na shoots nua a tharraingt amach go rialta. Ní ghearrtar shoots níos tiús agus craobhóga ach amháin sa gheimhreadh chun cailteanas roisín ag na comhéadain a theorannú don tréimhse fáis. Mar sin ní gá do bonsai fórsaí breise a shloádh. Déan an cedar a athchur gach trí go cúig bliana san earrach (Márta), ach ná bain an ithir go hiomlán nó déan bearrtha fréamhacha drastic. **Sa gheimhreadh:** Tá an cedar Himalayan crua coinníollach go -10° Celsius. Mar sin féin, is fearr a gheimhriónn sé i solas geal ag 10° go 15°. Mar sin féin, tá cumas iontach ag an Cedar athghiniúint má tharlaíonn comharthaí frostbite le linn gheimhreadh crua.



Himalaja sedrusviður

Cedrus deodara

Fjallafegurð frá Nepal - bonsai inni / úti bonsai

Einstakt vaxtarform himalayasedrusins gerir það líka strax auðþekktanlegt fyrir leikmanninn því sígræna barrtréð rekur helstu greinar sínar með hangandi oddunum lárétt frá stofninum og vex því næstum meira á breidd en á hæð. Blágrænar til grábláar, mjúkar nálár hans standa í byrpingum á stuttum sprotum og óslitnar á löngum sprotum. Þeir eru fjórir til fimm sentimetrar að lengd og eru meðal lengstu sedrusviðategunda. Eftir haustblóma standa átta sentimetra langar keilur Cedrus deodara nokkuð uppréttar á greinum. **Náttúruleg staðsetning:** Svæðið frá vesturluta Nepal til austurluta Afganistan er náttúrulegt búsvæði Himalayasedrusins og vex þar í 1.000 til 3.000 metra hæð. **Árangursrík ræktun:** Ræktun er möguleg allt árið um kring. Settu fyrst fræin í ísskápin (lagskipt) í viku til að hvetja fræin til að spíra. SettuFræið síðan um eins sentimetra djúpt í röku vaxtarlagi eða sandi bonsai jarðvegi. Hyljið ræktunarlátið með matarfilmu, sem þú útvegar með götum. Þetta verndar jarðvegin gegn þurrkun. Þú ættir að fjarlægja álpappírinn í 2 klukkustundir á tveggja til þriggja daga fresti. Þetta kemur í veg fyrir að mygla myndist á vaxandi jarðvegi. Settu fræpottinn á létta og heitan stað með um 20°C og haltu pottajarðveginum rökum en ekki blautum. Spírunartíminn er fjórar til tíu vikur. **Besta staðsetningin:** Veldu staðsetningu fyrir fulla sól. **Besta umönnun:** Veittu næga og jafna vökvun, en forðastu vatnslosun. Frjógvaðu á 3 vikna fresti frá maí til september með sérstökum Bonsai fljótandi áburði. Á meðan á vaxtarskeiðinu stendur er ráðlegt að draga reglulega út nýju sprotana. Þykkari sprotar og kvistir eru aðeins skornir á veturna til að takmarka tap á trjákvöðu við tengi við vaxtarlausu tímabilið. Þannig að bonsaiinn þinn þarf ekki að virkja neina viðbótarsveitir. Á meðan á vaxtarskeiðinu stendur er ráðlegt að draga reglulega út nýju sprotana. Þykkari sprotar og kvistir eru aðeins skornir á veturna til að takmarka tap á trjákvöðu við tengi við vaxtarlausu tímabilið. Þannig að bonsaiinn þinn þarf ekki að virkja neina viðbótarsveitir. Endurpottaðu sedrusviðið á þriggja til fimm ára fresti á vorin (mars), en fjarlægðu ekki jarðvegin alveg eða gerðu róttækar rætur. **Á veturna:** Himalayasedrusviðurinn er harðgerður með skilyrðum allt að -10° á Celsius. Hins vegar fer hann best í dvali í björtu ljósi á 10° til 15°. Hins vegar hefur sedrusviðið ótrúlega hæfileika til að endurnýjast ef merki um frostbit ættu að koma fram á erfiðum vetrum.



Cedro dell'Himalaya

Cedrus deodara

Bellezza dalle montagne del Nepal - Bonsai da appartamento / Bonsai da esterno

La peculiare forma del Cedro dell'Himalaya è riconoscibile anche dai profani, in quanto questa conifera sempreverde sviluppa i rami principali dal tronco in direzione orizzontale, con estremità pendule e cresce tanto velocemente in altezza quanto in ampiezza. Le sue foglie aghiformi verde-bluastre fino a grigio-blu sono raggruppate in ciuffi sui brachiblasti, mentre sono piuttosto diradate sui macroblasti. Con la loro lunghezza, dai quattro ai cinque centimetri, sono le più lunghe appartenenti alle specie dei cedri. Dopo la fioritura autunnale, le pigne lunghe otto centimetri del Cedrus deodara spuntano ben dritte sui rami. **Posizione naturale:** La regione del Nepal occidentale fino all'Afganistan orientale costituisce l'habitat naturale del Cedro dell'Himalaya, che cresce in quelle zone ad altitudini fra i 1000 e i 3000 metri. **Coltivazione riuscita:** La coltivazione da semi in casa è possibile durante tutto l'anno. Lasciate i semi per una settimana in frigorifero (stratificazione), per aumentarne la germinabilità. In seguito collocate i semi a circa un centimetro di profondità nel substrato di coltivo umido, o in terra sabbiosa per bonsai. Coprite il recipiente di coltivazione con pellicola trasparente, sulla quale praticherete dei fori, in questo modo la terra eviterà di seccarsi. Ogni due o tre giorni rimuovete la pellicola per 2 ore, per prevenire la formazione di muffe sulla terra. Collocate il recipiente di coltivazione in un luogo luminoso e caldo, a una temperatura attorno ai 20°C e mantenete il substrato umido, ma non bagnato. La germinazione avverrà da quattro a dieci settimane dopo. **La posizione migliore:** Scegliete un punto in pieno sole. **Cura ottimale:** Innaffiate sufficientemente e in maniera regolare, evitando i ristagni idrici. Da maggio a settembre concimate ogni 3 settimane, con un fertilizzante liquido speciale per bonsai. Durante la fase di crescita si consiglia di estirpare regolarmente i nuovi germogli. Solo in inverno sarà possibile tagliare i getti più spessi e i rami, per non limitare la perdita di resina al posto dei tagli al di fuori del periodo di crescita. In questo modo il vostro bonsai non dovrà impiegare alcuno sforzo ulteriore. Rinasate il Cedro ogni tre-cinque anni in primavera (marzo), ma non rimuovete completamente la terra e non operate alcun taglio drastico delle radici. **In inverno:** Il Cedro dell'Himalaya è resistente al freddo fino a una temperatura di -10° C. E' preferibile lo svernamento fra i 10° e i 15° C. In generale il Cedro possiede una sorprendente capacità di rigenerarsi, nel caso che geli durante inverni particolarmente rigidi.



Himalajski cedar

Cedrus deodara

Planinska ljepotica iz Nepala - indoor bonsai / outdoor bonsai

Jedinstveni oblik rasta himalajskog cedra čini ga odmah prepoznatljivim i laicima, jer zimzelena crnogorica svoje glavne grane s višećim vrhovima tjera vodoravno od debla i tako raste gotovo više u širinu nego u visinu. Njegove plavo-zelene do sivo-plave, meke iglice stoje u grozdovima na kratkim izbojima, a sporadično na dugim izbojima. S dužinom od četiri do pet centimetara, oni su među najdužima od svih vrsta cedra. Nakon jesenskog cvata češeri Cedrus deodara dugi osam centimetara stoje prilično uspravno na granama. **Zemlja porijekla:** Područje od zapadnog Nepala do istočnog Afganistana prirodno je stanište himalajskog cedra i ondje raste na visinama od 1000 do 3000 metara. **Uspješan uzgoj:** Uzgoj je moguć tijekom cijele godine. Prvo stavite sjeme u hladnjak (stratificirajte) na tjedan dana kako biste potaknuli klijanje sjemena. Stavite zatim posadite oko jedan centimetar duboko u vlažnu podlogu za uzgoj ili pjeskovito tlo za bonsai. Posudu s kulturom prekriti prozirnom folijom koju se opremili rupama. To štiti tlo od isušivanja. Svaka dva do tri dana skinite foliju na 2 sata. Time se sprječava stvaranje plijesni na tlu za uzgoj. Stavite posudu za sjeme na svijetlo i toplo mjesto s oko 20° Celzija i održavajte tlo u posudi vlažnim, ali ne mokrim. Razdoblje klijanja je četiri do deset tjedana. **Najbolja lokacija:** Odaberite sunčano mjesto. **Optimalna njega:** Osigurajte dovoljno i ravnomjerno zalijevanje, ali izbjegavajte nakupljanje vode. Gnojite svaka 3 tjedna od svibnja do rujna posebnim tekućim gnojivom za bonsai. U fazi rasta preporučljivo je redovito čupati nove izdanke. Deblje mladice i graničice režu se samo zimi kako bi se ograničio gubitak smole na međuprostorima do razdoblja bez rasta. Dakle, vaš bonsai ne mora mobilizirati nikakve dodatne snage. U fazi rasta preporučljivo je redovito čupati nove izdanke. Deblje mladice i graničice režu se samo zimi kako bi se ograničio gubitak smole na međuprostorima do razdoblja bez rasta. Dakle, vaš bonsai ne mora mobilizirati nikakve dodatne snage. Presadite cedar svake tri do pet godina u proljeće (ožujak), ali nemojte potpuno uklanjati tlo ili drastično podrezati korijenje. **U zimi:** Himalajski cedar je uvjetno otporan na -10°C. Ipak, najbolje hibernira pri jakom svjetlu na 10° do 15°. Međutim, cedar ima nevjerojatnu sposobnost regeneracije ako se tijekom jakih zima pojave znakovi ozeblina.



Himalaju ciedrs

Cedrus deodara

Kalnu skaistums no Nepālas - iekštelpu pundurkociņš / āra pundurkociņš

Himalaju ciedra unikālā augšanas forma padara to uzreiz atpazīstamu arī nespeciālistam, jo mūžzaļais skujkoks savus galvenos zarus ar nokarenajiem galiem dzen horizontāli no stumbra un tādējādi aug gandrīz vairāk platumā nekā augstumā. Tās zili zaļas līdz pelēkzilas mīkstās adatas sastājas ķekarus uz īsajiem dzinumiem un sporādiskāk uz garajiem dzinumiem. Ar garumu no četriem līdz pieciem centimetriem tie ir vieni no garākajiem no visām ciedru sugām. Pēc rudens ziedēšanas Cedrus deodara astoņus centimetrus garie čiekuri zaros stāv diezgan stāvus. **Dabiska vieta:** Reģions no Nepālas rietumiem līdz Afganistānas austrumiem ir Himalaju ciedra dabiskais biotops, un tas tur aug 1000 līdz 3000 metru augstumā. **Veiksmīga audzēšana:** Audzēšana iespējama visu gadu. Vispirms ievietojiet sēklas ledusskapī (stratificējiet) uz nedēļu, lai veicinātu sēklu dīgšanu. Ielieciet Pēc tam sējiet apmēram viena centimetra dziļumā mitrā augšanas substrātā vai smilšainā pundurkociņa augsnē. Nosedziet kultivēšanas trauku ar pārtikas plēvi, kuru nodrošina ar caurumiem. Tas pasargā augsni no izžūšanas. Jums vajadzētu noņemt foliju 2 stundas ik pēc divām līdz trim dienām. Tas novērš pelējuma veidošanos augošajā augsnē. Novietojiet sēklu podu gaišā un siltā vietā ar aptuveni 20°C un turiet augsni mitru, bet ne mitru. Dīgšanas periods ir četras līdz desmit nedēļas. **Labākā atrašanās vieta:** Izvēlieties vietu ar pilnu sauli. **Optimāla aprūpe:** Nodrošiniet pietiekamu un vienmērīgu laistīšanu, taču izvairieties no aizsērēšanas. Mēslojiet ik pēc 3 nedēļām no maija līdz septembrim ar īpašu pundurkociņš šķidro mēslojumu. Augšanas fāzē ir vēlams regulāri izvilkt jaunus dzinumus. Biezākus dzinumus un zarus nogriež tikai ziemā, lai ierobežotu sveķu zudumu saskarnēs līdz periodam bez augšanas. Tātad jūsu pundurkociņam nav jāmobilizē nekādi papildu spēki. Augšanas fāzē ir vēlams regulāri izvilkt jaunus dzinumus. Biezākus dzinumus un zarus nogriež tikai ziemā, lai ierobežotu sveķu zudumu saskarnēs līdz periodam bez augšanas. Tātad jūsu pundurkociņam nav jāmobilizē nekādi papildu spēki. Pārstādiet ciedru ik pēc trim līdz pieciem gadiem pavasarī (martā), taču nenoņemiet augsni pilnībā un neizgrieziet saknes. **Ziemā:** Himalaju ciedrs ir nosacīti izturīgs līdz -10°C. Tomēr tas vislabāk pārzīmo spilgtā gaismā no 10° līdz 15°. Tomēr ciedram ir pārsteidzoša spēja atjaunoties, ja bargās ziemās parādās apsaldējuma pazīmes.



Himalaju kedras

Cedrus deodara

Kalnu gražuolē iš Nepalo – kambariniai bonsai / lauko bonsai

Unikāli Himalaju kedro augimo forma leidžia jį iš karto atpažinti ir pasauliečiui, nes visžalis spygliuočiai savo pagrindines šakas kabančiomis viršūnėlėmis varo horizontaliai nuo kamieno ir taip auga beveik daugiau į plotį nei į aukštį. Jo melsvai žalios ir pilkai mėlynos spalvos minkštos spygliai išsidėstę ant trumpų ūglių ir retkarčiais ant ilgų ūglių. Nuo keturių iki penkių centimetrų ilgio jie yra vieni iš ilgiausių iš visų kedrų rūšių. Po rudens žydėjimo aštuonių centimetrų ilgio Cedrus deodara kūgiai stovi gana stačiai ant šakų. **Natūrali vieta:** Regionas nuo vakarų Nepalo iki rytų Afganistano yra natūrali Himalaju kedro buveinė ir ten auga 1000–3000 metrų aukštyje. **Sėkmingas auginimas:** Galima auginti ištisus metus. Pirmiausia įdėkite sėklas į šaldytuvą (sluoksniuokite) savaitę, kad paskatintumėte sėklų daigumą. Įdėti Tada sėkite maždaug vieno centimetro gyliu į drėgną auginimo substratą arba smėlingą bonsų žemę. Kultūros indą uždenkite maistine plėvele, kurioje yra skylės. Tai apsaugo dirvą nuo išdžiūvimo. Kas dvi ar tris dienas 2 valandas nuimkite foliją. Tai neleids augančioje dirvoje susidaryti pelėsiui. Sėklų vazoną padėkite į šviesią ir šiltą vietą, kurios temperatūra yra apie 20 °C, o vazono žemė turi būti drėgna, bet ne šlapia. Dygimo laikotarpis yra nuo keturių iki dešimties savaičių. **Geriausia vieta:** Pasirinkite saulėtą vietą. **Optimali priežiūra:** Tinkamai ir tolygiai laistykite, tačiau venkite užmirkimo. Tręškite kas 3 savaites nuo gegužės iki rugsėjo specialiomis bonsų skystosiomis trąšomis. Augimo fazėje patartina reguliariai ištraukti naujus ūglius. Storesni ūgliai ir šakelės pjaujami tik žiemą, kad dervos netektų sąsajos iki neaugimo laikotarpio. Taigi jūsų bonsui nereikia mobilizuoti jokių papildomų jėgų. Augimo fazėje patartina reguliariai ištraukti naujus ūglius. Storesni ūgliai ir šakelės pjaujami tik žiemą, kad dervos netektų sąsajos iki neaugimo laikotarpio. Taigi jūsų bonsui nereikia mobilizuoti jokių papildomų jėgų. Persodinkite kedrą kas trejus ar penkerius metus pavasarį (kovo mėnesį), tačiau visiškai nepašalinkite dirvožemio ir nedarykite drastiškų šaknų. **Ziemą:** Himalaju kedras yra sąlyginai atsparus -10 ° C temperatūrai. Tačiau geriausiai žiemoja esant ryškiai šviesai nuo 10° iki 15°. Tačiau kedras turi nuostabų gebėjimą atsinaujinti, jei atšiauriomis žiemomis atsiranda nušalimo požymių.



Čedru tal-Himalaja

Cedrus deodara

Sbuñjiva tal-muntanji min-Nepal - bonsai ġewwa / bonsai barra

Il-forma unika ta 'tkabbir tač-čedru tal-Himalaja tagħmilha wkoll immedjatament rikonoxxibbli għall-layperson, minħabba li l-konifera Evergreen issuq il-fergħat ewlenin tagħha bit-truf imdendlin orizzontalmment mit-tronk u għalhekk tikber kważi aktar fil-wisa' milli fl-gholi. Il-labar artab tiegħu ta' blu-aħdar għal griz-blū joqgħodu fi gruppi fuq ir-rimjiet qosra u aktar sporadikament fuq ir-rimjiet twal. B'tul ta 'erba' sa hames centimetri, huma fost l-itwal mill-ispeċi kollha tač-čedru. Wara l-fjur tal-harifa, il-koni twal ta 'tmien centimetri tač-Cedrus deodara joqgħodu pjuttost wiegħa fuq il-fergħat. **Post naturali:** Ir-reġjun mill-punent tan-Nepal sal-Lvant tal-Afganistan huwa l-ħabitat naturali tač-čedru tal-Himalaja u jikkber hemmhekk f'altitudni ta '1,000 sa 3,000 metru. **Kultivazzjoni b'suċċess:** Il-kultivazzjoni hija possibbli s-sena kollha. L-ewwel poġġi ż-żrieragħ fil-frigġ (stratifika) għal ġimgha biex tinkoragġixxi ż-żrieragħ biex jiġġerminaw. Poġġi l-lmbagħad żerriegħa madwar centimetru fond f'sottostrat ta 'tkabbir niedja jew ħamrija ramlija tal-bonsai. Għatti l-bastiment tal-kultura b'cling film, li inti tipprovi b'toqob. Dan jipproteġi l-ħamrija milli tinxe. Għandek tneħħi l-folj għal sagħtejn kull jumejn jew tlett ijiem. Dan jipprevjeni l-iffurmar tal-moffa fuq il-ħamrija li qed tikber. Poġġi l-borma tač-żerriegħa f'post ħafif u shun b'madwar 20° Celsius u żomm il-ħamrija tal-qasari niedja iżda mhux imxarrba. Il-perjodu tal-ġerminazzjoni huwa ta 'erba' sa għaxar ġimghat. **L-aħjar post:** Aghżel post tax-xemx shif. **Kura ottimali:** Ipprovi tisqija adegwata u uniformi, imma evita l-ilma. Fertilizza kull ġimghatejn 3 minn Mejju sa Settembru b'fertilizzant likwidu speċjali tal-bonsai. Matul il-fażi tač-tkabbir, huwa rakkomandabbli li regolarmment iġbed ir-rimjiet il-ġodda. Ir-rimjiet u l-friegħi eħxen jinqatgħu biss fix-xitwa biex jillimitaw it-telf tar-reżina fl-interfaces għall-perjodu mingħajr tkabbir. Allura l-bonsai tiegħek m'għandux għalfejn jimmobilizza xi forzi addizzjonali. Matul il-fażi tač-tkabbir, huwa rakkomandabbli li regolarmment iġbed ir-rimjiet il-ġodda. Ir-rimjiet u l-friegħi eħxen jinqatgħu biss fix-xitwa biex jillimitaw it-telf tar-reżina fl-interfaces għall-perjodu mingħajr tkabbir. Allura l-bonsai tiegħek m'għandux għalfejn jimmobilizza xi forzi addizzjonali. Repot ič-čedru kull tlieta sa hames snin fir-rebbiegħa (Marzu), imma tneħħi l-ħamrija kompletament jew tagħmel tirqim drastiku ta 'l-għeruq. **Fix-xitwa:** Ič-čedru tal-Himalaja huwa kondizzjonali rezistenti għal -10 ° Celsius. Madankollu, hibernates aħjar f'dawl qawwi f'10 ° sa 15 °. Madankollu, ič-čedru għandu kapaċità aqwa li jirriġenera jekk isehħu sinjali ta 'għata matul xtiwii ħorox.



Bonsai - Himalaya Ceder

Cedrus deodara

Bergschoonheid uit Nepal - indoor bonsai / outdoor bonsai

De unieke groeivorm van de Himalaya cedar maakt hem ook voor de leek direct herkenbaar, want de groenblijvende conifeer drijft zijn hoofdtakken met de hangende toppen horizontaal uit de stam en groeit daarmee bijna meer in de breedte dan in de hoogte. Hun blauwgroene tot grijsblauwe zachte naalden staan in clusters op de korte scheuten en af en toe op de lange scheuten. Met een lengte van vier tot vijf centimeter behoren ze tot de langste van alle ceder soorten. Na de herfstbloei staan de acht centimeter lange kegels van de Cedrus deodara mooi rechtop op de takken. **Natuurlijke locatie:** De regio van het westen van Nepal tot het oosten van Afghanistan vormt de natuurlijke habitat van de Himalaya cedar en groeit daar op hoogtes van 1.000 tot 3.000 meter. **Succesvolle teelt:** Teelt is het hele jaar mogelijk. Zet de zaden eerst een week in de koelkast (stratify) om de kieming van de zaden te stimuleren. Plaats de zaden vervolgens ongeveer een centimeter diep in vochtig groeimedium of zanderige bonsaistof. Dek de kweekbak af met vershoudfolie, die u van gaten heeft voorzien. Dit beschermt de aarde tegen uitdroging. Om de twee tot drie dagen moet u de film gedurende 2 uur verwijderen. Dit voorkomt schimmelvorming op de teeltgrond. Zet de kweekbak op een lichte en warme plaats met circa 20 ° Celsius en houd de kweekgrond vochtig, maar niet nat. De kiempriode is vier tot tien weken. **De beste locatie:** Kies een locatie in de volle zon. **Optimale verzorging:** Zorg voor voldoende en gelijkmatige watering, maar vermijd wateroverlast. Bemest van mei tot september elke 3 weken met een speciale vloeibare bonsaimeststof. Tijdens de groeifase is het raadzaam om de nieuwe scheuten regelmatig te plukken. Dikkere scheuten en twijgen worden alleen in de winter doorgesneden om het verlies van hars aan de grensvlakken naar de niet-groeiperiode te beperken. Uw bonsai hoeft dus geen extra krachten te mobiliseren. Tijdens de groeifase is het raadzaam om de nieuwe scheuten regelmatig te plukken. Dikkere scheuten en twijgen worden alleen in de winter doorgesneden om het harsverlies aan de grensvlakken naar de groeivrije periode te beperken. Uw bonsai hoeft dus geen extra krachten te mobiliseren. Verpot de cedar in het voorjaar (maart) om de drie tot vijf jaar, maar verwijder de grond niet volledig en snoei de wortels niet drastisch. **In de winter:** De Himalaya cedar is gedeeltelijk winterhard tot -10 ° Celsius. Maar hij overwintert het beste bij 10 ° tot 15 °. De cedar heeft echter een verbazingwekkend vermogen om te regenereren, mocht er in de strengere winters bevrozing optreden.



Himalaya sedertre

Cedrus deodara

Fjellskjønnhet fra Nepal - innendørs bonsai / utendørs bonsai

Den unike vekstformen til Himalaya-sederen gjør den også umiddelbart gjenkjennelig for lekmannen, fordi det eviggrønne bartræret driver sine hovedgrener med hengende spisser horisontalt fra stammen og vokser dermed nesten mer i bredden enn i høyden. Dens blågrønne til gråblå, myke nåler står i klynger på de korte skuddene og mer sporadisk på de lange skuddene. Med en lengde på fire til fem centimeter er de blant de lengste av alle sedertrearter. Etter høstoppblomstringen står de åtte centimeter lange konglene til Cedrus deodara ganske oppreist på greinene. **Naturlig beliggenhet:** Regionen fra det vestlige Nepal til det østlige Afghanistan er det naturlige habitatet til Himalaya-sederen, og den vokser der i høyder på 1000 til 3000 meter. **Vellykket dyrking:** Dyrking er mulig hele året. Legg først frøene i kjøleskapet (stratifiser) i en uke for å oppmuntre frøene til å spire. Sett frø deretter ca. en centimeter dypt i fuktig vekstsubstrat eller sandig bonsaijord. Dekk kulturkaret med matfilm, som du forsyner med hull. Dette beskytter jorda mot å tørke ut. Du bør fjerne folien i 2 timer annenhver til tredje dag. Dette forhindrer at det dannes mugg på den voksende jorda. Sett frøpotten på et lett og varmt sted med rundt 20° Celsius og hold pottejorda fuktig, men ikke våt. Spiretiden er fire til ti uker. **Den beste beliggenheten:** Velg et sted for full sol. **Optimal omsorg:** Sørg for tilstrekkelig og jevn vanning, men unngå vannlogging. Gjødsele hver 3. uke fra mai til september med en spesiell bonsai flytende gjødsel. I vekstfasen er det tilrådelig å trekke ut de nye skuddene regelmessig. Tykkere skudd og kvister kuttes kun om vinteren for å begrense tapet av harpiks ved grenseflatene til den vekstfrie perioden. Så bonsaien din trenger ikke å mobilisere noen ekstra styrker. I vekstfasen er det tilrådelig å trekke ut de nye skuddene regelmessig. Tykkere skudd og kvister kuttes kun om vinteren for å begrense tapet av harpiks ved grenseflatene til den vekstfrie perioden. Så bonsaien din trenger ikke å mobilisere noen ekstra styrker. Potter sedertren hvert tredje til femte år om våren (mars), men ikke fjern jorda helt eller gjør drastiske rotavskjæringer. **Om vinteren:** Himalaya-sederen er betinget hardfjor til -10° Celsius. Den går imidlertid best i dvale i sterkt lys ved 10° til 15°. Imidlertid har sedertre en fantastisk evne til å regenerere dersom tegn på frostskafer skulle oppstå under strenge vintre.



Bonsai - Cedr Himalajski

Cedrus deodara

Piękno gór z Nepalu - bonsai do wnętrza / na zewnątrz

Cedr indyjski ma wyjątkową formę wzrostu dla każdego, którą łatwo dostrzec. Wiecznie zielone drzewo iglaste rozwija swoje główne gałęzie z poziomo zwisającymi wierzchołkami i roślinie w ten sposób prawie szerzej niż wyżej. Jego niebiesko-zielone lub szaro-niebieskie miękkie kępy igieł są przeważnie osadzone na krótkich pędach i tylko przypadkowo można je znaleźć na dłuższych pędach. Igły o długości od 4 do 5 cm są uważane za jedne z najdłuższych ze wszystkich gatunków cedrów. Po kwitnieniu jesienią cedr indyjski wytwarza szyszki o długości do 8 cm, które równo stoją pionowo na gałęziach. **Naturalne położenie:** Naturalne siedlisko cedru indyjskiego rozciąga się od zachodniego Nepalu do wschodniego Afganistanu, gdzie rośnie na wysokości od 1000 do 3000 metrów nad poziomem morza. **Udana uprawa:** Rozmnażanie nasion w pomieszczeniach jest możliwe przez cały rok. Aby zwiększyć zdolność kiełkowania, nasiona należy przechowywać zamknięte w plastikowej torbie w zwykłej lodówce przez około tydzień. Następnie umieść nasiona na głębokości około 1 cm w wilgotnym kompoście doniczkowym lub piaszczystej ziemi bonsai i przykryj pojemnik na nasiona przezroczystą folią, aby zapobiec wysychaniu ziemi. Nie zapomnij zrobić dziur w przezroczystej folii i zdejmować ją co drugi lub trzeci dzień na około 2 godziny. W ten sposób unikniesz tworzenia się pleśni na kompoście doniczkowym. Umieść pojemnik na nasiona w miejscu jasnym i ciepłym o temperaturze około 20 ° Celsjusza i utrzymuj ziemię wilgotną, ale nie moką. Kiełkowanie trwa około czterech do dziesięciu tygodni. **Najlepsza lokalizacja:** Indyjski cedr woli być trzymany w całkowicie nasłonecznionym miejscu. **Optymalna pielęgnacja:** Podlewaj roślinę wystarczająco i konsekwentnie, ale bez podlewania. Od maja do września co trzy tygodnie można podawać specjalny płynny nawóz do roślin bonsai. W okresie wzrostu wskazane jest regularne wrywanie nowych kiełków. Silniejsze gałęzie i gałązki są przycinane dopiero w sezonie zimowym, aby ograniczyć utratę żywicy przez świeże kawałki do okresu, w którym nie rośnie. W ten sposób bonsai nie musi mobilizować dodatkowej siły do prawidłowego rozwoju. Co trzy do pięciu lat należy przesadzać cedr indyjski wiosną, najlepiej w marcu, ale nie zdejmuj całej ziemi i nie odcinaj dramatycznie korzeni. **W zimie:** Cedr indyjski jest odporny na mróz do -10 ° Celsjusza, ale do hibernacji roślinę najlepiej przechowywać w jasnym miejscu o temperaturze od 10 ° do 15 ° Celsjusza. Jednak cedr indyjski ma niezwykłą zdolność regeneracji w przypadku, gdy silna zima odcisnęła piętno na roślinie.



Cedro do Himalaia

Cedrus deodara

Beleza da montanha do Nepal - bonsai interior / bonsai exterior

A forma única de crescimento do cedro do Himalaia também o torna imediatamente reconhecível para o leigo, porque a conífera perene dirige seus galhos principais com as pontas penduradas horizontalmente do tronco e, portanto, cresce quase mais em largura do que em altura. Suas agulhas macias verde-azuladas e azul-acinzentadas ficam agrupadas nos brotos curtos e mais esporadicamente nos brotos longos. Com um comprimento de quatro a cinco centímetros, eles estão entre os mais longos de todas as espécies de cedro. Após a floração do outono, os cones de oito centímetros de comprimento do Cedrus deodara ficam bem eretos nos galhos. **Localização natural:** A região do oeste do Nepal ao leste do Afeganistão é o habitat natural do cedro do Himalaia e cresce em altitudes de 1.000 a 3.000 metros. **Cultivo bem sucedido:** O cultivo é possível durante todo o ano. Primeiro coloque as sementes na geladeira (estratifique) por uma semana para estimular a germinação das sementes. Coloque o em Semente, semeie cerca de um centímetro de profundidade em substrato de crescimento úmido ou solo de bonsai arenoso. Cubra o recipiente de cultura com filme plástico, que você fornece com furos. Isso protege o solo de secar. Você deve remover o papel alumínio por 2 horas a cada dois ou três dias. Isso evita a formação de mofo no solo em crescimento. Coloque o vaso de sementes em um local claro e quente com cerca de 20° Celsius e mantenha o solo do vaso úmido, mas não molhado. O período de germinação é de quatro a dez semanas. **A melhor localização:** Escolha um local com sol pleno. **Cuidado ideal:** Forneça rega adequada e uniforme, mas evite o alagamento. Fertilize a cada 3 semanas de maio a setembro com um fertilizante líquido especial para bonsai. Durante a fase de crescimento, é aconselhável arrancar regularmente os novos rebentos. Brotos e galhos mais grossos são cortados apenas no inverno para limitar a perda de resina nas interfaces durante o período sem crescimento. Portanto, seu bonsai não precisa mobilizar nenhuma força adicional. Durante a fase de crescimento, é aconselhável arrancar regularmente os novos rebentos. Brotos e galhos mais grossos são cortados apenas no inverno para limitar a perda de resina nas interfaces durante o período sem crescimento. Portanto, seu bonsai não precisa mobilizar nenhuma força adicional. Replante o cedro a cada três a cinco anos na primavera (março), mas não remova o solo completamente ou faça cortes drásticos nas raízes. **No inverno:** O cedro do Himalaia é condicionalmente resistente a -10° Celsius. No entanto, hiberna melhor em luz brilhante de 10° a 15°. No entanto, o cedro tem uma incrível capacidade de regeneração se ocorrerem sinais de congelamento durante invernos rigorosos.



Bonsai - Cedru Din Himalaya

Cedrus deodara

Frumusețe de munte din Nepal - bonsai de interior / bonsai în aer liber

Forma unică de creștere a cedrului Himalaya îl face imediat recunoscut pentru profan, deoarece coniferul veșnic verde își conduce ramurile principale cu vârfulurile aghate orizontal de trunchi și astfel crește aproape mai mult în lățime decât în înălțime. Acele lor moi albastru-verzi până la gri-albastru se află în grupuri pe lăstarii scurți și mai ocazional pe lăstarii lungi. Cu o lungime de patru până la cinci centimetri, acestea sunt printre cele mai lungi dintre toate speciile de cedru. După înflorirea toamnei, conurile lungi de opt centimetri ale Cedrus deodara stau frumos în poziție verticală pe ramuri. **Locație naturală:** Regiunea din vestul Nepalului până în estul Afganistanului formează habitatul natural al cedrului Himalaya și crește acolo la altitudini cuprinse între 1.000 și 3.000 de metri. **Cultivare de succes:** Cultivarea este posibilă pe tot parcursul anului. Mai întâi, puneți semințele la frigider (stratificați) timp de o săptămână pentru a încuraja semințele să germineze. Apoi puneți semințele cu o adâncime de aproximativ un centimetru în solul bonsai mediu sau de nisip. Acoperiți vasul de cultivare cu folie alimentară, pe care ați prevăzut-o cu găuri. Acest lucru protejează pământul de uscare. La fiecare două până la trei zile ar trebui să îndepărtați filmul timp de 2 ore. Acest lucru previne formarea mușcăiului pe solul de cultivare. Așezați vasul de cultivare într-un loc luminos și cald, cu aproximativ 20 ° Celsius și mențineți solul de cultivare umed, dar nu umed. Perioada de germinare este de patru până la zece săptămâni. **Cea mai bună locație:** Alegeți o locație în plin soare. **Îngrijire optimă:** Asigurați o udare adecvată și uniformă, dar evitați înmuiera. Fertilizați cu un îngrășământ lichid special pentru bonsai la fiecare 3 săptămâni din mai până în septembrie. În timpul fazei de creștere, este recomandabil să smulgeți lăstarii noi în mod regulat. Lăstarii și crenguțele mai groase sunt tăiate numai iarna pentru a limita pierderea de rășină la interfețe la perioadă fără creștere. Deci, bonsaiul tău nu trebuie să mobilizeze alte forțe suplimentare. În timpul fazei de creștere, este recomandabil să smulgeți lăstarii noi în mod regulat. Lăstarii și crenguțele mai groase sunt tăiate numai iarna pentru a limita pierderea de rășină la interfețe la perioadă de non-creștere. Deci bonsaiul tău nu trebuie să mobilizeze alte forțe suplimentare. Repetați cedrul la fiecare trei până la cinci ani primăvara (martie), dar nu îndepărtați complet solul și nu faceți tăieri drastice de rădăcini. **În iarnă:** Cedrul himalayan este parțial rezistent până la -10 ° Celsius. Dar hibernează cel mai bine la 10 ° până la 15 °. Cu toate acestea, cedrul are o abilitate uimitoare de regenerare, în cazul în care degerăturile apar în iernile mai dure.



Bonsai - Himalaya Cedar

Cedrus deodara

Bergskönhhet från Nepal - inomhusbonsai / utomhusbonsai

Den unika tillväxtformen av Himalaya-cederträet gör det omedelbart igenkännligt även för lekmannen, eftersom den vintergröna barrträdet driver sina huvudgrenar med hängande spetsar horisontellt från bagageutrymmet och växer därmed nästan mer i bredd än i höjd. Deras blågröna till gråblå mjuka nålar finns i kluster på de korta skotten och mer ibland på de långa skotten. Med en längd på fyra till fem centimeter är de bland de längsta av alla cederarter. Efter höstblomningen står de åtta centimeter långa kottarna i Cedrus deodara snyggt upprätt på grenarna. **Naturligt läge:** Regionen från västra Nepal till östra Afghanistan utgör Himalaya-cederns naturliga livsmiljö och växer där på höjder mellan 1000 och 3000 meter.

Framgångsrik odling: Odling är möjlig året runt. Först placera fröna i kylskåpet (stratifiera) i en vecka för att stimulera fröna. Placera sedan fröna ungefär en centimeter djupt i fuktigt odlingsmedium eller sandbonsaijord. Täck odlingskärlet med plastfolie, som du har försett med hål. Detta skyddar jorden från att torka ut. Varannan till var tredje dag ska du ta bort filmen i två timmar. Detta förhindrar att mögel bildas på odlingsjorden. Placera odlingskärlet på en ljus och varm plats med cirka 20 ° C och håll odlingsjorden fuktig men inte våt. Groningstiden är fyra till tio veckor. **Den bästa platsen:** Välj en plats i full sol. **Optimal vård:** Ge tillräcklig och jämn vattning, men undvik vattendrag. Gödsla under perioden maj till september var tredje vecka med ett speciellt flytande bonsai-gödselmedel. Under tillväxtfasen är det lämpligt att plocka de nya skotten regelbundet. Tjockare skott och kvistar skärs endast på vintern för att begränsa förlusten av harts vid gränsytorna till icke-tillväxtperioden. Så din bonsai behöver inte mobilisera några ytterligare krafter. Under tillväxtfasen är det lämpligt att plocka de nya skotten regelbundet. Tjockare skott och kvistar skärs endast på vintern för att begränsa förlusten av harts vid gränsytorna till den tillväxtfria perioden. Så din bonsai behöver inte mobilisera ytterligare krafter. Omplacera ceder vart tredje till fem år på våren (mars), men ta inte bort jorden helt eller gör drastiska rotbeskärningar. **På vintern:** Himalaya-cederträet är delvis hårdat ner till -10 ° Celsius. Men den vilar bäst vid 10 ° till 15 °. Cederträet har emellertid en häpnadsväckande förmåga att regenerera om frostsador skulle uppträda i hårdare vintrar.



Himalájsky céder

Cedrus deodara

Horská kráska z Nepálu - vnútorný bonsaj / vonkajší bonsaj

Jedinečná rastová forma himalájskeho cédra ho robí okamžite rozpoznateľným aj pre laika, pretože vždyzelený ihličnan vyháňa svoje hlavné konáre visiacimi hrotmi vodorovne od kmeňa a rastie tak takmer viac do šírky ako do výšky. Jeho modrozelené až sivomodré mákké ihličie stojí v zhlukoch na krátkych výhonkoch a sporadickejšie na dlhých výhonkoch. S dĺžkou štyri až päť centimetrov patria medzi najdlhšie zo všetkých cédrových druhov. Po jesennom odkvitnutí stoja osemcentimetrové šišky Cedrus deodara pekne vzpriamene na konároch. **Prirodzená poloha:** Región od západného Nepálu po východný Afganistan je prirodzeným biotopom himalájskeho cédra a rastie tam v nadmorských výškach 1 000 až 3 000 metrov. **Úspešná kultivácia:** Pestovanie je možné počas celého roka. Najprv vložte semená do chladničky (stratifikuje) na týždeň, aby ste podporili klíčenie semien. Vložte potom zasiaté asi jeden centimeter hlboko do vlhkého pestovateľského substrátu alebo piesočnatej bonsai pôdy. Kultivačnú nádobu prikryte potravinovou fóliou, ktorú opatríte otvormi. To chráni pôdu pred vysychaním. Fóliu by ste mali odstraňovať na 2 hodiny každé dva až tri dni. To zabraňuje tvorbe plesní na rastúcej pôde. Črepník umiestnite na svetlé a teplé miesto s teplotou okolo 20 ° Celzia a zeminu udržiavajte vlhkú, ale nie mokrú. Doba klíčenia je štyri až desať týždňov. **Najlepšie umiestnenie:** Vyberte miesto plného slnka. **Optimálna starostlivosť:** Zabezpečte dostatočné a rovnomerné zavlažovanie, ale vyhnite sa podmäčaniu. Od mája do septembra každé 3 týždne prihnojíte špeciálnym tekutým hnojivom na bonsaje. Vo fáze rastu je vhodné pravidelne vytrhávať nové výhonky. Hrubšie výhonky a vetvičky sa režu len v zime, aby sa obmedzil úbytok živice na rozhraniach do obdobia bez rastu. Váš bonsaj teda nemusí mobilizovať žiadne ďalšie sily. Vo fáze rastu je vhodné pravidelne vytrhávať nové výhonky. Hrubšie výhonky a vetvičky sa režu len v zime, aby sa obmedzil úbytok živice na rozhraniach do obdobia bez rastu. Váš bonsaj teda nemusí mobilizovať žiadne ďalšie sily. Céder presádzajte každé tri až päť rokov na jar (v marci), ale neodstraňujte pôdu úplne ani nerobte drastické orezávanie koreňov. **V zime:** Himalájsky céder je podmienenčne odolný do -10 ° Celzia. Najlepšie však hibernuje pri jasnom svetle pri 10° až 15°. Céder má však úžasnú schopnosť regenerácie, ak sa počas tuhých zím objavja známky omrzlin.



Himalajská cedra

Cedrus deodara

Gorska lepotica iz Nepala - notranji bonsaj / zunanji bonsaj

Zaradi svojevrstne rastne oblike je himalajská cedra tudi laiku takoj prepoznavna, saj zimzeleni iglavec svoje glavne veje s povešenimi konicami poganja vodoravno od debla in tako raste skoraj bolj v širino kot v višino. Njegove modro-zelene do sivo-modre mehke iglice stojijo v šopih na kratkih poganjkih in bolj sporadično na dolgih poganjkih. Z dolžino štiri do pet centimetrov so med najdaljšimi med vsemi vrstami cedrov. Po jesenskem cvetenju stojijo osem centimetrov dolgi storži Cedrus deodara precej pokonci na vejah. **Naravni habitat:** Območje od zahodnega Nepala do vzhodnega Afganistana je naravni habitat himalajške cedre in tam raste na nadmorski višini od 1000 do 3000 metrov. **Navodila za gojenje:** Gojenje je možno vse leto. Najprej postavite semena v hladilnik (stratificirajte) za en teden, da spodbudite kalitev semen. Postavite nato posejete približno en centimeter globoko v vlažen rastni substrat ali peščeno zemljo za bonsaj. Posodo z kulturo pokrijte s folijo za živila, ki jo opremite z luknjami. To ščiti tla pred izsušitvijo. Vsake dva do tri dni za 2 uri odstranite folijo. S tem preprečimo nastanek plesni na rastni zemlji. Lonček s semeni postavite na svetlo in toplo mesto s približno 20 ° C, zemlja v lončku pa naj bo vlažna, a ne mokra. Obdobje kalitve je štiri do deset tednov. **Najboljša lokacija:** Izberite sončno lokacijo. **Optimalna nega:** Zagotovite zadostno in enakomerno zalivanje, vendar se izogibajte zalivanju. Gnojite vsake 3 tedne od maja do septembra s posebnim tekočim gnojilom za bonsaj. V fazi rasti je priporočljivo redno puliti nove poganjke. Debelejše poganjke in vejice režemo le pozimi, da omejimo izgubo smole na mejah do obdobja brez rasti. Tako vašemu bonsaju ni treba mobilizirati dodatnih sil. V fazi rasti je priporočljivo redno puliti nove poganjke. Debelejše poganjke in vejice režemo le pozimi, da omejimo izgubo smole na mejah do obdobja brez rasti. Tako vašemu bonsaju ni treba mobilizirati dodatnih sil. Spomladi (marec) cedro posadite vsake tri do pet let, vendar ne odstranite zemlje v celoti ali drastično obrezujte korenin. **V zimskem času:** Himalajská cedra je pogojno odporna na -10°C. Najbolje pa prezimi pri močni svetlobi pri 10° do 15°. Vendar pa ima cedra neverjetno sposobnost regeneracije, če se v hudih zimah pojavijo znaki ozeblin.



Cedro del Himalaya

Cedrus deodara

Belleza de la montaña de Nepal. Bonsái para interior / Bonsái para exterior

El desarrollo único del cedro del Himalaya lo hace reconocible inmediatamente, incluso para los inexpertos, porque la conífera de hoja perenne impulsa sus principales ramas con puntas colgantes horizontalmente desde el tronco, y crecen de manera casi más en anchura que en altura. Sus acículas suaves de color azul verdoso a gris azulado, crecen en manojos desde los brotes cortos y sólo esporádicamente de los brotes largos. Con una longitud de cuatro a cinco centímetros son de las más largas de todas las especies de cedros. Después de la floración en otoño, los conos de ocho centímetros de largo están en vertical sobre las ramas. **Ubicación natural:** La región del oeste de Nepal hasta al este de Afganistán es el hábitat natural del cedro del Himalaya y crece en altitudes de 1.000 a 3.000 metros. **Cultivo exitoso:** La semilla se puede criar en interior durante todo el año. Mantenga las semillas durante una semana en el frigorífico (estratificación) para aumentar la germinación de las mismas. Introduzca las semillas a un centímetro de profundidad en sustrato húmedo o tierra arenosa para cultivo de bonsái. Cubra el recipiente de cultivo con un film transparente y agujereéelo. Así protegerá la tierra de la desecación. Para evitar la putrefacción del sustrato retire el film cada dos o tres días durante 2 horas. Coloque el recipiente de cultivo en un lugar luminoso y cálido a 20 grados y mantenga el sustrato húmedo, pero no mojado. La germinación tardará entre cuatro y diez semanas en producirse. **La mejor ubicación:** Elija un lugar a pleno sol. **Cuidado óptimo:** Procure un riego suficiente y regular, pero evite el anegamiento. De abril a septiembre, cada tres semanas suminístrele fertilizante líquido para bonsái. Durante el periodo de crecimiento se recomienda arrancar los brotes nuevos. Los brotes y ramas más gruesas se cortan en invierno, para evitar la pérdida de resina de los cortes se recomienda el corte solo en periodos de ausencia de crecimiento. Así su bonsái no tendrá que liberar energías adicionales. Trasplante el cedro cada tres a cinco años en primavera (marzo), no elimine toda la tierra y no corte las raíces de forma radical. **En el invierno:** El cedro del Himalaya tolera parcialmente heladas y temperaturas mínimas de hasta -10 grados. Manténgalo en un lugar luminoso y con temperaturas de entre 10 a 15 grados. Sin embargo, el cedro tiene una sorprendente capacidad para regenerarse, para el caso que muestre síntomas de congelaciones en los inviernos más severos.



Himalájský cedr

Cedrus deodara

Horská kráska z Nepálu - vnitřní bonsaje / venkovní bonsaje

Jedinečná růstová forma himalájského cedru ho činí okamžitě rozpoznatelným i pro laika, protože stálezelený jehličnan vyhání své hlavní větve visícími hroty vodorovně od kmene a roste tak téměř více do šířky než do výšky. Jeho modrozelené až šedomodré měkké jehlice stojí ve shlucích na krátkých výhonech a sporadicky na dlouhých výhonech. S délkou čtyři až pět centimetrů patří k nejdelším ze všech druhů cedrů. Po podzimním odkvětu stojí osmicentimetrové šišky Cedrus deodara pěkně vzpřímeně na větvích. **Přirozená poloha:** Oblast od západního Nepálu po východní Afghánistán je přirozeným prostředím himalájského cedru a roste tam v nadmořských výškách 1 000 až 3 000 metrů. **Úspěšné pěstování:** Pěstování je možné celoročně. Nejprve vložte semena do lednice (stratifikuje) na týden, abyste podpořili klíčení semen. Další Poté vysejte asi jeden centimetr hluboko do vlhkého pěstebního substrátu nebo písčité bonsaje. Kultivační nádobu zakryjte potravinářskou fólií, kterou opatříte otvory. To chrání půdu před vysycháním. Fólii byste měli odstraňovat na 2 hodiny každé dva až tři dny. Tím se zabrání tvorbě plísní na rostoucí půdě. Umístěte květináč na světlé a teplé místo s teplotou kolem 20 °C a udržujte půdu v květináči vlhkou, ale ne mokrou. Doba klíčení je čtyři až deset týdnů. **Nejlépejší umístění:** Vyberte místo plně slunce. **Optimální péče:** Zajistěte dostatečné a rovnoměrné zavlažování, ale vyhněte se přemokření. Od května do září každé 3 týdny přihnojujte speciálním tekutým hnojivem na bonsaje. Během růstové fáze je vhodné pravidelně vytrhávat nové výhony. Silnější výhonky a větvičky se stříhají pouze v zimě, aby se omezil úbytek pryskyřice na rozhraních do období bez růstu. Vaše bonsaje tedy nemusí mobilizovat žádné další síly. Během růstové fáze je vhodné pravidelně vytrhávat nové výhony. Silnější výhonky a větvičky se stříhají pouze v zimě, aby se omezil úbytek pryskyřice na rozhraních do období bez růstu. Vaše bonsaje tedy nemusí mobilizovat žádné další síly. Cedr přesazujte každé tři až pět let na jaře (březen), ale neodstraňujte zeminu úplně ani neprovádějte drastické ořezávání kořenů. **V zimě:** Himalájský cedr je podmíněně mrazuvzdorný do -10° Celsia. Nejlépe však hibernuje na jasném světle při 10° až 15°. Cedr má však úžasnou schopnost regenerace, pokud by se během tuhých zim objevily známky omrzlin.



Himalaya sediri

Cedrus deodara

Nepal'den dağ güzelliği - iç mekan bonsai / dış mekan bonsai

Himalaya sedirinin benzersiz büyüme şekli, onu meslekten olmayan kişiler için de hemen tanınabilir kılar, çünkü yaprak dökmeyen kozalaklı ağaç, ana dallarını sarkık uçlarla gövdeden yatay olarak sürer ve bu nedenle genişlik olarak yükseklikten neredeyse daha fazla büyür. Mavi-yeşilden gri-maviye kadar yumuşak iğneler kısa sürgünlerde kümeler halinde ve uzun sürgünlerde daha düzensiz durur. Dört ila beş santimetrelik uzunlukları ile tüm sedir türlerinin en uzunları arasındadırlar. Sonbahar çiçek açtıktan sonra, Cedrus deodara'nın sekiz santimetre uzunluğundaki kozalakları dalların üzerinde oldukça dik duruyor. **Doğal konum:** Batı Nepal'den doğu Afganistan'a kadar olan bölge, Himalaya sedirinin doğal yaşam alanıdır ve burada 1.000 ila 3.000 metre rakımlarda yetişir. **Başarılı yetiştirme:** Yetiştirme tüm yıl boyunca mümkündür. Tohumların çimlenmesini teşvik etmek için önce tohumları bir hafta buzdolabına koyun (tabakalaştırın). Koy Ardından, nemli büyüyen alt tabakaya veya kumlu bonsai toprağına yaklaşık bir santimetre derinlikte tohumlayın. Kültür kabının üzerini delikler açtığınız streç film ile kapatın. Bu, toprağın kurumasını önler. Folyoyu her iki ila üç günde bir 2 saat çıkarmalısınız. Bu, büyüyen toprakta küf oluşumunu önler. Tohum saksısını yaklaşık 20° Santigrat ile hafif ve sıcak bir yere koyun ve saksı toprağını nemli tutun ama ıslak tutmayın. Çimlenme süresi dört ila on haftadır. **En iyi konum:** Tam bir güneş konumu seçin. **Optimum bakım:** Yeterli ve eşit sulama sağlayın, ancak su birikmesinden kaçının. Mayıs'tan Eylül'e kadar her 3 haftada bir özel sıvı bonsai gübresi ile gübreleyin. Büyüme aşamasında, yeni sürgünlerin düzenli olarak çıkarılması tavsiye edilir. Daha kalın sürgünler ve ince dallar, büyümenin olmadığı dönemle arayüzlerdeki reçine kaybını sınırlamak için yalnızca kışın kesilir. Böylece bonsai'niz herhangi bir ek güç harekete geçirmek zorunda kalmaz. Büyüme aşamasında, yeni sürgünlerin düzenli olarak çıkarılması tavsiye edilir. Daha kalın sürgünler ve ince dallar, büyümenin olmadığı dönemle arayüzlerdeki reçine kaybını sınırlamak için yalnızca kışın kesilir. Böylece bonsai'niz herhangi bir ek güç harekete geçirmek zorunda kalmaz. İlkbaharda (Mart) her üç ila beş yılda bir sedirin saksısını değiştirin, ancak toprağı tamamen çıkarmayın veya köklü kök budamaları yapmayın. **Kışın:** Himalaya sediri şartlı olarak -10°C'ye dayanıklıdır. Ancak, en iyi parlak ışıktaki 10° ila 15° arasında kış uykusuna yatar. Bununla birlikte, sert kışlar sırasında donma belirtileri ortaya çıkarsa, sedirin inanılmaz bir yenilenme yeteneği vardır.



Himalájai cédrus

Cedrus deodara

Hegyi szépség Nepálból - beltéri bonsai / kültéri bonsai

A himalájai cédrus egyedi növekedési formája a laikusok számára is azonnal felismerhetővé teszi, mert az örökzöld túlevelű fő ágait a lelógó hegyekkel vízszintesen hajtja a törzsről, és így szinte szélesebbre, mint magasságra nő. Kék-zöldtől szürkés-kékig terjedő, puha túlevelei fűrtökben állnak a rövid hajtásokon, szórványosan a hosszú hajtásokon. Négy-öt centiméteres hosszukkal az összes cédrusfaj közül a leghosszabbak közé tartoznak. Az ősi virágzás után a Cedrus deodara nyolc centiméter hosszú kúpjai szép egyenesen állnak az ágakon. **Természetes elhelyezkedés:** A Nyugat-Nepáltól Kelet-Afganisztánig terjedő régió a himalájai cédrus természetes élőhelye, és ott 1000-3000 méteres magasságban nő. **Sikeres termesztés:** Termesztése egész évben lehetséges. Először tegyük a magokat a hűtőbe (rétegezzük) egy hétre, hogy serkentjük a magvak csírázását. Tedd aEzután vetje be körülbelül egy centiméter mélyre a nedves termesztőfelületet vagy homokos bonsai talajt. Fedje le a tenyészedényt ragasztó fóliával, amelyet lyukakkal lát el. Ez megvédi a talajt a kiszáradástól. A fóliát két-három naponta 2 órára le kell venni. Ez megakadályozza a penészképződést a növekvő talajon. Helyezze a magcserepet világos és meleg, körülbelül 20 °C-os helyre, és tartsa a virágföldet nedvesen, de ne nedvesen. A csírázási időszak négy-tíz hét. **A legjobb hely:** Válasszon egy teljes napfényes helyet. **Optimális gondozás:** Gondoskodjunk megfelelő és egyenletes öntözésről, de kerüljük a bevezesedést. Májustól szeptemberig 3 hetente műtrágyázzon speciális bonsai folyékony műtrágyával. **Télen:** A himalájai cédrus feltételeken ellenáll -10 °C-ig. A legjobban azonban 10-15°-os erős fényben hibernál. A cédrus azonban elképesztő képességgel rendelkezik a regenerálódásra, ha fagyás jelei jelentkeznek a súlyos tél során.

: : : : :



ヒマラヤ杉

Cedrus deodara

ネパールの山の美しさ - 室内または屋外盆栽

誰もが簡単に育てることができるユニークな成長形態を持ちます。常緑針葉樹で地面に水平な枝と垂れ下がった小枝を成長させるので、高さよりも幅のほうが広いこともあります。ブルーグリーン色またはブルーグレー色の柔らかい針葉の房は、主に短い芽に付き長い芽に付くのはランダムです。長さ4〜5cmの針葉はすべてのスギ種の中で最も長いものの1つと考えられています。開花した後、秋には8cmほどの松かさ枝の上にきれいに形成します。

自然な場所: 生息地は西ネパールからアフガニスタン東部まで広がり、それは海拔1,000〜3,000メートルの場所に生育しています。

栽培成功:

種子繁殖は室内で年間を通して可能です。発芽率を高めるには、種をビニール袋に入れて冷蔵庫で約1週間保管します。湿った培養土または盆栽用の砂を使用した土壌の深さ約1cmに種を植え、サランラップなどの透明フィルムで鉢をカバーします。透明フィルムには空気穴をいくつかあけ、2〜3日に1回は約2時間、完全にフィルムを鉢から外します。そうすることで、カビの発生を防ぎます。20°Cくらいの明るく暖かい場所に置き、用土は湿った状態に保ちます。通常は約4〜10週間後に発芽します。

最高のロケーション: 完全に日当たりのよい場所を好みます。

最適なケア:

定期的なたっぷりと水を与えますが、水溜まりができないように注意します。5月〜9月までは盆栽用の特別な液体肥料を3週間ごとに与えます。

成長期には定期的に新芽を摘芯することをお勧めします。強い枝と小枝の剪定は、樹脂の損失が最小限である冬に向けての時期に限ります。そうすることで、盆栽が生育に必要な以上のエネルギーを使わずに済みます。3〜5年毎の春、理想的には3月に植え替えが必要ですが、その際には全ての土壌を取り除かず、根も切り過ぎないように注意してください。

冬に:

マイナス10°Cまでの耐寒性を備えていますが、冬越しは10°C〜15°Cの明るい場所での保管が最適です。冬の寒さでダメージを受けたとしても、目覚ましい再生能力を持ち合わせています。

SKU: 14006 / Himalaya Zeder