



PL Nawóz przeciw brunatnieniu igieł 3kg Wysokoskoncentrowany siarczan magnezu
DE Brauner Nadeldünger 3kg Hochkonzentriertes Magnesiumsulfat
CS Hnojivo s hnědým jehličím 3 kg Vysoce koncentrovaný síran hořečnatý
SK Hnojivo s hnědým ihličím 3 kg Vysoke koncentrovaný síran horečnatý
LT Rudųjų adatų trąšos 3 kg Labai koncentruotas magnio sulfatas
BG Тор с кафяви иглички 3kg Висококонцентриран магнезиев сулфат

[PL] informacje

Nawóz przeciw brunatnieniu igieł 3kg Wysokoskoncentrowany siarczan magnezu

Nawóz przeciw brunatnieniu igieł to wysokoskoncentrowany siarczan magnezu, który skutecznie zapobiega i zwalcza brązowienie igieł.

Niedobór magnezu to najczęstsza przyczyna ich usychania, dlatego ten nawóz dostarcza go w optymalnej formie, łatwo przyswajalnej przez drzewa i krzewy iglaste.

Może być stosowany zarówno profilaktycznie, jak i dolistnie w postaci oprysku. Zapewnia zdrowy, intensywnie zielony wygląd iglaków przez cały sezon!

Zalety:

- ☐ **Skutecznie zwalcza brunatnienie i brązowienie igieł**, spowodowane **niedoborem magnezu**.
- ☐ **Stosowany profilaktycznie i interwencyjnie** – zarówno doglebowo, jak i dolistnie.
- ☐ **Łatwo przyswajalny przez rośliny** – szybkie efekty działania.
- ☐ **Łatwo rozpuszczalny w wodzie** – idealny do oprysków.
- ☐ **Wzmacnia rośliny i poprawia ich odporność na choroby i suszę**.

Parametry:

- ☐ **Marka:** Planta
- ☐ **Typ produktu:** Nawóz mineralny, siarczan magnezu
- ☐ **Forma:** Granulki, rozpuszczalne w wodzie
- ☐ **Masa netto:** 3 kg
- ☐ **Przeznaczenie:** Wszystkie gatunki drzew i krzewów iglastych
- ☐ **Działanie:** Zapobiegawcze i interwencyjne
- ☐ **Średnia wydajność:** 3 kg na 120 roślin
- ☐ **Skład:** MgO (16%) + SO₃ (32%)
- ☐ **Nawóz WE** – spełnia normy Unii Europejskiej

Dawkowanie i stosowanie:

- ☐ **Stosowanie doglebowe:** Profilaktycznie raz w sezonie – wczesną wiosną. Kilukrotnie od

Producent:

Planta Sp. z o.o.
biuro@planta.net.pl
Tarnów, ul. Ks. Prymusa Kardynała Stefana Wyszyńskiego 16A,
33-100, PL



5908278999628



LV Augsti koncentrēts magnija sulfāts 3kg Augsti koncentrēts magnija sulfāts
HU Barna tűs műtrágya 3kg Magas koncentrációjú magnézium-szulfát
RO Îngrășământ cu ace maro 3 kg Sulfat de magneziu foarte concentrat
ET Pruun nõelväetis 3kg Kõrge kontsentratsiooniga magneesiumsulfaat
FI Ruskeaneulannoite 3kg Erittäin väkevöity magneesiumsulfaatti

[EN] informations

Brown needle fertiliser 3kg Highly concentrated magnesium sulphate

Needle Browning Fertiliser is a highly concentrated magnesium sulphate that effectively prevents and combats needle browning.

Magnesium deficiency is the most common cause of needle withering, so this fertiliser provides it in an optimal form, easily absorbed by coniferous trees and shrubs.

It can be used both prophylactically and as a foliar spray. Ensures a healthy, intensely green appearance of conifers throughout the season!

Advantages:

- ☐ **Effectively combats browning and browning of needles** caused by **magnesium deficiency**.
- ☐ **Used prophylactically and interveningly** - both topically and foliarly.
- ☐ Easily **absorbed by plants** - fast-acting.
- ☐ Easily **soluble in water** - ideal for spraying.
- ☐ **Strengthens plants and improves their resistance to disease and drought**.

Parameters:

- ☐ **Brand:** Planta
- ☐ **Product type:** mineral fertiliser, magnesium sulphate
- ☐ **Form:** Granules, water-soluble
- ☐ **Net weight:** 3 kg
- ☐ **Intended use:** All coniferous tree and shrub species
- ☐ **Action:** Preventive and interventive
- ☐ **Average yield:** 3 kg per 120 plants
- ☐ **Composition:** MgO (16%) + SO₃ (32%)
- ☐ **EC fertiliser** - complies with European Union standards

Dosage and application:

- ☐ **Till application:** Prophylactically once per season - early spring. Several times from spring to autumn - every 1 month at a dose of 25-200 g per plant (depending on its size). In case of visible symptoms of needle browning - apply 2-3 times at 14-day intervals.

wiosny do jesieni – co 1 miesiąc w dawce 25-200 g na 1 roślinę (zależnie od jej wielkości). W przypadku widocznych objawów brązowienia igieł – stosować 2-3 razy w odstępach 14 dni.

❑ **Opryski dolistne:** 150-300 g na 10 litrów wody. Opryskiwać rośliny co 10 dni do ustąpienia objawów niedoboru magnezu.

Informacje o bezpieczeństwie:

- ❑ **Przechowywać w suchym miejscu, z dala od dzieci i zwierząt.**
- ❑ **Nie spożywać – w przypadku połknięcia skonsultować się z lekarzem.**
- ❑ **Przy stosowaniu dolistnym unikać opryskiwania w pełnym słońcu.**

Wygenerowane przez DomoDomo na podstawie danych od producenta, **kopiowanie zabronione.**

❑ **Volate spray:** 150-300 g per 10 litres of water. Spray plants every 10 days until magnesium deficiency symptoms have disappeared.

Safety information:

- ❑ **S tore in a dry place, away from children and animals.**
- ❑ **Do not ingest - consult a doctor if swallowed.**
- ❑ **For foliar application, avoid spraying in full sunlight.**

Generated by DomoDomo based on data from the manufacturer, **copy prohibited.**