



Producent: Agrii Polska Sp. z o.o. ul. Obornicka 233 60-650 Poznań

www.agrii.pl Telefon: +48 61 670 88 88 E-mail: bok@agrii.pl

foliQ TrioPGA

PFC 6(B): Biostymulator niemikrobiologiczny

Kategoria funkcji produktu. Definicja stosowana w przepisach dotyczących nawozów, czyli w Rozporządzeniu Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2019/1009 z dnia 5 czerwca 2019 r. ustanawiającego przepisy dotyczące udostępniania na rynku produktów nawozowych UE, zmieniające rozporządzenia (WE) nr 1069/2009 i (WE) nr 1107/2009 oraz uchylające rozporządzenie (WE) nr 2003/2003.

Biostymulator roślin

Zawiera kwas pyroglutaminowy

foliQ TrioPGA jest produktem zawierającym kompozyt z fermentacji mikrobiologicznej i kwas pyroglutaminowy. Produkt zawiera dodatkowo fitohormony, aminokwasy.

foliQ TrioPGA jest zalecany w uprawach rolniczych, sadowniczych i warzywniczych.

foliQ TrioPGA zwiększą biomasę systemu korzeniowego i części nadziemnych roślin wpływając na zwiększenie plonu.

foliQ TrioPGA:

- W kukurydzy zwiększa wigor, co ma pozytywny wpływ na szybszy wzrost, szybsze kwitnienie i zawiązywanie kolby oraz dojrzewanie ziarna.
- W buraku cukrowym zwiększa zawartość cukru w plonie handlowym.
- W uprawach sadowniczych zwiększa ilość zawiązanych owoców, poprawia wyrównanie średnicy owoców wpływając korzystnie na jakość i wielkość plonu handlowego.
- W uprawie truskawki i pomidora zwiększa zawartość cukrów w owocach, poprawia jędrność i wybarwienie owoców. Zwiększa udział największych owoców w plonie handlowym.

Dodatkowe informacje:

foliQ TrioPGA:

- W uprawach sadowniczych ogranicza straty spowodowane przez przymrozki wiosenne.
- W pszenicy ozimej może wpływać korzystnie na utrzymanie pędów kłosonośnych.

- W rzepaku ozimym może zwiększać ilość pędów bocznych, a także zawiązywanych łuszczyń, co może podnosić potencjał plonowania. Może wpływać na zaolejenie nasion.
- W uprawie sałaty może zwiększać biomasę.

Zastosowanie produktu

Produkt jest przeznaczony do stosowania dolistnego przy użyciu samobieżnych lub ciągnikowych opryskiwaczy polowych, sadowniczych oraz opryskiwaczy ręcznych w uprawach polowych, sadowniczych i warzywniczych. Produkt przeznaczony do stosowania doglebowego w systemach nawadniania kropelkowego (fertygacja) w uprawach warzywniczych (w tym: truskawka, pomidor).

Składniki (powyżej 5%):

Kompozyt fermentacji mikrobiologicznej (WE: 932-215-9) ¹

¹CMC 6: Produkty uboczne przemysłu spożywczego

Dawki i terminy stosowania:

Uprawa	Zalecana dawka (l/ha)	Termin stosowania	Zalecana liczba zabiegów	Zalecana ilość wody (l/ha)	Cel / Deklarowane skutki
Zboża	1,0	Od fazy 3 liści właściwych do początku kwitnienia. BBCH 13 do BBCH 61	2-3	Oprysk dolistny 150-300	Powoduje wyższą biomasę części nadziemnych.
Rzepak ozimy	1,0	Od jesieni w fazie 4 liści właściwych do początku kwitnienia (otwarte pierwsze kwiaty). BBCH 14 do BBCH 61	2-3	Oprysk dolistny 150-300	Wpływa korzystnie na fotosyntezę i wzmocnienie ścian komórkowych. Zwiększa zawartość chlorofilu w roślinach. Przyczynia się do zwiększenia ilości rozgałęzień.
Kukurydza	1,0	Od fazy 3 liści właściwych do ostatniego momentu wejścia opryskiwaczem w pole. BBCH 13 do BBCH 61	1-2	Oprysk dolistny 150-300	Zwiększa plon ziarna. Zwiększa wigor rośliny.
Burak cukrowy	1,0	Od fazy 4 liści właściwych do momentu zakrycia międzyrzędzi. BBCH 14 do BBCH 39	1-2	Oprysk dolistny 150-300	Zwiększa wielkość i jakość plonu. Przyczynia się do wzrostu zawartości cukru.
Ziemniak	1,0	Od fazy początku zakrywania międzyrzędzi do początku kwitnienia BBCH 39- do BBCH 61	2-3	Oprysk dolistny 150-300	Zwiększa wielkość i jakość plonu.
Uprawy bobowate	1,0	Od fazy 4 liści właściwych do początku kwitnienia. BBCH 14 do BBCH 61	2-3	Oprysk dolistny 150-300	Zwiększa wielkość i jakość plonu.
Słonecznik	1,0	Od fazy drugiej pary liści właściwych do ostatniego momentu wejścia opryskiwaczem w pole. BBCH 14 do BBCH 61	2-3	Oprysk dolistny 150-300	Zwiększa wielkość i jakość plonu.

Uprawy sadownicze (ziarnkowe, pestkowe i jagodowe)	1,0	Od fazy zielonego pąka do fazy wzrostu zawiązków.	3-4	Oprysk dolistny 300-700	Zwiększa średnicę owoców. Poprawia wyrównanie wielkości owoców. Ograniczenie opadania zawiązków.
Uprawy warzywnicze	0,5-1,0	10-14 dni po wysadzeniu roślin lub 14-21 dni po wschodach roślin; kolejne zabiegi, co 7-14 dni.	3	Oprysk dolistny 300-800	Wpływa na wielkość i jakość plonu.
Uprawy warzywnicze	0,05% - 0,1% stężenia roztworu	10-14 dni po wysadzeniu roślin lub 14-21 dni po wschodach roślin; kolejne zabiegi, co 7-14 dni.	3	Fertygacja 0,05% - 0,1% stężenia roztworu	Wpływa na wielkość i jakość plonu.

Odstęp między zabiegami: co 7-14 dni.

Zalecane warunki przechowywania

Przechowywać i transportować w oryginalnym, szczelnie zamkniętym opakowaniu w temp. od +5°C do +30°C. Unikać gwałtownych zmian temperatury. Niewłaściwe składowanie może powodować wysolenie lub przebarwienie produktu. Nie składować warstwami. Przechowywać pod zamknięciem. Możliwy osad na dnie opakowania nie wpływa na jakość produktu. Przed użyciem dokładnie wymieszać. Nie wlewać do kanalizacji. Utylizować zgodnie z lokalnymi przepisami.

Przygotowanie cieczy roboczej:

foliQ TrioPGA może być mieszany z większością środków ochrony roślin i nawozów. Przy pierwszym stosowaniu mieszaniny zbiornikowej zaleca się wykonanie próbnego mieszania w niewielkiej objętości wody. Przy sporządzaniu cieczy roboczej należy:

1) napełnić zbiornik opryskiwacza do połowy wodą 2) włączyć mieszadło 3) produkt dokładnie wymieszać w opakowaniu, a następnie wlać odmierzoną ilość 4) ewentualnie dodać środek ochrony roślin 5) uzupełnić wodą do żądanej objętości 6) ciecz należy zużyć bezpośrednio po przygotowaniu 7) po wykonaniu zabiegu opryskiwacz umyć wodą, chyba że zastosowany środek ochrony wymaga innego sposobu mycia.

Warunki bezpiecznego stosowania preparatu

Zawiera kwas pyroglutaminowy

Piktogramy:



Hasło ostrzegawcze:

Niebezpieczeństwo

Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia:

H318 Powoduje poważne uszkodzenie oczu.

Zwroty wskazujące środki ostrożności:

P280 Stosować rękawice ochronne/odzież ochronną/ochronę oczu/ochronę twarzy.

P305+P351+P338 W PRZYPADKU DOSTANIA SIĘ DO OCZU: Ostrożnie płukać wodą przez kilka minut. Wyjąć soczewki kontaktowe, jeżeli są i można je łatwo usunąć. Nadal płukać.

P501 Zawartość / pojemnik usuwać zgodnie z obowiązującymi przepisami

Środki ostrożności związane z ochroną środowiska naturalnego:

Nie zanieczyszczać wód preparatem lub jego opakowaniem. Nie myć aparatury w pobliżu wód powierzchniowych.

Unikać zanieczyszczania wód poprzez rowy odwadniające z gospodarstw i dróg.

Pojemność: ... L

Postać: roztwór

Okres przydatności do stosowania: 3 lata od daty produkcji

Numer partii:

Data produkcji: [data na opakowaniu]