



SAFLAX®



Tips



© Bluesday - Public Domain

Clianthus formosus syn. Swaisonia formosa

 Български	BG	2	 Malti	MT	5
 Dansk	DK	2	 Nederlands	NL	5
 Deutsch	DE	2	 Norsk	NO	6
 English	UK	2	 Polski	PL	6
 Eesti	EE	3	 Português	PT	6
 Suomalainen	FI	3	 Românesc	RO	6
 Français	FR	3	 Svenska	SE	7
 Ελληνική	GR	3	 Slovensky	SK	7
 Gaeilge	IE	4	 Slovenski	SI	7
 íslenskur	IS	4	 Español	ES	7
 Italiano	IT	4	 Český	CZ	8
 Hrvatski	HR	4	 Türkçe	TR	8
 Latviešu	LV	5	 Magyar	HU	8
 Lietuvių kalba	LT	5	 日本語	JP	9



Човката на папала / Главата на дявола

Clianthus formosus syn. Swaisonia formosa

Цветчета от лакиран червен клон!

Вечнозелената дяволска глава е бавно растящ катерещ се храст с красиво перести, овални и кадифено окосмени листа. Неговата запазена марка са впечатляващите, дълги дръжки и дълги до осем сантиметра, изправени венчелистчета. Характерното черно петно е разположено в центъра на клоновидните цветове, които греят в лакирано червено. С помощта средство за катерене човката на папала може да се държи добре в кофата и обогатява вашия балкон или градина с екзотичните си цветя през цялото лято. **Естествено местоположение:** Клонът на папала расте в сухите части на Австралия и северна Южна Австралия и се счита за националното цвете на Южна Австралия. **Успешно отглеждане:** Отглеждането от семена е възможно на закрито през цялата година. За да се повиши кълняемостта на семената, те трябва първо да се нагряват с шкурка или пила и след това да се оставят да се накиснат във вода със стайна температура за 24 часа. Тъй като по-късно разсадът е много чувствителен към пикиране, препоръчително е да се сее директно в малко по-голяма саксия. Поставете семената на един сантиметър във влажна почва за саксии и ги покрийте със средата за саксии. Покрийте съда с култура с домакинско фолио, което сте осигурили с дупки. Това предпазва почвата от изсушаване. Трябва да отстранявате фолиото за 2 часа на всеки два до три дни. Това предотвратява образуването на мухъл върху растящата почва. Поставете саксията със семена на светло и топло място с 20 до 25° по Целзий и поддържайте почвата влажна, но не мокра. Първите разсад се появяват след две до шест седмици. **Най-доброто местоположение:** За силен растеж и богато образуване на цветове, дяволската глава се нуждае от слънчево, защитено от вятър и топло място през летните месеци. Затова кофата трябва да е на открито само през топлите летни месеци. **Оптимална грижа:** Човката на папала е чувствителна към твърде много влага. Поради това е препоръчително да се използва почвена смес с много (до една трета) примесени пясък, перлит или експандирана глина. Трябва също да избягвате преовлажняване, причинено от остатъчна вода в подложката за чаша. През месеците от май до октомври трябва да снабдявате вашето растение с тор за контейнерни растения на интервали от 14 дни. Подрязването може да се ограничи до подрязване на по-стари клонове веднъж годишно. **През зимата:** Най-добре е дяволската глава да зимува в светло помещение при температура от 5° до 15° по Целзий. Тъмните стаи не са подходящи за зимен сън. Поливайте достатъчно, за да предпазите кореновата топка от изсъхване.



Papegøjenæb / Djævehoved

Clianthus formosus syn. Swaisonia formosa

Lak rødt næb blomstrer!

Det stedsgrønne djævehoved er en langsomt voksende klatrende busk med smukt finnedede, ovale og fløjlsagtige behårede blade. Dens varemærke er de slående, langstilkede og op til otte centimeter lange, opretstående kronblade. Den karakteristiske sorte plet er placeret i midten af de næb lignende blomster, som stråler i lakeret rødt. Med et klatrehjælpemiddel kan papegøjens næb holdes godt i spanden og beriger din altan eller have med sine eksotiske blomster hele sommeren. **Naturlig beliggenhed:** Papegøjens næb vokser i Australiens tørre indre og det nordlige Sydaustralien og betragtes som den nationale blomst i det sydlige Australien. **Succesfuld dyrkning:** Dyrkning fra frø er mulig indendørs hele året rundt. For at øge spireevnen af frøene bør de først gøres ru med sandpapir eller en fil og derefter lade dem trække i vand ved stuetemperatur i 24 timer. Da frøplanterne senere er meget følsomme over for udprækning, er det tilrådeligt at så direkte i en lidt større potte. Læg frøene en centimeter i fugtig pottejord og dæk dem med pottemediet. Dæk dyrkningskarret til med husholdningsfilm, som du forsyner med huller. Dette beskytter jorden mod udtørring. Du bør fjerne folien i 2 timer hver anden til tredje dag. Dette forhindrer mug i at dannes på den voksende jord. Stil frøpotten et let og varmt sted med 20 til 25° Celsius og hold pottejorden fugtig, men ikke våd. De første frøplanter vises efter to til seks uger. **Den bedste beliggenhed:** For stærk vækst og en rig dannelse af blomster har djævelens hoved brug for en solrig, vindbeskyttet og varm placering i sommermånederne. Derfor bør spanden kun stå udendørs i de varme sommermåneder. **Optimal pleje:** Papegøjens næb er følsomt over for meget fugt. Det er derfor tilrådeligt at bruge en jordblanding med rigeligt (op til en tredjedel) sand, perlit eller ekspanderet ler iblandet. Du bør også undgå vandfyldning forårsaget af resterende vand i coasteren. I månederne maj til oktober bør du forsyne din plante med containerplantegødning med 14 dages mellemrum. Beskæring kan begrænses til beskæring af ældre grene en gang om året. **Om vinteren:** Det er bedst at overvintre djævelens hoved i et lyst rum ved 5° til 15°Celsius. Mørke rum er ikke egnede til dvale. Vand kun nok til at forhindre rodklumpen i at tørre ud.



Papageischnabel / Teufelskopf

Clianthus formosus syn. Swaisonia formosa

Lackrote Schnabelblüten!

Der immergrüne Teufelskopf ist ein langsamwüchsiger Kletterstrauch mit hübsch gefiederten ovalen und samtig behaarten Blättern. Sein Markenzeichen sind die auffälligen, langgestielten und bis zu acht Zentimeter langen, aufrechtstehenden Blütenblätter. In der Mitte der lackrot strahlenden, schnabelartigen Blüten befindet sich der charakteristische schwarze Fleck. Mit einer Kletterhilfe kann der Papageischnabel gut im Kübel gehalten werden und bereichert Ihren Balkon oder Garten den ganzen Sommer über mit seinen exotischen Blüten. **Naturstandort:** Der Papageischnabel wächst im trockenen Inneren von Australien sowie im nördlichen Süd-Australien und gilt als die Nationalblume von Süd-Australien. **Anzucht:** Die Anzucht aus Samen ist im Haus das ganze Jahr über möglich. Um die Keimfähigkeit der Samen zu erhöhen, sollten sie zunächst mit Sandpapier oder einer Feile angeraut werden und danach für 24 Stunden in Wasser bei Raumtemperatur vorquellen können. Da die Sämlinge später sehr empfindlich gegen Pikieren sind, empfiehlt es sich, die Aussaat direkt in einem etwas größeren Topf vorzunehmen. Setzen Sie die Samen einen Zentimeter in feuchte Anzuchterde und bedecken Sie sie mit dem Anzuchtsubstrat. Decken Sie das Anzuchtgefäß mit Klarsichtfolie ab, die Sie mit Löchern versehen. So ist die Erde vor Austrocknung geschützt. Alle zwei bis drei Tage sollten Sie die Folie für 2 Stunden entfernen. Das beugt einer Schimmelbildung auf der Anzuchterde vor. Stellen Sie das Anzuchtgefäß an einen hellen und warmen Ort mit 20 bis 25° Celsius und halten Sie die Anzuchterde feucht, aber nicht nass. Nach zwei bis sechs Wochen erscheinen dann die ersten Sämlinge. **Standort:** Für ein kräftiges Wachstum und eine reiche Blütenbildung benötigt der Teufelskopf während der Sommermonate einen sonnigen, windgeschützten und warmen Standort. Daher sollte der Kübel auch nur in den warmen Sommermonaten im Freien stehen. **Pflege:** Der Papageischnabel ist empfindlich gegen zuviel Nässe. Es empfiehlt sich daher ein Erdgemisch, dem reichlich (bis zu einem Drittel) Sand, Perlite oder Blähton untergemischt ist. Auch Staunässe durch Restwasser im Untersetzer sollten Sie vermeiden. In den Monaten Mai bis Oktober sollten Sie Ihre Pflanze in einem Abstand von 14 Tagen mit Kübelpflanzendünger versorgen. Der Beschnitt kann auf das Auslichten älterer Zweige einmal jährlich beschränkt werden. **Im Winter:** Am besten überwintern Sie den Teufelskopf in einem hellen Raum bei 5° bis 15°Celsius. Dunkle Räume sind zur Überwinterung nicht geeignet. Gießen Sie nur noch soviel, dass der Wurzelballen nicht austrocknet.



Sturt's Desert Pea

Clianthus formosus syn. Swaisonia formosa

Shiny red rostrate flowers

The evergreen Sturt's Desert Pea is a slow-growing climbing bush with neatly pinnate, round-shaped and velvety haired leaves. Its trademark are the remarkable long-stalked and up to 8 cm long, upright standing petals. In the center of the shiny red, rostrate flowers is the characteristic black spot located. With a climbing aid the Sturt's Desert Pea can easily be cultivated as a tub plant and will decorate your balcony or garden all summer with its exotic blossoms. **Natural location:** The Sturt's Desert Pea has its natural habitat in the dry zones of Central Australia as well as in northern South Australia, where it is the national flower. **Successful cultivation:** Seed propagation indoors is possible throughout the year. To increase the germinability, you can slightly roughen the seed with a soft file or a piece of sandpaper and place it for about 24 hours in warm water for priming. Since the seedlings will be quite sensitive to pricking out later on, it is advisable to use a bigger pot for the propagation right away. Just plant the seeds about 1 cm deep into moist potting compost, put some compost earth on top and cover the seed container with clear film to prevent the earth from drying out. Don't forget to make some holes in the clear film and take it every second or third day completely off for about 2 hours. That way you avoid mold formation on your potting compost. Place the seed container somewhere bright and warm with a temperature between 20° and 25° Celsius and keep the earth moist, but not wet. After two to six weeks, the first seedlings will come up. **The best location:** To develop a strong growth with rich blossoming, the Sturt's Desert Pea needs a warm and sunny, wind-protected place during summer. Therefore, your tub plant should only be kept outdoors during the warm summer months. **Optimal care:** The Sturt's Desert Pea is sensitive to strong wetness. It is advisable to use a mixed soil with a good portion of sand, perlite or expanded clay. Waterlogging, especially in the saucer has to be avoided. From May until October you should give fertilizer for tub plants every two weeks. As for pruning it is enough to thin out old branches once a year. **In the winter:** The Sturt's Desert Pea is best kept in a bright room with a temperature of 5° to 15°Celsius. Dark places or not suitable for hibernation. Water the plant only modest, so the roots don't dry out.



Papagoi nokk / kuradipea

Clianthus formosus syn. Swaisonia formosa

Lakkpunane noka öied!

Igihaljas kuradipea on aeglaselt kasvav ronimis põõsas, millel on kaunitult sulgjas, ovaalsed ja sametiselt karvased lehed. Selle kaubamärgiks on silmatorkavad pika varrega ja kuni kaheksa sentimeetri pikkused püstised kroonlehed. Iseloomulik must laik paikneb nokataoliste õite keskel, mis kiirgavad lakipunasesena. Ronimisabiga saab papagoi noka hästi ämbris hoida ja rikastada teie rõdu või aeda oma eksotiliste õitega terve suve. **Looduslik asukoht:** Papagoi nokk kasvab Austraalia kuival sisemaal ja Lõuna-Austraalia põhjaosas ning seda peetakse Lõuna-Austraalia rahvuslilleks. **Edukas kasvatamine:** Seemnest kasvatamine on võimalik siseruumides aastaringselt. Seemnete idanemisvõime suurendamiseks tuleks need esmalt liivapaberi või viiliga karestada ning seejärel lasta 24 tundi toatemperatuuril vees liugeneda. Kuna istikud on hiljem väga tundlikud väljatorkamise suhtes, on soovitatav külvata otse veidi suuremasse potti. Asetage seemned üks sentimeeter niiskesse potimuld ja katke need istutusõitmega. Kata kultuurianum toidukilega, mille varustad aukudega. See kaitseb mulda kuivamise eest. Peaksite fooliumi eemaldama 2 tunniks iga kahe kuni kolme päeva järel. See takistab hallituse teket kasvupinnal. Asetage külvipott valgusküllasesse ja sooja kohta, mille temperatuur on 20–25 °C, ning hoidke istutusmuld niiskena, kuid mitte märjana. Esimesed seemikud ilmuvad kahe kuni kuue nädala pärast. **Parim asukoht:** Tugeva kasvu ja rikkaliku õite moodustumise jaoks vajab kuradipea suvekuudel päikeselist, tuule eest kaitsitud ja sooja kasvukohta. Seetõttu peaks ämber olema väljas ainult soojadel suvekuudel. **Optimaalne hooldus:** Papagoi nokk on tundlik liigse niiskuse suhtes. Seetõttu on soovitatav kasutada mullasegu, kuhu on segatud ohtralt (kuni kolmandikku) liiva, perliiti või paisutatud savi. Samuti peaksite vältima veekogumist, mis on põhjustatud rannasõidulaeva jääkveest. Maist oktoobrini peaksite oma taime varustama konteinerväetisega 14-päevaste intervallidega. Lõikamine võib piirduda vanemate pügamistega kord aastas. **Talvel:** Kõige parem on kuradipead üle talvitada valgusküllases ruumis, mille temperatuur on 5° kuni 15°C. Pimedad ruumid ei sobi talveuneks. Kasta ainult nii palju, et juurevall ei kuivaks.



Papukaijan nokka / Paholaisen pää

Clianthus formosus syn. Swaisonia formosa

Lakka punainen nokka kukkii!

Ikivihreä paholaisen pää on hitaasti kasvava kiipeävä pensas, jonka lehdet ovat kauniin pinnat, soikeat ja samettisen karvaiset. Sen tavamerkkejä ovat silmiinpistävät, pitkävärtiset ja jopa kahdeksan senttimetriä pitkät pystysuorat terälehdet. Tyypillinen musta täplä sijaitsee nokkamaisten kukkien keskellä, jotka säteilevät lakatun punaisena. Kiipeilyapuväljelineellä papukaijan nokka pysyy hyvin ämpärissä ja rikastuttaa parvekkeesi tai putarhaasi eksoottisilla kukilla koko kesän. **Luonnollinen sijainti:** Papukaijan nokka kasvaa Australian kuivissa sisäosissa ja Etelä-Australian pohjoisosassa, ja sitä pidetään Etelä-Australian kansalliskukkana. **Onnistunut viljely:** Siemenestä viljely on mahdollista sisätiloissa ympäri vuoden. Siementen itämiskyvyn lisäämiseksi ne tulee ensin karhentaa hiekkapaperilla tai viilalla ja antaa sitten liota vedessä huoneenlämmössä 24 tuntia. Koska taimet ovat myöhemmin erittäin herkkiä pistoksille, on suositeltavaa kylvää suoraan hieman isompaan ruukkuun. Aseta siemenet sentin verran kosteaan istutusmaahan ja peitä ne istutusaineella. Peitä viljelyastia kelmulla, johon on tehty reikiä. Tämä suojaa maaperää kuivumiselta. Poista folio 2 tunnin ajaksi kahden tai kolmen päivän välein. Tämä estää homeen muodostumisen kasvumaahan. Aseta siemenruukku valoisaan ja lämpimään paikkaan, jonka lämpötila on 20–25 °C, ja pidä istutusmaa kosteana, mutta ei märkänä. Ensimmäiset taimet ilmestyvät kahden tai kuuden viikon kuluttua. **Paras sijainti:** Voimakkaan kasvun ja runsaan kukkamuodostuksen saamiseksi paholaisen pää tarvitsee aurinkoisen, tuulelta suojatun ja lämpimän paikan kesäkuukausina. Siksi kauhun tulisi olla ulkona vain lämpiminä kesäkuukausina. **Optimaalinen hoito:** Papukaijan nokka on herkkä liialliselle kosteudelle. Siksi on suositeltavaa käyttää maaseosta, johon on sekoitettu runsaasti (jopa kolmasosa) hiekkaa, perliittiä tai paisutettua savea. Vältä myös lasialustaan jääneen veden aiheuttamaa kastumista. Toukokuusta lokakuuhun sinun tulee toimittaa kasvillesi sääliökasvilannoitetta 14 päivän välein. Leikkaaminen voidaan rajoittaa vanhempien oksien karsimiseen kerran vuodessa. **Talvella:** Paholaisen pää on parasta talvehtia valoisassa huoneessa, jonka lämpötila on 5–15 °C. Pimeät huoneet eivät sovellu lepotilaan. Kastele vain sen verran, että juuripallo ei kuivu.



Bec de perroquet / Tête de diable

Clianthus formosus syn. Swaisonia formosa

Des fleurs laque rouge en forme de bec !

La tête de diable sempervirente est une plante grimpante à croissance lente avec des feuilles ovales joliment pennées et veloutées. Ses signes distinctifs sont les pétales frappantes, aux longues tiges, et d'une longueur jusqu'à huit centimètres qui se tiennent droites. La tache noire caractéristique se trouve au milieu des fleurs rouges éclatantes et en forme de bec. Le bec de perroquet peut être bien entretenu en pot à l'aide d'un support pour plantes grimpantes et enrichit votre balcon ou votre jardin pendant tout l'été avec ses fleurs exotiques. **Emplacement naturel:** Le pois du désert de Sturt grandit à l'intérieur aride d'Australie, ainsi qu'au nord de l'Australie du Sud, et est la fleur nationale de l'Australie du Sud. **Culture réussie:** La culture des graines à la maison est possible tout au long de l'année. Pour améliorer la faculté germinative des graines, il faut d'abord les rendre rugueuses avec du papier de verre ou une lime, puis les mettre dans de l'eau à température ambiante pendant 24 heures. Comme les semis sont très sensibles au repiquage plus tard, il est conseillé de les mettre directement dans un pot un peu plus gros. Mettez les graines dans du terreau humide à environ un centimètre de profondeur et recouvrez-les avec le substrat. Couvrez le récipient avec une feuille transparente dans laquelle vous faites des trous. Comme ça, le terreau est protégé du dessèchement. Vous devez enlever la feuille pendant deux heures tous les deux ou trois jours. Ceci prévient la formation de moisissures dans le terreau. Mettez le récipient dans un endroit lumineux et chaud de 20° à 25° Celsius et gardez le terreau humide, mais pas mouillé. Les premiers semis apparaissent après deux à six semaines. **Le meilleur emplacement:** Pour une forte croissance et une floraison abondante, la tête de diable a besoin d'un emplacement ensoleillé et chaud qui peut aussi être protégé du vent en été. Le pot ne doit donc être en plein air qu'en été. **Soins optimaux:** Le bec de perroquet est sensible à trop d'humidité. Il est donc conseillé d'avoir un mélange de terre avec beaucoup (jusqu'à 1/3) de sable, perlite, ou argile expansée. Vous devez aussi éviter l'eau stagnante par eau résiduelle dans la soucoupe. Vous devez engraisser votre plante tous les 14 jours entre mai et octobre avec de l'engrais pour plantes en pot. La taille peut être réduite une fois par an pour les branches plus anciennes. **En hiver:** La tête de diable hiverne le mieux dans une salle lumineuse à 5°-15° Celsius. Les salles sombres ne sont pas adaptées à l'hivernage. N'arrosez que suffisamment pour que la motte de racines ne se dessèche pas.



Ράμφος Παπαγάλου / Κεφάλι του Διαβόλου

Clianthus formosus syn. Swaisonia formosa

Ανθίζει κόκκινο ράμφος λάκας!

Το αιθαλέ κεφάλι του διαβόλου είναι ένας αργά αναπτυσσόμενος θάμνος με όμορφα πτερωτή, οβάλ και βελούδινα τριχωτά φύλλα. Το σήμα κατατεθέν του είναι τα εντυπωσιακά, μακρόστενα και μήκους έως οκτώ εκατοστών, όρθια πέταλα. Η χαρακτηριστική μαύρη κηλίδα βρίσκεται στο κέντρο των λουλουδιών που μοιάζουν με ράμφος, τα οποία ακτινοβολούν σε λακαιομένο κόκκινο. Με ένα βολήθιμα αναρρίχησης, το ράμφος του παπαγάλου μπορεί να κρατηθεί καλά στον κορμό και εμπλουτίζει το μπαλκόνι ή τον κήπο σας με τα εξωτικά λουλούδια του όλο το καλοκαίρι. **Φυσική τοποθεσία:** Το ράμφος του παπαγάλου αναπτύσσεται στο άδυδρο εσωτερικό της Αυστραλίας και στη βόρεια Νότια Αυστραλία και θεωρείται το εθνικό λουλούδι της Νότιας Αυστραλίας. **Επιτυχημένη καλλιέργεια:** Η καλλιέργεια από σπόρους είναι δυνατή σε εσωτερικούς χώρους όλο το χρόνο. Για να αυξηθεί η βλαστική ικανότητα των σπόρων, θα πρέπει πρώτα να τραχυθούν με γυαλόχαρτο ή λίμα και μετά να αφεθούν να μουλιάσουν σε νερό σε θερμοκρασία δωματίου για 24 ώρες. Δεδομένου ότι τα σπορόφυτα αργότερα είναι πολύ ευαίσθητα στο τρύπημα, συνιστάται η σπορά απευθείας σε μια ελαφρώς μεγαλύτερη γλάστρα. Τοποθετήστε τους σπόρους κατά ένα εκατοστό σε υγρό χώμα γλάστρας και καλύψτε τους με το μέσο της γλάστρας. Καλύψτε το δοχείο καλλιέργειας με μεμβράνη, την οποία ανοίγετε με τρύπες. Αυτό προστατεύει το έδαφος από το στέγνωμα. Θα πρέπει να αφαιρεθεί το αλουμινοχαρτό για 2 ώρες κάθε δύο έως τρεις ημέρες. Αυτό αποτρέπει τη δημιουργία μούχλας στο αναπτυσσόμενο έδαφος. Τοποθετήστε τη γλάστρα σε ένα ελαφρύ και ζεστό μέρος σε θερμοκρασία 20 έως 25° Κελσίου και διατηρήστε το χώμα της γλάστρας υγρό αλλά όχι υγρό. Τα πρώτα σπορόφυτα εμφανίζονται μετά από δύο έως έξι εβδομάδες. **Η καλύτερη τοποθεσία:** Για σχοιρή ανάπτυξη και πλούσιο σχηματισμό λουλουδιών, το κεφάλι του διαβόλου χρειάζεται μια ηλιόλουστη, προστατευμένη από τον αέρα και ζεστή τοποθεσία κατά τους καλοκαιρινούς μήνες. Επομένως, ο κώδος πρέπει να βρίσκεται σε εξωτερικό χώρο μόνο τους ζεστούς καλοκαιρινούς μήνες. **Βέλτιστη φροντίδα:** Το ράμφος του παπαγάλου είναι ευαίσθητο στην υπερβολική υγρασία. Επομένως, συνιστάται η χρήση ενός μίγματος εδάφους με άφθονη (έως το ένα τρίτο) άμμου, περλίτη ή διογκωμένης αργίλου αναμεμιγμένη. Θα πρέπει επίσης να αποφύγετε την υπερχειλίση που προκαλείται από το υπόλοιπο νερό στο σουβέρ. Τους μήνες Μάιο έως Οκτώβριο θα πρέπει να προμηθεύετε το φυτό σας με λίπασμα φυτών δοχείων σε διαστήματα 14 ημερών. Το κλάδεμα μπορεί να περιοριστεί στο κλάδεμα παλαιότερων κλαδιών μία φορά το χρόνο. **Το χειμώνα:** Είναι καλύτερο να ξεχειμωνιάζετε το κεφάλι του διαβόλου σε ένα φωτεινό δωμάτιο στους 5° έως 15° Κελσίου. Τα σκοτεινά δωμάτια δεν είναι κατάλληλα για αδρανοποίηση. Ποτίστε μόνο τόσο ώστε να μην στεγνώσει η ρίζα.



Gob na bParrot / Ceann an Diabhail

Clianthus formosus syn. Swaisonia formosa

Bláthanna gog dearg laicir!

Is tor dreapadóireachta a fhásann go mall é cloigeann an diabhail shíorghlas le duilleoga gruagacha áille bioránacha, ubhchruthacha agus velvety. Is iad a thrádmharca na peitil buailte, fadbhacha agus suas le hocht ceintiméadar ar fad, ina seasamh. Tá an láthair dubh sainiúil suite i lár na bláthanna cosúil le gob, atá radiantach i dearg laiceairithe. Le cúnamh dreapadóireachta, is féidir gob an parrot go maith sa bhúicéad agus saibhrionn sé do bhalcóin nó do ghairdín lena bláthanna coimhthíocha an samhradh ar fad. **Suíomh nádúrtha:** Fásann gob an parrot i taobh istigh cras na hAstráile agus i dtuaisceart na hAstráile Theas agus meastar gurb é bláth náisiúnta na hAstráile Theas é. **Saothrú rathúil:** Is féidir fás ón síol taobh istigh ar feadh na bliana. D'fhonn cumas phéacadh na síolta a mhéadú, ba chóir iad a garbh ar dtús le páirín nó comhad agus ansin ligean dóibh sáithithe in uisce ag teocht an tseomra ar feadh 24 uair an chloig. Ós rud é go bhfuil na síológa níos déanaí an-fogair maidir le piocadh amach, moltar iad a chur go díreach i bpotá beagán níos mó. Cuir na síolta ceintiméadar amháin in ithir potaithe tais agus clúdaigh leis an meán potaithe iad. Clúdaigh an soitheach cultúir le scannán cling, a sholáthraíonn tú le poill. Cosnaíonn sé seo an ithir ó thriomú amach. Ba chóir duit an scragall a bhaint ar feadh 2 uair gach dhá nó trí lá. Cuireann sé seo cosc ar mhúnlá a fhoirmiú ar an ithir atá ag fás. Cuir an pota síolta in áit éadrom te ag 20 go 25 ° Celsius agus coinnigh an ithir potaithe tais ach ní fliuch. Tá na chéad síológa le feiceáil tar éis dhá go sé seachtaine. **An suíomh is fearr:** Le haghaidh fás láidir agus foirmiú saibhir bláthanna, tá suíomh griannmhar, cosanta ag an ngeath agus te ag teastáil ó cheann an diabhail i rith míonna an tsamhraidh. Dá bhri sin, níor chóir go mbeadh an buicéad lasmuigh ach amháin i míonna te an tsamhraidh. **Cúram is fearr is féidir:** Tá gob an parrot fogair do iomarca taise. Tá sé inmholta mar sin meascán ithreach a úsáid le neart (suas le trian) de ghaineamh, perlite nó cré leathnaithe measctha i. Ba chóir duit freisin a sheachaint waterlogging de bharr uisce iarmharach sa coaster. Sna míonna ó Bhealtaine go Deireadh Fómhair ba chóir duit leasachán planda coimeádán a sholáthar do do phlanda ag eatraimh 14 lá. Is féidir bearradh a theorannú go bearradh brainsí níos sine uair sa bhliain. **Sa gheimhreadh:** Is fearr ceann an diabhail a gheimhriú i seomra gael ag 5° go 15°Celsius. Níl seomraí dorchá oiriúnach don gheimhreadh. Uisce ach go leor chun an liaithróid fhréamh a choinneáil ó thriomú amach.



Parrot's Beak / Djöfulsins höfuð

Clianthus formosus syn. Swaisonia formosa

Lakk rauð gogg blómstrar!

Sígræna djöfulsins höfuðið er hægvasinn klifurrinni með fallega fjöðruðum, sporöskjulaga og flauelsmjúkum loðnum laufum. Vörumerki þess eru áberandi, langstíkuð og allt að átta sentímetra löng, upprétt blöð. Einkennandi svarti bletturinn er staðsettur í miðju goggalíku blómanna, sem eru geislandi í lakkaðri rauðu. Með klifurhjálpi er hægt að geyma gogg páfagauksins vel í fötunni og auðgar svalirnar þinar eða garðinn með framandi blómum sínum allt sumarið. **Náttúruleg staðsetning:** Gogg páfagauksins vex í þurru innanríki Ástralíu og í norðurhluta Suður-Ástralíu og er talið þjóðarblóm Suður-Ástralíu. **Árangursrík ræktun:** Ræktun úr fræi er möguleg innandyra allt árið um kring. Til þess að auka spirunargetu fræanna þarf fyrst að grófa þau með sandpappír eða skrá og láta síðan liggja í bleyti í vatni við stofuhita í 24 klukkustundir. Þar sem plönturnar eru seinna mjög viðkvæmar fyrir því að stinga út er ráðlegt að sá beint í aðeins stærri pott. Setjið fræin einn sentímetra í rakan pottjarðveg og hyljið þau með pottinum. Hyljið ræktunarlíatið með matarfilmu, sem þú útvegar með götum. Þetta verndar jarðveginn gegn þurrkun. Þú ættir að fjarlægja álpappírinn í 2 klukkustundir á tveggja til þriggja daga fresti. Þetta kemur í veg fyrir að mygla myndist á vaxandi jarðvegi. Settu fræpottinn á léttan og heitan stað með 20 til 25° Celsius og haltu pottjarðveginum rökum en ekki blautum. Fyrstu plönturnar birtast eftir tvær til sex vikur. **Besta staðsetningin:** Fyrir sterkan vöxt og ríka myndun blóma þarf höfuð djöfulsins sólríka, vindverndaða og hlýja stað yfir sumarmánuðina. Þess vegna ætti fötan aðeins að vera utandyra á heitum sumarmánuðum. **Besta umönnun:** Gogg páfagauksins er viðkvæmt fyrir öf miklum raka. Því er ráðlegt að nota jarðvegsblöndu með miklu (allt að þriðjung) af sandi, perlíti eða stækkuðum leir blandað í. Þú ættir líka að forðast vatnsrensli af völdum afgangsvatns í hafnarbakkanum. Í mánuðinum maí til október ættir þú að útvega plöntunni þinni gámaplöntuáburð með 14 daga millibili. Hægt er að takmarka klippingu við að klippa eldri greinar einu sinni á ári. **Á veturna:** Best er að yfirvetra höfuð djöfulsins í björtu herbergi við 5° til 15°Celsius. Dökk herbergi henta ekki í dvala. Vatn aðeins nóg til að koma í veg fyrir að rótarkúlan þorni.



Becco di pappagallo

Clianthus formosus syn. Swaisonia formosa

Fiori a forma di becco color rosso laccato

La Swaisonia sempreverde è un arbusto rampicante a crescita lenta con foglie palmate ovali, ricoperte da una peluria vellutata. Il suo segno distintivo sono i petali appariscenti dal lungo stelo, che crescono dritti fino a otto centimetri di lunghezza. Al centro del fiore color rosso splendente dalla forma a becco si trova la caratteristica macchia nera. Con l'aiuto di un tutore per rampicanti la Swaisonia può essere coltivata bene in vaso e per tutta l'estate arricchirà il vostro balcone o giardino con i suoi fiori esotici. **Posizione naturale:** La Swaisonia cresce nell'asciutto interland australiano così come in Australia meridionale, dove rappresenta il fiore nazionale. **Coltivazione riuscita:** La coltivazione da semi in casa è possibile durante tutto l'anno. Per aumentare la germinabilità dei semi, strofinateli per prima cosa con carta vetrata o con una lima, poi lasciateli immersi per 24 ore in acqua a temperatura ambiente affinché si gonfino. Poiché in seguito i semi saranno molto sensibili al trapianto, si consiglia di metterli a dimora direttamente in un vaso più grande. Collocate i semi a circa un centimetro di profondità nella terra di coltivo umida e copriteli con il substrato. Coprite il recipiente di coltivazione con pellicola trasparente, sulla quale praticherete dei fori, in questo modo la terra eviterà di seccarsi. Ogni due o tre giorni rimuovete la pellicola per 2 ore, per prevenire la formazione di muffe sulla terra. Collocate il recipiente di coltivazione in un luogo luminoso e caldo, a una temperatura fra i 20° e i 25°C e mantenete la terra umida, ma non bagnata. Le prime piantine compaiono da due a sei settimane dopo. **La posizione migliore:** Per una crescita forte e una ricca fioritura, durante i mesi estivi la Swaisonia ha bisogno di un luogo soleggiato, caldo e al riparo dal vento. In questo periodo dunque il vaso può stare bene all'aperto. **Cura ottimale:** La Swaisonia teme la troppa acqua. Per questo si consiglia un miscuglio di terra e una componente (fino a un terzo) a scelta fra sabbia, perlite o argilla espansa. Evitate anche il ristagno idrico causato dall'acqua rimanente nel sottovaso. Nel periodo da maggio a ottobre, concimate la pianta ogni 14 giorni con fertilizzante per piante in vaso. La potatura può essere limitata allo sfrondare i rami più vecchi una volta all'anno. **In inverno:** Per lo svernamento la Swaisonia predilige uno spazio luminoso, con una temperatura fra i 5° e i 15° C. Durante l'inverno non sono adatti gli spazi scuri, in questo periodo innaffiate ancora il minimo indispensabile per non far seccare il pane di radici.



Papagajev kljun / Đavolja glava

Clianthus formosus syn. Swaisonia formosa

Lakirani crveni kljunasti cvjetovi!

Zimzelena vražja glavica je spororastući penjački grm s lijepo perastim, ovalnim i baršunasto dlakavim listovima. Njegov zaštitni znak su upečatljive, duge peteljke i do osam centimetara duge, uspravne latice. Karakteristična crna mrlja nalazi se u središtu kljunastih cvjetova koji blistaju u lakirano crvenoj boji. Uz pomoć za penjanje, kljun papige može se dobro držati u kanti i obogaćuje vaš balkon ili vrt svojim egzotičnim cvijećem cijelo ljeto. **Zemlja porijekla:** Papagajev kljun raste u sušnoj unutrašnjosti Australije i sjevernoj Južnoj Australiji i smatra se nacionalnim cvijetom Južne Australije. **Uspješan uzgoj:** Uzgoj iz sjemena moguć je u zatvorenom tijekom cijele godine. Kako bi se povećala klijavost sjemena, potrebno ga je najprije nahrapaviti brusnim papirom ili turpijom, a potom ostaviti da odstoji 24 sata u vodi sobne temperature. Budući da su presadnice kasnije vrlo osjetljive na pikiranje, preporučljivo je sijati direktno u malo veću posudu. Stavite sjeme jedan centimetar u vlažnu zemlju za lonce i prekritje ga medijem za lonce. Posudu s kulturom prekritje prozornom folijom koju ste opremili rupama. To štiti tlo od isušivanja. Svaka dva do tri dana skinite foliju na 2 sata. Time se sprječava stvaranje plijesni na tlu za uzgoj. Stavite posudu za sjeme na svijetlo i toplo mjesto s 20 do 25° Celzija i održavajte tlo za saksije vlažnim, ali ne mokrim. Prve sadnice pojavljuju se nakon dva do šest tjedana. **Najbolja lokacija:** Za snažan rast i bogato formiranje cvjetova vražja glava treba sunčan, od vjetra zaštićen i topao položaj tijekom ljetnih mjeseci. Stoga bi kanta trebala biti na otvorenom samo u toplim ljetnim mjesecima. **Optimalna njega:** Kljun papige je osjetljiv na previše vlage. Stoga je preporučljivo koristiti mješavinu tla s dosta (do trećine) pijeska, perlita ili ekspandirane gline. Također biste trebali izbjeđavati nakupljanje vode uzrokovano zaostalom vodom u podmetaču. U mjesecima od svibnja do listopada trebali biste svoju biljku opskrbljivati gnojivom za kontejnerske biljke u intervalima od 14 dana. Rezidba se može ograničiti na orezivanje starijih grana jednom godišnje. **U zimi:** Vražju glavicu najbolje je prezimiti u svijetloj prostoriji na 5° do 15°C. Tamne sobe nisu prikladne za hibernaciju. Zalijevajte tek toliko da se korijenska kugla ne osuši.



Papagaiļa knābis / Velna galva

Clianthus formosus syn. Swaisonia formosa

Lakas sarkans knābis zied!

Mūžzaļais velna galva ir lēni augošs kāpšanas krūms ar skaisti smailām, ovālām un samtaini matainām lapām. Tās firmas zīme ir uzkrītošās, ar gariem kātiem un līdz astoņus centimetrus garas, stāvas ziedlapiņas. Raksturīgais melnais plankums atrodas knābim līdzīgu ziedu centrā, kas mirdz lakotā sarkanā krāsā. Ar kāpšanas palīgīdzekli papagaiļa knābi var labi turēt spainī un bagātīnāt jūsu balkonu vai dārzu ar saviem eksotiskajiem ziediem visas vasaras garumā. **Dabiska vieta:** Papagaiļa knābis aug Austrālijas sausajā iekšienē un Dienvidaustrālijas ziemeļos un tiek uzskatīts par Dienvidaustrālijas nacionālo ziedu. **Veiksmīga audzēšana:** Audzēšana no sēklām ir iespējama telpās visu gadu. Lai palielinātu sēklu dīgtspēju, tās vispirms jāraupina ar smilšpapīru vai vīli un pēc tam jāļauj 24 stundas mērcēt istabas temperatūrā ūdenī. Tā kā stādi vēlāk ir ļoti jutīgi pret izduršanu, vēlams sēt tieši nedaudz lielākā podā. Ievietojiet sēklas vienu centimetru mitrā augsnē un pārklājiet tās ar stādīšanas vidi. Nosedziet kultivēšanas trauku ar pārtikas plēvi, kuru nodrošina ar caurumiem. Tas pasargā augsni no izžūšanas. Jums vajadzētu noņemt foliju 2 stundas ik pēc divām līdz trim dienām. Tas novērš pelējuma veidošanos augošajā augsnē. Novietojiet sēklu podu gaišā un siltā vietā ar temperatūru 20 līdz 25 ° C un turiet augsni mitru, bet ne mitru. Pirmie stādi parādās pēc divām līdz sešām nedēļām. **Labākā atrašanās vieta:** Spēcīgai augšanai un bagātīgai ziedu veidošanai velna galvai vasaras mēnešos ir nepieciešama saulaina, vēja aizsargāta un silta vieta. Tāpēc spainim vajadzētu būt ārā tikai siltajos vasaras mēnešos. **Optimāla aprūpe:** Papagaiļa knābis ir jutīgs pret pārāk lielu mitrumu. Tāpēc ieteicams izmantot augsnes maisījumu, kurā ir iekļauts daudz (līdz trešdaļai) smilšu, perlīta vai keramzīta. Jums arī jāizvairās no ūdens aizsērēšanas, ko izraisa paliktņi esošais ūdens. No maija līdz oktobrim ik pēc 14 dienām apgādājiet savu augu ar konteineru mēslojumu. Atzarošana var aprobežoties ar vecāku zaru apgriešanu reizi gadā. **Ziemā:** Vislabāk velna galvu pārziemot gaišā telpā 5° līdz 15°C temperatūrā. Tumšas telpas nav piemērotas ziemas gulšanas režīmam. Laistiet tikai tik daudz, lai sakņu kamols neizžūtu.



Papūgos snapas / Velnio galva

Clianthus formosus syn. Swaisonia formosa

Lakas raudonas snapas žydi!

Visžālis velnio galva – lētai augantis vijoklis krūmas gražiai plunksnuotais, ovalais ir aksominiais plaukuotais lapais. Jo prekės ženklas yra ryškūs, ilgastiebiai ir iki aštuonių centimetrų ilgio vertikālūs ziedlapiņi. Būdinga juoda dėmė yra į snapą panašių gėlių, kurios švyti lakuota raudona spalva, centre. Su laipiojimo priemone papūgos snapas gali būti gerai laikomas kibire ir visą vasarą praturtins jūsų balkoną ar sodą egzotiškais žiedais. **Natūrali vieta:** Papūgos snapas auga sausringame Australijos viduje ir šiaurinėje Pietų Australijos dalyje ir yra laikomas nacionaline Pietų Australijos gėle. **Sėkmingas auginimas:** Auginti iš sėklų galima ištisus metus. Norint padidinti sėklų daigumą, pirmiausia jas reikia šiuurkštinti švitriiniu popieriumi arba dilde, o po to leisti 24 valandas mirkti kambario temperatūros vandenyje. Kadangi vėliau daigai labai jautrus išdygimui, patartina sėti tiesiai į kiek didesni vazonai. Įdėkite sėklas vieną centimetrą į drėgną vazoninę žemę ir uždenkite jas vazonine terpe. Kultūros indą uždenkite maistine plėvele, kurioje yra skylės. Tai apsaugo dirvą nuo išdžiūvimo. Kas dvi ar tris dienas 2 valandas nuimkite foliją. Tai neleidžia augančioje dirvoje susidaryti pelėsiui. Sėklų vazoną pastatykite šviesioje ir šiltoje vietoje, kurios temperatūra yra 20–25 ° C, o vazono žemė turi būti drėgna, bet ne šlapia. Pirmieji daigai pasirodo po dviejų–šešių savaičių. **Geriausia vieta:** Kad velnio galva stipriai augtų ir gausiai formuotųsi žiedai, vasaros mėnesiais velnio galvai reikia saulėtos, nuo vėjo apsaugotos ir šiltos vietos. Todėl kibiras lauke turėtų būti tik šiltas vasaros mėnesiais. **Optimali priežiūra:** Papūgos snapas jautrus per daug drėgmei. Todėl patartina naudoti žemių mišinį, į kurį įmaišoma daug (iki trečdaliu) smėlio, perlito ar keramzito. Taip pat turėtumėte vengti vandens užsikimšimo, kurį sukelia vandens likučiai padėkliuose. Gegužės–spalio mėnesiais kas 14 dienų turėtumėte tiekti augalą konteinerinėmis augalų trąšomis. Genėjimas gali apsiriboti senesnių šakų genėjimu kartą per metus. **Ziemą:** Geriausia velnio galvą žiemoti šviesioje patalpoje nuo 5° iki 15°C. Tamsios patalpos netinka žiemos miegui. Laistykite tik tiek, kad šaknies gumulas neišdžiūtų.



Munqar tal-Pappagall / Kap tax-Xitan

Clianthus formosus syn. Swaisonia formosa

Laker munqar aħmar blossoms!

Ir-ras tax-xitan Evergreen hija arbxuxell li jitla 'bil-mod bi weraq tax-xagħar sabiħ ħafna pinnate, ovali u bellusin. It-trademark tagħha huma l-petali wieqfa li jolqtu, bi zokk twil u twal sa tmien centimetri. Il-post iswed karatteristiku jinsab fiċ-ċentru tal-fjuri bħal munqar, li huma radjanti bl-aħmar verniċ. B'għajjuna għat-tixbit, il-munqar tal-pappagall jista' jinżamm sew fil-barmil u jsaħħaħ il-gallarija jew il-għnien tiegħek bil-fjuri eżotiċi tiegħu matul is-sajf kollu. **Post naturali:** Il-munqar tal-pappagall jikkber fl-intern niexef tal-Awstralja u fit-Tramuntana tal-Awstralja t'Isfel u huwa meqjus bħala l-fjura nazzjonali tal-Awstralja t'Isfel. **Kultivazzjoni b'suċċess:** It-ktabbir miż-żerriegħa huwa possibbli ġewwa s-sena kollha. Sabiex tizzied il-kapaċità tal-germinazzjoni taż-żrieragħ, l-ewwel għandhom jiġu mħarrġa b'karta sandpaper jew fajl u mbaġħad jithallew jixxarrbu fl-ilma f'temperatura tal-kamra għal 24 siegħa. Peress li n-nebbieta huma aktar tard sensittivi ħafna għat-tnaqqija, huwa rakkomandabbli li tinżerġha direttament f'borma kemmxejn akbar. Poġġi ż-żrieragħ centimetru wieħed f'ħamrija tal-qsari niedja u għattihom bil-mezz tal-qsari. Għatti l-bastiment tal-kultura b'cling film, li inti tipprovd i b'toqob. Dan jipproteġi l-ħamrija milli tinxef. Għandek tneħħi l-fojl għal saġhtejn kull jumejn jew tlett ijiem. Dan jipprevjeni l-iffurmar tal-moffa fuq il-ħamrija li qed tikber. Poġġi l-borma taż-żerriegħa f'post ħafif u šhun b'20 sa 25 ° Celsius u zomm il-ħamrija tal-qsari niedja izda mhux imxarba. L-ewwel nebbieta jidhru wara ġimagħtejn sa sitt ġimġat. **L-aħjar post:** Għal ktabbir qawwi u formazzjoni rikka ta' fjuri, ir-ras tax-xitan teħtieġ post xemxi, protett mir-riħ u šhun matul ix-xhur tas-sajf. Għalhekk, il-barmil għandu jkun barra biss fix-xhur šan tas-sajf. **Kura ottimali:** Il-munqar tal-pappagall huwa sensitiv għal wisq umdità. Għalhekk huwa rakkomandabbli li tuża taħlita tal-ħamrija b'ħafna (sa terz) ramel, perlit jew tafal estiz imħallta. Għandek tevita wkoll l-ilma ikkawżat minn ilma residwu fil-coaster. Fix-xhur ta' Mejju sa Ottubru għandek tipprovd i lill-impjant tiegħek b'fertilizzant tal-pjanti tal-kontenituri f'intervalli ta' 14-il jum. Iż-żbir jista' jkun limitat għaž-żbir ta' ferġat anzjani darba fis-sena. **Fix-xitwa:** L-aħjar huwa li tagħmel ix-xitwa r-ras tax-xitan f'kamra qawwiya f'5° sa 15° Celsius. Kmamar skuri mhumiex adattati għall-ibernazzjoni. Ilma biss biżżejjed biex iżzomm il-boċċa tal-għeruq milli tinxef.



Papegaai's Snavel / Duivelskop

Clianthus formosus syn. Swaisonia formosa

Lak rode snavel bloemen!

De groenblijvende duivelskop is een langzaam groeiende klimplant met prachtig geveerde ovale en fluweelzachte harige bladeren. Het handelsmerk zijn de opvallende, langgesteelde en tot acht centimeter lange, rechtopstaande bloembladen. De kenmerkende zwarte vlek bevindt zich in het midden van de lakrode, snavelachtige bloemen. Met een klimhulpmiddel kan de snavel van de papegaai goed in de emmer worden gehouden en verrijkt hij je balkon of tuin de hele zomer met zijn exotische bloemen. **Natuurlijke locatie:** De snavel van de papegaai groeit zowel in het droge binnenland van Australië als in het noorden van Zuid-Australië en wordt beschouwd als de nationale bloem van Zuid-Australië. **Succesvolle teelt:** Het kan het hele jaar door binnen uit zaden worden gekweekt. Om de kiemkracht van de zaden te vergroten, moeten ze eerst worden opgeruwd met schuurpapier of een vijl en daarna 24 uur laten weken in water op kamertemperatuur. Omdat de zaailingen erg gevoelig zijn voor later verspenen, is het raadzaam om ze direct in een iets grotere pot te zaaien. Zet de zaden een centimeter in vochtige potgrond en bedek ze met het groeisubstraat. Dek de kweekbak af met vershoudfolie, die u van gaten heeft voorzien. Dit beschermt de aarde tegen uitdroging. Om de twee tot drie dagen moet u de film gedurende 2 uur verwijderen. Dit voorkomt schimmelvorming op de teeltgrond. Zet de kweekbak op een lichte en warme plaats met 20 à 25 ° Celsius en houd de kweekgrond vochtig, maar niet nat. De eerste zaailingen verschijnen na twee tot zes weken. **De beste locatie:** Voor krachtige groei en overvloedige bloei heeft de duivelskop een zonnige, beschutte en warme standplaats nodig tijdens de zomermaanden. Daarom mag de emmer alleen in de warme zomermaanden buiten staan. **Optimale verzorging:** De snavel van de papegaai is gevoelig voor te veel vocht. Het is daarom aan te raden om een grondmengsel te gebruiken met daarin veel (tot een derde) zand, perliet of geëxpandeerde klei. U moet ook wateroverlast vermijden door restwater in de schotel. In de maanden mei t/m oktober dient u uw plant elke 14 dagen potplantenmest te geven. Het trimmen kan worden beperkt tot het één keer per jaar uitdunnen van oudere takken. **In de winter:** Het is het beste om het hoofd van de duivel te overwinteren in een lichte kamer bij 5° tot 15° Celsius. Donkere kamers zijn niet geschikt om te overwinteren. Giet alleen voldoende zodat de kluit niet uitdroogt.



Papegøyenebb / Djevelens hode

Clianthus formosus syn. Swaisonia formosa

Lakk rødnebb blomstrer!

Det eviggrønne djevelhodet er en saktevoksende klatrende busk med vakkert finne, ovale og fløyelsaktige hårete blader. Dens varemerke er de slående, langstilkede og opptil åtte centimeter lange, oppreiste kronbladene. Den karakteristiske sorte flekken befinner seg i midten av de neblignende blomstene, som stråler i lakkert rødt. Med et klatrehjelpemiddel kan papegøyenebbet holdes godt i bøtta og beriker din balkong eller hage med sine eksotiske blomster hele sommeren. **Naturlig beliggenhet:** Papegøyens nebb vokser i Australias tørre indre og nordlige Sør-Australia og regnes som nasjonalblomsten i Sør-Australia. **Vellykket dyrking:** Å dyrke fra frø er mulig innendørs hele året. For å øke spireevnen til frøene bør de først gjøres ru med sandpapir eller fil og deretter la de ligge i vann ved romtemperatur i 24 timer. Siden frøplantene senere er svært følsomme for utstikking, er det lurt å så direkte i en litt større potte. Plasser frøene en centimeter i fuktig pottejord og dekk dem med pottemediet. Dekk kulturkaret med matfilm, som du forsyner med hull. Dette beskytter jorda mot å tørke ut. Du bør fjerne folien i 2 timer annenhver til tredje dag. Dette forhindrer at det dannes mugg på den voksende jorda. Plasser frøpotten på et lett og varmt sted med 20 til 25° Celsius og hold pottejorda fuktig, men ikke våt. De første frøplantene vises etter to til seks uker. **Den beste beliggenheten:** For sterk vekst og en rik dannelse av blomster trenger djevelens hode en solrik, vindbeskyttet og varm plassering i sommermånedene. Derfor skal bøtta kun stå utendørs i de varme sommermånedene. **Optimal omsorg:** Papegøyenebbet er følsomt for for mye fuktighet. Det er derfor lurt å bruke en jordblanding med mye (opptil en tredjedel) sand, perlit eller ekspandert leire blandet inn. Du bør også unngå vannlogging forårsaket av restvann i dalbanen. I månedene mai til oktober bør du forsyne planten med beholderplantegjødsel med intervaller på 14 dager. Beskjæring kan begrenses til beskjæring av eldre greiner en gang i året. **Om vinteren:** Det er best å overvintre djevelens hode i et lyst rom ved 5° til 15°C. Mørke rom er ikke egnet for dvalemodus. Vann bare nok til at rotklumpen ikke tørker ut.



Rachunek Papugi / Głowa Diabła

Clianthus formosus syn. Swaisonia formosa

Lakieruj czerwone kwiaty dzioba!

Zimozielony groszek pustynny Sturt jest wolno rosnącym krzewem pnącym o starannie pierzastych, okrągłych i aksamitnych włosach liściach. Jej znakiem rozpoznawczym są wyjątkowo długie, szypułkowe i stojące do 8 cm płatki. W centrum lśniącej czerwienu, rozwidlonych kwiatów znajduje się charakterystyczna czarna plamka. Z pomocą przy wspinaczce Sturt's Desert Pea może być z łatwością uprawiany jako roślina doniczkowa i będzie ozdabiał Twój balkon lub ogród przez całe lato egzotycznymi kwiatami. **Naturalne położenie:** Groch pustynny Sturt's ma swoje naturalne środowisko w suchych strefach Australii Środkowej, a także w północnej Australii Południowej, gdzie jest kwiatem narodowym. **Udana uprawa:** Rozmnażanie nasion w pomieszczeniach jest możliwe przez cały rok. Aby zwiększyć zdolność kiełkowania, można lekko zmatowić nasiona miękkim pilnikiem lub kawałkiem papieru ściernego i umieścić je na około 24 godziny w ciepłej wodzie w celu przygotowania gleby. Ponieważ sadzonki będą później dość wrażliwe na klucie, do rozmnażania zaleca się od razu użyć większej doniczki. Wystarczy posadzić nasiona na głębokość około 1 cm w wilgotnym kompostie doniczkowym, nałożyć trochę ziemi kompostowej i przykryć pojemnik na nasiona przezroczystą folią, aby zapobiec wysychaniu ziemi. Nie zapomnij zrobić dziur w przezroczystej folii i zdejmuj ją co drugi lub trzeci dzień na około 2 godziny. W ten sposób unikniesz tworzenia się pleśni na kompostie doniczkowym. Użyj pojemnik na nasiona w miejscu jasnym i ciepłym o temperaturze od 20° do 25° Celsjusza i utrzymuj ziemię wilgotną, ale nie moką. **Najlepsza lokalizacja:** Aby rozwinąć silny wzrost i obfite kwitnienie, Sturt's Desert Pea potrzebuje ciepłego i słonecznego, chronionego przed wiatrem miejsca latem. Dlatego roślina doniczkowa powinna być trzymana na zewnątrz tylko podczas ciepłych letnich miesięcy. **Optymalna pielęgnacja:** Groch pustynny Sturt's jest wrażliwy na silną wilgoć. Zaleca się użycie gleby mieszanej z dużą ilością piasku, perlitu lub keramzytu. Należy unikać gromadzenia się wody, zwłaszcza na spodku. Od maja do października należy co dwa tygodnie podawać nawóz do roślin doniczkowych. Jeśli chodzi o przycinanie, wystarczy raz w roku przerezczać stare gałęzie. **W zimie:** Groszek Sturt's Desert najlepiej przechowywać w jasnym pomieszczeniu o temperaturze od 5° do 15° Celsjusza. Miejsca ciemne lub nieodpowiednie do hibernacji. Podlewaj roślinę tylko skromnie, aby korzenie nie wyschły.



Bico de Papagaio / Cabeça do Diabo

Clianthus formosus syn. Swaisonia formosa

Flores de bico vermelho laca!

A cabeça do diabo perene é um arbusto trepadeira de crescimento lento com folhas peludas lindamente pinadas, ovais e aveludadas. Sua marca registrada são as pétalas eretas, de caule longo e até oito centímetros de comprimento. A mancha preta característica está localizada no centro das flores em forma de bico, que são riantes em vermelho lacado. Com um auxiliar de escalada, o bico do papagaio pode ser bem guardado no balde e enriquecer sua varanda ou jardim com suas flores exóticas durante todo o verão. **Localização natural:** O bico do papagaio cresce no interior árido da Austrália e no norte da Austrália Meridional e é considerada a flor nacional da Austrália Meridional. **Cultivo bem sucedido:** Cultivar a partir de sementes é possível dentro de casa durante todo o ano. Para aumentar a capacidade de germinação das sementes, elas devem primeiro ser lixadas com lixa ou lima e depois deixadas de molho em água em temperatura ambiente por 24 horas. Como as mudas são posteriormente muito sensíveis à repicagem, é aconselhável semear diretamente em um vaso um pouco maior. Coloque as sementes um centímetro em solo úmido e cubra-as com o meio de envasamento. Cubra o recipiente de cultura com filme plástico, que você fornece com furos. Isso protege o solo de secar. Você deve remover o papel alumínio por 2 horas a cada dois ou três dias. Isso evita a formação de mofo no solo em crescimento. Coloque o vaso de sementes em um local claro e quente com 20 a 25° Celsius e mantenha o solo do vaso úmido, mas não molhado. As primeiras mudas aparecem após duas a seis semanas. **A melhor localização:** Para um crescimento forte e uma rica formação de flores, a cabeça do diabo precisa de um local ensolarado, protegido do vento e quente durante os meses de verão. Portanto, o balde só deve ficar ao ar livre nos meses quentes de verão. **Cuidado ideal:** O bico do papagaio é sensível a muita umidade. Portanto, é aconselhável usar uma mistura de solo com bastante (até um terço) de areia, perlita ou argila expandida misturada. Você também deve evitar o alagamento causado por água residual na montanha-russa. Nos meses de maio a outubro você deve abastecer sua planta com adubo de vasos em intervalos de 14 dias. A poda pode ser limitada a podar galhos mais velhos uma vez por ano. **No inverno:** É melhor hibernar a cabeça do diabo em uma sala iluminada de 5° a 15° Celsius. Salas escuras não são adequadas para hibernação. Regue apenas o suficiente para evitar que a raiz seque.



Cioc De Papagal

Clianthus formosus syn. Swaisonia formosa

Lăcăți flori de cioc roșu!

Capul diavolului veșnic verde este un arbust cățărător cu creștere lentă, cu frunze pănoase, ovale și catifelate frumos. Marca sa comercială sunt petalele verticale izbitoare, cu tulpini lungi și până la opt centimetri lungime. Pata neagră caracteristică este situată în mijlocul lacului de flori roșii, asemănătoare ciocului. Cu ajutorul unui dispozitiv de urcare, factura papagalului poate fi păstrată bine în găleată și în îmbogățite balconul sau grădina cu florile sale exotice toată vara. **Locație naturală:** Factura papagalului crește în interiorul uscat al Australiei, precum și în nordul Australiei de Sud și este considerată floarea națională a Australiei de Sud. **Cultivare de succes:** Se poate cultiva din semințe în interior tot timpul anului. Pentru a crește capacitatea de germinare a semințelor, acestea trebuie mai întâi asprite cu șmirghel sau cu o pilă și apoi lăstate să se înmoaie în apă la temperatura camerei timp de 24 de ore. Deoarece răsădurile sunt foarte sensibile la smulgerea mai târziu, este recomandabil să semănați semințele direct într-o oală puțin mai mare. Așezați semințele un centimetru în sol umed de ghiveci și acoperiți-le cu mediul de creștere. Acoperiți vasul de cultivare cu folie alimentară, pe care ați prevăzut-o cu găuri. Acest lucru protejează pământul de uscare. La fiecare două până la trei zile ar trebui să îndepărtați filmul timp de 2 ore. Acest lucru previne formarea mușgaiului pe solul de cultivare. Așezați vasul de cultivare într-un loc luminos și cald, cu 20-25° Celsius și mențineți solul de cultivare umed, dar nu umed. Primele răsăduri apar după două până la șase săptămâni. **Cea mai bună locație:** Pentru o creștere puternică și o formare abundentă a florilor, capul diavolului are nevoie de o locație însorită, adăpostită și caldă în lunile de vară. Prin urmare, cupa ar trebui să fie afară numai în lunile calde de vară. **Îngrijire optimă:** Ciocul papagalului este sensibil la prea multă umiditate. Prin urmare, se recomandă utilizarea unui amestec de sol cu mult (până la o treime) de nisip, perlit sau lut expandat amestecat. De asemenea, ar trebui să evitați apariția apei din cauza apei reziduale din farfurie. În lunile mai-octombrie, ar trebui să furnizați plantei dvs. îngrășămintă pentru plante la fiecare 14 zile. Tunderea se poate limita la subțierea ramurilor mai vechi o dată pe an. **În iarnă:** Cel mai bine este să iernăm capul diavolului într-o cameră luminoasă la 5° până la 15° Celsius. Camerele întunecate nu sunt potrivite pentru iernat. Se toarnă suficient încât să nu se usuce mingea rădăcinii.



Papegojens Räkning / Djävulens Huvud

Clianthus formosus syn. Swaisonia formosa

Lackröda näbblommor!

Det vintergröna djävulens huvud är en långsamt växande klättringsbuske med vackert pinnat oval och sammetslen håriga löv. Dess varumärke är de iögonfallande, långstjälkta och upp till åtta centimeter långa, upprätta kronbladen. Den karakteristiska svarta fläcken ligger i mitten av de glänsande röda näbblänkande blommorna. Med ett klättringshjälpmedel kan papegojens räkning hållas väl i linke och berikar din balkong eller trädgård med sina exotiska blommor hela sommaren. **Naturligt läge:** Papegojens näbb växer i det torra inre av Australien såväl som i norra södra Australien och anses vara den nationella blomman i södra Australien. **Framgångsrik odling:** Den kan odlas från frön inomhus året runt. För att öka fröns spiringskapacitet bör de först grovas med sandpapper eller en fil och sedan får blötläggas i vatten vid rumtemperatur i 24 timmar. Eftersom plantorna är mycket känsliga för att sticka ut senare är det lämpligt att så dem direkt i en lite större kruka. Lägg fröna en tum i fuktig krukväxt och täck dem med det växande substratet. Täck odlingskärlet med plastfolie, som du har försett med hål. Detta skyddar jorden från att torka ut. Varannan till var tredje dag ska du ta bort filmen i två timmar. Detta förhindrar att mögel bildas på odlingsjorden. Placera odlingskärlet på en ljus och varm plats med 20 till 25 ° Celsius och håll odlingsjorden fuktig men inte våt. De första plantorna dyker upp efter två till sex veckor. **Den bästa platsen:** För kraftig tillväxt och riklig blommande bildning behöver djävulens huvud en solig, skyddad och varm plats under sommarmånaderna. Därför bör skoppan bara vara ute under de varma sommarmånaderna. **Optimal vård:** Papegojens näbb är känslig för för mycket fukt. Det är därför lämpligt att använda en jordblandning med mycket (upp till en tredjedel) sand, perlit eller expanderad lera blandat i. Du bör också undvika vattentätning på grund av kvarvarande vatten i fatet. Under månaderna maj till oktober bör du förse din växt med krukväxtgödsel var 14:e dag. Trimmingen kan begränsas till att gallra äldre grenar en gång om året. **På vintern:** Det är bäst att övervintra djävulens huvud i ett ljusst rum vid 5 ° till 15 ° Celsius. Mörka rum är inte lämpliga för övervintring. Håll bara nog så att rotkulan inte torkar ut.



Papagájový zobák / Diablova hlava

Clianthus formosus syn. Swaisonia formosa

Lakovaný červený zobák kvitne!

Vždyzelená čertova hlava je pomaly rastúci popínavý ker s krásne perovito spereňými, oválnymi a zamatovo chlpatými listami. Jeho poznávacím znamením sú nápadné, dlho stopkaté a až osem centimetrov dlhé vzpriamené okvetné lístky. Charakteristická čierna škvrna sa nachádza v strede zobákovitých kvetov, ktoré sú žiarivé v lakovanej červenej farbe. S lezeckou pomôckou sa zobák papagája dobre udrží vo vedierku a celé leto obohacuje váš balkón či záhradu svojimi exotickými kvetmi. **Prirodzená poloha:** Zobák papagája rastie v suchom vnútrozemí Austrálie a na severe Južnej Austrálie a je považovaný za národný kvet Južnej Austrálie. **Úspešná kultivácia:** Pestovanie zo semien je možné v interiéri po celý rok. Aby sa zvýšila klíčivosť semien, mali by sa najskôr zdrsníť brúsnym papierom alebo pilníkom a potom nechať 24 hodín máčať vo vode pri izbovej teplote. Keďže sadenice sú neskôr veľmi citlivé na vypichovanie, je vhodné vysievať priamo do trochu väčšieho črepníka. Semená umiestnite jeden centimeter do vlhkej zeminy a zakryte ich pôdou. Kultivačnú nádobu prikryte potravinovou fóliou, ktorú opatrite otvormi. To chráni pôdu pred vysychaním. Fóliu by ste mali odstraňovať na 2 hodiny každé dva až tri dni. To zabraňuje tvorbe plesní na rastúcej pôde. Črepník umiestnite na svetlé a teplé miesto s teplotou 20 až 25 °C a udržiajte pôdu v črepníku vlhkú, ale nie mokrú. Prvé sadenice sa objavia po dvoch až šiestich týždňoch. **Najlepšie umiestnenie:** Pre silný rast a bohatú tvorbu kvetov potrebuje čertovina v letných mesiacoch slnečné, vetru chránené a teplé stanovište. Preto by vedro malo byť vonku iba v teplých letných mesiacoch. **Optimálna starostlivosť:** Zobák papagája je citlivý na príliš veľa vlhkosti. Preto je vhodné použiť pôdnu zmes s množstvom (až tretinou) prímiešaného piesku, perlitu alebo keramzitu. Mali by ste sa tiež vyhnúť podmačaniu spôsobenému zvyškovou vodou v táske. V mesiacoch máj až október by ste mali svoju rastlinu zásobovať hnojivom pre kontajnerové rastliny v intervaloch 14 dní. Rez možno obmedziť na orezávanie starších konárov raz ročne. **V zime:** Čertovu hlavu je najlepšie prezimovať vo svetlej miestnosti pri 5° až 15°Celzia. Tmavé miestnosti nie sú vhodné na zimný spánok. Zalievajte len toľko, aby koreňový bal nevyšchol.



Papagajev kljun / Hudičeva glava

Clianthus formosus syn. Swaisonia formosa

Lak rdeče kljunasti cvetovi!

Zimzelena vražja glavica je počasi rastoč vzpenjajoči grm z lepo pernatimi, ovalnimi in žametno dlakastimi listi. Njegov zaščitni znak so vpadljivi, dolgopecljati in do osem centimetrov dolgi pokončni cvetni listi. Značilna črna lisa se nahaja v središču kljunastih cvetov, ki se svetijo v lakirano rdeči barvi. S pripomočkom za plezanje lahko papagajin kljun dobro ostane v vedru in vse poletje obogati vaš balkon ali vrt s svojimi eksotičnimi cveticami. **Naravni habitat:** Papagajev kljun raste v sušni notranjosti Avstralije in severnem delu Južne Avstralije in velja za nacionalno rožo Južne Avstralije. **Navodila za gojenje:** Gojenje iz semen je možno v zaprtih prostorih vse leto. Da bi počakali kalivost semen, jih najprej nahrapavimo z brusnim papirjem ali pilico in nato pustimo 24 ur namakati v vodi pri sobni temperaturi. Ker so sadike kasneje zelo občutljive na pikiranje, je priporočljivo sejati neposredno v nekoliko večji lonec. Semena položite za en centimeter v vlažno zemljo za lončke in jih prekrijte z gojiščem za lončke. Posodo z kulturo pokrijte s folijo za živila, ki jo opremite z luknjami. To ščiti tla pred izsušitvijo. Vsake dva do tri dni za 2 uri odstranite folijo. S tem preprečimo nastanek plesni na rastni zemlji. Lonček s semeni postavite na svetlo in toplo mesto s temperaturo od 20 do 25 °C, zemlja v lončku pa naj bo vlažna, vendar ne mokra. Prve sadike se pojavijo po dveh do šestih tednih. **Najboljša lokacija:** Za močno rast in bogato tvorbo cvetov potrebuje vražja glava v poletnih mesecih sončno, pred vetrom zaščiteno in toplo lego. Zato naj bo vedro na prostem le v toplih poletnih mesecih. **Optimalna nega:** Kljun papige je občutljiv na preveč vlage. Zato je priporočljivo uporabiti mešanico tal z veliko (do tretjine) prímiešanega peska, perlita ali ekspandirane gline. Izogibajte se tudi namakanju zaradi ostanikov vode v podstavku za kozarce. V mesecih od maja do oktobra morate svojo rastlino oskrbovati z gnojilom za rastline v kontejnerjih v intervalih po 14 dni. Obrezovanje se lahko omeji na obrezovanje starejših vej enkrat letno. **V zimskem času:** Vražjo glavo je najbolje prezimiti v svetlem prostoru pri 5° do 15°C. Temni prostori niso primerni za zimsko spanje. Zalivajte le toliko, da se koreninska gruda ne izsuši.



Guisante del desierto de Sturt

Clianthus formosus syn. Swaisonia formosa

Flor rostral de color rojo

El árbol kaka beak de hoja perenne es un arbusto trepador que crece lentamente y tiene unas hojas ovaladas y aterciopeladas. Su seña de identidad son sus flores con pedúnculos largos y llamativos y hojas verticales de hasta 8 centímetros de longitud. En el medio de las flores de color rojo radiante y embellecer su balcón o jardín con sus flores exóticas durante todo el verano. **Ubicación natural:** El kaka beak crece en el interior seco de Australia y el norte de Australia del Sur y es considerada la flor nacional de Australia del Sur. **Cultivo exitoso:** La semilla se puede criar en interior durante todo el año. Graneé las semillas con papel de lijar y manténgalas durante 24 horas en agua a temperatura ambiente, para hidratarlas y aumentar la germinación de las mismas. Los plantones son muy delicados a la hora de trasplantarlos, por lo que se recomienda usar para la siembra unos envases más grandes. Entierre las semillas a un centímetro de profundidad en sustrato húmedo y cúbralas con el mismo sustrato. Cubra el recipiente de cultivo con un film transparente y agujeréelo. Así protegerá la tierra de la desecación. Para evitar la putrefacción del sustrato retire el film cada dos o tres días durante 2 horas. Coloque el recipiente de cultivo en un lugar luminoso y cálido entre 20 y 25 grados y mantenga el sustrato húmedo, pero no mojado. La germinación se produce a las dos a seis semanas. **La mejor ubicación:** Para un crecimiento fuerte y una flor escencia abundante el pico de kaka necesita un lugar soleado, cálido y protegido del viento durante los meses de verano. Por lo tanto, solo durante los meses de verano puede mantenerlo al aire libre. **Cuidado óptimo:** El pico del kaka es sensible al exceso de humedad. Por ello se recomienda un suelo mixto, una mezcla de tierra y arena (hasta un tercio), perlita o arcilla. También debe evitar anegamiento debido al agua residual en el platillo. En los meses de mayo a octubre debe proporcionarle a su planta, con un intervalo de 14 días, fertilizante para plantas en maceta. La poda se puede limitar a una anual seleccionando las ramas más antiguas. **En el invierno:** El mejor sitio para que el pico de kaka pase el invierno es un lugar luminoso y fresco de entre 5 y 15 grados. Los ambientes oscuros no son adecuados para pasar el invierno. Riegue sólo para que el cepellón no se seque.



Papouščí zobák / Ďáblova hlava

Clianthus formosus syn. Swaisonia formosa

Lakově červený zobák kvete!

Stálezelená čertova hlava je pomalu rostoucí popínavý keř s krásně zpeřenými, oválnými a sametově chlupatými listy. Jeho poznávacím znamením jsou nápadné, dlouze stopkaté a až osm centimetrů dlouhé vzpřímené okvětní lístky. Charakteristická černá skvrna se nachází ve středu zobákovitých květů, které jsou zářivé v lakované červeně. S lezečkou pomůckou se papouščí zobák dobře udrží v kbelíku a po celé léto obohatí váš balkon nebo zahradu svými exotickými květy. **Přírozená poloha:** Papouščí zobák roste ve vyprahlém vnitrozemí Austrálie a na severu Jižní Austrálie a je považován za národní květinu Jižní Austrálie. **Úspěšné pěstování:** Pěstování ze semen je možné v interiéru po celý rok. Aby se zvýšila klíčivost semen, měla by se nejprve zdrsnit brusným papírem nebo pilníkem a poté nechat 24 hodin máčet ve vodě při pokojové teplotě. Vzhledem k tomu, že sazenice jsou později velmi citlivé na vypichování, je vhodné vysévat přímo do o něco většího květináče. Semena umístěte jeden centimetr do vlhké zeminy a zakryjte je substrátem. Kultivační nádobu zakryjte potravinářskou fólií, kterou opatříte otvory. To chrání půdu před vysycháním. Fólii byste měli odstraňovat na 2 hodiny každé dva až tři dny. Tím se zabrání tvorbě plísni na rostoucí půdě. Umístěte květináč na světlé a teplé místo s teplotou 20 až 25 °C a udržujte půdu v květináči vlhkou, ale ne mokrou. První sazenice se objeví po dvou až šesti týdnech. **Nejlepší umístění:** Pro silný růst a bohatou tvorbu květů potřebuje čertovina v letních měsících slunné, před větrem chráněné a teplé stanoviště. Kbelík by proto měl být venku pouze v teplých letních měsících. **Optimální péče:** Zobák papouška je citlivý na přílišnou vlhkost. Je proto vhodné použít půdní směs s množstvím (až třetinou) přimíchaného písku, perlitu nebo keramzitu. Měli byste se také vyhnout podmáčení způsobenému zbytkovou vodou v tácku. V měsících květen až říjen byste měli rostlinu zásobovat hnojivem pro kontejnerové rostliny v intervalech 14 dnů. Prořezávání lze omezit na prořezávání starších větví jednou ročně. **V zimě:** Čertovu hlavu je nejlepší přezimovat ve světlé místnosti při 5° až 15°Celsia. Tmavé místnosti nejsou vhodné k zimnímu spánku. Zalévejte jen tolik, aby kořenový bal nevyschl.



Papağan Gagası / Şeytan Kafası

Clianthus formosus syn. Swaisonia formosa

Lake křmizí gaga çiçekleri!

Yaprak dökmeyen şeytanın kafası, güzelce tüylü, oval ve kadifemsi tüylü yaprakları olan, yavaş büyüyen, tırmanan bir çalıdır. Markası, çarpıcı, uzun saplı ve sekiz santimetreye kadar uzunlukta, dik yapraklarıdır. Karakteristik siyah nokta, lake křmizí renkte parıldayan gaga benzeri çiçeklerin merkezinde bulunur. Tırmanma yardımı ile papağanın gagası kovanın içinde iyi bir şekilde tutulabilir ve tüm yaz boyunca egzotik çiçekleriyle balkonunuzu veya bahçenizi zenginleştirir. **Doğal konum:** Papağanın gagası, Avustralya'nın kurak iç kesimlerinde ve kuzey Güney Avustralya'da yetişir ve Güney Avustralya'nın ulusal çiçeği olarak kabul edilir. **Başarılı yetiştirme:** Tohumdan büyüme tüm yıl boyunca iç mekanlarda mümkündür. Tohumların çimlenme kapasitesini arttırmak için önce zimpara veya törpü ile pürüzlendirilmeli ve ardından 24 saat oda sıcaklığında suda bekletilmelidir. Fideler daha sonra iğnelenmeye karşı çok hassas olduklarından, doğrudan biraz daha büyük bir saksıya ekilmesi tavsiye edilir. Tohumları nemli saksı toprağına bir santimetre yerleştirin ve saksı ortamı ile üzerlerini kapatın. Kültür kabının üzerini delikler açtığınız streč film ile kapatın. Bu, toprağın kurumasını önler. Folyoyu her iki ila üç günde bir 2 saat çıkarmalısınız. Bu, büyüyen toprakta küf oluşumunu önler. Tohumların 20 ila 25°C sıcaklıkta hafif ve sıcak bir yere koyun ve saksı toprağına nemli tutun ama ıslak değil. İlk fideler iki ila altı hafta sonra ortaya çıkar. **En iyi konum:** Güçlü büyüme ve zengin çiçek oluşumu için şeytanın başı yaz aylarında güneşli, rüzgardan korunan ve sıcak bir yere ihtiyaç duyar. Bu nedenle kova sadece sıcak yaz aylarında dışarıda olmalıdır. **Optimum bakım:** Papağanın gagası çok fazla neme karşı hassastır. Bu nedenle, bol miktarda (üçte bire kadar) kum, perlit veya genişletilmiş kil karıştırılmış bir toprak karışımının kullanılması tavsiye edilir. Ayrıca bardak altlığında kalan suyun neden olduğu su basması da önlemelisiniz. Mayıs-Ekim aylarında bitkinize 14 gün aralıklarla saksı bitki gübresi vermelisiniz. Budama, yaşlı dalları yılda bir kez budamakla sınırlandırılabilir. **Kışın:** Şeytanın kafasını 5° ila 15°C arasında aydınlık bir odada kışlamak en iyisidir. Karanlık odalar hazırda bekletme için uygun değildir. Sadece kök topunun kurumasını önleyecek kadar su.



Papagáj csőr / Ördögfej

Clianthus formosus syn. Swaisonia formosa

Lakk vörös csőr virágzik!

Az örökzöld ördögfej egy lassan növő kúszócserje, gyönyörűen szárnyas, ovális és bársonyosan szőrös levelekkel. Védjegyei a feltűnő, hosszú szárú és legfeljebb nyolc centiméter hosszú, függőleges szirmok. A jellegzetes fekete folt a csőrszerű virágok közepén található, amelyek lakkozott vörösből ragyognak. Egy hegyászó segédeszközzel a papagáj csőre jól tartható a vödörben, és egész nyáron egzotikus virágaival gazdagítja erkélyét vagy kertjét. **Természetes elhelyezkedés:** A papagáj csőr Ausztrália száraz belsejében és Észak-Dél-Ausztráliában nő, és Dél-Ausztrália nemzeti virágának tekintik. **Sikeres termesztés:** Beltéri termesztés egész évben lehetséges. A magvak csírázóképeségének növelése érdekében először csiszolópapírral vagy reszelővel érdesíteni kell, majd 24 órán át szobahőmérsékleten vízben áztatni kell. Mivel a palánták később nagyon érzékenyek a kiszárára, célszerű közvetlenül egy kicsit nagyobb cserépbe vetni. Helyezze a magokat egy centiméterre nedves virágföldbe, és fedje be őket a virágzó közeggel. Fedje le a tenyészedényt ragasztófóliával, amelyet lyukakkal lát el. Ez megvédi a talajt a kiszáradástól. A fóliát két-három naponta 2 órára le kell venni. Ez megakadályozza a penészképződést a növekvő talajon. Helyezze a magcserepet világos és meleg helyre, ahol a hőmérséklet 20-25°C, és a virágföldet tartsa nedvesen, de ne nedvesen. Az első palánták két-hat hét után jelennek meg. **A legjobb hely:** Az erős növekedéshez és a gazdag virágképződéshez az ördögfejnek napos, szélvédett és meleg helyre van szüksége a nyári hónapokban. Ezért a vödört csak a meleg nyári hónapokban szabad a szabadban tartani. **Optimális gondozás:** A papagáj csőre érzékeny a túl sok nedvességre. Ezért célszerű olyan talajkeveréket használni, amelybe bő (legfeljebb egyharmada) homokot, perlitet vagy duzzasztott agyagot keverünk. Kerülje el a poháralátétben visszamaradt víz okozta elvizesedést is. Májustól októberig 14 napos időközönként lássa el növényét konténeres műtrágyával. A metszés korlátozható az idősebb ágak évente egyszeri metszésére. **Télen:** A legjobb, ha az ördögfejet egy világos helyiségben, 5-15 Celsius-fokon átteljük. A sötét helyiségek nem alkalmasak hibernálásra. Csak annyit öntözzünk, hogy a gyökérgolyó ne száradjon ki.

: : : : :



クリアンサス

Clianthus formosus syn. *Swainsonia formosa*

赤く輝く匍匐(ほふく)性の花

常緑樹でゆっくりと成長するつる植物で、丸いベルベットのような毛を持つ整った羽状複葉です。素晴らしく長い茎と、長さ8cmの直立した花弁が特徴です。くちばし形の光沢のある赤い花の中心には、特徴的な黒い斑点があります。支柱などを準備することで鉢植えでも簡単に栽培でき、庭やベランダなどでエキゾチックな花を夏中楽しめます。

自然な場所:

生息地は中央オーストラリアの乾燥地帯、南オーストラリア州の北部です。そしてこの植物は南オーストラリア州花でもあります。

栽培成功:

種子繁殖は室内で年間を通して可能です。発芽率を高める方法として、柔らかめのサンドペーパーなどで種の表面を粗面化し、温水に24時間浸します。苗は繊細なので最初から大きめの鉢を使用して栽培することをお勧めします。湿った培養土の深さ約1cmに種を植え、乾燥を防ぐためにサランラップなどの透明フィルムで鉢をカバーします。透明フィルムには空気穴をいくつかあけ、2~3日に1回は約2時間、完全にフィルムを鉢から外します。そうすることで、カビの発生を防ぎます。20°C~25°Cの明るく暖かい場所に置き、用土は湿った状態に保ちます。通常は約2~6週間で発芽します。

最高のロケーション:

豊かな花と成長を促進するために、夏には暖かく日当たりの良い防風された場所での保管が必要です。したがって、鉢は気温の高い夏の間だけ屋外で保管します。

最適なケア:

強い湿気に敏感です。混合土壌に多めの砂、パーライトまたはエキスパンド粘土を混ぜた土壌の使用をお勧めします。水浸し、特に鉢の受け皿に水が溜まるのを避けます。5月~10月までは鉢植え用の肥料を2週間ごとに与えます。剪定は、年に一度古い枝を透かす程度で十分です。

冬に: 5°C~15°Cの明るい部屋に保管するのが最適です。暗い場所または冬越しには適しません。根が乾燥しない程度の水を与えます。

SKU: 13009 / Papageischnabel / Teufelskopf