

Czy wiesz, że...

Pro Keratin Hair Complex Conditioner 200 ml



- 1** Indeks naturalności nowej odżywki, jest o 1,2% wyższy niż w poprzedniej wersji i wynosi aż **96,2%**. Produkt zawiera więcej naturalnych składników, które są zwykle łagodniejsze dla włosów niż syntetyczne składniki. Oznacza to, że odżywka jest bardziej delikatna dla Twoich włosów.
- 2** Bogaty skład odżywki zawiera aż **6 substancji aktywnych**, tj. olej awokado, ekstrakt z wąkroty azjatyckiej, pantenol, masło shea, ekstrakt z malin oraz keratynę hydrolizowaną co pozwoliło stworzyć nowy wymiar w pielęgnacji włosów. Wszystkie te składniki razem tworzą kompleksową formułę, która nawilża, chroni i odżywia włosy. Odżywka pozostawia na włosach **warstwę ochronną**, dzięki czemu włosy są chronione przed szkodliwym działaniem czynników zewnętrznych oraz przed uszkodzeniami mechanicznymi (np. podczas suszenia).

Bogaty skład zapewnia odpowiednie **nawilżenie** sprawia, że włosy są **łśniące** oraz **gładkie**.
- 3** Skład wzbogacony został o:
 - olej awokado, który odżywia, wzmacnia i nawilża;
 - ekstrakt z wąkroty azjatyckiej (*Centella asiatica* L.) przyspiesza procesy regeneracji¹⁻².
- 4** Składniki w szamponie i odżywce z tej samej serii są dobrane tak, aby współpracować ze sobą, a ich synergiczne działanie przyczynia się do poprawy kondycji włosów i skóry głowy.
- 5** Odżywka ma świeżą nutę zapachową, w której **soczyste, owocowe nuty jabłka, truskawki, śliwki, maliny i grejpfruta** przenikają do delikatnego, kwiatowego serca lilii i jaśminu.
- 6** **Wielofunkcyjność odżywki**, którą można stosować jako odżywkę oraz maskę do włosów dzięki temu jest bardziej uniwersalna i może zastąpić wiele innych produktów, co pozwala na **oszczędność czasu i pieniędzy**.

¹ Council of Europe. Plants preparations used as ingredients of cosmetic products. Vol.I. Strasbourg Cedex: Council of Europe Publishing, 1994; p: 116-117 (61*8 PAT).

² Jayashree, G., Kurup Muraleedhara, G., Sudarslal, S., Jacob, V.B. Anti-oxidant activity of *Centella asiatica* on lymphoma-bearing mice. Fitoterapia, 2003; 74 (5): 431-4 (ref.6351).

