



SAFLAX®



Tips



© Jeremy Norbury - About © : Contact SAFLAX

Malus sylvestris

	 Български	BG		2		 Malti	MT		5
	 Dansk	DK		2		 Nederlands	NL		5
	 Deutsch	DE		2		 Norsk	NO		6
	 English	UK		2		 Polski	PL		6
	 Eesti	EE		3		 Português	PT		6
	 Suomalainen	FI		3		 Românesc	RO		6
	 Français	FR		3		 Svenska	SE		7
	 Ελληνική	GR		3		 Slovensky	SK		7
	 Gaeilge	IE		4		 Slovenski	SI		7
	 íslenskur	IS		4		 Español	ES		7
	 Italiano	IT		4		 Český	CZ		8
	 Hrvatski	HR		4		 Türkçe	TR		8
	 Latviešu	LV		5		 Magyar	HU		8
	 Lietuvių kalba	LT		5		 日本語	JP		9



Европейска дива ябълка

Malus sylvestris

Донор на витамини от каменната ера / бонсай на открито

Съществуват около 20 архетипа на широколистната ябълка, кръстосването на които през хилядолетията е довело до почти 20 000 разновидности, което прави ябълката най-разпространеното оwoчно дърво в света. **Естествено местоположение:** Първоначално ябълката е била разпространена в Европа, Азия и Северна Америка. **Успешно отглеждане:** Отглеждането на закрито е възможно от февруари до октомври. Поставете семената в хладилника си за три дни, след това ги накиснете в купа с топла вода за още 24 часа и след това ги засадете на един сантиметър дълбочина в почвата за саксии. покрийте съда с културата със стреч фолио, което сте осигурили с дупки. Това предпазва почвата от изсушаване. Трябва да отстранявате фолиото за 2 часа на всеки два до три дни. Това предотвратява образуването на мухъл върху растящата почва. Поставете саксията със семена на светло и топло място с 20 до 25° по Целзий и поддържайте почвата влажна, но не мокра. Тогава покълването става доста бързо след четири до осем седмици. **Най-доброто местоположение:** Ябълката предпочита слънчево място, защото се нуждае от много светлина за цъфтеж и плододаване. През лятото се препоръчва защита от пряко обедно слънце. **Оптимална грижа:** Ябълковите дървета се нуждаят от много вода - особено след цъфтежа с началото на плододаването. Трябва да наторявате леко през март преди цъфтежа, в началото на юни след плододаване и от края на август до ноември веднъж месечно с течен тор за бонсай. Новите издънки трябва да се подрязват само след цъфтежа, за да се запази завръзката на плодовете. При млади растения можете да отрежете половината от новите листа, а през есента можете също да изрежете клоните във форма. В края на май трябва да спуснете новите клони с тел, преди да са вдървесени, за да забавите растежа и да насърчите образуването на по-голям брой прирасти. След месец можете отново да премахнете кабела. Младите бонсаи - ябълките трябва да се пресаждат всяка година, а по-възрастните - на всеки две години в началото на есента или през пролетта. **През зимата:** През зимата е най-добре да извадите своя ябълков бонсай от черупката му и да го засадите на открито, защитено от вятъра.



Europæisk vildæble

Malus sylvestris

Vitaminsdonor siden stenalderen / udendørs bonsai

Der er omkring 20 arketyper af løvfældende æble, hvorfra krydsninger gennem årtusinder har resulteret i næsten 20.000 sorter, hvilket gør æblet til det mest udbredte frugttræ i verden. **Naturlig beliggenhed:** Oprindeligt var æblet spredt ud over Europa, Asien og Nordamerika. **Succesfuld dyrkning:** Indendørs dyrkning er mulig fra februar til oktober. Stil frøene i dit køleskab i tre dage, læg dem derefter i blød i en skål med stuevarmt vand i yderligere 24 timer og plant dem derefter en centimeter dybt i pottejord. dække dyrkningskarret til med husholdningsfilm, som du forsyner med huller. Dette beskytter jorden mod udtørring. Du bør fjerne folien i 2 timer hver anden til tredje dag. Dette forhindrer mug i at dannes på den voksende jord. Stil frøpotten et let og varmt sted med 20 til 25° Celsius og hold pottejorden fugtig, men ikke våd. Spiringen sker så ret hurtigt efter fire til otte uger. **Den bedste beliggenhed:** Æblet foretrækker et solrigt sted, fordi det har brug for meget lys til blomstring og frugtsætning. Om sommeren er beskyttelse mod den direkte middagssol tilrådeligt. **Optimal pleje:** Æbletræer har brug for meget vand - især efter blomstring med begyndelsen af frugtsætning. Du bør gøde let i marts før blomstring, i begyndelsen af juni efter frugtsætning og fra slutningen af august til november en gang om måneden med flydende bonsai-gødning. De nye skud bør først beskæres efter blomstring, så frugtsættet bevares. Med unge planter kan du skære ned på halvdelen af de nye blade - og om efteråret også demSkære grene i form. I slutningen af maj bør du sænke de nye grene med tråd, før de bliver træagtige for at bremse væksten og dannelsen af et større antal udløbereat forfremme. Du kan fjerne ledningen igen efter en måned. Unge bonsai - æbler skal transplanteres hvert år og ældre hvert andet år i begyndelsen af efteråret eller om foråret. **Om vinteren:** Om vinteren er det bedst at tage din æblebonsai ud af dens skal og plante den udendørs, beskyttet mod vinden.



Europäischer Wildapfel

Malus sylvestris

Vitaminspender seit der Steinzeit / Freiland-Bonsai

Es gibt ungefähr 20 Urarten des sommergrünen Apfels, aus deren Kreuzungen im Laufe der Jahrtausende fast 20.000 Varietäten entstanden sind und den Apfel zum weltweit am weitesten verbreiteten Fruchtbaum gemacht haben. **Naturstandort:** Ursprünglich war der Apfel über Europa, Asien und Nordamerika verbreitet. **Anzucht:** Die Anzucht im Haus ist von Februar bis Oktober möglich. Legen Sie die Samen zunächst für drei Tage in Ihren Kühlschrank, lassen Sie sie danach nochmals für 24 Stunden in einer Schale mit raumwarmem Wasser vorquellen und setzen Sie sie dann einen Zentimeter tief in Anzuchterde. edecken das Anzuchtgefäß mit Klarsichtfolie, die Sie mit Löchern versehen. So ist die Erde vor Austrocknung geschützt. Alle zwei bis drei Tage sollten Sie die Folie für 2 Stunden entfernen. Das beugt einer Schimmelbildung auf der Anzuchterde vor. Stellen Sie das Anzuchtgefäß an einen hellen und warmen Ort mit 20 bis 25° Celsius und halten Sie die Anzuchterde feucht, aber nicht nass. Die Keimung erfolgt dann recht schnell nach vier bis acht Wochen. **Standort:** Der Apfel bevorzugt einen sonnigen Standort, denn er braucht für die Blüten- und Fruchtbildung viel Licht. Im Sommer ist ein Schutz vor direkter Mittagssonne angebracht. **Pflege:** Apfelbäume benötigen viel Wasser - besonders nach der Blüte mit dem Beginn der Fruchtbildung. Düngen sollten Sie leicht im März vor der Blüte, Anfang Juni nach der Fruchtbildung und von Ende August bis November einmal monatlich mit flüssigem Bonsaidünger. Die neuen Triebe sollten erst nach der Blüte beschnitten werden, damit der Fruchtansatz erhalten bleibt. Bei jungen Pflanzen können Sie auf die Hälfte der neuen Blätter zurück- und im Herbst auch die Zweige in Form schneiden. Ende Mai sollten Sie die neuen Zweige vor ihrer Verholzung mit Draht absenken, um das Wachstum zu bremsen und die Bildung einer größeren Zahl von Kurztrieben zu fördern. Den Draht können Sie nach einem Monat wieder entfernen. Junge Bonsai - Äpfel sollten Sie jedes Jahr und ältere alle zwei Jahre Zum Beginn des Herbstes oder im Frühjahr umpflanzen. **Im Winter:** Im Winter nehmen Sie Ihren Apfelbonsai am besten aus seiner Schale und pflanzen ihn vor Wind geschützt im Freiland ein.



Bonsai - Wild Crab

Malus sylvestris

Vitamine provider since the Stone Age / Outdoor Bonsai

There are about twenty original species of the deciduous Wild Crab. Through cross-breeding over centuries, almost 20.000 varieties were developed, and the plant became the most common fruit tree in the world. **Natural location:** Originally the Wild Crab grew all over Europe, Asia and North America. **Successful cultivation:** Seed propagation indoors is possible from February until October. To increase the germinability, you should initially keep the seeds in the refrigerator for about three days - then place them for another 24 hours in a bowl with lukewarm water for priming. After that, plant the seeds about 1 cm deep into moist potting compost and cover the seed container with clear film to prevent the earth from drying out. Don't forget to make some holes in the clear film and take it every second or third day completely off for about 2 hours. That way you avoid mold formation on your potting compost. Place the seed container somewhere bright and warm with a temperature between 20°C and 25° Celsius and keep the earth moist, but not wet. Usually it takes only four to eight weeks until germination. **The best location:** The Wild Crab prefers a sunny place since it needs plenty of light for developing a rich blossoming and plenty of fruits. During summer it should be protected from the direct midday sun. **Optimal care:** The Wild Crab needs plenty of water, especially after blossoming and the beginning of fructification. In March, before blossoming, and at the beginning of June, after fructification, as well as in the time from the end of August until November, you should provide the plant with fluid fertilizer for bonsai plants once a month. The new shoots should only be pruned after blossoming to protect the base of the fruit formation. In young plants you can cut back half of the new leaves, and in autumn you may also prune the branches to achieve the desired form. At the end of May, you should lower the new branches before they lignify through wiring, to slow down the growth and enhance the development of more short sprouts. After one month you can remove the wiring. Young plants should be repotted annually and matured trees every two years, either during autumn or in spring. **In the winter:** During winter, you best remove the bonsai from its bowl and plant it out in a wind-protected place.



Euroopa metsik õun

Malus sylvestris

Kiviajast saadik vitamiinidoonor / välibonsai

Lehtõuna arhetüüpe on umbes 20, millest aastatuhandete jooksul tehtud ristandid on andnud ligi 20 000 sorti, mis teeb õunast maailma kõige levinuima viljapuu. **Looduslik asukoht:** Algselt levis õun Euroopas, Aasias ja Põhja-Ameerikas. **Edukas kasvatamine:** Toas kasvatamine on võimalik veebruarist oktoobrini. Asetage seemned kolmeks päevaks külmkappi, seejärel leotage neid veel 24 tundi toasoojas vees ja istutage seejärel ühe sentimeetri sügavusele potimulda. katke kultuurianum toidukilega, mille varustate aukudega. See kaitseb mulda kuivamise eest. Peaksite fooliumi eemaldama 2 tunniks iga kahe kuni kolme päeva järel. See takistab hallituse teket kasvupinnal. Asetage külvipott valgusküllasesse ja sooja kohta, mille temperatuur on 20–25 ° C, ning hoidke istutusmuld niiskena, kuid mitte märjana. Idanemine toimub siis üsna kiiresti nelja kuni kaheksa nädala pärast. **Parim asukoht:** Õun eelistab päikeselist kasvukohta, sest vajab õitsemiseks ja vilja kandmiseks palju valgust. Suvel on soovitatav kaitsta keskpäevase otse päikese eest. **Optimaalne hooldus:** Õunapuud vajavad palju vett – eriti pärast õitsemist koos vilja algusega. Vätetada tuleks kergelt märtsis enne õitsemist, juuni alguses pärast vilja kandmist ja augusti lõpust novembrini kord kuus vedela bonsai väetisega. Uusi võrseid tuleks kärpida alles pärast õitsemist, et viljastik säiliks. Noorte taimedega saab tagasi lõigata pooled uued lehed – ja sügisel ka need Lõika oksad vormi. Mai lõpus tuleks uued oksad enne puitumist traadiga alla lasta, et pidurdada kasvu ja suurema hulga okste teket edutama. Kuu aja pärast saate traadi uuesti eemaldada. Noored bonsai - õunu tuleks ümber istutada igal aastal ja vanemaid iga kahe aasta tagant sügise alguses või kevadel. **Talvel:** Talvel on kõige parem õunabonsai koorest välja võtta ja õue, tuule eest kaitstud istutada.



Euroopan villi omena

Malus sylvestris

Vitamiiniluovuttaja kivikaudelta / ulkoilmabonsai

Lehtiomenoita on noin 20 arkkityypia, joista vuosittuhansien aikana tehdyt risteytykset ovat tuottaneet lähes 20 000 lajiketta, joten omena on maailman yleisin hedelmäpuu. **Luonnollinen sijainti:** Alun perin omena levis Eurooppaan, Aasiaan ja Pohjois-Amerikkaan. **Onnistunut viljely:** Sisäviljely on mahdollista helmikuusta lokakuuhun. Aseta siemenet jääkaappiin kolmeksi päiväksi, liota niitä sitten huoneenlämpöisessä vedessä vielä 24 tuntia ja istuta ne sentin syvyyteen ruukkumultaan. peitä viljelyastia kalvolla, jossa on reikiä. Tämä suojaaa maaperää kuivumiselta. Poista folio 2 tunnin ajaksi kahden tai kolmen päivän välein. Tämä estää homeen muodostumisen kasvumaahan. Aseta siemenruukku valoisaan ja lämpimään paikkaan, jonka lämpötila on 20–25 °C, ja pidä istutusmaa kosteana, mutta ei märkänä. Itäminen tapahtuu sitten melko nopeasti neljästä kahdeksaan viikon kuluttua. **Paras sijainti:** Omena suosii aurinkoista paikkaa, koska se tarvitsee paljon valoa kukintaakseen ja hedelmällisyyteen. Kesällä on suositeltavaa suojata suoralta keskipäivän auringolta. **Optimaalinen hoito:** Omenapuut tarvitsevat paljon vettä - varsinkin kukinnan jälkeen hedelmän alkaessa. Lannoita kevyesti maaliskuussa ennen kukintaa, kesäkuun alussa hedelmän jälkeen ja elokuun lopusta marraskuuhun kerran kuukaudessa nestemäisellä bonsai-lannoitteella. Uudet versot tulisi leikata vasta kukinnan jälkeen, jotta hedelmäpari säilyy. Nuorilla kasveilla voit leikata puolet uusista lehdistä - ja syksyllä myös neLeikkaa oksat muotoon. Toukokuun lopussa uudet oksat tulee laskea lankalla ennen kuin ne puustuttavat kasvuun hidastamiseksi ja kannujen lisääntymisen hidastamiseksiylentää. Voit irrottaa langan uudelleen kuukauden kuluttua. Nuoret bonsai - omenat tulee istuttaa joka vuosi ja vanhemmat kahden vuoden välein syksyn alussa tai keväällä. **Talvella:** Talvella on parasta ottaa omenabonsai kuorestaan ja istuttaa se ulos tuulelta suojattuna.



Pommier sauvage

Malus sylvestris

Donneur de vitamines depuis l'âge de pierre / Bonsai de jardin

Il y a environ 20 espèces principales de la pomme caduque, et presque 20 000 variétés sont apparues au cours des décennies, ce qui a fait du pommier l'arbre fruitier le plus répandu au monde. **Emplacement naturel:** Le pommier était originalement répandu en Europe, en Asie, et en Amérique du Nord. **Culture réussie:** La culture des graines à la maison est possible de février à octobre. Mettez d'abord les graines dans votre réfrigérateur pendant trois jours, puis mettez-les dans un bol avec de l'eau à température ambiante pendant 24 heures et mettez les graines dans du terreau humide à un centimètre de profondeur. Couvrez le récipient avec une feuille transparente dans laquelle vous faites des trous. Comme ça, le terreau est protégé du dessèchement. Vous devez enlever la feuille pendant deux heures tous les deux ou trois jours. Ceci prévient la formation de moisissures dans le terreau. Mettez le récipient dans un endroit lumineux et chaud de 20° à 25° Celsius et gardez le terreau humide, mais pas mouillé. La germination a lieu après quatre à huit semaines. **Le meilleur emplacement:** Le pommier a besoin d'un emplacement ensoleillé, car il a besoin de beaucoup de lumière pour le développement des fleurs et des fruits. En été, il faut une protection contre les rayonnements directs du soleil du midi. **Soins optimaux:** Les pommiers ont besoin de beaucoup d'eau, surtout après la floraison avec le début du développement des fruits. Vous devez engraisser le pommier légèrement en mars avant la floraison, en début juin après le développement des fruits, et une fois par mois de fin août à novembre avec de l'engrais liquide pour bonsai. Les nouveaux rameaux doivent être coupés seulement après la floraison pour que la fructification soit conservée. Vous pouvez tailler les nouvelles feuilles de jeunes plantes jusqu'à la moitié de leur longueur, et donner une forme aux branches en automne. En fin mai, vous devez abaisser les nouveaux rameaux avec une ligature avant leur lignification, afin de ralentir la croissance et de stimuler la formation d'un grand nombre de rameaux courts. Vous pouvez enlever la ligature après un mois. Vous devez rempoter les jeunes pommiers bonsai tous les ans et les bonsai plus anciens tous les deux ans au début d'automne ou en printemps. **En hiver:** En hiver, enlevez votre pommier bonsai de son bac et plantez-le dans le jardin à l'abri du vent.



Ευρωπαϊκό άγριο μήλο

Malus sylvestris

Δότης βιταμινών από την λίθινη εποχή / μπονσάι εξωτερικού χώρου

Υπάρχουν περίπου 20 αρχέτυπα του φυλλοβόλου μήλου, από τα οποία διασταυρώσεις κατά τη διάρκεια των χιλιετιών έχουν οδηγήσει σε σχεδόν 20.000 ποικιλίες, καθιστώντας τη μηλιά το πιο διαδεδομένο οπωροφόρο δέντρο στον κόσμο. **Φυσική τοποθεσία:** Αρχικά, το μήλο εξαπλώθηκε σε όλη την Ευρώπη, την Ασία και τη Βόρεια Αμερική. **Επιτυχημένο καλλιέργεια:** Η καλλιέργεια σε εσωτερικούς χώρους είναι δυνατή από τον Φεβρουάριο έως τον Οκτώβριο. Τοποθετήστε τους σπόρους στο ψυγείο σας για τρεις ημέρες, στη συνέχεια μουλιάστε τους σε ένα μπολ με ζεστό νερό για άλλες 24 ώρες και μετά φυτέψτε τους σε βάθος ενός εκατοστού σε χώμα γλάστρας. Καλύψτε το δοχείο καλλιέργειας με μεμβράνη προσκόλλησης, στην οποία έχετε ανοίξει τρύπες. Αυτό προστατεύει το έδαφος από το στέγνωμα. Θα πρέπει να αφαιρείτε το αλουμινόχαρτο για 2 ώρες κάθε δύο έως τρεις ημέρες. Αυτό αποτρέπει τη δημιουργία μούχλας στο αναπτυσσόμενο έδαφος. Τοποθετήστε τη γλάστρα σε ένα ελαφρύ και ζεστό μέρος με θερμοκρασία 20 έως 25° Κελσίου και διατηρήστε το χώμα της γλάστρας υγρό αλλά όχι υγρό. Στη συνέχεια, η βλάστηση λαμβάνει χώρα αρκετά γρήγορα μετά από τέσσερις έως οκτώ εβδομάδες. **Η καλύτερη τοποθεσία:** Το μήλο προτιμά μια ηλιόλουστη τοποθεσία γιατί χρειάζεται πολύ φως για ανθοφορία και καρποφορία. Το καλοκαίρι, συνιστάται προστασία από τον άμεσο μεσημεριανό ήλιο. **Βέλτιστη φροντίδα:** Οι μηλιές χρειάζονται πολύ νερό - ειδικά μετά την ανθοφορία με την έναρξη της καρποφορίας. Θα πρέπει να λιπαίνετε ελαφρά τον Μάρτιο πριν την ανθοφορία, αρχές Ιουνίου μετά την καρποφορία και από τα τέλη Αυγούστου έως τον Νοέμβριο μία φορά το μήνα με υγρό λίπασμα μπονσάι. Οι νέοι βλαστοί πρέπει να κλαδεύονται μόνο μετά την ανθοφορία για να διατηρηθεί η καρπόδεση. Με νεαρά φυτά μπορείτε να κόψετε τα μισά από τα νέα φύλλα - και το φθινόπωρο επίσης Κόψτε τα κλαδιά σε σχήμα. Στα τέλη Μαΐου θα πρέπει να χαμηλώσετε τα νέα κλαδιά με σύρμα προτού γίνουν ξυλώδη για να επιβραδύνετε την ανάπτυξη και το σχηματισμό μεγαλύτερου αριθμού σπικρινιών.να προωθώ. Μπορείτε να αφαιρέσετε ξανά το καλώδιο μετά από ένα μήνα. Τα νεαρά μπονσάι - τα μήλα πρέπει να μεταφυτεύονται κάθε χρόνο και τα μεγαλύτερα κάθε δύο χρόνια στις αρχές του φθινοπώρου ή την άνοιξη. **Το χειμώνα:** Το χειμώνα, είναι καλύτερο να βγάλετε το μπονσάι μήλου σας από το καβούκι του και να το φυτέψετε σε εξωτερικό χώρο, προστατευμένο από τον άνεμο.



Úll fiáin na hEorpa

Malus sylvestris

Deontóir vitimín ó aois na cloiche / bonsai amuigh faoin aer

Tá thart ar 20 archetypes den úll dhuillsilteach, as a d'eascair beagnach 20,000 cineál mar thoradh ar thrasnú thar na mílte bliain, rud a fhágann gurb é an t-úll an crann torthaí is forleithne ar domhan. **Suíomh nádúrtha:** Ar dtús, scaipeadh an t-úll ar fud na hEorpa, san Áise agus i Meiriceá Thuaidh. **Saothrú rathúil:** Is féidir saothrú taobh istigh ó mhí Feabhra go Deireadh Fómhair. Cuir na síolta i do chuisneoir ar feadh trí lá, ansin soak iad i mbabhla uisce te seomra ar feadh 24 uair an chloig eile agus ansin iad a phlandáil ceintiméadar domhain san ithir potaithe. ecover an soitheach cultúir le scannán cumhdaithe, a sholáthraíonn tú le poill. Cosnaíonn sé seo an ithir ó thriomú amach. Ba chóir duit an scragall a bhaint ar feadh 2 uair gach dhá nó trí lá. Cuireann sé seo cosc ar mhúnlá a fhoirmiú ar an ithir atá ag fás. Cuir an pota síolta in áit éadrom te ag 20 go 25 ° Celsius agus coinneigh an ithir potaithe tais ach ní fliuch. Tarlaíonn péacadh ansin sách gasta tar éis ceithre nó ocht seachtaine. **An suíomh is fearr:** Is fearr leis an úll suíomh grianmhar mar go dteastaíonn go leor solais uaidh le haghaidh bláthanna agus torthaí. Sa samhradh, tá sé inmholta cosaint ón ghrian meán lae. **Cúram is fearr is féidir:** Tá go leor uisce ag teastáil ó chrainn Apple - go háirithe tar éis bláthanna le tús na torthúla. Ba chóir duit toirchiú go héadrom i mí an Mhárta roimh bláthanna, go luath i mí an Mheithimh tar éis torthúlachta agus ó dheireadh Lúnasa go Samhain uair sa mhí le leasachán bonsai leachtach. Níor chóir na shoots nua a ghearradh ach amháin tar éis bláthanna, ionas go gcaomhnófar an tsraith torthaí. Le plandaí óga is féidir leat gearradh siar ar leath de na duilleoga nua - agus sa titim freisin iad siúd Gearr brainsí i gcruth. Ag deireadh mhí na Bealtaine ba chóir duit na brainsí nua a ísliú le sreang sula n-éiríonn siad adhmaid chun fás a mhoilliú agus foirmiú líon níos mó spor. a chur chun cinn. Is féidir leat an sreang a bhaint arís tar éis míosa. Bonsai óga - ba chóir ulla a thrasphlandú gach bliain agus cinn níos sine gach dhá bhliain ag tús an fhómhair nó san earrach. **Sa gheimhreadh:** Sa gheimhreadh, is fearr do bonsai ulla a bhaint as a bhlaosc agus é a phlandáil lasmuigh, arna chosaint ón ghaoth.



Evrópskt villta epli

Malus sylvestris

Vítamíngjafi frá steinöld / úti bonsai

Það eru til um 20 erkigerðir af lafaepli, en þaðan hafa krossar í gegnum árpúsundir leitt til næstum 20.000 afbrigða, sem gerir eplið á útbreiddasta ávaxtatré í heimi. **Náttúruleg staðsetning:** Upphaflega var eplið dreift um Evrópu, Asíu og Norður-Ameríku. **Árangursrík ræktun:** Ræktun innandyrá er möguleg frá febrúar til október. Settu fræin í ísskápin þinn í þrjá daga, drekktu þau síðan í skál með volgu vatni í 24 klukkustundir í viðbót og gróðursettu þau síðan eins sentímetra djúpt í pottjarðvegi. hyljið ræktunarilátið með matfilmu, sem þú útvegar með götum. Þetta verndar jarðveginn gegn þurrkun. Þú ættir að fjarlægja álpappírinn í 2 klukkustundir á tveggja til þriggja daga fresti. Þetta kemur í veg fyrir að mygla myndist á vaxandi jarðvegi. Settu fræpottinn á léttan og heitan stað með 20 til 25 ° Celsius og haltu pottjarðveginum rökum en ekki blautum. Spírun fer síðan nokkuð hratt fram eftir fjórar til átta vikur. **Besta staðsetningin:** Eplið vill frekar sólríkan stað vegna þess að það þarf mikla birtu fyrir blómgun og ávöxt. Á sumrin er ráðlegt að vernda gegn beinni hádegissól. **Besta umönnun:** Eplatré þurfa mikið vatn - sérstaklega eftir blómgun með upphafi ávaxta. Þú ættir að frjóvga létt í mars fyrir blómgun, í byrjun júní eftir ávöxt og frá lok ágúst til nóvember einu sinni í mánuði með fljótandi Bonsai áburði. Nýju sprotana ætti aðeins að klippa eftir blómgun þannig að ávaxtasettið varðveitist. Með ungum plöntum er hægt að skera niður helming af nýju laufunum - og á haustin líka þeim Skerið greinar í form. Í lok maí ættirðu að lækka nýju greinarnar með vír áður en þær verða viðarkenndar til að hægja á vexti og myndun fleiri sporað auglýsa. Þú getur fjarlæggt vírin aftur eftir mánuð. Ungt bonsai - epli ætti að ígræða á hverju ári og eldri á tveggja ára fresti í byrjun hausts eða á vorin. **A veturna:** Á veturna er best að taka eplabonsaið úr skelinni og planta því utandyra, varíð fyrir vind.



Melo selvatico

Malus sylvestris

Dispenser di vitamine sin dai tempi della pietra / Bonsai da esterno

Esistono circa 20 specie di base del Melo a foglie caduche, da cui nel corso dei millenni sono nate circa 20.000 varietà, rendendo il melo uno degli alberi da frutto più diffusi nel mondo. **Posizione naturale:** Il Melo è originario di Europa, Asia e Nord America. **Coltivazione riuscita:** La coltivazione da semi in casa è possibile durante tutto l'anno. Lasciate i semi per tre giorni dentro il frigorifero, poi per 24 ore in un recipiente con acqua a temperatura ambiente per farli gonfiare. In seguito collocate i semi a circa un centimetro di profondità nel substrato di coltivo umido. Coprite il recipiente di coltivazione con pellicola trasparente, sulla quale praticerete dei fori, in questo modo la terra eviterà di seccarsi. Ogni due o tre giorni rimuovete la pellicola per 2 ore, per prevenire la formazione di muffe sulla terra. Collocate il recipiente di coltivazione in un luogo luminoso e caldo, a una temperatura fra i 20° e i 25°C e mantenete il substrato umido, ma non bagnato. La germinazione avviene piuttosto velocemente, da quattro a otto settimane dopo. **La posizione migliore:** Il Melo predilige un luogo soleggiato, perché ha bisogno di molta luce per la fioritura e la fruttificazione. In estate è necessaria una protezione dal sole diretto di mezzogiorno. **Cura ottimale:** L'albero di melo necessita di molta acqua, in particolare dopo la fioritura con l'inizio della fruttificazione. A marzo prima della fioritura, all'inizio di giugno dopo la fruttificazione e alla fine di agosto concimate una volta al mese con poco fertilizzante liquido per bonsai. Tagliate i nuovi getti dopo la fioritura, per mantenere salda l'attaccatura del frutto. Nelle giovani piante potete fino alla metà delle nuove foglie e, in autunno, potete i rami secondo la forma desiderata. A fine maggio curate i nuovi rami prima che lignifichino utilizzando del filo di metallo, per frenare la crescita e per favorire un maggiore sviluppo di nuovi germogli. Potete rimuovere il filo di metallo dopo un mese. I giovani bonsai di melo andranno trapiantati ogni anno, mentre quelli più adulti ogni due, all'inizio dell'autunno o in primavera. **In inverno:** In inverno è consigliabile estrarre il vostro bonsai di melo dal suo recipiente e trapiantarli all'aperto, al riparo dal vento.



Europska divlja jabuka

Malus sylvestris

Donator vitamina još od kamenog doba / otvoreni bonsai

Postoji oko 20 arhetipova listopadne jabuke, od kojih je križanjem tijekom tisućljeća nastalo gotovo 20.000 sorti, što jabuku čini najrasprostranjenijom voćkom na svijetu. **Zemlja porijekla:** Izvorno je jabuka bila raširena po Europi, Aziji i Sjevernoj Americi. **Uspješan uzgoj:** Sobni uzgoj moguć je od veljače do listopada. Stavite sjeme u hladnjak na tri dana, zatim ga namočite u zdjelu sobno tople vode na još 24 sata i zatim ga posadite jedan centimetar duboko u zemlju za posude. Posudu s kulturom prekrijte prozirnom folijom na kojoj napravite rupe. To štiti tlo od isušivanja. Svaka dva do tri dana skinite foliju na 2 sata. Time se sprječava stvaranje plijesni na tlu za uzgoj. Stavite posudu za sjeme na svijetlo i toplo mjesto s 20 do 25° Celzija i održavajte tlo za saksije vlažnim, ali ne mokrim. Klijanje se zatim odvija prilično brzo nakon četiri do osam tjedana. **Najbolja lokacija:** Jabuka preferira sunčano mjesto jer joj je za cvatnju i plodove potrebno dosta svjetla. Ljeti se savjetuje zaštita od izravnog podnevnog sunca. **Optimalna njega:** Stabla jabuke trebaju puno vode - posebno nakon cvatnje s početkom plodonošenja. Trebate lagano gnojiti u ožujku prije cvatnje, početkom lipnja nakon ploda i od kraja kolovoza do studenog jednom mjesečno tekućim gnojivom za bonsai. Nove mladice treba orezati tek nakon cvatnje kako bi se sačuvalo zametanje plodova. Kod mladih biljaka možete smanjiti polovicu novih listova - au jesen i onelzrežite grane u obliku. Krajem svibnja nove grane treba spustiti žicom prije nego što odrvene kako bi se usporio rast i stvaranje većeg broja izdanaka.promovirati. Nakon mjesec dana možete ponovno ukloniti žicu. Mlade bonsai jabuke treba presađivati svake godine, a starije svake dvije godine početkom jeseni ili u proljeće. **U zimi:** Zimi je najbolje izvaditi bonsai od jabuke iz ljuske i posaditi ga na otvorenom, zaštićenom od vjetrova.



Eiropas savvaļas ābols

Malus sylvestris

Vitamīnu donors kopš akmens laikmeta / āra pundurkociņš

Ir aptuveni 20 lapu koku ābolu arhetipi, no kuriem, krustojot tūkstošgades, ir iegūtas gandrīz 20 000 šķirņu, padarot ābolu par visizplatītāko augļu koku pasaulē. **Dabiska vieta:** Sākotnēji ābols tika izplatīts Eiropā, Āzijā un Ziemeļamerikā. **Veiksmīga audzēšana:** Audzēšana telpās ir iespējama no februāra līdz oktobrim. Ievietojiet sēklas ledusskapī trīs dienas, pēc tam vēl 24 stundas iemērciet tās bļodā ar istabas siltu ūdeni un pēc tam iestādiet vienu centimetru dziļi podiņos. Pārklājiet kultivēšanas trauku ar pārtikas plēvi, kuru nodrošina ar caurumiem. Tas pasargā augsni no izžūšanas. Jums vajadzētu noņemt foliju 2 stundas ik pēc divām līdz trim dienām. Tas novērš pelējuma veidošanos augošajā augsnē. Novietojiet sēklu podu gaišā un siltā vietā ar temperatūru 20 līdz 25 ° C un turiet augsni mitru, bet ne mitru. Pēc četrām līdz astoņām nedēļām dīgšana notiek diezgan ātri. **Labākā atrašanās vieta:** Ābols dod priekšroku saulainai vietai, jo ziedēšanai un augļu nešanai ir nepieciešams daudz gaismas. Vasarā ieteicams aizsargāties no tiešiem pusdienlaika saules stariem. **Optimāla aprūpe:** Ābelēm nepieciešams daudz ūdens – īpaši pēc ziedēšanas līdz ar augļu sākumu. Martā pirms ziedēšanas, jūnijā sākumā pēc augļu iestāšanās un no augusta beigām līdz novembrim reizi mēnesī ar šķidro pundurkociņu mēslojumu vajadzētu nedaudz mēslot. Jaunos dzinumus vajadzētu apgriezt tikai pēc ziedēšanas, lai saglabātos augļu kopums. Ar jauniem augiem jūs varat nogriezt pusi no jaunajām lapām – un rudenī arī tās izgriezt zarus formā. Maijā beigās jaunos zarus vajadzētu nolaist ar stiepli, pirms tie kļūst pārkoksnējušies, lai palēninātu augšanu un lielāka spuru veidošanos. Paaugstināt. Pēc mēneša jūs varat atkal noņemt vadu. Jauni pundurkociņš – āboli jāpārstāda katru gadu, bet vecāki – reizi divos gados rudens sākumā vai pavasarī. **Ziemā:** Ziemā ābolu pundurkociņš vislabāk ir izņemt no čaumalas un stādīt ārā, pasargāts no vēja.



Europos laukinis obuolys

Malus sylvestris

Vitamīnu donors nuo akmens amžiaus / lauko bonsai

Yra apie 20 lapuočių obelų archetipų, iš kurių tūkstantmečius sukryžminus buvo sukurta beveik 20 000 veislių, todėl obelis yra labiausiai paplitęs vaismedis pasaulyje. **Natūrali vieta:** Iš pradžių obuolys buvo paplitęs Europoje, Azijoje ir Šiaurės Amerikoje. **Sėkmingas auginimas:** Auginti patalpose galima nuo vasario iki spalio mėn. Įdėkite sėklas į šaldytuvą trims dienoms, tada dar 24 valandas pamerkite jas į dubenį su kambario šilto vandens ir pasodinkite vieno centimetro gyliu į vazoninę žemę. kultivavimo indą uždenkite maistine plėvele, kurioje yra skylės. Tai apsaugo dirvą nuo išdžiūvimo. Kas dvi ar tris dienas 2 valandas nuimkite foliją. Tai neleidžia augančioje dirvoje susidaryti pelėsiui. Sėklų vazoną pastatykite šviesioje ir šiltoje vietoje, kurios temperatūra yra 20–25 ° C, o vazono žemė turi būti drėgna, bet ne šlapia. Tada sudygsta gana greitai po keturių ar aštuonių savaičių. **Geriausia vieta:** Obuolys mėgsta saulėtą vietą, nes žydėjimui ir derėjimui jai reikia daug šviesos. Vasarą patartina saugotis nuo tiesioginių vidurdienio saulės spindulių. **Optimali priežiūra:** Obelys turi daug vandens – ypač po žydėjimo prasidėjus derėjimui. Lengvai tręšti reikėtų kovo mėnesį prieš žydėjimą, birželio pradžioje po derliaus nuėmimo ir nuo rugpjūčio pabaigos iki lapkričio kartą per mėnesį skystomis bonsų trąšomis. Naujus ūglius reikia genėti tik po žydėjimo, kad būtų išsaugotas vaisių mežginys. Su jaunais augalais galite nupjauti pusę naujų lapų, o rudenį ir tuos supjaustykite šakas į formą. Gegužės pabaigoje naujas šakas reikėtų nuleisti viela, kol jos nesumedėjo, kad sulėtintų augimą ir didesnio ataugų skaičiaus susidarymą. skatinti. Po mėnesio vėl galite nuimti laidą. Jaunus bonsus – obuolius reikia persodinti kasmet, o senesnius – kas dvejus metus rudens pradžioje arba pavasarį. **Ziemą:** Ziemą obuolių bonsą geriausia ištraukti iš lukšto ir pasodinti lauke, apsaugotame nuo vėjo.



Tuffieħ selvaġġ Ewropew

Malus sylvestris

Donatur ta 'vitamina mill-età tal-ġebel / Bonsai ta' barra

Hemm madwar 20 arketipi tat-tuffieħ li jwaqqghu l-weraq, li minnhom slaleb matul il-millenni rriżultaw fi kważi 20,000 varjetà, li jagħmlu t-tuffieħ l-aktar siġra tal-frott mifruxa fid-dinja. **Post naturali:** Originarjament, it-tuffieħ kien mifrux madwar l-Ewropa, l-Asja u l-Amerika ta 'Fuq. **Kultivazzjoni b'suċċess:** Il-kultivazzjoni fuq ġewwa hija possibbli minn Frar sa Ottubru. Poġġi ż-żrieragħ fil-frigġ tiegħek għal tlett ijiem, imbagħad xarrabhom fi skutella ta 'ilma sħun tal-kamra għal 24 siegħa oħra u mbagħad hawwelhom centimetru fond fil-hamrija tal-qsa. ecover il-bastiment tal-kultura b'film li jaqbad, li inti tipprovi d'toqob. Dan jipproteġi l-hamrija milli tinxef. Għandek tneħhi l-fojl għal sagħtejn kull jumejn jew tlett ijiem. Dan jipprevjeni l-iffurmar tal-moffa fuq il-hamrija li qed tikber. Poġġi l-borma taż-żerriegħa f'post haġif u sħun b'20 sa 25 ° Celsius u żomm il-hamrija tal-qsa niedja iżda mhux imxarba. Il-ġerminazzjoni mbagħad issir pjuttost malajr wara erba' sa tmien ġimgħat. **L-aħjar post:** It-tuffieħ jippreferi post xemxi għax jeħtieġ haġfa dawl għall-fjoritura u l-frott. Fis-sajf, protezzjoni mix-xemx diretta ta' nofs in-nhar hija rakkomandabbli. **Kura ottimali:** Is-siġar tat-tuffieħ jeħtieġu haġfa ilma - speċjalment wara l-fjur mal-bidu tal-frott. Għandek tiffertilizza haġif f'Marzu qabel il-fjur, fil-bidu ta 'Gunju wara l-frott u mill-aħħar ta 'Awwissu sa Novembru darba fix-xahar b'fertilizzant bonsai likwidu. Ir-rimjiet il-godda għandhom jiġu maqtugħa biss wara l-fjur sabiex is-sett tal-frott jiġi ppreservat. Bi pjanti żgħar tista 'taqta' lura fuq nofs il-weraq il-godda - u fil-harifa wkoll dawkaqta 'fergħat fil-forma. Fl-aħħar ta 'Mejju għandek tbaxxi l-fergħat il-godda bil-wajer qabel ma jsiru injam sabiex tnaqqas it-tkabbir u l-formazzjoni ta' numru akbar ta 'xprunbiex jippromwovu. Tista 'tneħhi l-wajer mill-ġdid wara xahar. Bonsai żgħir - it-tuffieħ għandu jiġi trapjantat kull sena u anzjani kull sentejn fil-bidu tal-harifa jew fir-rebbieġha. **Fix-xitwa:** Fix-xitwa, huwa aħjar li tieħu l-bonsai tat-tuffieħ tiegħek mill-qoxra tagħha u tħawwel barra, protett mir-riħ.



Bonsai - Europese Wilde Appel

Malus sylvestris

Vitamine donor sinds het stenen tijdperk / buitenbonsai

Er zijn ongeveer 20 oersoorten van de bladverliezende appel, waarvan de kruisingen in de afgelopen millennia hebben geresulteerd in bijna 20.000 variëteiten, waardoor de appel de meest verspreide fruitboom ter wereld is. **Natuurlijke locatie:** Oorspronkelijk was de appel verspreid over Europa, Azië en Noord-Amerika. **Succesvolle teelt:** Ze kan van februari tot oktober binnen worden gekweekt. Zet de zaden eerst drie dagen in de koelkast, laat ze daarna nog eens 24 uur weken in een kom met kamervarm water en zet ze dan een centimeter diep in potgrond. Dek de kweekbak af met vershoudfolie, deze voorzie je van gaten. Dit beschermt de aarde tegen uitdroging. Om de twee tot drie dagen moet u de film gedurende 2 uur verwijderen. Dit voorkomt schimmelvorming op de teeltgrond. Zet de kweekbak op een lichte en warme plaats met 20 à 25 ° Celsius en houd de kweekgrond vochtig, maar niet nat. Kieming vindt dan na vier tot acht weken zeer snel plaats. **De beste locatie:** De appel staat het liefst op een zonnige standplaats omdat hij veel licht nodig heeft om de bloesems en het fruit te laten groeien. In de zomer is bescherming tegen de directe middagzon aan te raden. **Optimale verzorging:** Appelbomen hebben veel water nodig - vooral na de bloei wanneer zich fruit begint te vormen. In maart voor de bloei licht bijmesten, begin juni na vruchtvorming en 1 keer per maand van eind augustus tot november met vloeibare bonsaimeststof. De nieuwe scheuten mogen pas na de bloei worden gesnoeid, zodat de vruchtzetting behouden blijft. Bij jonge planten kun je de helft van het nieuwe blad terug snoeien en in de herfst ook de twijgen in vorm knippen. Eind mei moet u de nieuwe takken met draad laten zakken voordat ze verhout worden om de groei te vertragen en de vorming van een groter aantal korte scheuten te stimuleren. U kunt de draad na een maand verwijderen. U moet elk jaar jonge bonsai-appels verplanten en oudere elke twee jaar aan het begin van de herfst of in de lente. **In de winter:** In de winter kun je je appelbonsai het beste uit de schaal halen en buiten planten, beschermd tegen de wind.



Europeisk villeple

Malus sylvestris

Vitamingiver siden steinalderen / utendørs bonsai

Det er rundt 20 arketyper av løvfellende epler, hvorfra kryss over årtusener har resultert i nesten 20 000 varianter, noe som gjør eplet til det mest utbredte frukttreet i verden. **Naturlig beliggenhet:** Opprinnelig ble eplet spredt over Europa, Asia og Nord-Amerika. **Vellykket dyrking:** Innendørs dyrking er mulig fra februar til oktober. Plasser frøene i kjøleskapet i tre dager, bløtlegg dem deretter i en bolle med romvarmt vann i ytterligere 24 timer og plant dem deretter en centimeter dypt i pottejord. Dekk til dyrkingskaret med matfilm, som du forsyner med hull. Dette beskytter jorda mot å tørke ut. Du bør fjerne folien i 2 timer annenhver til tredje dag. Dette forhindrer at det dannes mugg på den voksende jorda. Plasser frøpotten på et lett og varmt sted med 20 til 25° Celsius og hold pottejorda fuktig, men ikke våt. Spiringen skjer da ganske raskt etter fire til åtte uker. **Den beste beliggenheten:** Eplet foretrekker et solrikt sted fordi det trenger mye lys for blomstring og fruktsetting. Om sommeren anbefales beskyttelse mot direkte middagssol. **Optimal omsorg:** Epletrær trenger mye vann - spesielt etter blomstring med begynnelsen av fruktsetting. Du bør gjødsle lett i mars før blomstring, i begynnelsen av juni etter fruktsetting og fra slutten av august til november en gang i måneden med flytende bonsai-gjødsel. De nye skuddene bør kun beskæres etter blomstring slik at fruktsettet bevares. Med unge planter kan du kutte ned på halvparten av de nye bladene - og om høsten også deklipp grener i form. I slutten av mai bør du senke de nye grenene med tråd før de blir treaktige for å bremse veksten og dannelsen av et større antall sporerå forfremme. Du kan fjerne ledningen igjen etter en måned. Unge bonsai - epler bør transplanteres hvert år og eldre annethvert år på begynnelsen av høsten eller om våren. **Om vinteren:** Om vinteren er det best å ta eplebonsaien ut av skallet og plante den utendørs, beskyttet mot vinden.



Bonsai - Europejskie Jabłko

Malus sylvestris

Dawca witamin od epoki kamienia łupanego / bonsai na świeżym powietrzu

Istnieje około dwudziestu oryginalnych gatunków dzikiego kraba liściastego. Dzięki krzyżowaniu się na przestrzeni wieków opracowano prawie 20 000 odmian, a rośliną stała się najpopularniejszym drzewem owocowym na świecie. **Naturalne położenie:** Pierwotnie dziki krab występował w całej Europie, Azji i Ameryce Północnej. **Udana uprawa:** Rozmnażanie nasion w pomieszczeniach jest możliwe od lutego do października. Aby zwiększyć zdolność kiełkowania, należy początkowo przechowywać nasiona w lodówce przez około trzy dni - następnie umieścić je na kolejne 24 godziny w misce z letnią wodą w celu zalania. Następnie umieść nasiona na głębokości około 1 cm w wilgotnym kompoście doniczkowym i przykryj pojemnik na nasiona przezroczystą folią, aby zapobiec wysychaniu ziemi. Nie zapomnij zrobić dziur w przezroczystej folii i zdejmuj ją co drugi lub trzeci dzień na około 2 godziny. W ten sposób unikniesz tworzenia się pleśni na kompoście doniczkowym. Umieść pojemnik na nasiona w miejscu jasnym i ciepłym o temperaturze od 20 ° C do 25 ° Celsjusza i utrzymuj ziemię wilgotną, ale nie mokrą. Zwykle do kiełkowania potrzeba tylko czterech do ośmiu tygodni. **Najlepsza lokalizacja:** Dziki krab preferuje słoneczne miejsce, ponieważ potrzebuje dużo światła, aby rozwinąć obfite kwitnienie i obfite owoce. Latem należy chronić go przed bezpośrednim południowym słońcem. **Optymalna pielęgnacja:** Dziki krab potrzebuje dużo wody, zwłaszcza po kwitnieniu i początku owocowania. W marcu przed kwitnieniem oraz na początku czerwca po owocowaniu, a także w okresie od końca sierpnia do listopada, raz w miesiącu należy dostarczać roślinie płynny nawóz do roślin bonsai. Nowe pędy należy przycinać dopiero po kwitnieniu, aby chronić podstawę owocowania. W młodych roślinach można ścinać połowę nowych liści, a jesienią można również przyciąć gałęzie do pożądanej kształtu. Pod koniec maja nowe gałęzie należy obniżyć, zanim zdrewniały przez okablowanie, aby spowolnić wzrost i przyspieszyć rozwój krótszych pędów. Po miesiącu możesz usunąć okablowanie. Młode rośliny należy przesadzać corocznie, a dojrzewające drzewa co dwa lata, jesienią lub wiosną. **W zimę:** Zimą najlepiej wyjąć bonsai z miski i posadzić w miejscu chronionym przed wiatrem.



Maçã selvagem europeia

Malus sylvestris

Doador de vitaminas desde a idade da pedra / bonsai ao ar livre

Existem cerca de 20 arquétipos da macieira de folha caduca, dos quais cruzamentos ao longo dos milênios resultaram em quase 20.000 variedades, tornando a macieira a árvore frutífera mais difundida no mundo. **Localização natural:** Originalmente, a maçã foi espalhada pela Europa, Ásia e América do Norte. **Cultivo bem sucedido:** O cultivo interno é possível de fevereiro a outubro. Coloque as sementes na geladeira por três dias, depois mergulhe-as em uma tigela com água morna por mais 24 horas e depois plante-as com um centímetro de profundidade no solo para vasos. Cubra o recipiente de cultura com filme plástico, que você fornece com furos. Isso protege o solo de secar. Você deve remover o papel alumínio por 2 horas a cada dois ou três dias. Isso evita a formação de mofo no solo em crescimento. Coloque o vaso de sementes em um local claro e quente com 20 a 25 ° Celsius e mantenha o solo do vaso úmido, mas não molhado. A germinação ocorre rapidamente após quatro a oito semanas. **A melhor localização:** A macieira prefere um local ensolarado porque precisa de muita luz para florescer e frutificar. No verão, é aconselhável proteger-se do sol direto do meio-dia. **Cuidado ideal:** As macieiras precisam de muita água - principalmente após a floração com o início da frutificação. Você deve fertilizar levemente em março antes da floração, no início de junho após a frutificação e do final de agosto a novembro uma vez por mês com fertilizante líquido para bonsai. Os brotos novos só devem ser podados após a floração, para preservar a frutificação. Com plantas jovens, você pode cortar metade das folhas novas - e no outono também aquelas que os galhos em forma. No final de maio deve-se abaixar os galhos novos com arame antes que se tornem lenhosos para retardar o crescimento e a formação de um maior número de esporóspromover. Você pode remover o fio novamente após um mês. Bonsai jovem - as maçãs devem ser transplantadas todos os anos e as mais velhas a cada dois anos no início do outono ou na primavera. **No inverno:** No inverno, o melhor é tirar o bonsai de maçã da casca e plantá-lo ao ar livre, protegido do vento.



Bonsai - Măr Sălbatic

Malus sylvestris

Donator de vitamine din epoca de piatră / bonsai în aer liber

Există în jur de 20 de specii primordiale de măr de foioase, ale căror încrucișări au dus la aproape 20.000 de soiuri de-a lungul mileniilor, făcând mărul cel mai răspândit pom fructifer din lume. **Locație naturală:** Inițial, mărul a fost răspândit în Europa, Asia și America de Nord. **Cultivare de succes:** Poate fi cultivat în interior din februarie până în octombrie. Mai întâi puneți semințele în frigider timp de trei zile, apoi lăsați-le să se înmoaie într-un castron cu apă caldă în încăperea pentru încă 24 de ore și apoi puneți-le adânc la un centimetru în pământ. Acoperiți vasul de cultivare cu folie alimentară, pe care o asigurați cu găuri. Acest lucru protejează pământul de uscare. La fiecare două până la trei zile ar trebui să îndepărtați filmul timp de 2 ore. Acest lucru previne formarea mucegaiei pe solul de cultivare. Așezați vasul de cultivare într-un loc luminos și cald, cu 20-25 ° Celsius și mențineți solul de cultivare umez, dar nu umez. Germinarea are loc apoi foarte repede după patru până la opt săptămâni. **Cea mai bună locație:** Mărul preferă o locație însorită, deoarece are nevoie de multă lumină pentru ca florile și fructele să se dezvolte. Vara, se recomandă protecția împotriva soarelui direct la amiază. **Îngrijire optimă:** Pomii au nevoie de multă apă - mai ales după înflorire când începe să se formeze fructe. Ar trebui să fertilizați ușor în martie înainte de înflorire, la începutul lunii iunie după formarea fructelor și o dată pe lună cu îngrășământ bonsai lichid de la sfârșitul lunii august până în noiembrie. Noii lăstari trebuie tăiați numai după înflorire, astfel încât setul de fructe să fie reținut. Cu plantele tinere puteți tăia înapoi la jumătate din frunzele noi și toamna tăiați și crenguțele în formă. La sfârșitul lunii mai ar trebui să coborâți ramurile noi cu sărmă înainte ca acestea să devină lemnoase pentru a încetini creșterea și a încuraja formarea unui număr mai mare de lăstari scurți. Puteți scoate firul după o lună. Ar trebui să transplantați mere tinere bonsai în fiecare an și mai mari la fiecare doi ani la începutul toamnei sau primăvara. **În iarnă:** Iarna, cel mai bine este să scoți bonsaiul de mere din coajă și să-l plantezi în aer liber, ferit de vânt.



Bonsai - Europeiskt Vildt Äpple

Malus sylvestris

Vitamingivare sedan stenåldern / utomhusbonsai

Det finns cirka 20 ursprungliga arter av löväplet, vars korsningar har resulterat i nästan 20 000 sorter under årtusenden, vilket gör äpplet till det mest utbredda fruktträdet i världen. **Naturligt läge:** Ursprungligen sprids äpplet över Europa, Asien och Nordamerika. **Framgångsrik odling:** Den kan odlas inomhus från februari till oktober. Placera fröna i kylskåpet i tre dagar, låt dem sedan suga i en skål med rumsvarmt vatten i ytterligare 24 timmar och placera dem sedan en centimeter djupt i krukväxt. Täck odlingskärlet med plastfolie, som du förser med hål. Detta skyddar jorden från att torka ut. Varannan till var tredje dag ska du ta bort filmen i två timmar. Detta förhindrar att mögel bildas på odlingsjorden. Placera odlingskärlet på en ljus och varm plats med 20 till 25 ° Celsius och håll odlingsjorden fuktig men inte våt. Spiring sker sedan mycket snabbt efter fyra till åtta veckor. **Den bästa platsen:** Äpplet föredrar en solig plats eftersom det behöver mycket ljus för att blommorna och frukten ska utvecklas. På sommaren rekommenderas skydd mot direkt middagssol. **Optimal vård:** Äppelträd behöver mycket vatten - särskilt efter blomning när frukt börjar bildas. Du bör gödsla lätt i mars före blomningen, i början av juni efter fruktbildning och en gång i månaden med flytande bonsai-gödselmedel från slutet av augusti till november. De nya skotten bör endast beskåras efter blomningen så att fruktsatsen bibehålls. Med unga växter kan du skära ner till hälften av de nya bladen och på hösten också klippa kvistar i form. I slutet av maj bör du sänka de nya grenarna med tråd innan de blir träiga för att sakta ner tillväxten och uppmuntra bildandet av ett större antal korta skott. Du kan ta bort ledningen efter en månad. Du bör transplantera unga bonsai-äpplen varje år och äldre varannan år i början av hösten eller på våren. **På vintern:** På vintern är det bäst att ta din äpplebonsai ur skalet och plantera den utomhus, skyddad från vinden.



Európske divoké jablko

Malus sylvestris

Darca vitamínov od doby kamennej / vonkajšie bonsaje

Existuje okolo 20 archetypov listnatých jabloní, z ktorých krížením v priebehu tisícročí vzniklo takmer 20 000 odrôd, čím sa jablko stalo najrozšírenejším ovocným stromom na svete. **Prirodzená poloha:** Pôvodne bolo jablko rozšírené v Európe, Ázii a Severnej Amerike. **Úspešná kultivácia:** Die Anzucht im Haus ist von Februar bis Oktober möglich. Legen Sie die Samen zunächst für drei Tage in Ihren Kühlschrank, lassen Sie sie danach nochmals für 24 Stunden in einer Schale mit raumwarmem Wasser vorquellen und setzen Sie sie dann einen Zentimeter tief in Anzuchterde. edecken das Anzuchtgefäß mit Klarsichtfolie, die Sie mit Löchern versehen. So ist die Erde vor Austrocknung geschützt. Alle zwei bis drei Tage sollten Sie die Folie für 2 Stunden entfernen. Das beugt einer Schimmelbildung auf der Anzuchterde vor. Stellen Sie das Anzuchtgefäß an einen hellen und warmen Ort mit 20 bis 25 ° Celsius und halten Sie die Anzuchterde feucht, aber nicht nass. Die Keimung erfolgt dann recht schnell nach vier bis acht Wochen. **Najlepšie umiestnenie:** Jablko uprednostňuje slnečné miesto, pretože potrebuje veľa svetla na kvitnutie a rodenie. V lete je vhodná ochrana pred priamym poľudňajším slnkom. **Optimálna starostlivosť:** Jablone potrebujú veľa vody – najmä po odkvitnutí so začiatkom rodenia. Zľahka by ste mali prihnojiť v marci pred kvitnutím, začiatkom júna po zaplodení a od konca augusta do novembra raz za mesiac tekutým hnojivom na bonsaje. Nové výhonky treba strihať až po odkvitnutí, aby sa zachovala násada plodov. S mladými rastlinami môžete znížiť polovicu nových listov - a na jeseň aj tieNarežte vetvy do tvaru. Koncom mája by ste mali nové konáre podkosiť drôtom skôr, ako zdrevnatejú, aby sa spomalil rast a tvorba väčšieho počtu ostrohypovýšit. Po mesiaci môžete drôt znova odstrániť. Mladé bonsaje – jablká presádzajte každý rok a staršie každé dva roky začiatkom jesene alebo na jar. **V zime:** V zime je najlepšie jablkový bonsaj vybrať zo škrupeiny a vysadiť ho vonku, chránený pred vetrom.



Evropsko divje jabolko

Malus sylvestris

Donator vitamínov že od kamene dobe / zunanji bonsaj

Obstaja okoli 20 arhetipov listnatega jabolka, iz katerih so križanja skozi tisočletja privedla do skoraj 20.000 sort, zaradi česar je jabolko najbolj razširjeno sadno drevo na svetu. **Naravni habitat:** Prvotno je bilo jabolko razširjeno po Evropi, Aziji in Severni Ameriki. **Navodila za gojenje:** Gojenje v zaprtih prostorih je možno od februarja do oktobra. Semena postavite za tri dni v hladilnik, nato jih za nadaljnjih 24 ur namočite v skledo s sobno toplo vodo in jih posadite en centimeter globoko v zemljo za lončke. Posodo s kulturo pokrijte s folijo za živila, ki jo opremite z luknjami. To štiti tla pred izsušitvijo. Vsake dva do tri dni za 2 uri odstranite folijo. S tem preprečimo nastanek plesni na rastni zemlji. Lonček s semeni postavite na svetlo in toplo mesto s temperaturo od 20 do 25 °C, zemlja v lončku pa naj bo vlažna, vendar ne mokra. Nato pride precej hitro do kalitve po štirih do osmih tednih. **Najboljša lokacija:** Jablana ima najraje sončno lego, saj za cvetenje in plodove potrebuje veliko svetlobe. Poleti je priporočljiva zaščita pred neposrednim opoldanskim soncem. **Optimalna nega:** Jablane potrebujejo veliko vode - zlasti po cvetenju z začetkom plodov. Rahlo gnojite marca pred cvetenjem, v začetku junija po obroditvi in od konca avgusta do novembra enkrat mesečno s tekočim gnojilom za bonsaj. Nove poganjke obrezujemo šele po cvetenju, da ohranimo nastanek plodov. Pri mladih rastlinah lahko odrežete polovico novih listov - jeseni pa tudi telzrežite veje v obliko. Konec maja nove veje znižajte z žico, preden olesenejo, da upočasnite rast in nastanek večjega števila ostrogov.promovirati. Po enem mesecu lahko ponovno odstranite žico. Mlade bonsaje – jabolka presajamo vsako leto, starejše pa vsaki dve leti v začetku jeseni ali spomladi. **V zimskem času:** Pozimi je najbolje, da jabolčni bonsaj vzamete iz lupine in ga posadite na prosto, zaščiteno pred vetrom.



Manzano silvestre

Malus sylvestris

Donante de vitaminas desde la edad de piedra / Bonsái de exterior

Del manzano silvestre existen alrededor de 20 clases antiguas de las que evolucionaron, con el paso de varios milenios, 20 mil variedades. El manzano es el frutal más popular a nivel mundial. **Ubicación natural:** El manzano originariamente se extendió sobre Europa, Asia y el Norte de América. **Cultivo exitoso:** La semilla se puede criar en interior desde febrero a octubre. Mantenga las semillas durante tres días en el frigorífico y después durante 24 horas en agua a temperatura ambiente, para hidratarlas y aumentar la germinación de las mismas. Introduzcalas a un centímetro de profundidad en sustrato húmedo. Cubra el recipiente de cultivo con un film transparente y agujeréelo. Así protegerá la tierra de la desecación. Para evitar la putrefacción del sustrato retire el film cada dos o tres días durante 2 horas. Coloque el recipiente de cultivo en un lugar luminoso y cálido entre 20 y 25 grados y mantenga el sustrato húmedo, pero no mojado. La germinación tarda poco, por lo general entre cuatro a ocho semanas. **La mejor ubicación:** El manzano prefiere lugares soleados, porque necesita mucha luz para la inflorescencia y el desarrollo de las frutas. En verano lo ideal es una protección ante los rayos del sol directos, durante el mediodía. **Cuidado óptimo:** El manzano necesita mucha agua, sobre todo después de la inflorescencia con el comienzo del desarrollo de la fruta. Debe suministrarle abono en marzo, antes de la inflorescencia, a comienzos de junio después del desarrollo de la fruta, y desde finales de agosto hasta noviembre, una vez al mes con fertilizante líquido para bonsái. Los brotes nuevos se pueden podar después de la inflorescencia para mantener el desarrollo de la fruta intacta. Los brotes nuevos de plantas jóvenes pueden podarse a la mitad y poner las ramas en forma en otoño. A finales de mayo se recomienda colocar alambre a los brotes nuevos antes de su leñificación, para frenar el crecimiento y fomentar el crecimiento de un número mayor de brotes cortos. El alambre lo puede retirar después de un mes. Trasplante su bonsái manzano en primavera o a comienzos de otoño, los ejemplares jóvenes cada año y más adelante cada dos años. **En el invierno:** En invierno se recomienda trasplantar el bonsái de manzano al exterior, en un sitio protegido del viento.



Evropské divoké jablko

Malus sylvestris

Dárce vitamínů od doby kamenné / venkovní bonsaje

Existuje kolem 20 archetypů listnatého jabloně, z nichž křížení v průběhu tisíciletí vzešlo téměř 20 000 odrůd, čímž se jablko stalo nejrozšířenějším ovocným stromem na světě. **Přirozená poloha:** Původně bylo jablko rozšířeno po Evropě, Asii a Severní Americe. **Úspěšné pěstování:** Pěstování v interiéru je možné od února do října. Umístěte semena na tři dny do lednice, poté je namočte na dalších 24 hodin do misky s pokojovou vodou a poté je zasadte jeden centimetr hluboko do zeminy. kulturační nádobu přikryjte potravinářskou fólií, kterou opatříte otvory. To chrání půdu před vysycháním. Fólii byste měli odstraňovat na 2 hodiny každé dva až tři dny. Tím se zabrání tvorbě plísní na rostoucí půdě. Umístěte květináč na světlé a teplé místo s teplotou 20 až 25 °C a udržujte půdu v květináči vlhkou, ale ne mokrou. Klíčení pak probíhá celkem rychle po čtyřech až osmi týdnech. **Nejlepší umístění:** Jablono preferuje slunné stanoviště, protože potřebuje hodně světla pro kvetení a plodování. V létě je vhodná ochrana před přímým poledním sluncem. **Optimální péče:** Jabloně potřebují hodně vody – zvláště po odkvětu se začátkem plodování. Lehce přihnojíte v březnu před rozkvětem, začátkem června po oplodnění a od konce srpna do listopadu jednou měsíčně tekutým hnojivem na bonsaje. Nové výhony je vhodné stříhat až po odkvětu, aby byla zachována násada plodů. U mladých rostlin můžete seříznout polovinu nových listů - a na podzim i ty. Nakrájejte větve do tvaru. Na konci května byste měli nové větve posadit drátem, než zduřevnatí, aby se zpomalil růst a tvorba většího počtu ostruh povýšit. Po měsíci můžete drát znovu odstranit. Mladé bonsaje - jablka přesazujte každý rok a starší každé dva roky na začátku podzimu nebo na jaře. **V zimě:** V zimě je nejlepší vyjmout jablečnou bonsaj ze skořápky a vysadit ji venku, chráněnou před větrem.



Avrupa yaban elması

Malus sylvestris

Taş devrinden beri vitamin donörü / açık hava bonsai

Yaprak döken elmanın yaklaşık 20 arketipi vardır ve bunların bin yıllık melezlemeleri yaklaşık 20.000 çeşitle sonuçlanmıştır ve bu da elmayı dünyadaki en yaygın meyve ağacı yapmaktadır. **Doğal konum:** Başlangıçta, elma Avrupa, Asya ve Kuzey Amerika'ya yayıldı. **Başarılı yetiştirme:** Kapalı ekim Şubat'tan Ekim'e kadar mümkündür. Tohumları üç gün boyunca buzdolabınıza koyun, ardından 24 saat daha oda sıcaklığında bir kase suda bekletin ve ardından sakı toprağına bir santimetre derinliğinde ekin. Kültür kabının üzerini delikler açtığınız streç film ile kapatın. Bu, toprağın kurumasını önler. Folyoyu her iki ila üç günde bir 2 saat çıkarmalısınız. Bu, büyüyen toprakta küf oluşumunu önler. Tohum sakısını 20 ila 25°C sıcaklıkta hafif ve sıcak bir yere koyun ve sakı toprağını nemli tutun ama ıslak değil. Çimlenme daha sonra dört ila sekiz hafta sonra oldukça hızlı bir şekilde gerçekleşir. **En iyi konum:** Elma, çiçeklenme ve meyve verme için çok fazla ışığa ihtiyaç duyduğu için güneşli bir yeri tercih eder. Yaz aylarında, doğrudan öğle güneşinden korunma tavsiye edilir. **Optimum bakım:** Elma ağaçlarının çok fazla suya ihtiyacı vardır - özellikle meyve vermeye başlayan çiçek açtıktan sonra. Mart ayında çiçeklenmeden önce, Haziran başında meyve verdikten sonra ve Ağustos sonundan Kasım ayına kadar ayda bir sıvı bonsai gübresi ile hafifçe gübrelemelisiniz. Yeni sürgünler ancak çiçek açtıktan sonra budanmalıdır, böylece meyve tutumu korunur. Genç bitkilerde yeni yaprakların yarısını kesebilirsiniz - ve sonbaharda da dalları şekle kesin. Mayıs ayının sonunda, büyümeyi ve daha fazla sayıda mahmuz oluşumunu yavaşlatmak için yeni dalları odunsu hale gelmeden tel ile indirmelisiniz. Terfi etmek. Bir ay sonra teli tekrar çıkarabilirsiniz. Genç bonsai - elmalar her yıl ve daha yaşlı olanlar iki yılda bir sonbaharın başında veya ilkbaharda ekilmelidir. **Kışın:** Kışın, elma bonsai'nizi kabuğundan çıkarıp rüzgardan koruyarak açık havada dikmek en iyisidir.



Európai vadalma

Malus sylvestris

Kőkorszak óta vitamindonor / kültéri bonsai

A lombhullató almának mintegy 20 archetípusa létezik, amelyekből az évezredek során végzett keresztezések közel 20 000 fajtát eredményeztek, így az alma a világ legelterjedtebb gyümölcsfája. **Természetes elhelyezkedés:** Eredetileg az alma Európában, Ázsiában és Észak-Amerikában terjedt el. **Sikeres termesztés:** A beltéri termesztés februártól októberig lehetséges. Tedd a magokat három napra a hűtőbe, majd áztasd egy tál szobameleg vízbe további 24 órára, majd ültesd el egy centiméter mélyen virágföldbe. fedje le a tenyészedényt ragasztó fóliával, amelyet lyukakkal lát el. Ez megvédi a talajt a kiszáradástól. A fóliát két-három naponta 2 órára le kell venni. Ez megakadályozza a penészképződést a növekvő talajon. Helyezze a magcserepet világos és meleg helyre, ahol a hőmérséklet 20-25°C, és a virágföldet tartsa nedvesen, de ne nedvesen. A csírázás elég gyorsan megtörténik négy-nyolc hét után. **A legjobb hely:** Az alma a napos helyet kedveli, mert a virágzáshoz és a terméshez sok fényre van szüksége. Nyáron célszerű védeni a közvetlen déli napfénytől. **Optimális gondozás:** Az almáknak sok vízre van szükségük - különösen virágzás után, a termés kezdetekor. Márciusban virágzás előtt, június elején a termés után, augusztus végétől novemberig havonta egyszer folyékony bonsai műtrágyával trágyázzon. **Télen:** Télen a legjobb, ha az alma bonsait kivesszük a héjából, és a szélétől védve a szabadba ültetjük.

: : : : :



ワイルドクラブアップル

Malus sylvestris

石器時代からのビタミン供給者/屋外盆栽

ワイルドクラブアップルは約20種類あります。何世紀にも渡って交配し約20,000品種が開発され、世界で最も一般的な果樹になりました。

自然な場所: もともとはヨーロッパ、アジア、北アメリカ全土で増えていきました。

栽培成功:

室内での種の栽培は2月～10月の間可能です。発芽性を高めるには、最初に冷蔵庫で約3日間保存します；その後、種を温水に24時間浸します。湿った培養土の深さ約1cmに種を植え、サランラップなどの透明フィルムで鉢をカバーします。透明フィルムには空気穴をいくつかあけ、2～3日に1回は約2時間、完全にフィルムを鉢から外します。そうすることで、カビの発生を防ぎます。20°C～25°Cの明るく暖かい場所に置き、用土は湿った状態に保ちます。通常は約4～8週間で発芽します。

最高のロケーション:

豊かな花と果実のために十分な光が必要なので、日当たりの良い場所を好みます。夏の間は日中の直射日光を避けてください。

最適なケア:

開花時期と結実の時期には特にたっぷりの水が必要です。開花前の3月と結実後の6月の初旬、そして8月の下旬から11月までは盆栽用の液体肥料を月に一度与える必要があります。

果実が形成する根元を保護するために、新芽は開花後にのみ剪定します。若い木は葉の半分以上を剪定でき、秋には枝を好みの形に剪定できます。5月下旬には木質化する前の枝を針金かけで下げて、成長を遅くしより多くの芽の成長を促すようにします。1か月後には針金を外せます。若い木は毎年、成熟した木は2年ごとに秋または春に植え替えが必要です。

冬に: 冬の間は、盆栽を鉢から取り出し風防された場所に植えるのがよいでしょう。

SKU: 14953 / Europäischer Wildapfel