

Dawkowanie

Burak cukrowy, Burak pastewny

Zalecana dawka do jednorazowego zastosowania: 1,0-1,5 kg/ha

Termin stosowania:

- przed (najlepsze rezultaty) lub natychmiast po zauważeniu pierwszych objawów chwościka (do 5% porażonych roślin na plantacji)
- sprzyjający przebieg pogody - wysoka wilgotność i temperatura powyżej 15°C w nocy

Burak ćwikłowy

Zalecana dawka do jednorazowego zastosowania: 1,0-1,5 kg/ha

Termin stosowania:

- przed (najlepsze rezultaty) lub natychmiast po zauważeniu pierwszych objawów (do 5% porażonych roślin na plantacji)

Soja

Zalecana dawka do jednorazowego zastosowania: 1,0-1,5 kg/ha

Termin stosowania:

- przed (najlepsze rezultaty) lub natychmiast po zauważeniu pierwszych objawów (do 5% porażonych roślin na plantacji)

Seler liściowy i Seler naciowy

Zalecana dawka do jednorazowego zastosowania: 1,0-1,5 kg/ha

Termin stosowania:

- przed (najlepsze rezultaty) lub natychmiast po zauważeniu pierwszych objawów (do 5% porażonych roślin na plantacji)