

Jak stosować Magnicur Energy?

Sposób użycia: **oprysk lub podlewanie**

1 Środek stosuj do odkażania podłoża, szczególnie podczas produkcji rozsady, a także do wzmacniania rozwoju roślin.

2 W celu odkażania pryzmę polej cieczą użytkową i dokładnie wymieszaj.

3 Podlewanie wykonuj zgodnie z zaleceniami dotyczącymi poszczególnych gatunków roślin i w wymaganej dawce cieczy użytkowej (w zalecanych dawkach Magnicur Energy nie jest fitotoksyczny).

4 Opryski przeprowadzaj natychmiast po zauważeniu objawów chorobowych.

👉 **Koncentratu Magnicur Energy możesz używać przez cały rok** w zależności od zabiegów i roślin chronionych.

👉 Optymalnym terminem stosowania są jednak miesiące **od marca do lipca**.

👉 Stosuj preparat zapobiegawczo lub natychmiast po zauważeniu objawów choroby.

👉 **Zaleca się stosować środek poza okresami aktywności pszczoł oraz innych owadów zapylających.**

Dawkowanie Magnicur Energy:

✳️ **Pomidor, ogórek**

✗ zgnilizna pierścieniowa, zgorzele siewek, zgnilizny korzeni

- Odkazanie

Środek stosować do ziemi kompostowej i innych substratów używanych do produkcji rozsady

Zalecana dawka: **25 ml środka + 2 l wody/100 l podłoża**

Pryzmę dokładnie połać cieczą użytkową i dokładnie wymieszać

Maksymalna liczba zabiegów: 1

- Podlewanie

Podlewanie siewek lub rozsady

Zalecane stężenie: **0,15% (15 ml środka/10 l wody)**

Zalecana ilość cieczy użytkowej: **2-3 l roztworu/1 m² powierzchni**

Ilość cieczy użytkowej dostosować do wielkości roślin

Podlewanie roślin po posadzeniu na miejsce stałe

Zalecane stężenie: **0,15% (15 ml środka/10 l wody)**

Zalecana ilość cieczy użytkowej: **1 l roztworu/4-5 roślin**

Podlewanie roślin uprawianych na wełnie mineralnej

Zalecane stężenie: **0,015-0,03% (1,5-3 ml środka/10 l wody)**

Rośliny podlewać 1-2 razy w odstępach, co 2-3 tygodnie

Termin stosowania: w fazie rozwoju liści

Maksymalna liczba zabiegów w sezonie wegetacyjnym: 2

Odstęp między zabiegami: co najmniej 14 dni



* Papryka

✗ zgorzele siewek, fytoftoroz powodowana przez organizmy grzybopodobne z rodzaju *Pythium* spp. i *Phytophthora* spp.

- Odkazanie

Środek stosować do ziemi kompostowej i innych substratów używanych do produkcji rozsady

Zalecana dawka: **25 ml środka + 2 l wody/100 l podłoża**

Prysmę dokładnie połączyć cieczą użytkową i dokładnie wymieszać

Zabieg powinien być wykonany na 2-3 dni przed użyciem podłoża do siewu lub pikowania

Maksymalna liczba zabiegów: 1

- Podlewanie

Podlewanie siewek lub rozsady lub podlewanie roślin po posadzeniu na miejsce stałe

Zalecane stężenie: **0,1-0,15% (10-15 ml środka/10 l wody)**

Wyższe stężenie stosować w przypadku zwiększonego zagrożenia roślin chorobami

Zalecana ilość cieczy użytkowej:

- w zależności od wieku siewek: **2-3 l/1 m²**
- po posadzeniu roślin na miejsce stałe: **1 l/4-5 roślin**

Termin stosowania: w fazie rozwoju liści

Maksymalna liczba zabiegów w sezonie wegetacyjnym: 2

Odstęp między zabiegami: co najmniej 14 dni



* **Kapusta głowiasta**

✗ zgorzele siewek, fytoftoroza powodowana przez organizmy grzybybopodobne z rodzaju *Pythium* spp. i *Phytophthora* spp.

- Odkazanie

Środek stosować do ziemi kompostowej i innych substratów używanych do produkcji rozsady

Zalecana dawka: **25 ml środka + 2 l wody/100 l podłoża**

Pryzmę dokładnie poleć cieczą użytkową i dokładnie wymieszać

Zabieg powinien być wykonany na 2-3 dni przed użyciem podłoża do siewu lub pikowania

Maksymalna liczba zabiegów: 1

- Podlewanie

Podlewanie siewek lub rozsady

Zalecane stężenie: **0,1-0,15% (10-15 ml środka/10 l wody)**

Wyższe stężenie stosować w przypadku zwiększonego zagrożenia roślin chorobami

Termin stosowania: w fazie rozwoju liści

Maksymalna liczba zabiegów w sezonie wegetacyjnym: 2

Odstęp między zabiegami: co najmniej 14 dni



* Rośliny ozdobne (uprawa w gruncie)

- Opryskiwanie

✗ fytoftoroz, zgorzel siewek i sadzonek, zgnilizna korzeni, zgorzel zgnilakowa

Maksymalne stężenie dla jednorazowego zastosowania: **0,2% (20 ml środka/10 l wody)**

Termin stosowania: zapobiegawczo lub natychmiast po wystąpieniu pierwszych objawów chorób, od momentu pojawienia się liści do pełni kwitnienia

Maksymalna liczba zabiegów w sezonie wegetacyjnym: 2

Odstęp między zabiegami: co najmniej 15 dni

Zalecana ilość cieczy użytkowej: 5 l/100 m²

* Rododendron (rózaniecnik)

✗ fytoftoroz

Zalecane stężenie: **0,25% (25 ml środka/10 l wody)**

Termin stosowania: od fazy rozwiniętych 2 liści do fazy, gdy pędy osiągną 90% typowej długości

Maksymalna liczba zabiegów w sezonie wegetacyjnym: 2

Odstęp między zabiegami: co najmniej 15 dni

Zalecana ilość cieczy użytkowej: 10 l/100 m²

Róża

✗ mączniak rzekomy

Zalecane stężenie: **0,2% (20 ml środka/10 l wody)**

Termin stosowania: od fazy rozwoju liści do pełni kwitnienia

Maksymalna liczba zabiegów w sezonie wegetacyjnym: 2

Odstęp między zabiegami: co najmniej 15 dni

Zalecana ilość cieczy użytkowej: 10 l/100 m²



* Rośliny ozdobne (uprawa pod osłonami)

✗ fytoftoraza, zgorzel siewek i sadzonek, zgnilizna korzeni, zgorzel zgnilakowa

- Opryskiwanie

Maksymalne/zalecane stężenie dla jednorazowego zastosowania: **0,2% (20 ml środka/10 l wody)**

Termin stosowania: zapobiegawczo lub natychmiast po wystąpieniu pierwszych objawów chorób, od momentu pojawienia się liści do pełni kwitnienia

Maksymalna liczba zabiegów w sezonie wegetacyjnym: 2

Odstęp między zabiegami: co najmniej 15 dni

Zalecana ilość cieczy użytkowej: 5 l/100 m²

- Podlewanie

Maksymalne/zalecane stężenie dla jednorazowego zastosowania: **0,2% (20 ml środka/10 l wody)**

Termin stosowania: zapobiegawczo lub natychmiast po wystąpieniu pierwszych objawów chorób, bezpośrednio po posadzeniu roślin do momentu rozwoju liści

Maksymalna liczba zabiegów w sezonie wegetacyjnym: 2

Odstęp między zabiegami: co najmniej 15 dni

Zalecana ilość cieczy użytkowej: 10 l/100 m²

Róża

✗ mączniak rzekomy

- Opryskiwanie

Zalecane stężenie: **0,2% (20 ml środka/10 l wody)**

Termin stosowania: od fazy rozwoju liści do pełni kwitnienia

Maksymalna liczba zabiegów sezonie wegetacyjnym: 2

Odstęp między zabiegami: co najmniej 15 dni

Zalecana ilość cieczy użytkowej: 10 l/100 m²

Pelargonium

✗ zgorzel zgnilakowa

- Podlewanie

Zalecane stężenie: **0,15% (15 ml środka/10 l wody)**

Ilość cieczy użytkowej dostosować do wielkości roślin.

W przypadku zagrożenia stosować bezpośrednio po posadzeniu roślin na miejsce stałe

Maksymalna liczba zabiegów w sezonie wegetacyjnym: 2

Odstęp między zabiegami: co najmniej 7 dni

Zalecana ilość cieczy użytkowej: **1,5 litra/1 m² podłoża**