



Siarkol® 800 SC Agropak [50 ML] - Ochrona przed mączniakiem

Siarkol® 800 SC to skuteczny fungicyd powierzchniowy z siarką (800 g/l), zwalczający mączniaka prawdziwego, amerykańskiego i rzekomego. Tworzy barierę ochronną na roślinach, działa zapobiegawczo i interwencyjnie. Do stosowania w sadach, warzywach, ziołach i roślinach ozdobnych. Bezpieczny dla pszczoł (poza okresem kwitnienia), certyfikowany do rolnictwa ekologicznego.

Siarkol® 800 SC fungicyd o działaniu powierzchniowym, tworzący na roślinach skuteczną barierę ochronną **zapobiegającą rozwojowi mączniaka prawdziwego, amerykańskiego mączniaka agrestu i mączniaka rzekomego dyniowatych**. Produkt może być stosowany zarówno zapobiegawczo, jak i z chwilą wystąpienia pierwszych objawów choroby, **w uprawach sadowniczych, roślinach ozdobnych, warzywach i roślinach zielarskich**. Można go stosować przez **cały okres wegetacji**, poza okresami intensywnej aktywności pszczoł (kwitnienie). Jest **certyfikowany do stosowania w uprawach ekologicznych**.

Nie należy przekraczać zalecanych dawek preparatu. Przed użyciem proszę zapoznać się z etykietą produktu i ściśle stosować się do zawartych w niej zaleceń dotyczących dawkowania oraz sposobu stosowania.

Główne korzyści stosowania produktu Siarkol® 800 SC

- **Skuteczność:** Działa zapobiegawczo tworząc na roślinie barierę ochronną.
- **Uniwersalność:** Zapobiega rozwojowi mączniaka, wzbogaca rośliny w przyswajalną siarkę, wzmacnia odporność roślin.
- **Wygoda:** Możliwość wielokrotnego stosowania w sezonie wegetacyjnym.
- **Bezpieczeństwo:** Dopuszczony do stosowania w rolnictwie ekologicznym.

Jak stosować Siarkol® 800 SC

- **Dawkowanie:** 15 - 75 ml środka w 2 - 15 L wody / 100 m² (w zależności od uprawy i fazy rozwojowej rośliny) – tabela poniżej.
- **Częstotliwość:** 2 - 8 zabiegów w odstępie 7 - 14 dni (w zależności od uprawy i fazy rozwojowej rośliny).
- **Zalecany termin stosowania:** Marzec – październik.
- **Sposób użycia:** Rośliny opryskiwać w taki sposób, aby zostały dokładnie zwilżone ale nie tworzyły się na nich krople, przy użyciu opryskiwaczy ręcznych lub szklarniowych.

Siarkol® 800 SC - zwalczane choroby i uprawy, w których można zastosować środek

- **Choroby:** Mączniak prawdziwy, amerykański mączniak agrestu, mączniak rzekomy dyniowatych.
- **Uprawy:** Jabłoni, grusza, brzoskwinia, morela, śliwa, winorośl, rośliny ozdobne, porzeczka, agrest, borówka wysoka, malina,

truskawka, ogórek, dynia, cukinia, kabaczek, pomidor, bakłażan, marchew, pietruszka, groch, kapusty, sałaty, rzodkiewka, rośliny zielarskie.

Cechy produktu Siarkol® 800 SC

- **Składnik aktywny:** Siarka – 800 g / L (55,73%).
- **Forma:** Stężona zawiesina (koncentrat) do rozcieńczania wodą przed zastosowaniem.
- **Zgodność z ekologicznymi standardami:** Certyfikowany do stosowania w uprawach ekologicznych.

Wybrane zastosowanie preparatu Siarkol® 800 SC

Uprawa	Zalecana dawka	Choroba
jabłoń	60 - 75 ml w 6 L wody / 100 m ²	mączniak jabłoni
grusza	75 ml w 6 L wody / 100 m ²	mączniak prawdziwy
brzoskwinia, morela, śliwa	30 - 50 ml w 5 L wody / 100 m ²	mączniak prawdziwy
winorośl	27,5 - 40 ml w 10 L wody / 100 m ²	mączniak prawdziwy winorośli
rośliny ozdobne	30 - 50 ml w 10 L wody / 100 m ²	mączniak prawdziwy
porzeczka, agrest	30 - 50 ml w 10 L wody / 100 m ²	amerykański mączniak agrestu
borówka wysoka, malina, truskawka	30 - 50 ml w 10 L wody / 100 m ²	mączniak prawdziwy
ogórek, dynia, cukinia	15 ml w 6 L wody / 100 m ²	mączniak rzekomy dyniowatych
pomidor, bakłażan	15 - 30 ml w 6 L wody / 100 m ²	mączniak prawdziwy
kapusta, sałata	30 ml w 2 - 6 L wody / 100 m ²	mączniak prawdziwy
marchew, pietruszka	30 ml w 6 L wody / 100 m ²	mączniak prawdziwy
rośliny zielarskie	15 ml w 4 - 6 L wody / 100 m ²	mączniak prawdziwy