



SAFLAX®



Tips



© Jeremy Norbury - About © : Contact SAFLAX

Morus alba

	 Български	BG		2		 Malti	MT		5
	 Dansk	DK		2		 Nederlands	NL		5
	 Deutsch	DE		2		 Norsk	NO		6
	 English	UK		2		 Polski	PL		6
	 Eesti	EE		3		 Português	PT		6
	 Suomalainen	FI		3		 Românesc	RO		6
	 Français	FR		3		 Svenska	SE		7
	 Ελληνική	GR		3		 Slovensky	SK		7
	 Gaeilge	IE		4		 Slovenski	SI		7
	 íslenskur	IS		4		 Español	ES		7
	 Italiano	IT		4		 Český	CZ		8
	 Hrvatski	HR		4		 Türkçe	TR		8
	 Latviešu	LV		5		 Magyar	HU		8
	 Lietuvių kalba	LT		5		 日本語	JP		9



Бяла черница

Morus alba

Красиви бели пъпки и цвeта в началото на лятото / студен домашен бонсай

Листата на широколистната бяла черница служат като хранителни дървета за копринените буби в производството на коприна в Индия. Листата на дървото могат да вариат от гладки ръбове до дълбоко пръстовидни и дълбоко разчленени. Дължи името си на белите си пъпки, които се появяват през май и юни, и белите плодове, които могат да станат червеникави при силно слънце. Дори младите дървета могат да дадат обилни количества от сочните, сладки като захар плодове. **Естествено местоположение:** Бялата черница първоначално е родом от Манджурия в Китай. **Успешно отглеждане:** Отглеждането на закрито е възможно цялгодишно. Разпръснете семената върху влажен субстрат за отглеждане и ги покрийте само тънко със субстрат. Покрийте съда с култура с домакинско фолио, което сте осигурили с дупки. Това предпазва почвата от изсушаване. Трябва да отстранявате фолиото за 2 часа на всеки два до три дни. Това предотвратява образуването на мухъл върху растящата почва. Поставете саксията със семена на светло и топло място с 20 до 25° по Целзий и поддържайте почвата влажна, но не мокра. Покълването обикновено става след две до пет седмици. **Най-доброто местоположение:** Черничите обичат слънчеви и топли места, но обичат да бъдат защитени от вятъра. **Оптимална грижа:** Грижата за черницата е изключително лесна. Винаги оставайте почвения субстрат да изсъхне малко, преди да го поливате обилно отново. Торете на всеки две седмици от април до началото на есента с течен тор за бонсай. Morus всъщност е подходящ за всички размери и стилове - свободна изправена форма, двоен ствол, множество стволчета или гори. Можете да отрежете дебели клонове през есента и пролетта, преди да поникнат. Най-добре е винаги да отрязвате новите издънки през лятото до два листа. Най-добре е да окабелите през юни и след шест месеца отново да премахнете телта, за да не врасне. Презасаждайте черницата на всеки две години в началото на април с леко подрязване на корените, преди да започне напълването. **През зимата:** През зимните месеци нуждата от вода след окапването на листата е значително по-малка. Сега поливайте по-пестеливо, но никога не оставайте почвата да изсъхне напълно. Morus увеличава зимната издръжливост до -20° по Целзий през годините, но защитено, хладно място без твърде много минусови температури сега е идеално за бонсай.



Hvidt morbærtræ

Morus alba

Smukke hvide knopper og blomster i forsommeren / kold husbonsai

Bladene fra den løvfældende hvide morbær tjener som fødetræer for silkeormene i indisk silkeproduktion. Træets blade kan variere fra glatkantede til dybt fingerformede og dybt dissekere. Den skylder sit navn til sine hvide knopper, som dukker op i maj og juni, og de hvide frugter, som også kan blive rødlig i stærkt solskin. Selv unge træer kan bære rigelige mængder af den saftige, sukkersøde frugt. **Naturlig beliggenhed:** Det hvide morbærtræ er oprindeligt hjemmehørende i Manchuriet i Kina. **Succesfuld dyrkning:** Indendørs dyrkning er mulig hele året rundt. Spred frøene på fugtigt voksende substrat og dæk dem kun tyndt med substratet. Dæk dyrkningskarret til med husholdningsfilm, som du forsyner med huller. Dette beskytter jorden mod udtørring. Du bør fjerne folien i 2 timer hver anden til tredje dag. Dette forhindrer mug i at dannes på den voksende jord. Stil frøpotten et let og varmt sted med 20 til 25° Celsius og hold pottejorden fugtig, men ikke våd. Spiring sker normalt efter to til fem uger. **Den bedste beliggenhed:** Morbærtræer elsker solrige og varme steder, men kan godt lide at blive beskyttet mod vinden. **Optimal pleje:** Morbærtræet er ekstremt nemt at passe. Lad altid jordsubstratet tørre lidt ud, før du vander det grundigt igen. Gød hver anden uge fra april til det tidlige efterår med en flydende bonsai-gødning. Morus er faktisk velegnet til alle størrelser og stilarter - den frie opretstående form, den dobbelte stamme, flere stammer eller skove. Du kan klippe tykke grene i efteråret og foråret, før de spirer. Det er bedst altid at skære de nye skud om sommeren ned til to blade. Det er bedst at træde i juni og fjerne tråden igen efter seks måneder, så den ikke vokser ind. Ompot morbæret hvert andet år i begyndelsen af april med en let rodbeskyring, før knopskydningen begynder. **Om vinteren:** I vintermånederne er det betydeligt lavere vandbehov efter bladtab. Vand mere sparsomt nu, men lad aldrig jorden tørre helt ud. Morus stiger i vinterhårdførhed ned til -20° Celsius gennem årene, men en beskyttet, kølig placering uden for meget minusgrader er nu ideel til bonsai.



Weißer Maulbeerbaum

Morus alba

Hübsche weiße Knospen und Blüten im Frühsommer / Kalthaus-Bonsai

Die Blätter der sommergrünen Weißen Maulbeere dienen den Seidenraupen in der indischen Seidenherstellung als Futterbäume. Die Blätter des Baums können von glattrandig bis hin zu tief fingerförmig und tief eingeschnittenen variieren. Ihren Namen verdankt sie ihren im Mai und Juni erscheinenden weißen Knospen und den weißen Früchten, die sich bei starker Sonne allerdings auch rötlich färben können. Schon junge Bäume können reichliche Mengen der saftigen, zuckersüßen Früchte tragen. **Naturstandort:** Der Weiße Maulbeerbaum ist in der Mandschurei in China ursprünglich heimisch. **Anzucht:** Die Anzucht im Haus ist das ganze Jahr über möglich. Streuen Sie die Samen auf feuchtes Anzuchtsubstrat und bedecken Sie sie nur dünn mit dem Substrat. Decken Sie das Anzuchtgefäß mit Klarsichtfolie ab, die Sie mit Löchern versehen. So ist die Erde vor Austrocknung geschützt. Alle zwei bis drei Tage sollten Sie die Folie für 2 Stunden entfernen. Das beugt einer Schimmelbildung auf der Anzuchterde vor. Stellen Sie das Anzuchtgefäß an einen hellen und warmen Ort mit 20 bis 25° Celsius und halten Sie die Anzuchterde feucht, aber nicht nass. Die Keimung erfolgt zumeist nach zwei bis fünf Wochen. **Standort:** Maulbeerbäume lieben sonnige und warme Standorte, stehen aber gerne etwas windgeschützt. **Pflege:** Der Maulbeerbaum ist ausgesprochen pflegeleicht. Lassen Sie das Erds substrat immer etwas abtrocknen, bevor Sie wieder ausgiebig gießen. Düngen Sie von April bis zum Frühherbst alle zwei Wochen mit einem flüssigen Bonsaidünger. Der Morus eignet sich eigentlich für alle Größen und Stilartern - die frei aufrechte Form, den Doppelstamm, Mehrfachstämmen oder Wälder. Dicke Äste können Sie im Herbst und im Frühjahr vor dem Austrieb schneiden. Die neuen Triebe im Sommer schneiden Sie am besten immer auf zwei Blätter zurück. Drahten nimmt man am besten im Juni vor und entfernt den Draht nach einem halben Jahr wieder, damit er nicht einwächst. Topfen Sie die Maulbeere alle zwei Jahre Anfang April mit einem leichten Wurzelschnitt um, bevor der Austrieb beginnt. **Im Winter:** In den Wintermonaten ist der Wasserbedarf nach dem Laubverlust deutlich geringer. Gießen Sie jetzt sparsamer, aber lassen Sie die Erde nie ganz austrocknen. Der Morus nimmt mit den Jahren zwar an Winterhärte bis -20° Celsius zu, aber für den Bonsai ist ein geschützter kühler Standort ohne allzustarke Minusgrade jetzt ideal.



Bonsai - White Mulberry

Morus alba

Beautiful white buds and flowers in early summer / Cold house Bonsai

The leaves of the deciduous White Mulberry provide the food for the silkworms in the Indian silk making and come in various shapes, from clear-cut edged to deep-cut finger-shaped. Its name comes from the white buds and white fruits that the plant produces in May and June, although the fruits may take on a reddish colour with strong sunlight. Even young plants can grow copious amounts of the sweet and juicy fruits. **Natural location:** The White Mulberry has its natural habitat in the Manchuria region of China. **Successful cultivation:** Seed propagation indoors is possible throughout the year. Spread the seeds onto moist potting compost and put just a little compost earth on top. Then, cover the seed container with clear film to prevent the earth from drying out. Don't forget to make some holes in the clear film and take it every second or third day completely off for about 2 hours. That way you avoid mold formation on your potting compost. Place the seed container somewhere bright and warm with a temperature between 20° and 25° Celsius and keep the earth moist, but not wet. Usually it takes two to six weeks until germination. **The best location:** The White Mulberry prefers sunny and warm places, ideally in a slightly wind-protected spot. **Optimal care:** The White Mulberry is rather carefree. Always let the earth dry out a little before the next proper watering. From April until early autumn you may provide fluid fertilizer for bonsai plants every two weeks. The Morus is suited for cultivation of all types and sizes of bonsai plants - the free upright form, the double master, the multiple strain or the forest bonsai form. Thick branches can be pruned in autumn and in spring before the sprouting. The new shoots are best cut back to two leaves during summer. June would be the best time for wiring, and after about half a year you can remove the wire to prevent it from growing in. Every two years at the beginning of April and before the sprouting, you may repot the Mulberry after a brief root cutting. **In the winter:** During winter, the tree needs only modest watering since it casts the leaves - just make sure that the earth doesn't dry out completely. Even though the Morus is getting more frost-resistant up to -20° Celsius over the years, the best place for hibernation is a sheltered cool place with only light frost.



Valge mooruspuu

Morus alba

Päris valged pungad ja õied varasuvel / külmamaja bonsai

Heitlehise valge mooruspuu lehed on India siiditootmises siidiusside toidupuud. Puu lehed võivad varieeruda siledaservalistest kuni sügavalt sõrmekujulisteni ja sügavalt tükeldatud. Oma nime võlgneb ta oma valgetele pungadele, mis ilmuvad mais ja juunis, ning valgetele viljadele, mis võivad ka tugeva päikesepeaiste käes punakaks muutuda. Isegi noored puud võivad kanda suures koguses mahlasid suhkrumagusaid puuvilju. **Looduslik asukoht:** Valge mooruspuu on algselt pärit Hiinas Mandžuriast. **Edukas kasvatamine:** Toas kasvatamine on võimalik aastaringselt. Puista seemned niiskele kasvusubstraadile ja kata need vaid õhukeselt substraadiga. Kata kultuurianum toidukilega, mille varustad aukudega. See kaitseb mulda kuivamise eest. Peaksite fooliumi eemaldama 2 tunniks iga kahe kuni kolme päeva järel. See takistab hallituse teket kasvupinnal. Asetage külvipott valgusküllasesse ja sooja kohta, mille temperatuur on 20–25 ° C, ning hoidke istutusmuld niiskena, kuid mitte märjana. Idanemine toimub tavaliselt kahe kuni viie nädala pärast. **Parim asukoht:** Mooruspuud armastavad päikeselisel ja sooja kohta, kuid neile meeldib olla kaitstud tuule eest. **Optimaalne hooldus:** Mooruspuu eest hoolitsemine on äärmiselt lihtne. Enne uuesti ulatuslikku kastmist laske mullasubstraadil alati veidi kuivada. Väetage iga kahe nädala tagant aprillist varasügiseni vedela bonsai väetisega. Morus sobib tegelikult igas suuruses ja stiilis – vaba püstises vormis, topelttüvega, mitme tüvega või metsas. Jämedaid oksa võid lõigata sügisel ja kevadel enne täkamist. Parim on suvel uued võrsed alati kahele lehele tagasi lõigata. Traat on kõige parem teha juunis ja traat kuue kuu pärast uuesti eemaldada, et see sisse ei kasvaks. Istutage mooruspuu ümber iga kahe aasta tagant aprilli alguses, enne täkamise algust kergelt juurelõikusega. **Talvel:** Talvekuudel on oluliselt väiksem veevajadus pärast lehtede kadumist. Kastke nüüd säästlikumalt, kuid ärge laske mullal täielikult kuivada. Moruse talvekindlus suureneb aastate jooksul -20 ° C-ni, kuid varjatud ja jahe asukoht, kus pole liiga palju miinustemperatuure, on nüüd bonsai jaoks ideaalne.



Valkoinen mulperipuu

Morus alba

Kauniit valkoiset silmut ja kukat alkukesällä / kylmä talo bonsai

Lehtipuun valkoisen mulperipuun lehdet toimivat intialaisen silkintuotannon silkkiäistoukkien ruokapuina. Puun lehdet voivat vaihdella sileäreunaisista syvän sormenmuotoisiin ja syväle leikattuihin. Se johtuu nimensä valkoisista silmuistaan, jotka ilmestyvät toukokuussa ja kesäkuussa, sekä valkoisista hedelmistä, jotka voivat myös muuttua punertavaksi voimakkaassa auringonpaisteessa. Jopa nuoret puut voivat kantaa suuria määriä mehukkaita, sokerimakeita hedelmiä. **Luonnollinen sijainti:** Valkoinen mulperipuu on alun perin kotoisin Kiinan Mantšuriasta. **Onnistunut viljely:** Sisäviljely on mahdollista ympäri vuoden. Sirottele siemenet kostealle kasvualustalle ja peitä ne vain ohuesti alustalla. Peitä viljelyastia kelmulla, johon on tehty reikiä. Tämä suojaaa maaperää kuivumiselta. Poista folio 2 tunnin ajaksi kahden tai kolmen päivän välein. Tämä estää homeen muodostumisen kasvumaahan. Aseta siemenruukku valoisaan ja lämpimään paikkaan, jonka lämpötila on 20–25 °C, ja pidä istutusmaa kosteana, mutta ei märkänä. Itäminen tapahtuu yleensä kahden tai viiden viikon kuluttua. **Paras sijainti:** Mulperipuut rakastavat aurinkoisia ja lämpimiä paikkoja, mutta haluavat olla suojassa tuulelta. **Optimaalinen hoito:** Mulperipuu on erittäin helppohoitoinen. Anna maaperän aina kuivua hieman ennen kuin kastelet sitä uudelleen runsaasti. Lannoita joka toinen viikko huhtikuusta alkusyksyyn nestemäisellä bonsai-lannoitteella. Morus sopii kaikenkokoisiin ja -tyyleihin - vapaaseen pystysuoraan muotoon, kaksoisrunkoon, monirunkoiseen tai metsiin. Voit leikata paksuja oksia syksyllä ja keväällä ennen kuin ne itävät. Kesällä uudet versot on parasta leikata aina kahteen lehteen. Lanka on parasta tehdä kesäkuussa ja irrottaa lanka uudelleen kuuden kuukauden kuluttua, jotta se ei kasva sisään. Istuta mulperipuu kahden vuoden välein huhtikuun alussa kevyesti juurikarsimalla ennen orastumisen alkamista. **Talvella:** Talvikaukaussina se on huomattavasti pienempi vedentarve lehtien häviämisen jälkeen. Kastele nyt säästeliäämmin, mutta älä koskaan anna maaperän kuivua kokonaan. Morus lisää talvenkestävyyttä -20 °C:seen vuosien mittaan, mutta suojainen, viileä paikka ilman liikaa pakkasta on nyt ihanteellinen bonsaille.



Mûrier blanc

Morus alba

De jolis bourgeons blancs en début d'été / Bonsai pour serre froide

Les feuilles du mûrier blanc sempervirent servent aux vers à soie d'aliment dans la fabrication de soie indienne. Les feuilles du même arbre peuvent varier de forme, elles peuvent être lisses, en forme de doigt et profondément entaillées. Il doit son nom aux bourgeons blancs qui apparaissent en mai et juin, et aux fruits blancs qui peuvent être rouges en plein soleil. Les jeunes plantes peuvent porter une grande quantité de fruits juteux et sucrés. **Emplacement naturel:** Le mûrier blanc est originaire de la Mandchourie, en Chine. **Culture réussie:** La culture des graines à la maison est possible tout au long de l'année. Parsemez les graines sur du substrat humide et recouvrez-les légèrement avec le substrat. Couvrez le récipient avec une feuille transparente dans laquelle vous faites des trous. Comme ça, le terreau est protégé du dessèchement. Vous devez enlever la feuille pendant deux heures tous les deux ou trois jours. Ceci prévient la formation de moisissures dans le terreau. Mettez le récipient dans un endroit lumineux et chaud de 20° à 25° Celsius et gardez le terreau humide, mais pas mouillé. En général, la germination a lieu après deux à cinq semaines. **Le meilleur emplacement:** Les mûriers aiment des emplacements ensoleillés et chauds, mais assez protégés du vent. **Soins optimaux:** Le mûrier blanc est très peu exigeant. Laissez toujours le substrat se dessécher un peu avant de l'arroser abondamment. Engraissez la plante toutes les deux semaines d'avril à début automne avec de l'engrais pour bonsai. Le mûrier blanc est adapté pour toutes les tailles et tous les styles - la forme droite libre, le double tronc, troncs multiples, ou forêt. Vous pouvez couper les branches denses en automne et en printemps avant la pousse. Coupez les nouveau rameaux en été de préférence de deux feuilles. La ligature se fait de préférence en juin, puis s'enlève six mois plus tard pour qu'elle ne grandisse pas. Rempotez le mûrier tous les deux ans en début avril, avant que la pousse ne commence, et taillez légèrement les racines. **En hiver:** En hiver, le besoin en eau est beaucoup plus faible après la chute des feuilles. Arrosez la plante plus économiquement mais ne laissez jamais la terre se dessécher complètement. Le mûrier devient rustique jusqu'à -20° Celsius avec l'âge, mais un emplacement protégé et froid, sans de températures glaciales trop importantes, est idéal pour le bonsai.



Λευκή μουριά

Morus alba

Αρκετά λευκά μπουμπούκια και λουλούδια στις αρχές του καλοκαιριού / κρύο μπονσάι

Τα φύλλα της φυλλοβόλας λευκής μουριάς χρησιμεύουν ως δέντρα τροφής για τους μεταξοσκώληκες στην ινδική παραγωγή μεταξίου. Τα φύλλα του δέντρου μπορεί να ποικίλλουν από λείες άκρες έως βαθιά δακτυλόμορφα και βαθιά τεμαχισμένα. Οφείλει το όνομά του στους λευκούς οφθαλμούς του, που εμφανίζονται τον Μάιο και τον Ιούνιο, και στους λευκούς καρπούς, που μπορούν επίσης να κοκκινίσουν σε έντονη ροζοφάνεια. Ακόμη και τα νεαρά δέντρα μπορούν να φέρουν άφθονες ποσότητες από ζουμερά, γλυκά φρούτα. **Φυσική τοποθεσία:** Η λευκή μουριά είναι αρχικά εγγενής στη Μαντζουρία στην Κίνα. **Επιτυχημένη καλλιέργεια:** Η καλλιέργεια σε εσωτερικούς χώρους είναι δυνατή όλο το χρόνο. Διασκορπίστε τους σπόρους σε υγρό υπόστρωμα ανάπτυξης και καλύψτε τους μόνο αργά με το υπόστρωμα. Καλύψτε το δοχείο καλλιέργειας με μεμβράνη, την οποία ανοίγετε με τρύπες. Αυτό προστατεύει το έδαφος από το στέγνωμα. Θα πρέπει να αφαιρέτε το αλουμινοχαρτό για 2 ώρες κάθε δύο έως τρεις ημέρες. Αυτό αποτρέπει τη δημιουργία μούχλας στο αναπτυσσόμενο έδαφος. Τοποθετήστε τη γλάστρα σε ένα ελαφρύ και ζεστό μέρος με θερμοκρασία 20 έως 25° Κελσίου και διατηρήστε το χώμα της γλάστρας υγρό αλλά όχι υγρό. Η βλάστηση εμφανίζεται συνήθως μετά από δύο έως πέντε εβδομάδες. **Η καλύτερη τοποθεσία:** Οι μουριές αγαπούν τις ηλιόλουστες και ζεστές τοποθεσίες, αλλά τους αρέσει να προστατεύονται από τον άνεμο. **Βέλτιστη φροντίδα:** Η μουριά είναι εξαιρετικά εύκολη στη φροντίδα. Αφηνετε πάντα το εδαφικό υπόστρωμα να στεγνώσει λίγο πριν το ποτίσετε ξανά εκτεταμένα. Λιπάνετε κάθε δύο εβδομάδες από τον Απρίλιο έως τις αρχές του φθινοπώρου με υγρό λίπασμα μπονσάι. Το Morus είναι πραγματικά κατάλληλο για όλα τα μεγέθη και στυλ - την ελεύθερη όρθια φόρμα, τον διπλό κορμό, πολλαπλούς κορμούς ή δάση. Μπορείτε να κόψετε χοντρά κλαδιά το φθινόπωρο και την άνοιξη πριν φυτρώσουν. Είναι καλύτερο να κόβετε πάντα τους νέους βλαστούς το καλοκαίρι σε δύο φύλλα. Είναι καλύτερο να καλωδιώσετε τον Ιούνιο και να αφαιρέσετε ξανά το σύρμα μετά από έξι μήνες για να μην μεγαλώσει. Επανατοποθετείτε τη μουριά κάθε δύο χρόνια στις αρχές Απριλίου με ένα ελαφρύ κλάδεμα ρίζας πριν αρχίσει η εκκόλαψη. **Το χειμώνα:** Τους χειμερινούς μήνες είναι σημαντικά χαμηλότερη απαίτηση σε νερό μετά την απώλεια φύλλων. Ποτίστε με πιο φειδωλό τρόπο, αλλά ποτέ μην αφήσετε το χώμα να στεγνώσει τελείως. Το Morus αυξάνει τη χειμερινή ανθεκτικότητα έως και -20° Κελσίου με την πάροδο των ετών, αλλά μια προστατευμένη, δροσερή τοποθεσία χωρίς υπερβολικές θερμοκρασίες κάτω από το μηδέν είναι πλέον ιδανική για το μπονσάι.



Crann mulberry bán

Morus alba

bachlóga agus bláthanna deasa bána go luath sa samhradh / teach fuar bonsai

Féidhmíonn duilleoga na móna bána duillsilteacha mar chrainn bhia do na péisteanna síoda i dtáirgeadh síoda Indiach. Is féidir le duilleoga an chrainn a bheith éagsúil ó chiumhais mhíne go dtí méar-chruthach agus deighilte domhain. Tá an t-ainm mar gheall ar a bachlóga bána, atá le feiceáil i mí na Bealtaine agus i mí an Mheithimh, agus na torthaí bána, ar féidir leo casadh dearg freisin i solas na gréine láidir. Is féidir fiú crainn óga a iompróidh méideanna go leor de na juicy, torthaí siúcra-milis. **Suíomh nádúrtha:** Tá an crann mulberry bán dúchasach do Mhanchuria sa tSín. **Saothrú rathúil:** Is féidir saothrú taobh istigh ar feadh na bliana. Scaip na síolta ar fhoshraith tais atá ag fás agus gan ach iad a chlúdach go tanaí leis an tsubstráit. Clúdaigh an soitheach cultúir le scannán cling, a sholáthraíonn tú le poill. Cosnaíonn sé seo an ithir ó thriomú amach. Ba chóir duit an scragall a bhaint ar feadh 2 uair gach dhá nó trí lá. Cuireann sé seo cosc ar mhúnlá a fhoirmiú ar an ithir atá ag fás. Cuir an pota síolta in áit éadrom te ag 20 go 25 ° Celsius agus coinnigh an ithir potaithe tais ach ní fliuch. Tarlaíonn péacadh de ghnáth tar éis dhá go cúig seachtaine. **An suíomh is fearr:** Is breá le crainn Mulberry áiteanna grianmhara agus te, ach is maith leo a bheith cosanta ón ghaoth. **Cúram is fearr is féidir:** Tá sé thar a bheith éasca aire a thabhairt don chrainn mulch. Lig don tsubstráit ithreach a thriomú beagán i gcónaí sula n-uisceáil tú go forleathan arís é. Fertilize gach coicís ó Aibreán go dtí titim go luath le leasachán bonsai leachtach. Tá an Morus oiriúnach i ndáiríre do gach méid agus stíl - an fhoirm ina seasamh saor in aisce, an stoc dúbailte, an iliomad trunks nó foraoisí. Is féidir leat brainsí tiubh a ghearradh san fhómhar agus san earrach sula sprout siad. Is fearr i gcónaí na shoots nua a ghearradh siar sa samhradh go dtí dhá duilleoga. Is fearr sreangú i mí an Mheithimh agus an sreang a bhaint arís tar éis sé mhí ionas nach bhfásann sé isteach. Déan an mulberry a athchur gach dhá bhliain ag tús mhí Aibreáin le bearradh fréimhe éadrom sula dtosaíonn na cinn óga. **Sa gheimhreadh:** I míonna an gheimhridh tá sé Riachtanas uisce go suntasach níos ísle tar éis cailteanas duille. Uisce níos teirce anois, ach ná lig don ithir tirim amach go hiomlán. Méadaíonn an Morus cruas an gheimhridh síos go -20° Celsius thar na blianta, ach tá suíomh fothain, fionnuar gan an iomarca teochtaí fo-nialas oiriúnach don bonsai anois.



Hvít mórberjatré

Morus alba

Nokkuð hvít brum og blóm snemga sumars / kalt hús bonsai

Lauf laufhvíta mórberjans þjóna sem mattré fyrir silkiorma i indverskri silkiframleiðslu. Blöðin á trénu geta verið breytileg frá sléttum brúnum til djúpt fingurlaga og djúpt krufin. Nafnið á hún að þakka hvítum brum sem birtast í maí og júní og hvítum ávöxtum sem geta líka orðið rauðleitir í sterku sólskini. Jafnvel ung tré geta borið mikið magn af safaríkum, sykursættum ávöxtum. **Náttúruleg staðsetning:** Hvíta mórberjatréd er upprunalega ættað frá Mansjúríu í Kína. **Árangursrík ræktun:** Ræktun innandyrar er möguleg allt árið um kring. Dreifið fræjunum á rakt vaxandi undirlag og hyljið þau aðeins þunnt með undirlaginu. Hyljið ræktunarilátið með matarfilmu, sem þú útvegar með götum. Þetta verndar jarðvegin gegn þurrkun. Þú ættir að fjarlægja álpappírinn í 2 klukkustundir á tveggja til þriggja daga fresti. Þetta kemur í veg fyrir að mygla myndist á vaxandi jarðvegi. Settu fræpottinn á léttan og heitan stað með 20 til 25° Celsius og haltu pottajarðveginum rökum en ekki blautum. Spírun á sér venjulega stað eftir tvær til fimm vikur. **Besta staðsetningin:** Mórberjatré elska sólríka og hlýja staði, en vilja vera vernduð fyrir vindi. **Besta umönnun:** Mórberjatréd er einstaklega auðvelt að sjá um. Látið jarðvegin alltaf þorna aðeins áður en þú vökvar það mikið aftur. Frjóngaðu á tveggja vikna fresti frá apríl til byrjun hausts með fljótandi Bonsai áburði. Morus hentar í raun fyrir allar stærðir og stíla - frjálsta upprétta formið, tvöfalda bolinn, magna bol eða skóga. Hægt er að klippa þykkar greinar á haustin og vorin áður en þær spretta. Best er að skera alltaf niður nýju sprotana á sumrin í tvö blöð. Best er að víra í júní og fjarlægja vírinn aftur eftir hálf ár svo hann vaxi ekki inn. Endurræstu mórberið á tveggja ára fresti í byrjun apríl með léttu rötarklippingu áður en brjóst hefst. **Á veturna:** Á vetrarmánuðunum er það Verulega minni vatnspörf eftir laufmissi. Vökvaðu sparlega núna, en láttu jarðvegin aldrei þorna alveg. Morus eykst í vetrarhærleika niður í -20° á Celsius með árunum, en skjólsæl og sval staðsetning án of mikils frosts er nú tilvalin fyrir bonsai.



Moro bianco

Morus alba

Graziosi grappoli fioriti nella prima estate / Bonsai da serra fredda

Le foglie del Gelso bianco sempreverde servono ai bachi da seta come alimento nella produzione indiana della seta. Le foglie dello stesso albero sono poliformi, variando da una forma a bordo liscio a una dattiliforme o con una profonda incisione. Il suo nome deriva dai germogli bianchi che compaiono in maggio e giugno e dai frutti bianchi, che possono colorarsi di rosso se esposti al sole forte. Già gli alberi giovani possono produrre grandi quantità di frutti succosi e dolci come lo zucchero. **Posizione naturale:** Il gelso bianco è endemico della regione cinese di Manciuria. **Coltivazione riuscita:** La coltivazione da semi in casa è possibile durante tutto l'anno. Distribuite i semi sulla terra di coltivo umida e copriteli solo un po' con il substrato. Coprite il recipiente di coltivazione con pellicola trasparente, sulla quale praticherete dei fori, in questo modo la terra eviterà di seccarsi. Ogni due o tre giorni rimuovete la pellicola per 2 ore, per prevenire la formazione di muffe sulla terra. Collocate il recipiente di coltivazione in un luogo luminoso e caldo, a una temperatura fra i 20° e i 25° C, mantenete la terra umida, ma non bagnata. La germinazione avviene da due a cinque settimane dopo. **La posizione migliore:** Il Gelso bianco predilige gli ambienti soleggiati e caldi, ma al riparo dal vento. **Cura ottimale:** Il Gelso bianco è davvero facile da curare. Lasciate sempre asciugare il substrato prima di una nuova e abbondante irrigazione. Da aprile al primo autunno concimate ogni due settimane con fertilizzante liquido per bonsai. Il morus si adatta bene a tutte le tagli e le forme - diritta, a doppio tronco, a tronco multiplo o a boschetto. Potete tagliare i rami spessi in autunno e in primavera, prima che nascano nuovi getti. In estate potete i nuovi germogli preferibilmente di due foglie. E' preferibile legarlo con un filo metallico in giugno e rimuovere il filo sei mesi dopo, per fare in modo che non cresca. Rinvasate il Gelso bianco ogni due anni all'inizio di aprile, prima dello sbocciare di nuovi germogli, tagliando leggermente le radici. **In inverno:** Nei mesi invernali il fabbisogno d'acqua dopo la perdita delle foglie è minimo. Innaffiate più di rado, senza lasciare mai che la terra secchi completamente. Il Gelso bianco resiste a temperature fino a -20° C, ma per i bonsai l'ideale è un ambiente più fresco e riparato, senza temperature sotto lo zero.



Stablo bijelog duda

Morus alba

Lijepi bijeli pupoljci i cvjetovi u rano ljeto / hladni kućni bonsai

Lišće listopadnog bijelog duda služi kao hrana za svilene bube u indijskoj proizvodnji svile. Listovi stabla mogu varirati od glatkih rubova do duboko prstastih i duboko rasječenih. Ime duguje bijelim pupoljcima koji se pojavljuju u svibnju i lipnju te bijelim plodovima koji na jakom suncu mogu pocrvenjeti. Čak i mlada stabla mogu roditi obilne količine sočnog voća slatkog poput šećera. **Zemlja porijekla:** Drvo bijelog duda porijeklom je iz Mandžurije u Kini. **Uspješan uzgoj:** Uzgoj u zatvorenom prostoru moguć je tijekom cijele godine. Sjeme pospite po vlažnom supstratu za uzgoj i samo ga tanko prekrijte supstratom. Posvoden s kulturom prekrijte prozirnom folijom koju ste opremili rupama. To štiti tlo od isušivanja. Svaka dva do tri dana skinite foliju na 2 sata. Time se sprječava stvaranje plijesni na tlu za uzgoj. Stavite posudu za sjeme na svijetlo i toplo mjesto s 20 do 25° Celzija i održavajte tlo za saksije vlažnim, ali ne mokrim. Klijanje obično nastupa nakon dva do pet tjedana. **Najbolja lokacija:** Stabla murve vole sunčana i topla mjesta, ali vole biti zaštićena od vjetrova. **Optimalna njega:** Stablo duda izuzetno je jednostavno za njegu. Uvijek pustite da se zemljani supstrat malo osuši prije nego što ga ponovno obilno zalijete. Gnojite svaka dva tjedna od travnja do rane jeseni tekućim gnojivom za bonsai. Morus je zapravo prikladan za sve veličine i stilove - slobodni uspravni oblik, dvostruko deblo, više debila ili šume. Debele grane možete rezati u jesen i proljeće prije nego niknu. Najbolje je nove izdanke ljeti uvijek rezati na dva lista. Najbolje je ožičiti u lipnju, a nakon šest mjeseci ponovo izvaditi žicu da ne uraste. Presadite dud svake dvije godine početkom travnja uz laganu rezidbu korijena prije početka pupanja. **U zimi:** U zimskim mjesecima je značajno niža potreba za vodom nakon gubitka lišća. Sada zalijevajte štedljivo, ali nikada ne dopustite da se tlo potpuno osuši. Otpornost Morus-a na zimu raste do -20°C tijekom godina, ali zaštićeno, hladno mjesto bez previše temperatura ispod nule sada je idealno za bonsai.



Baltais zīdkoks

Morus alba

Skaisti balti pumpuri un ziedi vasaras sākumā / aukstās mājas pundurkociņš

Lapkoku baltā zīdkoka lapas kalpo kā barības koki zīdtārpiņiem Indijas zīda ražošanā. Koka lapas var atšķirties no gludām malām līdz dziļi pirkstveida un dziļi sadalītām. Savu nosaukumu tas ir parādā saviem baltajiem pumpuriem, kas parādās maijā un jūnijā, un baltajiem augļiem, kas spēcīgā saulē var arī kļūt sarkanīgi. Pat jauni koki var nest lielu daudzumu sulīgo, saldo augļu. **Dabiska vieta:** Baltā zīdkoka dzimtene sākotnēji ir Mandžūrija Ķīnā. **Veiksmīga audzēšana:** Audzēšana telpās ir iespējama visu gadu. Izkaisiet sēklas uz mitra augšanas substrāta un tikai plānā kārtā pārklājiet ar substrātu. Nosedziet kultivēšanas trauku ar pārtikas plēvi, kuru nodrošina ar caurumiem. Tas pasargā augsni no izžušanas. Jums vajadzētu noņemt foliju 2 stundas ik pēc divām līdz trim dienām. Tas novērš pelējuma veidošanos augošajā augsnē. Novietojiet sēklu podu gaišā un siltā vietā ar temperatūru 20 līdz 25 ° C un turiet augsni mitru, bet ne mitru. Dīgšana parasti notiek pēc divām līdz piecām nedēļām. **Labākā atrašanās vieta:** Zīdkokiem patīk saulainas un siltas vietas, taču viņiem patīk būt pasargātiem no vēja. **Optimāla aprūpe:** Zīdkoka kopšana ir ļoti vienkārša. Vienmēr ļaujiet augsnes substrātam nedaudz nožūt, pirms to atkal plaši laistāt. Mēslojiet ik pēc divām nedēļām no aprīļa līdz rudens sākumam ar šķidru pundurkociņa mēslojumu. Morus faktiski ir piemērots visiem izmēriem un stiliem - brīvai vertikālai formai, dubultam stumbram, vairākiem stumbriem vai mežiem. Resnus zarus var griezt rudenī un pavasarī, pirms tie izaug. Vislabāk jaunus dzinumus vasarā vienmēr nogriezt līdz divām lapām. Vislabāk ir veikt vadu jūnijā un pēc sešiem mēnešiem atkal noņemt, lai tas neaugsu. Pārstādiet zīdkoku reizi divos gados aprīļa sākumā ar vieglu sakņu atzarošanu pirms pumpuru veidošanās. **Ziemā:** Ziemas mēnešos tā ir relevējama mazāka ūdens nepieciešamība pēc lapu zuduma. Tagad laistiet taupīgāk, taču nekad nelaujiet augsnei pilnībā izžūt. Gadu gaitā Morus ziemcietība palielinās līdz -20° pēc Celsija, bet aizsargāta, vēsa vieta bez pārāk zemas temperatūras tagad ir ideāla pundurkociņam.



Baltasis šilkmedis

Morus alba

Gražūs balti pumpurai ir žiedai vasaras pradžioje / šalto namo bonsai

Lapuocių baltojo šilkmedžio lapai yra maisto medžiai šilkaverpiams Indijos šilko gamyboje. Medžio lapai gali skirtis nuo lygių kraštų iki giliai piršto formos ir giliai išpaustyti. Savo vardą jis skolingas dėl baltų pumpurų, kurie pasirodo gegužę ir birželį, ir baltiems vaisiams, kurie ryškioje saulėje taip pat gali parausti. Netgi jauni medžiai gali duoti daug sultingų, cukrumi saldžių vaisių. **Natūrali vieta:** Baltasis šilkmedis iš pradžių kilęs iš Mandžūrijos Kinijoje. **Sėkmingas auginimas:** Auginti patalpose galima ištisus metus. Išbarstykite sėklas ant drėgno auginimo substrato ir tik ploniau uždenkite substratu. Kultūros indą uždenkite maistine plėvele, kurioje yra skylės. Tai apsaugo dirvą nuo išdžiūvimo. Kas dvi ar tris dienas 2 valandas nuimkite foliją. Tai neleids augančioje dirvoje susidaryti pelėsiui. Sėklų vazoną pastatykite šviesioje ir šiltoje vietoje, kurios temperatūra yra 20–25 ° C, o vazono žemė turi būti drėgna, bet ne šlapia. Paprastai sudygsta po dviejų ar penkių savaičių. **Geriausia vieta:** Šilkmedžiai mėgsta saulėtą ir šiltą vietą, tačiau mėgsta būti apsaugoti nuo vėjo. **Optimali priežiūra:** Šilkmedžio medį itin lengva prižiūrėti. Visada leiskite dirvožemio substratui šiek tiek išdžiūti, prieš vėl gausiai laistydami. Treškite kas dvi savaites nuo balandžio iki ankstyvo rudens skystomis bonsų trąšomis. Morus iš tikrųjų tinka visų dydžių ir stilių - laisvos vertikalios formos, dvigubo kamieno, kelių kamienų ar miškų. Storas šakas galite pjauti rudenį ir pavasarį, kol jos neišdygsta. Geriausia vasarą naujus ūglius nupjauti iki dviejų lapų. Geriausia vielą nutiesti birželio mėnesį, o po šešių mėnesių vėl nuimti, kad ji nejaugtų. Persodinkite šilkmedį kas dvejus metus balandžio pradžioje, prieš prasidedant pumpurų atsiradimui, lengvai genėdami šaknis. **Ziemą:** Žiemos mėnesiai yra žymiai mažesnis vandens poreikis nukritus lapams. Dabar laistykite saikingiau, bet niekada neleiskite dirvai visiškai išdžiūti. Bėgant metams Moruso atsparumas žiemai padidėja iki -20 ° C, tačiau apsaugota, vėsi vieta, kurioje nėra per daug minusinės temperatūros, dabar idealiai tinka bonsui.



Sigra tač-čawsli abjad

Morus alba

Blanzuni u fjuri pjuttost bojod fil-bidu tas-sajf / Bonsai tad-dar kiesha

Il-weraq tač-čawsli abjad jwaqqghu l-weraq iservu bħala sigar tal-ikel għad-dud tal-ħarir fil-produzzjoni tal-ħarir Indjan. Il-weraq tas-sigra jistghu jvarjaw minn defer lixx għal forma ta 'saba' profunda u mqassma fil-fond. Ismu għandu l-blanzuni bojod tiegħu, li jidhru f'Mejju u Ġunju, u l-frott abjad, li jista' wkoll isir ħamrani f'xemx qawwija. Anki sigar zgħar jistghu jgħorru ammonti kbar tal-frott mmerraq u ħelu biż-zokkor. **Post naturali:** Is-sigra tač-čawsli bajda hija oriġinarjament indigēna għall-Manchuria fič-Ċina. **Kultivazzjoni b'suċċess:** Il-kultivazzjoni fuq ġewwa hija possibbli s-sena kollha. Ferrex iż-żrieragħ fuq sottostrat ta 'tkabbir niedi u għattihom biss irqiq bis-sottostrat. Għatti l-bastiment tal-kultura b'cling film, li inti tipprovdi b'toqob. Dan jipprotegi l-ħamrija milli tinxf. Għandek tneħhi l-fojl għal saġhtejn kull jumejn jew tlett ijiem. Dan jipprevjeni l-iffurmar tal-moffa fuq il-ħamrija li qed tikber. Poġġi l-borma taż-żerriegħa f'post ħafif u sħun b'20 sa 25 ° Celsius u zomm il-ħamrija tal-qasri niedja iżda mhux imxarrba. Il-ġerminazzjoni ġeneralment isseħħ wara ġimagħtejn sa ħames ġimghat. **L-aħjar post:** Is-sigra tač-čawsli jħobbu postijiet xemxija u sħan, iżda jixtiequ jkun protetti mir-riħ. **Kura ottimali:** Is-sigra tač-čawsli hija estremament faċli biex tiehu hsiebha. Dejjem halli s-sottostrat tal-ħamrija jinxef ftit qabel ma terġa 'tisqija b'mod estensiv. Fertilizza kull ġimghatejn minn April sal-bidu tal-ħarifa b'fertilizzant bonsai likwidu. Il-Morus fil-fatt huwa adattat għad-daqsijiet u l-istili kollha - il-forma wieqfa ħielsa, it-tronk doppju, bagolli multipli jew foresti. Tista 'taqta' ferġhat ħoxnin fil-ħarifa u fir-rebbiegħa qabel ma jinbtu. L-aħjar huwa li dejjem naqqas ir-rimjiet il-ġodda fis-sajf għal żewġ weraq. L-aħjar huwa li wajer f'Ġunju u neħhi l-wajer mill-ġdid wara sitt xhur sabiex ma jikberx. Repot-čawsli kull sentejn fil-bidu ta 'April bi żbir ta' għerq ħafif qabel ma jibda jibza. **Fix-xitwa:** Fix-xhur tax-xitwa huwa Rekwiżit ta 'ilma aktar baxx b'mod sinifikanti wara t-telf tal-weraq. Ilma aktar kemxejn issa, imma qatt ma tħalli l-ħamrija tinxf kompletament. Il-Morus jizdied fir-reżistenza għax-xitwa sa -20 ° Celsius matul is-snin, iżda post kenn u frisk mingħajr wisq temperaturi taħt iż-żero issa huwa ideali għall-bonsai.



Bonsai - Witte Moerbeiboom

Morus alba

Mooie witte knoppen en bloemen in de vroege zomer / koude huisbonsai

De bladeren van de bladverliezende witte moerbeibomen dienen als voederbomen voor de zijderupsen bij de Indiase zijdeproductie. De bladeren van de boom kunnen variëren van gladgerand tot diep vingervormig en diep ingesneden. Het dankt zijn naam aan zijn witte knoppen, die verschijnen in mei en juni, en de witte vruchten, die echter roodachtig kunnen worden in de felle zon. Zelfs jonge bomen kunnen overvloedige hoeveelheden van het sappige, suikerzoete fruit produceren. **Natuurlijke locatie:** De witte moerbeiboom komt oorspronkelijk uit Mantsjoerije, China. **Succesvolle teelt:** Binnen kweken is het hele jaar mogelijk. Strooi de zaden op een vochtig groeimedium en bedek ze slechts dun met het substraat. Dek de kweekbak af met vershoudfolie, die u van gaten heeft voorzien. Dit beschermt de aarde tegen uitdroging. Om de twee tot drie dagen moet u de film gedurende 2 uur verwijderen. Dit voorkomt schimmelvorming op de teeltgrond. Zet het kweekvat op een lichte en warme plaats met 20 tot 25 ° Celsius en houd de kweekgrond vochtig, maar niet nat. Kieming vindt meestal plaats na twee tot vijf weken. **De beste locatie:** Moerbeibomen houden van zonnige en warme locaties, maar staan graag een beetje beschut tegen de wind. **Optimale verzorging:** De moerbeiboom is buitengewoon gemakkelijk te verzorgen. Laat de aarde altijd een beetje drogen voordat u weer uitgebreid giet. Bemest van april tot het vroege najaar elke twee weken met een vloeibare bonsai-meststof. De Morus is eigenlijk geschikt voor alle maten en stijlen - de vrij opgaande vorm, de dubbele stam, meerdere stammen of bossen. Je kunt dikke takken in de herfst en lente afsnijden voordat ze uitlopen. Het is het beste om de nieuwe scheuten in de zomer altijd terug te knippen tot twee bladeren. Het is het beste om in juni te bedruiden en na zes maanden de draad te verwijderen zodat deze niet ingroeit. Verpot de moerbeiboom begin april om de twee jaar met een lichte worteluitsnede voordat het ontkiemen begint. **In de winter:** In de wintermaanden is de waterbehoefte na bladverlies beduidend lager. Geef nu zuiniger water, maar laat de grond nooit helemaal uitdrogen. Het morus neemt in de loop van de jaren toe in winterhardheid tot -20 ° Celsius, maar een beschutte koele standplaats zonder te hoge vriestemperaturen is nu ideaal voor de bonsai.



Hvitt morbætre

Morus alba

Ganske hvite knopper og blomster på forsommeren / kald husbonsai

Bladene til den løvfellende hvite morbæren tjener som mattrær for silkeormene i indisk silkeproduksjon. Treets blader kan variere fra glattkantet til dypt fingerformet og dypt dissekert. Navnet skylder den sine hvite knopper, som dukker opp i mai og juni, og de hvite fruktene, som også kan bli rødlig i sterkt solskinn. Selv unge trær kan bære store mengder av den saftige, sukkersøte frukten. **Naturlig beliggenhet:** Det hvite morbæret er opprinnelig hjemmehørende i Manchuria i Kina. **Vellykket dyrking:** Innendørs dyrking er mulig hele året. Spred frøene på fuktig voksende substrat og dekk dem bare tynt med substratet. Dekk kulturkaret med matfilm, som du forsyner med hull. Dette beskytter jorda mot å tørke ut. Du bør fjerne folien i 2 timer annenhver til tredje dag. Dette forhindrer at det dannes mugg på den voksende jorda. Plasser frøpotten på et lett og varmt sted med 20 til 25° Celsius og hold pottejorda fuktig, men ikke våt. Spiring skjer vanligvis etter to til fem uker. **Den beste beliggenheten:** Morbærtrær elsker solrike og varme steder, men liker å bli beskyttet mot vinden. **Optimal omsorg:** Morbæret er ekstremt enkelt å ta vare på. La alltid jordsubstratet tørke litt før du vanner det mye igjen. Gjødse annenhver uke fra april til tidlig høst med flytende bonsaigjødsel. Morus passer faktisk for alle størrelser og stiler - den frie oppreiste formen, den doble stammen, flere stammer eller skoger. Du kan klippe tykke greiner om høsten og våren før de spirer. Det er best å alltid kutte de nye skuddene om sommeren til to blader. Det er best å kable i juni og fjerne ledningen igjen etter seks måneder slik at den ikke vokser inn. Potter morbæret om hvert annet år i begynnelsen av april med en lett rotbeskjæring før spiren begynner. **Om vinteren:** I vintermånedene er det betydelig lavere vannbehov etter bladtap. Vann mer sparsomt nå, men la aldri jorden tørke helt ut. Morus øker i vinterhardhet ned til -20° Celsius med årene, men et lunt, kjølig sted uten for mye minusgrader er nå ideelt for bonsai.



Bonsai - Drzewo Morwy Białej

Morus alba

Ladnie białe pąki i kwiaty na początku lata / zimnej bonsai

Liście morwy białej liściastej stanowią pożywienie dla jedwabników w indyjskiej produkcji jedwabiu i mają różne kształty, od wyraźnych krawędzi po głęboko wycięte w kształcie palców. Jej nazwa pochodzi od białych pąków i białych owoców, które roślina produkuje w maju i czerwcu, chociaż przy silnym nasłonecznieniu owoce mogą przybrać czerwony kolor. Nawet młode rośliny mogą wyhodować obfite ilości słodkich i soczystych owoców. **Naturalne położenie:** Morwa biała ma swoje naturalne siedlisko w regionie Mandżurii w Chinach. **Udana uprawa:** Rozmnażanie nasion w pomieszczeniach jest możliwe przez cały rok. Rozłóż nasiona na wilgotnym kompoście doniczkowym i umieść na nim niewielką ilość ziemi kompostowej. Następnie przykryj pojemnik na nasiona przezroczystą folią, aby ziemia nie wyschła. Nie zapomnij zrobić dziur w przezroczystej folii i zdejmować ją co drugi lub trzeci dzień na około 2 godziny. W ten sposób unikniesz tworzenia się pleśni na kompoście doniczkowym. Umieść pojemnik na nasiona w miejscu jasnym i ciepłym o temperaturze od 20° do 25° Celsjusza i utrzymuj ziemię wilgotną, ale nie mokrą. Zwykle kiełkowanie trwa od dwóch do sześciu tygodni. **Najlepsza lokalizacja:** Morwa biała preferuje miejsca słoneczne i ciepłe, najlepiej w miejscach lekko osłoniętych od wiatru. **Optymalna pielęgnacja:** Biała morwa jest raczej beztraska. Zawsze pozwól ziemi trochę wyschnąć przed następnym właściwym podlewaniem. Od kwietnia do wczesnej jesieni co dwa tygodnie można podawać roślinom bonsai płynny nawóz. Morus nadaje się do uprawy wszystkich rodzajów i rozmiarów roślin bonsai - w formie wolnej, pionowej, podwójnej odmiany, odmiany wielorakiej lub bonsai leśnej. Grube gałęzie można przycinać jesienią i wiosną przed kiełkowaniem. Nowe pędy najlepiej przyciąć latem od dwóch liści. Czerwiec byłby najlepszym czasem na okablowanie, a po około pół roku można usunąć drut, aby zapobiec jego wrosnięciu. Co dwa lata na początku kwietnia i przed kiełkowaniem morwy można przesadzić po krótkim wycięciu korzeni. **W zimę:** Zimą drzewo potrzebuje tylko niewielkiego podlewania, ponieważ wyrzuca liście - tylko upewnij się, że ziemia nie wyschnie całkowicie. Chociaż Morus z biegiem lat staje się bardziej odporny na mróz do -20° Celsjusza, najlepszym miejscem do hibernacji jest osłonięte, chłodne miejsce z jedynie lekkim mrozem.



Amoreira branca

Morus alba

Botões e flores muito brancos no início do verão/bonsai de casa fria

As folhas da amoreira branca decidua servem como árvores de alimento para os bichos-da-seda na produção de seda indiana. As folhas da árvore podem variar de bordas lisas a profundamente em forma de dedo e profundamente dissecadas. Deve seu nome aos botões brancos, que aparecem em maio e junho, e aos frutos brancos, que também podem ficar avermelhados sob o sol forte. Mesmo as árvores jovens podem produzir grandes quantidades da fruta suculenta e açucarada. **Localização natural:** A amoreira branca é originalmente nativa da Manchúria, na China. **Cultivo bem sucedido:** O cultivo interno é possível durante todo o ano. Espalhe as sementes no substrato de cultivo úmido e cubra-as apenas com o substrato. Cubra o recipiente de cultura com filme plástico, que você fornece com furos. Isso protege o solo de secar. Você deve remover o papel alumínio por 2 horas a cada dois ou três dias. Isso evita a formação de mofo no solo em crescimento. Coloque o vaso de sementes em um local claro e quente com 20 a 25° Celsius e mantenha o solo do vaso úmido, mas não molhado. A germinação geralmente ocorre após duas a cinco semanas. **A melhor localização:** As amoreiras adoram locais ensolarados e quentes, mas gostam de ser protegidas do vento. **Cuidado ideal:** A amoreira é extremamente fácil de cuidar. Sempre deixe o substrato do solo secar um pouco antes de regá-lo abundantemente novamente. Fertilize a cada duas semanas, de abril até o início do outono, com um fertilizante líquido para bonsai. O Morus é realmente adequado para todos os tamanhos e estilos - a forma vertical livre, o tronco duplo, troncos múltiplos ou florestas. Você pode cortar galhos grossos no outono e na primavera antes que brotem. É melhor sempre cortar os novos brotos no verão para duas folhas. O ideal é fazer a fiação em junho e retirar o fio novamente após seis meses para que não cresça. Repot a amoreira a cada dois anos no início de abril com uma leve poda de raiz antes de começar a brotar. **No inverno:** Nos meses de inverno é necessária de água significativamente menor após a perda de folhas. Regue com mais moderação agora, mas nunca deixe o solo secar completamente. O Morus aumenta a resistência do inverno até -20° Celsius ao longo dos anos, mas um local fresco e protegido, sem muitas temperaturas abaixo de zero, agora é ideal para o bonsai.



Bonsai - Dud Alb

Morus alba

Muguri și flori destul de albe la începutul verii / bonsai de casă rece

Frunzele dudului alb de foioase servesc drept copaci furajeri pentru viermii de mătase din producția de mătase indiană. Frunzele copacului pot varia de la margini netede la profunde în formă de deget și adânc incizate. Își datorează numele mugurilor săi albi, care apar în mai și iunie, și fructelor albe, care, totuși, pot deveni roșiatice la soare puternic. Chiar și copacii tineri pot produce cantități abundente de fructe suculente, dulci cu zahăr. **Locație naturală:** Dullul alb este originar din Manchuria, China. **Cultivare de succes:** Cultivarea în interior este posibilă pe tot parcursul anului. Imprastiați semințele pe un mediu de creștere umed și acoperiți-le doar subțire cu substratul. Acoperiți vasul de cultivare cu folie alimentară, pe care ați prevăzut-o cu găuri. Acest lucru protejează pământul de uscăre. La fiecare două până la trei zile ar trebui să îndepărtați filmul timp de 2 ore. Acest lucru previne formarea mușcăiului pe solul de cultivare. Așezați vasul de cultivare într-un loc luminos și cald, cu 20-25° Celsius și mențineți solul de cultivare umed, dar nu umezi. Germinarea are loc de obicei după două până la cinci săptămâni. **Cea mai bună locație:** Dudii adoră locațiile însorite și calde, dar le place să fie puțin la adăpost de vânt. **Îngrijire optimă:** Dullul este extrem de ușor de îngrijit. Lăsați întotdeauna solul să se usuce puțin înainte de a turna din nou pe larg. Fertilizați cu un îngrășământ lichid bonsai la fiecare două săptămâni din aprilie până la începutul toamnei. Morus este de fapt potrivit pentru toate dimensiunile și stilurile - forma verticală liberă, trunchiul dublu, trunchiuri multiple sau păduri. Puteți tăia ramuri groase toamna și primăvara înainte de înmugurire. Cel mai bine este să tăiați întotdeauna lăstarii noi la două frunze vara. Cel mai bine este să sârmați în iunie și să scoateți firul după șase luni, astfel încât să nu crească. Repetați dudul la fiecare doi ani la începutul lunii aprilie cu o rădăcină ușoară tăiată înainte de începerea înmuguririi. **În iarnă:** În lunile de iarnă, necesarul de apă după pierderea frunzelor este semnificativ mai mic. Apă acum cu mai multă cumpătare, dar nu lăsa niciodată solul să se usuce complet. Morusul crește în timpul iernii până la -20° Celsius de-a lungul anilor, dar o locație protejată și rece, fără temperaturi de îngheț excesive, este acum ideală pentru bonsai.



Bonsai - Vitt Mullbärsträd

Morus alba

Ganska vita knoppar och blommor i försommaren / kallhusbonsai

Bladen av lövvida mullbärsträd fungerar som foderträd för silkesmaskarna i indisk sidenproduktion. Trädets löv kan variera från släta kanter till djupt fingerformade och djupt snittade. Det har sitt namn tack vare sina vita knoppar, som dyker upp i maj och juni, och de vita frukterna, som dock kan bli rödaktiga i stark sol. Även unga träd kan producera rikliga mängder av den saftiga, sockersöta frukten. **Naturligt läge:** Det vita mullbärsträdet är ursprungligen infödd i Manchuria, Kina. **Framgångsrik odling:** Att växa inomhus är möjligt året runt. Sprid fröna på ett fuktigt odlingsmedium och täck dem bara tunt med substratet. Täck odlingskärlet med plastfolie, som du har försett med hål. Detta skyddar jorden från att torka ut. Varannan till var tredje dag ska du ta bort filmen i två timmar. Detta förhindrar att mögel bildas på odlingsjorden. Placera odlingskärlet på en lätt och varm plats med 20 till 25 ° Celsius och håll odlingsjorden fuktig men inte våt. Spiring tar vanligtvis två till fem veckor. **Den bästa platsen:** Mullbärsträd älskar soliga och varma platser, men gillar att vara lite skyddade från vinden. **Optimal vård:** Mullbärsträdet är extremt lätt att ta hand om. Låt alltid jorden torka lite innan du håller igen i stor utsträckning. Gödsla varannan vecka från april till början av hösten med ett flytande bonsai-gödselmedel. Morus är faktiskt lämplig för alla storlekar och stilar - den fria stående formen, den dubbla stammen, flera stammar eller skogar. Du kan klippa tjocka grenar på hösten och våren innan du spirar. Det är bäst att alltid klippa tillbaka de nya skotten till två löv på sommaren. Det är bäst att leda i juni och ta bort ledningen efter sex månader så att den inte växer in. Omplotta mullbäret vartannat år i början av april med en lätt rotsnitt innan spiringen börjar. **På vintern:** Under vintermånaderna är vattenbehovet efter förlust av löv betydligt lägre. Vattna mer sparsamt nu, men låt aldrig jorden torka ut helt. Moruset ökar i vinterhårdhet ner till -20 ° C med åren, men en skyddad sval plats utan alltför fryssande temperaturer är nu idealisk för bonsai.



Biely strom moruše

Morus alba

Pekné biele puky a kvety na začiatku leta / studený domáci bonsai

Listy opadavej moruše bielej slúžia ako potravné stromy pre priadky morušovej pri výrobe hodvábu v Indii. Listy stromu sa môžu líšiť od hladkých až po hlboko v tvare prstov a hlboko rozrezané. Za svoj názov vďaka svojim bielym pukom, ktoré sa objavujú v máji a júni, a bielym plodom, ktoré sa pri silnom slnku môžu sfarbiť aj do červenka. Dokonca aj mladé stromy znesú veľké množstvo šťavnatého, sladkého ovocia. **Prirodzená poloha:** Moruša biela pochádza pôvodne z Mandžuska v Číne. **Úspešná kultivácia:** Vnútorne pestovanie je možné po celý rok. Semená rozsypte na vlhký pestovateľský substrát a substrátom ich prikryte len tenko. Kultivačnú nádobu prikryte potravinovou fóliou, ktorú opatríte otvormi. To chráni pôdu pred vysychaním. Fóliu by ste mali odstraňovať na 2 hodiny každé dva až tri dni. To zabraňuje tvorbe plesní na rastúcej pôde. Črepník umiestnite na svetlé a teplé miesto s teplotou 20 až 25 ° C a udržiavajte pôdu v črepníku vlhkú, ale nie mokrá. Klíčenie zvyčajne nastáva po dvoch až piatich týždňoch. **Najlepšie umiestnenie:** Moruše milujú slnečné a teplé polohy, ale radi sú chránené pred vetrom. **Optimálna starostlivosť:** Starostlivosť o moruše je mimoriadne jednoduchá. Pred opätovným výdatným zalievaním nechajte pôdny substrát vždy trochu preschnúť. Od apríla do začiatku jesene každé dva týždne prihnojujte tekutým hnojivom na bonsaje. Morus je v skutočnosti vhodný pre všetky veľkosti a štýly - voľná vzpriamená forma, dvojité kmeň, viac kmeňov alebo lesy. Hrubé konáre môžete rezať na jeseň a na jar ešte pred vypučaním. Nové výhonky je najlepšie vždy v lete skrátiť na dva listy. Najlepšie je drôťovať v júni a po šiestich mesiacoch drôťik opäť odstrániť, aby nezarástol. Moruše presádzajte každé dva roky začiatkom apríla s ľahkým koreňovým rezom pred začiatkom pučania. **V zime:** V zimných mesiacoch je výrazne nižšia potreba vody po strate listov. Teraz zalievajte striedmejšie, ale nikdy nenechajte pôdu úplne vyschnúť. Zimovzdornosť Morus sa v priebehu rokov zvyšuje až na -20 ° Celzia, ale teraz je pre bonsaje ideálne chránené, chladné miesto bez príliš vysokých teplôt pod nulou.



Bela murva

Morus alba

Lepi beli popki in cvetovi v zgodnjem poletju / hladni hišni bonsaj

Listi listopadne bele murve služijo kot hrana za sviloprejke v indijski proizvodnji svile. Listi drevesa se lahko razlikujejo od gladkih robov do globoko prstastih in globoko razčlenjenih. Ime ima zaradi belih popkov, ki se pojavijo maja in junija, ter belih plodov, ki se ob močnem soncu lahko obarvajo tudi rdečkasto. Celo mlada drevesa lahko obrodijo obilo sočnih, sladkorno sladkih sadežev. **Naravni habitat:** Bela murva izvira iz Mandžurije na Kitajskem. **Navodila za gojenje:** Gojenje v zaprtih prostorih je možno vse leto. Semena raztresemo po vlažnem rastnem substratu in jih le na tanko prekrijemo s substratom. Posodo z kulturo pokrijte s folijo za živila, ki jo opremite z luknjami. To ščiti tla pred izsušitvijo. Vsake dva do tri dni za 2 uri odstranite folijo. S tem preprečimo nastanek plesni na rastni zemlji. Lonček s semeni postavite na svetlo in toplo mesto s temperaturo od 20 do 25 ° C, zemlja v lončku pa naj bo vlažna, vendar ne mokra. Kaljenje običajno nastopi po dveh do petih tednih. **Najboljša lokacija:** Murve obožujejo sončne in tople lege, a rade zaščitene pred vetrom. **Optimalna nega:** Nega murve je izjemno enostavna. Vedno pustite, da se zemeljski substrat nekoliko posuši, preden ga znova izdatno zalijete. Gnojite vsaka dva tedna od aprila do zgodnje jeseni s tekočim gnojilom za bonsaj. Morus je pravzaprav primeren za vse velikosti in sloge - prosto pokončno obliko, dvojno deblo, več debel ali gozdove. Debele veje lahko odrežete jeseni in spomladi, preden poženejo. Najbolje je, da nove poganjke poleti vedno porežemo na dva lista. Najbolje je, da ožičimo junija in po šestih mesecih žico spet odstranimo, da se ne zaraste. Murvo presadite vsaki dve leti v začetku aprila z rahlim obrezovanjem korenin, preden se začne brstenje. **V zimskem času:** V zimskih mesecih je bistveno manjša potreba po vodi po izgubi listov. Zdaj zalivajte bolj zmerno, vendar nikoli ne pustite, da se zemlja popolnoma izsuši. Morus z leti poveča svojo zimsko odpornost do -20 ° C, vendar je zaščiten, hladna lokacija brez previsokih temperatur pod ničlo zdaj idealna za bonsaj.



Morera blanca

Morus alba

Preciosos capullos blancos y flores a principios de primavera / Bonsái

Las hojas de la morera sirven a los gusanos de seda en la producción de seda india, como árboles forrajeros. Las hojas de este árbol pueden variar desde bordes totalmente planos, ondulados, hasta con incisiones profundas. Su nombre, morera blanca, la obtiene a raíz de sus capullos y frutos blancos que nacen en mayo y junio. Con mucho sol pueden cambiar de color a un rojizo. Incluso los árboles jóvenes pueden alcanzar buenas cantidades de esta fruta jugosa y dulce. **Ubicación natural:** La morera blanca es originariamente de Manchuria en China. **Cultivo exitoso:** La semilla se puede criar en interior durante todo el año. Esparza las semillas sobre sustrato húmedo y cúbralas con un poco del mismo sustrato. Cubra el recipiente con un film transparente y agujeréelo. Así protegerá la tierra de la desecación. Para evitar la putrefacción del sustrato retire el film cada dos o tres días durante 2 horas. Coloque el recipiente de cultivo en un lugar luminoso y cálido con entre 20 y 25 grados y mantenga el sustrato húmedo, pero no mojado. La germinación se producirá después de dos a cinco semanas. **La mejor ubicación:** La morera ama lugares soleados y cálidos, y prefiere zonas protegidas del viento. **Cuidado óptimo:** La morera blanca es de fácil cuidado. Antes de regar espere a que la primera capa de tierra se seque, entonces riegue abundantemente. De abril a primeros de otoño suminístrele fertilizante líquido para bonsái. La morera es adecuada para todos los tamaños y estilos - erguido, dos tallos, varios tallos o bosques. Las ramas gruesas se pueden podar en otoño o primavera antes del brote. Los nuevos brotes en verano los puede podar mejor hasta dejar dos hojas. En junio se puede colocar un alambre que debe retirar después de seis meses, para evitar que se encarne. Cada dos años puede trasplantar la morera a comienzos de abril, antes del brote y podar ligeramente las raíces. **En el invierno:** Durante el invierno, después de la caída del follaje, su requerimiento de agua es considerablemente inferior. Riegue poco pero evite que la tierra se seque del todo. La morera aumenta con los años su tolerancia a heladas hasta temperaturas de -20 grados, pero para el bonsái es ahora ideal un sitio luminoso y fresco con pocos grados bajo cero.



Bílý strom moruše

Morus alba

Pěkně bílá poupata a květy na začátku léta / studená domácí bonsai

Listy opadavé moruše bílé slouží jako potravní stromy pro bource morušového při výrobě indického hedvábí. Listy stromu se mohou lišit od hladkých po hluboce prstovité a hluboce členité. Za svůj název vděčí svým bílým poupatům, která se objevují v květnu a červnu, a bílým plodům, které se při silném slunci mohou také zbarvit do červena. Dokonce i mladé stromy mohou nést velké množství šťavnatého, sladkého ovoce. **Přirozená poloha:** Morušovník bílý pochází původně z Mandžuska v Číně. **Úspěšné pěstování:** Pěstování v interiéru je možné po celý rok. Semena rozsypte na vlhký pěstební substrát a substrátem je pouze tence zakryjte. Kultivační nádobu zakryjte potravinářskou fólií, kterou opatřte otvory. To chrání půdu před vysycháním. Fólii byste měli odstraňovat na 2 hodiny každé dva až tři dny. Tím se zabrání tvorbě plísní na rostoucí půdě. Umístěte květináč na světlé a teplé místo s teplotou 20 až 25 °C a udržujte půdu v květináči vlhkou, ale ne mokrou. Klíčení obvykle nastává po dvou až pěti týdnech. **Nejlepší umístění:** Moruše milují slunné a teplé polohy, ale rády jsou chráněny před větrem. **Optimální péče:** Péče o moruše je velmi snadná. Půdní substrát vždy nechte trochu proschnout, než jej znovu vydatně zalijete. Od dubna do začátku podzimu každé dva týdny přihnojíte tekutým hnojivem na bonsaje. Morus je vlastně vhodný pro všechny velikosti a styly - volně vzpřímený tvar, dvojitý kmen, více kmenů nebo lesy. Silné větve můžete řezat na podzim a na jaře, než vyraší. Nové výhony je nejlepší vždy v létě zkrátit na dva listy. Drátovat nejlépe v červnu a po šesti měsících drát zase odstranit, aby nezarostl. Moruše přesazujte každé dva roky na začátku dubna s lehkým kořenovým řezem před začátkem pučení. **V zimě:** V zimních měsících je výrazně nižší potřeba vody po ztrátě listů. Zalévejte nyní střídavě, ale nikdy nenechte zeminu úplně vyschnout. Zimní odolnost Morus se v průběhu let zvyšuje až na -20° Celsia, ale pro bonsaje je nyní ideální chráněné, chladné místo bez příliš vysokých teplot pod nulou.



Beyaz dut ağacı

Morus alba

Erken yaz / soğuk ev bonsaisinde güzel beyaz tomurcuklar ve çiçekler

Yaprak döken beyaz dutun yaprakları, Hint ipek üretiminde ipekböcekleri için besin ağacı görevi görür. Ağacın yaprakları düz kenarlıdan derin parmak şekline ve derin disseke kadar değişebilir. Adını mayıs ve haziran aylarında açan beyaz tomurcukları ve kuvvetli güneş ışığında kırmızımsı renge dönüşebilen beyaz meyvelerinden alır. Genç ağaçlar bile bol miktarda sulu, şekerli meyve verebilir. **Doğal konum:** Beyaz dut ağacı aslen Çin'deki Mančurya'ya özgüdür. **Başarılı yetiştirme:** Tüm yıl boyunca iç mekan ekimi mümkündür. Tohumları nemli büyüyen alt tabakaya dağıtın ve alt tabaka ile sadece ince bir şekilde örtün. Kültür kabının üzerini delikler açtığınız streč film ile kapatın. Bu, toprağın kurumasını önler. Folyoyu her iki ila üç günde bir 2 saat çıkarmalısınız. Bu, büyüyen toprakta küf oluşumunu önler. Tohum saksısını 20 ila 25°C sıcaklıkta hafif ve sıcak bir yere koyun ve saksı toprağını nemli tutun ama ıslak değil. Çimlenme genellikle iki ila beş hafta sonra gerçekleşir. **En iyi konum:** Dut ağaçları güneşli ve sıcak yerleri sever ama rüzgardan korunmayı da severler. **Optimum bakım:** Dut ağacının bakımı son derece kolaydır. Tekrar yoğun bir şekilde sulamadan önce her zaman toprak alt tabakasının biraz kurumasını bekleyin. Nisan ayından erken sonbahara kadar her iki haftada bir sıvı bonsai gübresi ile gübreleyin. Morus aslında tüm boyutlar ve stiller için uygundur - serbest dik form, çift gövde, çöklü gövdeler veya ormanlar. Sonbahar ve ilkbaharda kalın dalları filizlenmeden önce kesebilirsiniz. Yaz aylarında yeni sürgünleri her zaman iki yaprağa kesmek en iyisidir. En iyisi haziran ayında tel çekmek ve altı ay sonra teli tekrar çıkarmak, böylece içinde büyümmez. Dutu iki yılda bir Nisan başında tomurcuklanma başlamadan önce hafif bir kök budaması ile tekrarlayın. **Kışın:** Kış aylarında ise Yaprak kaybından sonra önemli ölçüde daha düşük su gereksinimi. Şimdi daha idareli sulayın, ancak toprağın tamamen kurumasına asla izin vermeyin. Morus'un kışa dayanıklılığı yıllar içinde -20°C'ye kadar yükselir, ancak artık bonsai için çok fazla sıfırın altındaki sıcaklıkların olmadığı korunaklı, serin bir yer idealdir.



Fehér eperfa

Morus alba

Szép fehér rügyek és virágok nyár elején / hideg ház bonsai

A lombhullató fehér eperfa levelei a selyemhernyók táplálékáiként szolgálnak az indiai selyemtermelésben. A fa levelei a sima szélűtől a mélyen ujj alakúakig és mélyen szétvágottakig változhatnak. Nevét a májusban és júniusban megjelenő fehér bimbóinak, valamint a fehér terméseknél közsönheti, amelyek erős napsütésben is vörösesek lehetnek. Még a fiatal fák is bőséges mennyiségű lédús, cukorédes gyümölcsöt hozhatnak. **Természetes elhelyezkedés:** A fehér eperfa eredetileg Kínában, Mandzsúriában őshonos. **Sikeres termesztés:** A beltéri termesztés egész évben lehetséges. Szórja ki a magokat a nedves termesztőfelületre, és csak vékonyan takarja be őket az aljzattal. Fedje le a tenyészedényt ragasztó fóliával, amelyet lyukakkal lát el. Ez megvédi a talajt a kiszáradástól. A fóliát két-három naponta 2 órára le kell venni. Ez megakadályozza a penészképződést a növekvő talajon. Helyezze a magcserepet világos és meleg helyre, ahol a hőmérséklet 20-25°C, és a virágföldet tartsa nedvesen, de ne nedvesen. A csírázás általában két-öt hét után következik be. **A legjobb hely:** Az eperfák szeretik a napos és meleg helyeket, de szeretik, ha megvédik őket a szélről. **Optimális gondozás:** Az eperfa gondozása rendkívül egyszerű. Mindig hagyja a talajt egy kicsit kiszáradni, mielőtt ismét alaposan öntözi. Áprilistól kora őszig kéthetente műtrágyázzon folyékony bonsai műtrágyával. **Télen:** A téli hónapokban az A lombhullás után lényegesen kisebb vízigény. Öntözze most takarékosabban, de soha ne hagyja, hogy a talaj teljesen kiszáradjon. A Morus télállósága az évek során -20 Celsius fokig nő, de a védett, hűvös hely, ahol nincs túlságosan mínusz hőmérséklet, most ideális a bonsai számára.

: : : : :



クワ

Morus alba

美しい白い芽と初夏の花/室内盆栽

落葉樹のこの葉はインドシルクの製造において蚕の食糧となります。また葉は端からくっきり深く切れ込みが入り手のような形をしています。名称は5月と6月に形成する白い芽と果実に由来します。また果実は強い日差しで赤みを帯びることがあります。若い樹木でさえ甘くてジューシーな果実をたくさん実らせます。

自然な場所: 中国の満州地域が生息地です。

栽培成功:

種子繁殖は室内で年間を通して可能です。湿った用土に種を広げ、その上に少量の用土を被せます。用土の乾燥を防ぐため、鉢をサランラップなどの透明なフィルムでカバーします。透明フィルムには空気穴をいくつかあけ、2~3日に1回は約2時間、完全にフィルムを鉢から外します。そうすることで、カビの発生を防ぎます。20°C~25°Cの明るく暖かい場所に置き、用土は湿った状態に保ちます。通常は約2~6週間で発芽します。

最高のロケーション: 日当たりのよい暖かい場所を好み、やや防風された場所での保管が理想的です。

最適なケア:

手間のかからない樹木です。土壌の表面が乾いてから次の水を与えてください。4月から初秋にかけては盆栽用の液体肥料を2週間ごとに与えます。

クワは模様木、双幹、株立ち、寄せ植えの盆栽のすべての樹形とサイズの栽培に適しています。込み入った枝は秋と芽が出る前の春に剪定できます。新芽のために葉を二枚残して剪定します。6月に針金かけをしたら、そのまま伸びるのを防ぐため約半年後には針金を取り除きます。2年ごとに4月上旬の発芽の前に分根をして植え替えをします。

冬に:

冬の間、葉を散らした後は水は控えめに与えます；土壌が完全に乾かないように注意してください。耐霜性が向上しマイナス20°Cまで対処しますが、冬越しは軽い霜程度の涼しい保護された場所に保管します。

SKU: 14002 / Weißer Maulbeerbaum