



SAFLAX®



Tips



About © : Contact SAFLAX -

Eschscholzia californica

	 Български	BG	 2		 Malti	MT	 5
	 Dansk	DK	 2		 Nederlands	NL	 5
	 Deutsch	DE	 2		 Norsk	NO	 6
	 English	UK	 2		 Polski	PL	 6
	 Eesti	EE	 3		 Português	PT	 6
	 Suomalainen	FI	 3		 Românesc	RO	 6
	 Français	FR	 3		 Svenska	SE	 7
	 Ελληνική	GR	 3		 Slovensky	SK	 7
	 Gaeilge	IE	 4		 Slovenski	SI	 7
	 íslenskur	IS	 4		 Español	ES	 7
	 Italiano	IT	 4		 Český	CZ	 8
	 Hrvatski	HR	 4		 Türkçe	TR	 8
	 Latviešu	LV	 5		 Magyar	HU	 8
	 Lietuvių kalba	LT	 5		 日本語	JP	 9



Калифорнийски мак

Eschscholzia californica

Американско степно цвете с копринени чашки

Заради цвета на цветовете калифорнийският мак е наричан още златен мак. Това е пестеливо растение, което се справя добре в сухи и бедни на хранителни вещества почви. Ако се чувства добре в градината, не се нуждае от специални грижи и се размножава сама, но без да обрства цели лехи. Макът е особено ценен в градината, тъй като е едно от малкото растения, които цъфтят между май и юни. Всяка сутрин, докато слънцето го целува, това нежно американско степно цвете отваря копринените си чашки. Калифорнийските макове са истински оцелели, тъй като семената могат да издържат на суша в продължение на години, само за да покълнат при продължителни валежи. **Естествено местоположение:** В югозападната част на Съединените щати дивата форма на Eschscholzia californica покрива цели пейзажи с ярко море от цветя след първите дъждове през пролетта. **Успешно отглеждане:** Препоръчва се предкултура от март на първаза на прозореца, за да се постигне ранен цъфтеж от май. От май можете да сеете и директно на открито. Въпреки това цъфтеж през същата година е малко вероятно. Фините семена покълват на светло и затова се притискат леко и не се покриват с пръст. Необходими са около две до три седмици, за да покълнат. По-късно можете да разределите подложките и да отделите младите растения на разстояние от 20 до 25 сантиметра. Местоположение: Калифорнийският мак предпочита слънчево място и бедна на хранителни вещества, рохкава почва, в която развива дебели главни корени, които му позволяват да оцелее през по-хладните зими. **Най-доброто местоположение:** Калифорнийският мак предпочита слънчево място и бедна на хранителни вещества, рохкава почва, в която развива дебели главни корени, които му позволяват да оцелее през по-хладните зими. **Оптимална грижа:** Усилията за поддръжка са много ниски. Ако искате да избегнете прекалено разпространение, отрежете цветята преди образуването на семена. Отстранявайте редовно избледнелите цветя, за да насърчите цъфтежа и да удължите цъфтежа. Поливайте саксията ежедневно - в градината само ако сушата продължи по-дълго. До септември семената са узрели и могат да бъдат събрани и запазени за сеитба през следващата година. Семената са в шушулки с дължина до 10 см и имат цилиндрична форма. Когато узреят, шушулките се отварят по дългите страни. **През зимата:** Всъщност калифорнийският мак е многогодишно растение, но обикновено се отглежда като едногодишно растение. Той се счита за ограничено издръжлив до -10 ° по Целзий.



Californisk valmue

Eschscholzia californica

Amerikansk steppeblomst med silkebløde bæger

På grund af farven på dens blomster kaldes den californiske valmue også for guldvalmuen. Det er en nøjsom plante, der klarer sig godt i tørre og næringsfattige jorder. Hvis han føler sig godt tilpas i haven, har han brug foringen særlig pleje og reproducerer sig selv, men uden at overgroe hele bede. Valmuen er særligt værdifuld i haven, da den er en af de få planter, der blomstrer mellem maj og juni. Hver morgen, mens solen kysser den, åbner denne sarte amerikanske steppeblomst sine silkebløde bæger. Californiske valmuer er sande overlevende, da frøet kan modstå tørke i årevis, kun for at spire under længerevarende nedbør. **Naturlig beliggenhed:** I den sydvestlige del af USA dækker den vilde form af Eschscholzia californica hele landskabet med et lyst hav af blomster efter den første regn om foråret. **Successful dyrkning:** Eine Vorkultur ab März auf der Fensterbank ist empfehlenswert, um eine frühe Blüte ab Mai zu erreichen. Ab Mai können Sie auch direkt ins Freiland aussäen. Eine Blüte im selben Jahr ist dann allerdings eher unwahrscheinlich. Die feinen Samen sind Lichtkeimer und werden daher nur leicht angedrückt und nicht mit Erde bedeckt. Bis zur Keimung dauert es circa zwei bis drei Wochen. Später können Sie die Bestände ausdünnen und die Jungpflanzen auf 20 bis 25 Zentimeter Abstand vereinzeln. Standort: Der Kalifornische Mohn bevorzugt einen sonnigen Standort und einen nährstoffarmen, lockeren Boden, in dem er dicke Pfahlwurzeln ausbildet, die ihn auch kühlere Winter überstehen lässt. **Den bedste beliggenhed:** Den californiske valmue foretrækker en solrig placering og næringsfattig, løs jord, hvor den udvikler tykke pælerødder, der gør det muligt for den at overleve køligere vintre. **Optimal pleje:** Vedligeholdelsesindsatsen er meget lav. Hvis du vil undgå at sprede for meget, skal du skære blomster af inden frødannelse. Fjern falmende blomster regelmæssigt for at fremme blomstringen og forlænge blomstringen. Du bør vande potten dagligt - i haven kun hvis tørken varer længere. I september er frøene modne og kan indsamles og gemmes til næste års såning. Frøene er i bælg, der er op til 10 cm lange og har en cylindrisk form. Når bælgene er modne, åbner de sig på langsiderne. **Om vinteren:** Faktisk er den californiske valmue en flerårig plante, men den dyrkes normalt som en etårig plante. Han anses for at være begrænset hårdfør til -10 ° Celsius.



Kalifornischer Mohn

Eschscholzia californica

Amerikanische Steppenblume mit seidenen Blütenkelchen

Wegen seiner Blütenfarbe wird der Kalifornische Mohn auch Goldmohn genannt. Er ist eine genügsame Pflanze, die gut mit trockenen und nährstoffarmen Böden zurechtkommt. Fühlt er sich im Garten wohl, benötigt er keine besondere Pflege und vermehrt sich selbst, ohne jedoch ganze Beete zu überwuchern. Im Garten ist der Mohn besonders wertvoll, denn er blüht als eine der wenigen Pflanzen zwischen Mai und Juni. Jeden Morgen, wenn die Sonne sie küsst, öffnet diese zarte amerikanische Steppenblume ihre seidenen Blütenkelche. Kalifornischer Mohn ist ein wahrer Überlebenskünstler, denn der Samen kann bei Dürre jahrelang ausharren, um dann bei längeren Regenfällen zu keimen. **Naturstandort:** Im Südwesten der Vereinigten Staaten überzieht die Wildform der Eschscholzia californica nach den ersten Regenfällen im Frühjahr großflächig ganze Landschaften mit einem leuchtenden Blütenmeer. **Anzucht:** Eine Vorkultur ab März auf der Fensterbank ist empfehlenswert, um eine frühe Blüte ab Mai zu erreichen. Ab Mai können Sie auch direkt ins Freiland aussäen. Eine Blüte im selben Jahr ist dann allerdings eher unwahrscheinlich. Die feinen Samen sind Lichtkeimer und werden daher nur leicht angedrückt und nicht mit Erde bedeckt. Bis zur Keimung dauert es circa zwei bis drei Wochen. Später können Sie die Bestände ausdünnen und die Jungpflanzen auf 20 bis 25 Zentimeter Abstand vereinzeln. Standort: Der Kalifornische Mohn bevorzugt einen sonnigen Standort und einen nährstoffarmen, lockeren Boden, in dem er dicke Pfahlwurzeln ausbildet, die ihn auch kühlere Winter überstehen lässt. **Standort:** Der Kalifornische Mohn bevorzugt einen sonnigen Standort und einen nährstoffarmen, lockeren Boden, in dem er dicke Pfahlwurzeln ausbildet, die ihn auch kühlere Winter überstehen lässt. **Pflege:** Der Pflegeaufwand ist sehr gering. Möchten Sie eine zu starke Ausbreitung vermeiden, dann schneiden Sie Blüten vor der Samenbildung ab. Entfernen Sie Verblühtes regelmäßig, um die Blütenbildung anzuregen und die Blütezeit zu verlängern. Im Topf sollten Sie täglich gießen - im Garten nur bei länger anhaltender Trockenheit. Im September sind die Samen ausgereift und können gesammelt und für die Aussaat im kommenden Jahr verwahrt werden. Die Samen befinden sich in bis zu 10 cm langen und zylinderartig geformten Schoten. Bei Reife öffnen sich die Schoten an den Längsseiten. **Im Winter:** Eigentlich ist der Kalifornische Mohn eine mehrjährige Staude, aber er wird normalerweise als einjährige Pflanze kultiviert. Er gilt als begrenzt winterhart bis -10 ° Celsius.



California poppy

Eschscholzia californica

American steppe flower with silky calyxes

Because of the color of its flowers, the Californian poppy is also called the gold poppy. It is a frugal plant that does well in dry and nutrient-poor soils. If it feels comfortable in the garden, it does not need any special care and multiplies itself, but without overgrowing entire beds. The poppy is particularly valuable in the garden, as it is one of the few plants to flower between May and June. Every morning, as the sun kisses it, this delicate American steppe flower opens its silky calyxes. Californian poppies are true survivors, as the seed can withstand drought for years, only to germinate during prolonged rainfall. **Natural location:** In the southwest of the United States, the wild form of the Eschscholzia californica covers entire landscapes with a bright sea of flowers after the first rains in spring. **Successful cultivation:** A pre-culture from March on the windowsill is recommended in order to achieve early flowering from May. From May you can also sow directly outdoors. However, flowering in the same year is then rather unlikely. The fine seeds germinate in the light and are therefore only lightly pressed and not covered with soil. It takes about two to three weeks to germinate. Later you can thin out the stocks and separate the young plants at a distance of 20 to 25 centimeters. Location: The Californian poppy prefers a sunny location and nutrient-poor, loose soil in which it develops thick taproots that enable it to survive cooler winters. **The best location:** The Californian poppy prefers a sunny location and nutrient-poor, loose soil in which it develops thick taproots that allow it to survive cooler winters. **Optimal care:** The maintenance effort is very low. If you want to avoid spreading too much, cut off flowers before seed formation. Remove faded flowers regularly to encourage flowering and prolong flowering. You should water the pot daily - in the garden only if the drought lasts longer. By September the seeds are mature and can be collected and saved for next year's sowing. The seeds are in pods that are up to 10 cm long and have a cylindrical shape. When ripe, the pods open on the long sides. **In the winter:** Actually, the California poppy is a perennial, but it is usually cultivated as an annual plant. He is considered limited hardy to -10 ° Celsius.



California moon Eschscholzia californica Siidiste tupplehtedega Ameerika stepiilli

Õite värvi tõttu nimetatakse California moonit ka kuldmooniks. See on kokkuhoidev taim, mis saab hästi kuival ja toitainevaesel pinnasel. Kui ta tunneb end aias mugavalt, siis ta vajab ei eristatavat hoolt ja paljuneb ise, kuid ilma terveid peenraid üle kasvatama. Moon on aias eriti väärtuslik, kuna see on üks vähesed taimi, mis õitseb maist juunini. Igal hommikul, kui päike teda suudleb, avab see õrn Ameerika stepiilli oma siidised tupplehed. Kalifornia moonid on tõelised ellujääjad, kuna seeme talub pöuda aastaid, idanedes vaid pikaajalise vihmajärgi ajal. **Looduslik asukoht:** Ameerika Ühendriikide edelaosas katab Eschscholzia californica metsik vorm pärast esimesi kevadvihmasid terveid maastrikke ereda lillemerena. **Edukas kasvatamine:** Varajase õitsemise saavutamiseks alates maist on soovitatav eelkultuur aknalaual teha märtsist. Alates maist võib külvata ka otse avamaale. Samal aastal õitsemine on aga siis üsna ebatüüpiline. Peened seemned idanevad valguse käes ja on seetõttu vaid kergelt pressitud ega kata mullaga. Idanemiseks kulub umbes kaks kuni kolm nädalat. Hiljem saab varusid harvendada ja noortaimed eraldada 20–25 sentimeetri kaugusel. Asukoht: Kalifornia moon eelistab päikeselist kasvukohta ja toitainetevaest lahtist mulda, kus tal arenevad paksud karujuured, mis võimaldavad tal üle elada jahedamad talved. **Parim asukoht:** Kalifornia moon eelistab päikesepaistelist kasvukohta ja toitainetevaest lahtist mulda, kus tal arenevad paksud karujuured, mis võimaldavad tal üle elada jahedamad talved. **Optimaalne hooldus:** Hoolduskulu on väga väike. Kui soovite vältida liigset levikut, lõigake õied enne seemnete moodustumist ära. Õitsemise soodustamiseks ja õitsemise pikendamiseks eemaldage regulaarselt pleekinud lilled. Potti tuleks kasta iga päev – aias vaid siis, kui pöud kestab kauem. Septembriks on seemned küpsed ja neid saab koguda ja järgmise aasta külviks salvestada. Seemned on kuni 10 cm pikkustes ja silindrilise kujuga kaunades. Küpselt avanevad kaunad pikkadelt külgedelt. **Talvel:** Tegelikult on California moon mitmeaastane taim, kuid seda kasvatatakse tavaliselt üheaastase taimena. Teda peetakse piiratud vastupidavusega kuni -10 ° C.



Kalifornian unikko Eschscholzia californica Amerikkalainen steppikukka silkkisillä verhiöillä

Kukkien väriin vuoksi Kalifornian unikko kutsutaan myös kultaunikoksi. Se on säästäväinen kasvi, joka pärjää hyvin kuivassa ja ravinneköyhässä maaperässä. Jos hän viihtyy puutarhassa, hän tarvitsee erityistä hoitoa ja lisääntyy itsestään, mutta kasvatamatta umpeen kokonaisa penkkejä. Unikko on erityisen arvokas puutarhassa, koska se on yksi harvoista touko-kesäkuussa kukkivista kasveista. Joka aamu, kun aurinko suutelee sitä, tämä herkkä amerikkalainen arokukka avaa silkkisen verhiönsä. Kalifornian unikot ovat todellisia selviytyjiä, sillä siemenet kestävät kuivuutta vuosia ja itävät vain pitkien sateiden aikana. **Luonnollinen sijainti:** Yhdysvaltojen lounaisosassa Eschscholzia californican villi muoto peittää kokonaisa maisemia kirkaalla kukkamerellä kevään ensimmäisten sateiden jälkeen. **Onnistunut viljely:** Maaliskuun esiviljelyä ikkunalaudalla suositellaan, jotta saavutetaan varhainen kukinta toukokuusta alkaen. Toukokuusta alkaen voit kylvää myös suoraan ulkona. Kukinta samana vuonna on kuitenkin melko epätodennäköistä. Hienot siemenet itävät valossa, joten niitä puristetaan vain kevyesti eikä niitä ole peitetty mullalla. Itäminen kestää noin kaksi tai kolme viikkoa. Myöhemmin voit harventaa varastoja ja erottaa nuoret kasvit 20-25 senttimetrin etäisyydeltä. Sijainti: Kalifornian unikko suosii aurinkoista paikkaa ja ravintoaineköyhää, löysää maaperää, jossa se kehittää paksuja juurijuuria, jotka mahdollistavat sen selviytymisen kylmemmistä talvista. **Paras sijainti:** Kalifornian unikko suosii aurinkoista paikkaa ja ravinnehuonoa, löysää maaperää, jossa se kehittää paksuja juurijuuria, jotka mahdollistavat sen selviytymisen viileämmistä talvista. **Optimaalinen hoito:** Huoltotyö on erittäin vähäistä. Jos haluat välttää leviämisen liikaa, leikkaa kukat pois ennen siementen muodostumista. Poista haalistuneet kukat säännöllisesti kukinnan edistämiseksi ja kukinnan pidentämiseksi. Sinun tulisi kastaa ruukku päivittäin - puutarhassa vain, jos kuivuus kestää pidempään. Syyskuuhun mennessä siemenet ovat kypsiä ja ne voidaan kerätä ja säastää ensi vuoden kylvöä varten. Siemenet ovat jopa 10 cm pituisissa ja lieriömäisissä paloissa. Kypsyessään palot avautuvat pitkittäin. **Talvella:** Itse asiassa Kalifornian unikko on monivuotinen, mutta sitä viljellään yleensä yksivuotisena kasvina. Häntä pidetään rajoitetusti kestäväenä -10 celsiusasteeseen.



Pavot de Californie Eschscholzia californica Fleur de steppe américaine aux calices soyeux

En raison de la couleur de ses fleurs, le coquelicot de Californie est aussi appelé coquelicot d'or. C'est une plante frugale qui pousse bien dans les sols secs et pauvres en nutriments. S'il se sent à l'aise dans le jardin, il n'a pas besoin de soins particuliers et se multiplie, mais sans envahir des massifs entiers. Le coquelicot est particulièrement précieux au jardin, car c'est l'une des rares plantes à fleurir entre mai et juin. Chaque matin, alors que le soleil l'embrasse, cette délicate fleur des steppes américaines ouvre ses calices soyeux. Les coquelicots de Californie sont de véritables survivants, car la graine peut résister à la sécheresse pendant des années, pour germer uniquement lors de pluies prolongées. **Emplacement naturel:** Dans le sud-ouest des États-Unis, la forme sauvage de l'Eschscholzia californica recouvre des paysages entiers d'une mer lumineuse de fleurs après les premières pluies du printemps. **Culture réussie:** Une pré-culture à partir de mars sur le rebord de la fenêtre est recommandée afin d'obtenir une floraison précoce à partir de mai. À partir de mai, vous pouvez également semer directement à l'extérieur. Cependant, une floraison la même année est alors peu probable. Les graines fines germent à la lumière et ne sont donc que légèrement pressées et non recouvertes de terre. Il faut environ deux à trois semaines pour germer. Plus tard, vous pouvez éclaircir les ceps et séparer les jeunes plants à une distance de 20 à 25 centimètres. **Emplacement :** Le pavot de Californie préfère un emplacement ensoleillé et un sol meuble pauvre en éléments nutritifs dans lequel il développe des racines pivotantes épaisses qui lui permettent de survivre aux hivers plus frais. **Le meilleur emplacement:** Le coquelicot de Californie préfère un emplacement ensoleillé et un sol meuble pauvre en éléments nutritifs dans lequel il développe des racines pivotantes épaisses qui lui permettent de survivre à des hivers plus frais. **Soins optimaux:** L'effort de maintenance est très faible. Si vous voulez éviter de trop répandre, coupez les fleurs avant la formation des graines. Supprimez régulièrement les fleurs fanées pour favoriser la floraison et prolonger la floraison. Vous devez arroser le pot tous les jours - dans le jardin uniquement si la sécheresse dure plus longtemps. En septembre, les graines sont mûres et peuvent être collectées et conservées pour les semis de l'année prochaine. Les graines sont dans des gousses qui mesurent jusqu'à 10 cm de long et ont une forme cylindrique. À maturité, les gousses s'ouvrent sur les côtés longs. **En hiver:** En fait, le pavot de Californie est une plante vivace, mais il est généralement cultivé comme plante annuelle. Il est considéré comme rustique limité à -10 ° Celsius.



Καλιφόρνια παπαρούνα Eschscholzia californica Λουλούδι αμερικανικής στέπας με μεταξωτούς κάλυκες

Λόγω του χρώματος των λουλουδιών της, η καλιφορνέζικη παπαρούνα ονομάζεται επίσης χρυσή παπαρούνα. Είναι ένα λιτό φυτό που τα πάει καλά σε ξηρά και φτωχά σε θρεπτικά συστατικά εδάφη. Αν νιώθει άνετα στον κήπο, χρειάζεται χωρίς ιδιαίτερη φροντίδα και αναπαράγεται μόνο του, αλλά χωρίς να μεγαλώνει ολόκληρα κρεβάτια. Η παπαρούνα είναι ιδιαίτερα πολύτιμη στον κήπο, καθώς είναι ένα από τα λίγα φυτά που ανθίζουν μεταξύ Μαΐου και Ιουνίου. Κάθε πρωί, καθώς ο ήλιος το φιλάει, αυτό το λεπτό λουλούδι της αμερικανικής στέπας ανοίγει τους μεταξωτούς κάλυκες του. Οι παπαρόνες της Καλιφόρνια είναι αληθινοί επιζώντες, καθώς ο σπόρος μπορεί να αντέξει την ξηρασία για χρόνια, μόνο για να βλαστήσει κατά τη διάρκεια παρατεταμένων βροχοπτώσεων. **Φυσική τοποθεσία:** Στα νοτιοδυτικά των Ηνωμένων Πολιτειών, η άγρια μορφή του Eschscholzia californica καλύπτει ολόκληρα τοπία με μια λαμπερή θάλασσα από λουλούδια μετά τις πρώτες βροχές την άνοιξη. **Επιτυχημένη καλλιέργεια:** Συνιστάται μια προκαλλιέργεια από τον Μάρτιο στο περβάζι για να επιτευχθεί πρόωγη ανθοφορία από τον Μάιο. Από τον Μάιο μπορείτε επίσης να σπείρετε απευθείας σε εξωτερικούς χώρους. Ωστόσο, η ανθοφορία την ίδια χρονιά είναι μάλλον απίθανη. Οι λεπτοί σπόροι βλασταίνουν στο φως και επομένως πιέζονται ελαφρά και δεν καλύπτονται με χώμα. Χρειάζονται περίπου δύο με τρεις εβδομάδες για να βλαστήσει. Αργότερα μπορείτε να αραιώσετε τα αποθέματα και να χωρίσετε τα νεαρά φυτά σε απόσταση 20 έως 25 εκατοστών. **Τοποθεσία:** Η Καλιφορνέζικη παπαρούνα προτιμά μια ηλιόλουστη τοποθεσία και φτωχό σε θρεπτικά συστατικά, χαλαρό έδαφος στο οποίο αναπτύσσει παχιές ρίζες που της επιτρέπουν να επιβιώσει τους πιο δροσερούς χειμώνας. **Η καλύτερη τοποθεσία:** Η Καλιφορνέζικη παπαρούνα προτιμά μια ηλιόλουστη τοποθεσία και φτωχό σε θρεπτικά συστατικά, χαλαρό έδαφος στο οποίο αναπτύσσει παχιές ρίζες που της επιτρέπουν να επιβιώσει σε ψυχρότερους χειμώνας. **Βέλτιστη φροντίδα:** Η προσπάθεια συντήρησης είναι πολύ χαμηλή. Εάν θέλετε να αποφύγετε την υπερβολική εξάπλωση, κόψτε τα λουλούδια πριν σχηματιστεί ο σπόρος. Αφαιρέστε τα ξεθωριασμένα λουλούδια τακτικά για να ενθαρρύνετε την ανθοφορία και να παρατείνετε την ανθοφορία. Θα πρέπει να ποτίζετε τη γλάστρα καθημερινά - στον κήπο μόνο εάν η ξηρασία διαρκεί περισσότερο. Μέχρι τον Σεπτέμβριο οι σπόροι είναι ώριμοι και μπορούν να συλλεχθούν και να αποθηκευτούν για τη σπορά του επόμενου έτους. Οι σπόροι είναι σε λοβούς που έχουν μήκος έως 10 εκατοστά και έχουν κυλινδρικό σχήμα. Όταν ωριμάσουν, οι λοβοί ανοίγουν στις μακριές πλευρές. **Το χειμώνα:** Στην πραγματικότητα, η παπαρούνα Καλιφόρνια είναι πολυετής, αλλά συνήθως καλλιεργείται ως ετήσιο φυτό. Θεωρείται περιορισμένη ανθεκτικότητα στους -10 ° Κελσίου.



Poipín californía

Eschscholzia californica

Bláth steppe Meiriceánach le calyxes silky

Mar gheall ar dhath a bhláthanna, tugtar an poipín óir ar an bpáipín California freisin. Is planda frugal é a éiríonn go maith in ithreacha tirime agus nach bhfuil mórán cothaitheach orthu. Má bhraitheann sé compordach sa ghairdín, ní mór dógan aon chúram speisialta agus a atáirgeann é féin, ach gan ró-fhás leapacha iomlána. Tá an poppy luachmhar go háirithe sa ghairdín, mar tá sé ar cheann den bheagán plandaí a bhláth idir Bealtaine agus Meitheamh. Gach maidin, de réir mar a phógann an ghrian é, osclaíonn an bláth steppe fogair Meiriceánach seo a chalyxes síoda. Is fíor-mharthanóirí iad poppies California, mar is féidir leis an síol triomach a sheasamh ar feadh na mblianta, gan péacadh ach le linn báistí fada. **Suíomh nádúrtha:** In iardheisceart na Stát Aontaithe, clúdaíonn foirm fiáin an Eschscholzia californica tírdhreacha iomlána le farraige geal bláthanna tar éis na chéad bháisteach san earrach. **Saothrú rathúil:** Moltar réamhchultúr ó Mháirta ar an bhfuinneog chun bláthanna luath a bhaint amach ó mhí na Bealtaine. Ó mhí na Bealtaine is féidir leat cur díreach lasmuigh freisin. Mar sin féin, tá bláthanna sa bhliain chéanna ansin sách dócha. Péacann na síolta mín sa solas agus mar sin ní bhíonn siad ach brúite go héadrom agus gan a bheith clúdaithe le hithir. Tógann sé thart ar dhá nó trí seachtaine chun péacadh. Níos déanaí is féidir leat na stoic a tanáí amach agus na plandaí óga a scaradh ar fad idir 20 agus 25 ceintiméadar. **Suíomh:** Is fearr le poipín California áit ghrianmhar agus ithir scaoilte gan mórán cothaitheach ina bhforbraíonn sé barrchaoltaí tiubh a chuireann ar a chumas maireachtáil i ngeimhreadh níos fuaire. **An suíomh is fearr:** Is fearr leis an bpáipín California suíomh griannmhar agus ithir scaoilte gan mórán cothaitheach ina bhforbraíonn sé barrchaoltaí tiubh a ligeann dó maireachtáil sa gheimhreadh níos fuaire. **Cúram is fearr is féidir:** Tá an iarracht chothabhála an-íseal. Más mian leat an iomarca scaipeadh a sheachaint, gearrtha amach bláthanna roimh fhoirmiú síolta. Bain bláthanna fadad go rialta chun bláthanna a spreagadh agus chun bláthanna a shíneadh. Ba chóir duit an pota a uisce go laethúil - sa ghairdín ach amháin má mhaireann an triomach níos faide. Faoi Mheán Fómhair tá na síolta aibí agus is féidir iad a bhailiú agus a shábháil le haghaidh cur na bliana seo chugainn. Tá na síolta i pods atá suas le 10 cm ar fad agus tá cruth sorcóireach acu. Nuair a bhíonn siad aibí, osclaíonn na pods ar na taobhanna fada. **Sa gheimhreadh:** I ndáiríre, is é an poipín California ilbhiantúil, ach tá sé saothraithe de ghnáth mar phlanda bliantúil. Meastar go bhfuil sé teoranta hardy go -10 ° Celsius.



Kaliforníuvalmúi

Eschscholzia californica

Amerískt steppablóm með silkimjúkum bikarum

Vegna litar blómanna er Kaliforníuvalmúinn einnig kallaður gullvalmúinn. Hún er sparsamleg planta sem dafnar vel í þurrum og næringarsnauðum jarðvegi. Ef honum líður vel í garðinum þarf hannenginn sérstök umhirða og fjölgar sér, en án þess að gróa heil rúm. Valmúinn er sérstaklega dýrmætur í garðinum þar sem hann er ein af fáum plöntum sem blómstra milli maí og júní. Á hverjum morgni, þegar sólin kyssir hana, opnar þetta viðkvæma ameríska steppablóm silkimjúka bikarana sína. Valmúar frá Kaliforníu eru sannir eftirlífendur, þar sem fræið þolir þurrka í mörg ár, en spírar aðeins við langvarandi úrkomu. **Náttúruleg staðsetning:** Í suðvesturhluta Bandaríkjanna nær villt form Eschscholzia californica fyrir allt landslag með björtu blómahafi eftir fyrstu rigninguna á vorin. **Árangursrík ræktun:** Mælt er með forræktun frá mars á gluggakistunni til að ná snemma blómgun frá maí. Frá og með maí er einnig hægt að sá beint utandyra. Hins vegar er blómgun á sama ári þá frekar ólíkleg. Finu fræin spíra í birtu og eru því aðeins pressuð létt og ekki þakin mold. Það tekur um tvær til þrjár vikur að spíra. Seinna er hægt að þynna út stofnana og aðskilja unga plönturnar í 20 til 25 sentímetra fjarlægð. **Staðsetning:** Kaliforníuvalmúinn vill frekar sólrikan stað og næringarsnauðan, lausan jarðveg þar sem hann myndar þykkan rætur sem gera honum kleift að lifa af kaldari vetur. **Besta staðsetningin:** Kaliforníuvalmúinn vill frekar sólrikan stað og næringarsnauðan, lausan jarðveg þar sem hann myndar þykkan rætur sem gera honum kleift að lifa af kaldari vetur. **Besta umönnun:** Viðhaldsálagið er mjög lítið. Ef þú vilt forðast að dreifa of miklu skaltu klippa blómin af áður en fræ myndast. Fjarlægðu fólnuð blóm reglulega til að hvetja til flóru og lengja blómgun. Þú ættir að vökva pottinn daglega - í garðinum aðeins ef þurrkurinn varir lengur. Í september eru fræin fullþroskuð og hægt er að safna þeim og vista fyrir sáningu á næsta ári. Fræin eru í fræbelg sem eru allt að 10 cm löng og með sívala lögun. Þegar þeir eru þroskaðir opnast fræbelgirnir á langhlíðunum. **Á veturna:** Reyndar er Kaliforníuvalmúinn fjölær, en hún er venjulega ræktuð sem árleg planta. Hann er talinn takmarkaður harðgerður niður í -10 ° Celsius.



Papavero della California

Eschscholzia californica

Fiore della steppa americana con calici setosi

Per il colore dei suoi fiori, il papavero californiano è anche chiamato papavero dorato. È una pianta frugale che cresce bene in terreni asciutti e poveri di nutrienti. Se si trova a suo agio in giardino, non ha bisogno di cure particolari e si moltiplica, ma senza ricoprire intere aiuole. Il papavero è particolarmente prezioso in giardino, in quanto è una delle poche piante a fiorire tra maggio e giugno. Ogni mattina, mentre il sole lo bacia, questo delicato fiore della steppa americana apre i suoi calici setosi. I papaveri californiani sono veri sopravvissuti, poiché il seme può resistere alla siccità per anni, solo per germogliare durante le piogge prolungate. **Posizione naturale:** Nel sud-ovest degli Stati Uniti, la forma selvatica dell'Eschscholzia californica ricopre interi paesaggi con un luminoso mare di fiori dopo le prime piogge primaverili. **Coltivazione riuscita:** Si consiglia una precoltura da marzo sul davanzale della finestra per ottenere una fioritura precoce da maggio. Da maggio puoi anche seminare direttamente all'aperto. Tuttavia, la fioritura nello stesso anno è piuttosto improbabile. I semi finì germinano alla luce e vengono quindi solo leggermente pressati e non ricoperti di terra. Ci vogliono circa due o tre settimane per germogliare. Successivamente puoi sfoltire i ceppi e separare le giovani piante a una distanza di 20-25 centimetri. Ubicazione: il papavero californiano preferisce una posizione soleggiata e un terreno sciolto e povero di nutrienti in cui sviluppa spesse radici a fittone che gli consentono di sopravvivere a inverni più freddi. **La posizione migliore:** Il papavero californiano preferisce una posizione soleggiata e un terreno sciolto e povero di nutrienti in cui sviluppa spesse radici a fittone che gli consentono di sopravvivere a inverni più freddi. **Cura ottimale:** Lo sforzo di manutenzione è molto basso. Se vuoi evitare di diffondere troppo, taglia i fiori prima della formazione del seme. Rimuovi regolarmente i fiori appassiti per incoraggiare la fioritura e prolungarla. Dovresti innaffiare la pentola ogni giorno - in giardino solo se la siccità dura più a lungo. Entro settembre i semi sono maturi e possono essere raccolti e conservati per la semina dell'anno successivo. I semi sono contenuti in baccelli lunghi fino a 10 cm e di forma cilindrica. A maturità i baccelli si aprono sui lati lunghi. **In inverno:** In realtà, il papavero della California è una pianta perenne, ma di solito viene coltivato come pianta annuale. È considerato resistente limitato a -10 ° Celsius.



Kalifornijski mak

Eschscholzia californica

Američki stepski cvijet sa svilenkastim čaškama

Zbog boje cvjetova kalifornijski mak nazivaju i zlatnim makom. To je štedljiva biljka koja dobro uspijeva na suhim i hranjivim tvarima siromašnim tlama. Ako se osjeća ugodno u vrtu, trebanema posebne njege i razmnožava se sam, ali bez prerastanja cijelih gredica. Mak je posebno vrijedan u vrtu, jer je jedna od rijetkih biljaka koja cvjeta između svibnja i lipnja. Svakog jutra, dok ga sunce ljubi, ovaj nježni američki stepski cvijet otvara svoje svilenkaste čaške. Kalifornijski makovi su pravi preživjeli, jer sjeme može izdržati sušu godinama, samo da bi prokljalo tijekom dugotrajnih padalina. **Zemlja porijekla:** Na jugozapadu Sjedinjenih Država, divlji oblik Eschscholzia californica prekriva cijele krajolike svijetlim morem cvijeća nakon prvih kiša u proljeće. **Uspješan uzgoj:** Preporuča se predkultura od ožujka na prozorskoj dasci kako bi se postigla rana cvatnja od svibnja. Od svibnja možete sijati i direktno na otvorenom. Međutim, cvjetanje u istoj godini tada je malo vjerojatno. Fino sjeme klija na svjetlu i zato se samo lagano pritisne i ne prekriva zemljom. Potrebno je oko dva do tri tjedna da proklja. Kasnije možete prorijediti temelje i odvojiti mlade biljke na razmak od 20 do 25 centimetara. Položaj: Kalifornijski mak voli sunčano mjesto i rahlo tlo siromašno hranjivim tvarima u kojem razvija debele matične korijene koji mu omogućuju da preživi hladnije zime. **Najbolja lokacija:** Kalifornijski mak voli sunčano mjesto i rahlo tlo siromašno hranjivim tvarima u kojem razvija debele matične korijene koji mu omogućuju da preživi hladnije zime. **Optimalna njege:** Održavanje je vrlo malo. Ako želite izbjeći previše širenja, odrežite cvjetove prije stvaranja sjemena. Redovito uklanjajte ocvale cvjetove kako biste potaknuli cvjetanje i produljili cvjetanje. Posudu treba zalijevati svakodnevno - u vrtu samo ako suša potraje duže. Do rujna sjeme je zrelo i može se sakupiti i spremati za sjetvu sljedeće godine. Sjemenke su u mahunama koje su duge do 10 cm i imaju valjkasti oblik. Kad sazriju, mahune se otvaraju na dugim stranama. **U zimi:** Zapravo, kalifornijski mak je trajnica, ali se najčešće uzgaja kao jednogodišnja biljka. Smatra se ograničeno otpornim na -10 ° Celzija.



Kalifornijias magone

Eschscholzia californica

Amerikas stepes zieds ar zīdainiem kausiņiem

Ziedu krāsas dēļ Kalifornijias magoņu sauc arī par zelta magoņu. Tas ir taupīgs augs, kas labi darbojas sausās un barības vielām nabadzīgās augsnes. Ja viņš dārzā jūtas ērti, viņam vajagnav īpašas kopšanas un vairojas pati, bet neaizaugot veselās dobes. Magones ir īpaši vērtīgas dārzā, jo tās ir viens no nedaudzajiem augiem, kas zied no maija līdz jūnijam. Katru rītu, kad saule to skūpst, šis smalkais Amerikas stepes zieds atver savus zīdainos kausiņus. Kalifornijias magones ir patiesi izdzīvojušās, jo sēklas var izturēt sausumu gadiem ilgi, lai tikai uzdzīgt ilgstošu lietusgāžu laikā. **Dabiska vieta:** Amerikas Savienoto Valstu dienvidrietumos Eschscholzia californica savvaļas forma aptver veselās ainavas ar košu ziedu jūru pēc pirmajām lietavām pavasarī. **Veiksmīga audzēšana:** Lai no maija panāktu agru ziedēšanu, no marta ieteicama priekšskultūra uz palodzes. No maija var sēt arī tieši ārā. Tomēr ziedēšana tajā pašā gadā ir maz ticama. Smalkās sēklas dīgst gaismā, tāpēc tās ir tikai viegli nospiešanas un nav pārklātas ar augsni. Tas aizņem apmēram divas līdz trīs nedēļas, lai dīgtu. Vēlāk var retināt krājumus un atdalīt jaunus stādus 20 līdz 25 centimetru attālumā. **Atrašanās vieta:** Kalifornijias magones dod priekšroku saulainai vietai un ar barības vielām nabadzīgai, irdenai augsnei, kurā tai attīstās biezas mīkstsaknes, kas ļauj tai pārdzīvot vēsākas ziemas. **Labākā atrašanās vieta:** Kalifornijias magones dod priekšroku saulainai vietai un barības vielām nabadzīgai, irdenai augsnei, kurā tai attīstās biezas mīkstsaknes, kas ļauj tai pārdzīvot vēsākas ziemas. **Optimāla aprūpe:** Apkopes piepūle ir ļoti zema. Ja vēlaties izvairīties no pārmērīgas izplatīšanās, nogrieziet ziedus pirms sēklu veidošanās. Regulāri noņemiet izbalējušos ziedus, lai veicinātu ziedēšanu un paildzinātu ziedēšanu. Podu vajadzētu laistīt katru dienu - dārzā tikai tad, ja sausums ilgst ilgāk. Līdz septembrim sēklas ir nobriedušas, un tās var savākt un saglabāt nākamā gada sējai. Sēklas ir pākstis, kuru garums ir līdz 10 cm, un tām ir cilindrisks forma. Kad nogatavojušās, pākstis atveras garajās pusēs. **Ziemā:** Faktiski Kalifornijias magones ir daudzgadīgas, taču tās parasti kultivē kā viengadīgu augu. Viņš tiek uzskatīts par ierobežotu izturību līdz -10 ° C.



Kalifornijios aguonos

Eschscholzia californica

Amerikietiška stepiņū gēlē su šilkinēmis taurelēmīs

Dēļ ziedu spalvos Kalifornijios aguonos dar vadinamos aukšinēmis aguonomis. Tai taupus augalas, puikiai derantis sausoje ir neturtingoje maistinių medžiagų dirvoje. Jei jis sode jaučiasi patogiai, jam reikianereikalauja ypatingos priežiūros ir dauginasi pats, bet neperaugdamas ištisų lysvių. Aguona ypač vertinga sode, nes tai vienas iš nedaugelio augalų, žydinčių nuo gegužės iki birželio mėn. Kiekvieną rytą, kai saulė ją bučiuoja, ši gležna amerikietiška stepiņū gēlē atveria šilkinės taurelės. Kalifornijios aguonos tikrai išgyvena, nes sėklos gali išverti sausras metų metus, o tik sudrygsta ilgai lyjant. **Natūrali vieta:** Jungtinių Valstijų pietvakariuose laukinė Eschscholzia californica forma apima ištisus kraštovaizdžius su ryškia gėlių jūra po pirmųjų pavasario liūčių. **Sėkmingas auginimas:** Norint pasiekti ankstyvą žydėjimą nuo gegužės mėnesio, ant palangės rekomenduojama sodinti iš anksto. Nuo gegužės galite sėti ir tiesiai į lauką. Tačiau žydėjimas tais pačiais metais yra mažai tikėtinas. Smulkios sėklos dygsta šviesoje, todėl yra tik lengvai spaudžiamos ir nepadengiamos žeme. Sudyti užtrunka apie dvi tris savaites. Vėliau galite retinti išteklus ir atskirti jaunus augalus 20–25 centimetrų atstumu. **Vieta:** Kalifornijios aguonoms labiau patinka saulėta vieta ir maistinių medžiagų neturtingas, purus dirvožemis, kuriame auga storos liemeninės šaknys, leidžiančios išgyventi vėsėsnės žiemos. **Geriausia vieta:** Kalifornijios aguonoms labiau patinka saulėta vieta ir maistinių medžiagų neturtinga puri dirva, kurioje auga storos liemeninės šaknys, leidžiančios išgyventi vėsėsnės žiemos. **Optimali priežiūra:** Priežiūros pastangos yra labai mažos. Jei nenorite per daug išplisti, nupjaukite žiedus prieš formuodami sėklą. Reguliariai pašalinkite išblukusias gėles, kad paskatintumėte žydėjimą ir pailgintumėte žydėjimą. Puodą laistyti reikėtų kasdien - sode tik tuo atveju, jei sausra užsitęsia. Iki rugsėjo mėn. sėklos subręsta ir jas galima rinkti ir išsaugoti kitų metų sėjai. Sėklos yra iki 10 cm ilgio ankštarošose, turinčiose cilindro formą. Sunokusios ankštys atsidaro iš ilgujų pusių. **Ziema:** Tiesą sakant, Kalifornijios aguonos yra daugiamečiai, tačiau dažniausiai auginamos kaip vienmetis augalas. Jis laikomas ribotu atsparumu iki -10 ° C.



Peprin tal-Kalifornija

Eschscholzia californica

Fjura tal-istepa Amerikana b'kalči harir

Minhabba l-kulur tal-fjuri tiegħu, il-peprin Kalifornjan jissejjaħ ukoll il-peprin tad-deheb. Hija pjanta frugali li tagħmel tajjeb f'ħamrija niexfa u fqira fin-nutrijenti. Jekk iħossu komdu fil-ġnien, għandu bżonn l-ebda kura speċjali u tirriproduċi ruħha, izda mingħajr tkabbir żejjed sodod shaħ. Il-peprin huwa partikolarment siewi fil-ġnien, peress li huwa wieħed mill-ftit pjanti li jiffjorixxu bejn Mejju u Gunju. Kull filgħodu, hekk kif ix-xemx bewsha, din il-fjura delikata tal-istepa Amerikana tiftaħ il-kalči harir tagħha. Il-peprin Kalifornjan huma superstiti veri, peress li ż-żerriegħa tiflaħ għan-nixfa għal snin shaħ, biex tiġġermina biss waqt xita fit-tul. **Post naturali:** Fil-Lbiċ tal-Istati Uniti, il-forma selvaġġa tal-Eschscholzia californica tkopri pajsagħgi shaħ b'baħar qawwi ta 'fjuri wara l-ewwel xita fir-rebbiegħa. **Kultivazzjoni b'suċċess:** Pre-kultura minn Marzu fuq it-tiegħa hija rakkomandata sabiex tinkiseb il-fjoritura bikrija minn Mejju. Minn Mejju tista 'wkoll tiżerġħu direttament barra. Madankollu, il-fjur fl-istess sena huwa pjuttost improbabbli. Iz-żrieragħ fini jiġġerminaw fid-dawl u għalhekk huma biss ippressati ħafif u mħux koperti bil-ħamrija. Huwa jieħu madwar ġimagħtejn sa tliet ġimgħat biex jiġġerminaw. Aktar tard tista 'tnaqqas il-ħażniet u tissepura l-pjanti žġħar f'distanza ta' 20 sa 25 centimetru. Post: Il-peprin Kalifornjan jippreferi post xemxi u ħamrija fqira fin-nutrijenti u maħlula li fiha tiżviluppa għeruq ħoxnin li jippermettulu jgħix xtiewi aktar friski. **L-aħjar post:** Il-peprin Kalifornjan jippreferi post xemxi u ħamrija maħlula u fqira fin-nutrijenti li fiha tiżviluppa għeruq ħoxnin li jippermettulu jgħix xtiewi aktar friski. **Kura ottimali:** L-isforz ta 'manutenzjoni huwa baxx ħafna. Jekk trid tevita li tinfirex wisq, aqta 'l-fjuri qabel il-formazzjoni taż-żerriegħa. Nehħi l-fjuri faded regolarment biex tinkoragħxi l-fjoritura u ttawwal il-fjoritura. Għandek ilma l-borma kuljum - fil-ġnien biss jekk in-nixfa ddum aktar. Sa Settembru ż-żrieragħ huma maturi u jistgħu jingħabru u jiġu salvati għaž-żrieragħ tas-sena d-dieħla. Iz-żrieragħ huma fi mżiewed li huma twal sa 10 cm u għandhom forma cilindrika. Meta misjura, il-miżwed jinfethu fuq il-ġnub twal. **Fix-xitwa:** Attwalment, il-peprin tal-Kalifornija huwa perenni, izda ġeneralment jiġi kkultivat bħala pjanta annwali. Huwa meqjus li jifilhu limitat għal -10 ° Celsius.



Californische papaver

Eschscholzia californica

Amerikaanse steppebloem met zijdeachtige kelken

Vanwege de kleur van zijn bloemen wordt de Californische klaproos ook wel de gouden klaproos genoemd. Het is een zuinige plant die het goed doet op droge en voedselarme gronden. Als het zich prettig voelt in de tuin, heeft het geen speciale zorg nodig en vermenigvuldigt het zich, maar zonder hele bedden te overwoekeren. De papaver is bijzonder waardevol in de tuin, omdat het een van de weinige planten is die tussen mei en juni bloeit. Elke ochtend, als de zon haar kust, opent deze delicate Amerikaanse steppebloem haar zijdezachte kelken. Californische klaprozen zijn echte overlevers, want het zaad kan jaren tegen droogte en ontkiemt pas bij langdurige regenval. **Natuurlijke locatie:** In het zuidwesten van de Verenigde Staten bedekt de wilde vorm van de Eschscholzia californica na de eerste regenbui in het voorjaar hele landschappen met een heldere bloemenzee. **Succesvolle teelt:** Een week na de aankoop van de vensterbank is aan te raden om vanaf mei een vroege bloei te realiseren. Vanaf mei kunt u ook direct buiten zaaien. Bloei in hetzelfde jaar is dan echter vrij onwaarschijnlijk. De fijne zaden ontkiemen in het licht en worden daarom slechts licht geperst en niet bedekt met aarde. Het duurt ongeveer twee tot drie weken om te ontkiemen. Later kun je de bouillon uitdunnen en de jonge plantjes op een afstand van 20 tot 25 centimeter uit elkaar halen. **Locatie:** De Californische papaver geeft de voorkeur aan een zonnige locatie en voedselarme, losse grond waarin hij dikke penwortels ontwikkelt die hem in staat stellen om koelere winters te overleven. **De beste locatie:** De Californische papaver geeft de voorkeur aan een zonnige standplaats en voedselarme, losse grond waarin hij dikke penwortels ontwikkelt waarmee hij koelere winters kan overleven. **Optimale verzorging:** De onderhoudspanning is zeer laag. Wil je niet te veel uitzaaien, snij dan de bloemen af voor de zaadvorming. Verwijder uitgebloeide bloemen regelmatig om de bloei te stimuleren en de bloei te verlengen. Je moet de pot dagelijks water geven - in de tuin alleen als de droogte langer aanhoudt. In september zijn de zaden volwassen en kunnen ze worden verzameld en bewaard voor het zaaien van volgend jaar. De zaden zitten in peulen die tot 10 cm lang zijn en een cilindrische vorm hebben. Als ze rijp zijn, gaan de peulen aan de lange zijden open. **In de winter:** De Californische klaproos is eigenlijk een vaste plant, maar wordt meestal als eenjarige plant gekweekt. Hij wordt als beperkt winterhard beschouwd tot -10° Celsius.



California valmue

Eschscholzia californica

Amerikansk steppeblomst med silkeaktige beger

På grunn av fargen på blomstene, kalles den californiske valmuen også gullvalmuen. Det er en nøysom plante som klarer seg godt i tørr og næringsfattig jord. Hvis han føler seg komfortabel i hagen, trenger haningen spesiell omsorg og reproducerer seg selv, men uten å overgrove hele senger. Valmuen er spesielt verdifull i hagen, siden den er en av få planter som blomstrer mellom mai og juni. Hver morgen, mens solen kysser den, åpner denne delikate amerikanske steppeblomsten sine silkeaktige beger. Californian valmuer er sanne overlevende, siden frøet tåler tørke i årevis, bare for å spire under langvarig nedbør. **Naturlig beliggenhet:** I sørvest i USA dekker den ville formen av Eschscholzia californica hele landskap med et lyst hav av blomster etter de første regnet om våren. **Vellykket dyrking:** En forkultur fra mars i vinduskarmen anbefales for å oppnå tidlig blomstring fra mai. Fra mai kan du også så direkte utendørs. Blomstring samme år er imidlertid ganske usannsynlig. De fine frøene spirer i lyset og blir derfor kun lett presset og ikke dekket med jord. Det tar omtrent to til tre uker å spire. Senere kan du tynne ut bestandene og skille de unge plantene i en avstand på 20 til 25 centimeter. Plassering: Den kaliforniske valmuen foretrekker en solrik beliggenhet og næringsfattig, løs jord der den utvikler tykke pælerøtter som gjør den i stand til å overleve kjøligere vintre. **Den beste beliggenheten:** Den californiske valmuen foretrekker en solrik beliggenhet og næringsfattig, løs jord der den utvikler tykke pælerøtter som lar den overleve kjøligere vintre. **Optimal omsorg:** Vedlikeholdsinnsatsen er svært lav. Hvis du vil unngå å spre for mye, klipp av blomster før frødannelse. Fjern falmede blomster regelmessig for å oppmuntre til blomstring og forlenge blomstringen. Du bør vanne potten daglig - i hagen kun hvis tørken varer lenger. I september er frøene modne og kan samles og lagres for neste års såing. Frøene er i belger som er opptil 10 cm lange og har en sylindrisk form. Når de er modne, åpner belgene seg på langsiden. **Om vinteren:** Egentlig er California-valmuen en flerårig plante, men den dyrkes vanligvis som en årlig plante. Han regnes som begrenset hardfør til -10 ° Celsius.



Mak kalifornijski

Eschscholzia californica

Amerykański stepowy kwiat z jedwabistymi kielichami

Ze względu na kolor kwiatów mak kalifornijski nazywany jest również makiem złotym. Jest to oszczędna roślina, która dobrze radzi sobie na glebach suchych i ubogich w składniki odżywcze. Jeśli dobrze czuje się w ogrodzie, nie wymaga specjalnej pielęgnacji i rozmnaża się, ale bez zarastania całych grządek. Mak jest szczególnie cenny w ogrodzie, ponieważ jako jedna z nielicznych roślin kwitnie między majem a czerwcem. Każdego ranka, gdy słońce całuje go, ten delikatny amerykański kwiat stepowy otwiera swoje jedwabiste kielichy. Maki kalifornijski naprawdę przeżywa, ponieważ nasiona mogą wytrzymać suszę przez lata, by wykiełkować podczas długotrwałych opadów. **Naturalne położenie:** Na południowym zachodzie Stanów Zjednoczonych dzika forma Eschscholzia californica pokrywa całe krajobrazy jasnym morzem kwiatów po pierwszych wiosennych deszczach. **Udana uprawa:** Zalecana jest wstępna kultura od marca na parapecie, aby uzyskać wczesne kwitnienie od maja. Od maja można siać bezpośrednio na zewnątrz. Jednak kwitnienie w tym samym roku jest wtedy raczej mało prawdopodobne. Drobne nasiona kiełkują w świetle i dlatego są tylko lekko sprasowane i nie są przykryte ziemią. Kiełkowanie trwa około dwóch do trzech tygodni. Później możesz przerzedzić zapasy i oddzielić młode rośliny w odległości od 20 do 25 centymetrów. Lokalizacja: Mak kalifornijski preferuje słoneczne miejsca i ubogą w składniki odżywcze, luźną glebę, na której rozwija grube korzenie palowe, które umożliwiają mu przetrwanie chłodniejszych zim. **Najlepsza lokalizacja:** Mak kalifornijski preferuje słoneczne miejsce i ubogą w składniki odżywcze, luźną glebę, na której rozwija grube korzenie palowe, które pozwalają mu przetrwać chłodniejsze zimy. **Optymalna pielęgnacja:** Nakłady na konserwację są bardzo niskie. Jeśli chcesz uniknąć zbytniego rozprzestrzeniania się, odetnij kwiaty przed utworzeniem nasion. Regularnie usuwaj przekwitłe kwiaty, aby pobudzić kwitnienie i przedłużyć kwitnienie. Doniczkę należy podlewać codziennie - w ogrodzie tylko wtedy, gdy susza trwa dłużej. We wrześniu nasiona są dojrzałe i można je zebrać i zachować do siewu w przyszłym roku. Nasiona znajdują się w strąkach o długości do 10 cm i cylindrycznym kształcie. Dojrzałe strąki otwierają się na dłuższych bokach. **W zimę:** W rzeczywistości mak kalifornijski jest rośliną wieloletnią, ale zwykle uprawia się go jako roślinę jednoroczną. Uważa się, że jest ograniczony do -10 ° Celsjusza.



Papoula da Califórnia

Eschscholzia californica

Flor de estepe americana com cálices sedosos

Por causa da cor de suas flores, a papoula californiana também é chamada de papoula dourada. É uma planta frugal que se dá bem em solos secos e pobres em nutrientes. Se ele se sente confortável no jardim, ele precisará de um cuidado especial e se reproduz, mas sem crescer demais canteiros inteiros. A papoula é particularmente valiosa no jardim, pois é uma das poucas plantas que floresce entre maio e junho. Todas as manhãs, enquanto o sol a beija, esta delicada flor da estepe americana abre seus cálices sedosos. As papoulas californianas são verdadeiras sobreviventes, pois a semente pode resistir à seca por anos, apenas para germinar durante chuvas prolongadas. **Localização natural:** No sudoeste dos Estados Unidos, a forma selvagem da Eschscholzia californica cobre paisagens inteiras com um mar brilhante de flores após as primeiras chuvas da primavera. **Cultivo bem sucedido:** Recomenda-se um pré-cultivo a partir de março no parapeito da janela para obter uma floração precoce a partir de maio. A partir de maio você também pode semear diretamente ao ar livre. No entanto, a floração no mesmo ano é bastante improvável. As sementes finas germinam na luz e, portanto, são apenas levemente pressionadas e não cobertas com terra. Leva cerca de duas a três semanas para germinar. Posteriormente, você pode desbastar os estoques e separar as plantas jovens a uma distância de 20 a 25 centímetros. Localização: A papoula californiana prefere um local ensolarado e solo solto e pobre em nutrientes, no qual desenvolve raízes principais grossas que permitem sobreviver a invernos mais frios. **A melhor localização:** A papoula californiana prefere um local ensolarado e um solo solto e pobre em nutrientes, no qual desenvolve raízes principais grossas que lhe permitem sobreviver a invernos mais frios. **Cuidado ideal:** O esforço de manutenção é muito baixo. Se você quiser evitar espalhar muito, corte as flores antes da formação das sementes. Remova as flores desbotadas regularmente para estimular a floração e prolongar a floração. Você deve regar a panela diariamente - no jardim apenas se a seca durar mais tempo. Em setembro, as sementes estão maduras e podem ser coletadas e guardadas para a semeadura do próximo ano. As sementes estão em vagens com até 10 cm de comprimento e formato cilíndrico. Quando maduras, as vagens se abrem nos lados longos. **No inverno:** Na verdade, a papoula da Califórnia é perene, mas geralmente é cultivada como planta anual. Ele é considerado resistente limitado a -10 ° Celsius.



Mac de California

Eschscholzia californica

Floare de stepă americană cu calici mătăsoși

Datorită culorii florilor sale, macul din California este numit și macul auriu. Este o plantă frugală care se descurcă bine în soluri uscate și sărace în nutrienți. Dacă se simte confortabil în grădina, nu are nevoie de nicio îngrijire specială și se înmulțește, dar fara sa depaseasca paturi întregi. Macul este deosebit de valoros în grădina, deoarece este una dintre puținele plante care înflorește între mai și iunie. În fiecare dimineață, în timp ce soarele o sărută, această floră delicată de stepă americană își deschide calicii mătăsoși. Macii din California sunt adevărați supraviețuitori, deoarece sămânța poate rezista la secetă ani de zile, doar pentru a germina în timpul ploilor prelungite. **Locație naturală:** În sud-vestul Statelor Unite, forma sălbatică a Eschscholzia californica acoperă peisaje întregi cu o mare strălucitoare de flori după primele ploii de primăvară. **Cultivare de succes:** Se recomandă o precultură din martie pe pervaz pentru a obține o înflorire timpurie din mai. Din luna mai puteți semăna și direct în aer liber. Cu toate acestea, înflorirea în același an este destul de puțin probabilă. Semințele fine germinează la lumină și, prin urmare, sunt doar ușor presate și nu sunt acoperite cu pământ. Durează aproximativ două până la trei săptămâni pentru a germina. Ulterior, puteți răi stocurile și puteți separa plantele tinere la o distanță de 20 până la 25 de centimetri. Locație: macul din California preferă o locație însorită și un sol slab, sărac în nutrienți, în care dezvoltă rădăcini groase care îi permit să supraviețuiască iernilor mai reci. **Cea mai bună locație:** Macul din California preferă o locație însorită și un sol slab în nutrienți, afanat, în care dezvoltă rădăcini groase care îi permit să supraviețuiască iernilor mai reci. **Îngrijire optimă:** Efortul de întreținere este foarte scăzut. Dacă doriți să evitați răspândirea prea multă, tăiați florile înainte de formarea semințelor. Îndepărtați florile decolorate în mod regulat pentru a încuraja înflorirea și pentru a prelungi înflorirea. Ar trebui să udați vasul zilnic - în grădină doar dacă seceta durează mai mult. Până în septembrie, semințele sunt mature și pot fi colectate și păstrate pentru semănatul de anul viitor. Semințele sunt în păstăi care au până la 10 cm lungime și au formă cilindrică. Când sunt coapte, păstăile se deschid pe părțile lungi. **În iarnă:** De fapt, macul din California este o plantă perenă, dar de obicei este cultivat ca plantă anuală. El este considerat rezistent la -10 ° Celsius.



Kalifornien vallmo

Eschscholzia californica

Amerikansk stäppblomma med silkeslena blomkålar

På grund av färgen på sina blommor kallas den kaliforniska vallmo också för guldvallmo. Det är en sparsam växt som klarar sig bra i torra och näringsfattiga jordar. Känns den bekväm i trädgården behöver den ingen speciell skötsel och förökar sig, men utan att överväxa hela bäddar. Vallman är särskilt värdefull i trädgården, eftersom den är en få växter som blommar mellan maj och juni. Varje morgon, när solen kysser den, öppnar denna delikata amerikanska stäppblomma sina silkeslena blomkålar. Kaliforniska vallmo är sanna överlevande, eftersom fröet tål torka i årtal, bara för att gro under långvarig nederbörd. **Naturligt läge:** I sydvästra USA täcker den vilda formen av Eschscholzia californica hela landskap med ett ljus hav av blommor efter de första regnet på våren. **Framgångsrik odling:** En förkultur från mars på fönsterbrädan rekommenderas för att uppnå tidig blomning från maj. Från och med maj kan du även så direkt utomhus. Men att blomma samma år är då ganska osannolikt. De fina fröna gro i ljuset och är därför bara lätt pressade och inte täckta med jord. Det tar ungefär två till tre veckor att gro. Senare kan du tunna ut bestånden och separera de unga plantorna på ett avstånd av 20 till 25 centimeter. Plats: Kalifornisk vallmo föredrar ett soligt läge och näringsfattig, lös jord där den utvecklar tjocka pålrötter som gör att den klarar svalare vintrar. **Den bästa platsen:** Den kaliforniska vallmo föredrar ett soligt läge och näringsfattig, lös jord där den utvecklar tjocka pålrötter som gör att den kan överleva kallare vintrar. **Optimal vård:** Underhållsansträngningen är mycket låg. Om du vill undvika att sprida för mycket, klipp av blommor innan fröbildning. Ta bort bleknade blommor regelbundet för att uppmuntra blomningen och förlänga blomningen. Du bör vattna krukan dagligen - i trädgården bara om torkan varar längre. I september är fröna mogna och kan samlas in och sparas för nästa års sådd. Fröna finns i baljor som är upp till 10 cm långa och har en cylindrisk form. När de är mogna öppnar sig baljorna på långsidorna. **På vintern:** Egentligen är kalifornisk vallmo en perenn, men den odlas vanligtvis som en ettårig växt. Han anses vara begränsad hårdig till -10 ° Celsius.



Kalifornský mak

Eschscholzia californica

Americký stepný kvet s hodvábnými kalichmi

Kalifornskému maku sa pre farbu kvetov hovorí aj zlatý mak. Je to šetrná rastlina, ktorej sa darí v suchých a na živiny chudobných pôdach. Ak sa v záhrade cíti príjemne, potrebuje žiadna špeciálna starostlivosť a rozmnožuje sa sám, ale bez zarastania celých záhonov. Mak je obzvlášť cenný v záhrade, pretože ako jedna z mála rastlín kvitne od mája do júna. Každé ráno, keď ju pobozká slnko, tento jemný americký stepný kvet otvára svoje hodvábné kalichy. Kalifornský mak skutočne prežil, pretože semenko dokáže roky odolávať suchu, len aby vyklíčilo pri dlhotrvajúcich daždoch. **Prirodzená poloha:** Na juhozápade Spojených štátov pokrýva divoká forma Eschscholzia californica po prvých jarných daždoch celú krajinu s jasným morom kvetov. **Úspešná kultivácia:** Eine Vorkultur ab März auf der Fensterbank ist empfehlenswert, um eine frühe Blüte ab Mai zu erreichen. Ab Mai können Sie auch direkt ins Freiland aussäen. Eine Blüte im selben Jahr ist dann allerdings eher unwahrscheinlich. Die feinen Samen sind Lichtkeimer und werden daher nur leicht angedrückt und nicht mit Erde bedeckt. Bis zur Keimung dauert es circa zwei bis drei Wochen. Später können Sie die Bestände ausdünnen und die Jungpflanzen auf 20 bis 25 Zentimeter Abstand vereinzeln. Standort: Der Kalifornische Mohn bevorzugt einen sonnigen Standort und einen nährstoffarmen, lockeren Boden, in dem er dicke Pfahlwurzeln ausbildet, die ihn auch kühlere Winter überstehen lässt. **Najlepšie umiestnenie:** Kalifornský mak uprednostňuje slnečné miesto a kypnú pôdu chudobnú na živiny, v ktorej sa mu vytvárajú hrubé koreňové korene, ktoré mu umožňujú prežiť chladnejšie zimy. **Optimálna starostlivosť:** Náročnosť na údržbu je veľmi nízka. Ak sa chcete vyhnúť príliš veľkému šíreniu, odrežte kvety pred tvorbou semien. Pravidelne odstraňujte odkvitnuté kvety, aby ste podporili kvitnutie a predĺžili kvitnutie. Črepník by ste mali polievať denne – v záhrade iba vtedy, ak sucho trvá dlhšie. V septembri sú semená zrelé a môžu sa zozbierať a uložiť na siatie v budúcom roku. Semená sú v strukoch, ktoré sú dlhé až 10 cm a majú valcovitý tvar. Po dozretí sa struky otvárajú na dlhých stranách. **V zime:** Kalifornský mak je v skutočnosti trvalka, ale zvyčajne sa pestuje ako jednoročná rastlina. Je považovaný za obmedzený mrazuvzdorný do -10 ° Celzia.



Kalifornijski mak

Eschscholzia californica

Ameriška stepska roža s svilnatimi čašami

Zaradi barve cvetov kalifornijski mak imenujemo tudi zlati mak. Je varčna rastlina, ki dobro uspeva na suhih in s hranili revnih tleh. Če se na vrtu dobro počuti, potrebuje brez posebne nege in se razmnožuje sam, vendar brez preraščanja celih gredic. Posebej dragocen je mak na vrtu, saj je ena redkih rastlin, ki cveti med majem in junijem. Vsako jutro, ko jo sonce poljubi, ta nežna ameriška stepska roža odpre svoje svilnate čaše. Kalifornijski mak resnično preživi, saj lahko seme več let zdrži sušo, vzklíje pa le med dolgotrajnejšimi padavinami. **Naravni habitat:** Na jugozahodu ZDA divja oblika Eschscholzia californica pokriva celotne pokrajine s svetlim morjem cvetja po prvem deževju spomladi. **Navodila za gojenje:** Priporočamo predkulturo od marca na okensko polico, da dosežemo zgodnje cvetenje od maja. Od maja lahko sejete tudi neposredno na prostem. Vendar pa je cvetenje v istem letu malo verjetno. Drobna semena kalijo na svetlobi in jih zato le rahlo potlačimo in ne prekrijemo z zemljo. Za kalitev traja približno dva do tri tedne. Kasneje lahko zaloge redčite in mlade rastline ločite na razdalji 20 do 25 centimetrov. Lega: Kalifornijski mak ima najraje sončno lego in s hranili revno, rahlo zemljo, v kateri razvije debele glavne korenine, ki mu omogočajo preživetje hladnejših zim. **Najboljša lokacija:** Kalifornijski mak ima najraje sončno lego in s hranili revno, rahlo zemljo, v kateri razvije debele glavne korenine, ki mu omogočajo preživetje hladnejših zim. **Optimalna nega:** Vzdrževanje je zelo malo. Če se želite izogniti prevelikemu širjenju, odrežite cvetove pred nastankom semena. Odcvetele cvetove redno odstranjujte, da spodbudite cvetenje in podaljšate cvetenje. Lončnico zalivajte vsak dan – na vrtu le, če suša traja dlje. Do septembra so semena zrela in jih je mogoče pobrati in shraniti za setev naslednje leto. Semena so v strokih, ki so dolgi do 10 cm in so valjaste oblike. Ko dozori, se stroki po dolgih straneh odprejo. **V zimskem času:** Pravzaprav je kalifornijski mak trajnica, vendar se običajno goji kot enoletnica. Velja za omejeno odporno na -10 ° Celzija.



Amapola de california

Eschscholzia californica

Flor de estepa americana con cálices sedosos

Por el color de sus flores, la amapola de California también se llama amapola dorada. Es una planta frugal que crece bien en suelos secos y pobres en nutrientes. Si se siente cómoda en el jardín, no necesita ningún cuidado especial y se multiplica, pero sin desbordar parterres enteros. La amapola es particularmente valiosa en el jardín, ya que es una de las pocas plantas que florece entre mayo y junio. Cada mañana, mientras el sol la besa, esta delicada flor de la estepa americana abre sus sedosos cálices. Las amapolas de California son verdaderas sobrevivientes, ya que la semilla puede resistir la sequía durante años, solo para germinar durante las lluvias prolongadas. **Ubicación natural:** En el suroeste de Estados Unidos, la forma salvaje de la Eschscholzia californica cubre paisajes enteros con un brillante mar de flores tras las primeras lluvias de primavera. **Cultivo exitoso:** Se recomienda un precultivo a partir de marzo en el alféizar de la ventana para lograr una floración temprana a partir de mayo. A partir de mayo también se puede sembrar directamente en exterior. Sin embargo, la floración en el mismo año es bastante improbable. Las semillas finas germinan a la luz y, por lo tanto, solo se presanan ligeramente y no se cubren con tierra. Tarda entre dos y tres semanas en germinar. Más tarde, puede diluir las existencias y separar las plantas jóvenes a una distancia de 20 a 25 centímetros. Ubicación: la amapola de California prefiere un lugar soleado y un suelo suelto y pobre en nutrientes en el que desarrolla raíces primarias gruesas que le permiten sobrevivir inviernos más fríos. **La mejor ubicación:** La amapola de California prefiere un lugar soleado y un suelo suelto y pobre en nutrientes en el que desarrolla raíces primarias que le permiten sobrevivir inviernos más fríos. **Cuidado óptimo:** El esfuerzo de mantenimiento es muy bajo. Si quiere evitar esparcir demasiado, corte las flores antes de la formación de semillas. Retire las flores marchitas con regularidad para estimular la floración y prolongarla. Debe regar la maceta todos los días, en el jardín solo si la sequía dura más. Para septiembre, las semillas están maduras y se pueden recolectar y guardar para la siembra del próximo año. Las semillas se encuentran en vainas que miden hasta 10 cm de largo y tienen forma cilíndrica. Cuando están maduras, las vainas se abren por los lados largos. **En el invierno:** En realidad, la amapola de California es una planta perenne, pero generalmente se cultiva como una planta anual. Se le considera resistente limitado a -10 ° Celsius.



Kalifornský mák

Eschscholzia californica

Americká stepní květina s hedvábnými kalichy

Kalifornskému máku se pro barvu květů říká také zlatý mák. Je to spořivá rostlina, které se dobře daří v suchých a na živiny chudých půdách. Pokud se na zahradě cítí dobře, potřebuje žádná zvláštní péče a množí se sama, ale bez zarůstání celých záhonů. Mák je zvláště cenný na světle, protože jako jedna z mála rostlin kvete mezi květnem a červnem. Každé ráno, když ji slunce políbí, tato jemná americká stepní květina otevírá své hedvábné kalichy. Kalifornský mák skutečně přežil, protože semeno vydrží roky sucha, aby vyklíčilo během dlouhých deštů. **Přírozená poloha:** Na jihozápadě Spojených států pokrývá divoká forma Eschscholzia californica po prvních jarních deštích celé krajiny s jasným mořem květin. **Úspěšné pěstování:** Pro dosažení časného kvetení od května se doporučuje předpěstování z března na parapetu. Od května můžete vysévat i přímo venku. Kvetení ve stejném roce je však pak spíše nepravděpodobné. Jemná semena klíčí na světle, a proto jsou jen lehce přitlačena a nezasypaná zeminou. Klíčení trvá asi dva až tři týdny. Později můžete zásoby proředit a mladé rostliny oddělit na vzdálenost 20 až 25 centimetrů. Umístění: Kalifornský mák preferuje slunné místo a na živiny chudou, kyprou půdu, ve které vytváří silné kulové kořeny, které mu umožňují přežít chladnější zimy. **Nejlepší umístění:** Kalifornský mák preferuje slunné místo a na živiny chudou, kyprou půdu, ve které si vytváří silné kulové kořeny, které mu umožňují přežít chladnější zimy. **Optimální péče:** Náročnost údržby je velmi nízká. Pokud se chcete vyhnout přílišnému šíření, odřízněte květy před tvorbou semen. Pravidelně odstraňujte odkvetlé květy, abyste podpořili kvetení a prodloužili kvetení. Květináč byste měli zalévat denně – na zahradě pouze v případě, že sucha trvá déle. V září jsou semena zralá a lze je sbírat a uchovávat pro výsev v příštím roce. Semena jsou v luscích, které jsou až 10 cm dlouhé a mají válcovitý tvar. Když jsou zralé, lusky se otevírají na dlouhých stranách. **V zimě:** Kalifornský mák je ve skutečnosti trvalka, ale obvykle se pěstuje jako jednoletá rostlina. Je považován za omezeně mrazuvzdorný do -10 ° Celsia.



Kaliforniya haşhaş

Eschscholzia californica

İpeksi kaliksli Amerikan bozkır çiçeği

Kaliforniya haşhaşına çiçeklerinin renginden dolayı altın haşhaş da denir. Kuru ve besin açısından fakir topraklarda iyi olan tutumlu bir bitkidir. Bahçede kendini rahat hissediyorsa ihtiyacı var. Özel bir bakım gerektirmez ve kendini yeniden üretir, ancak tüm yatakları büyütmeden. Mayıs ve Haziran ayları arasında çiçek açan birkaç bitkiden biri olduğu için haşhaş bahçede özellikle değerlidir. Her sabah, güneş onu öptüğünde, bu narin Amerikan bozkır çiçeği ipeksi kalikslerini açar. Kaliforniya haşhaşları gerçek hayatta kalanlardır, çünkü tohum yıllarca kuraklığa dayanabilir, ancak uzun süreli yağışlar sırasında çimlenebilir. **Doğal konum:** Amerika Birleşik Devletleri'nin güneybatısında, Eschscholzia californica'nın vahşi formu, ilkbaharın ilk yağmurlarından sonra tüm manzaraları parlak bir çiçek denizi ile kaplar. **Başarılı yetiştirme:** Mayıs ayından itibaren erken çiçeklenme elde etmek için pencere kenarında Mart ayından itibaren bir ön kültür önerilir. Mayıs ayından itibaren doğrudan açık havada da ekim yapabilirsiniz. Bununla birlikte, aynı yıl içinde çiçek açması pek olası değildir. İnce tohumlar ışıktaki çimlenir ve bu nedenle sadece hafifçe bastırılır ve üzeri toprakla örtülmez. Çimlenmesi yaklaşık iki ila üç hafta sürer. Daha sonra stokları inceltilir ve genç bitkileri 20 ila 25 santimetre mesafeden ayırabilirsiniz. Konum: Kaliforniya haşhaşı, güneşli bir yeri ve daha soğuk kışlarda hayatta kalmasını sağlayan kalın kökler geliştirdiği besin açısından fakir, gevşek toprağı tercih eder. **En iyi konum:** Kaliforniya haşhaşı, güneşli bir yeri ve daha soğuk kışlarda hayatta kalmasını izin veren kalın ana kökler geliştirdiği, besin açısından fakir, gevşek toprağı tercih eder. **Optimum bakım:** Bakım çabası çok düşüktür. Çok fazla yayılmasını önlemek istiyorsanız, tohum oluşumundan önce çiçekleri kesin. Çiçeklenmeyi teşvik etmek ve çiçeklenmeyi uzatmak için solmuş çiçekleri düzenli olarak çıkarın. Sakıyı her gün sulamalısınız - sadece kuraklık daha uzun sürerse bahçede. Eylül ayına kadar tohumlar olgunlaşır ve bir sonraki yılın ekimi için toplanıp saklanabilir. Tohumlar 10 cm uzunluğa kadar olan ve silindirik bir şekle sahip baklalardır. Olgunlaştığında, baklalar uzun kenarlarda açılır. **Kışın:** Aslında, California haşhaşı çok yıllık bir bitkidir, ancak genellikle tek yıllık bir bitki olarak yetiştirilir. -10 ° C'ye kadar dayanıklı olduğu kabul edilir.



Kaliforniai mák

Eschscholzia californica

Amerikai sztyeppei virág selymes kelyhekkel

Virágainak színe miatt a kaliforniai mákot aranyárnak is nevezzük. Takarékos növény, amely jól érzi magát száraz és tápanyagban szegény talajban. Ha jól érzi magát a kertben, szüksége van rá nem igényel különösebb gondot, és önmagát reprodukálja, de anélkül, hogy az egész ágyakat túlnőné. A mák különösen értékes a kertben, mivel azon kevés növények közé tartozik, amelyek május és június között virágoznak. Minden reggel, ahogy a nap megcsókolja, ez a finom amerikai sztyeppvirág kinyitja selymes kelyheit. A kaliforniai mák igazi túlélő, mivel a mag évekig ellenáll a szárazságnak, csak hosszan tartó csapadék esetén csírázik ki. **Természetes elhelyezkedés:** Az Egyesült Államok délnyugati részén az Eschscholzia californica vad formája egész tájakat borít be ragyogó virágtengerrel az első tavaszi esők után. **Sikeresebb termesztés:** Eine Vorkultur ab März auf der Fensterbank ist empfehlenswert, um eine frühe Blüte ab Mai zu erreichen. Ab Mai können Sie auch direkt ins Freiland aussäen. Eine Blüte im selben Jahr ist dann allerdings eher unwahrscheinlich. Die feinen Samen sind Lichtkeimer und werden daher nur leicht angedrückt und nicht mit Erde bedeckt. Bis zur Keimung dauert es circa zwei bis drei Wochen. Später können Sie die Bestände ausdünnen und die Jungpflanzen auf 20 bis 25 Zentimeter Abstand vereinzeln. Standort: Der Kalifornische Mohn bevorzugt einen sonnigen Standort und einen nährstoffarmen, lockeren Boden, in dem er dicke Pfahlwurzeln ausbildet, die ihn auch kühlere Winter überstehen lässt. **A legjobb hely:** A kaliforniai mák a napos helyet és a tápanyagban szegény, laza talajt részesíti előnyben, amelyben vastag karógyökereket fejleszt, amelyek lehetővé teszik, hogy túlélje a hűvösebb teleket. **Optimális gondozás:** A karbantartási ráfordítás nagyon alacsony. Ha el akarja kerülni a túlzott terjedést, vágja le a virágokat a magképződés előtt. A kifakult virágokat rendszeresen távolítsa el a virágzás ösztönzése és a virágzás meghosszabbítása érdekében. Az edényt naponta kell öntözni - a kertben csak akkor, ha a szárazság tovább tart. Szeptemberre a magvak beérnek, összegyűjthetők, és a következő évi vetésre menthetők. A magok legfeljebb 10 cm hosszú hüvelyekben vannak, és hengeres alakúak. Éréskor a hüvelyek a hosszú oldalon kinyílnak. **Télen:** Valójában a kaliforniai mák évelő, de általában egygyári növényként termesztik. -10 °C-ig korlátozottan tűrhetőnek tekinthető.

: : : : :



カリフォルニアポピー

Eschscholzia californica

絹のような萼を持つアメリカの草原の花

その花の色から、カリフォルニアポピーはゴールドポピーとも呼ばれます。乾燥した栄養分の少ない土壌でもよく育つ質素な植物です。庭で快適に過ごせれば、特別な世話をする必要はなく、ベッド全体を大きくしすぎずに増殖します。ポピーは、5月から6月にかけて花が咲く数少ない植物の1つ

であるため、庭で特に価値があります。毎朝、太陽がキスをする、このデリケートなアメリカの草原の花が絹のような萼を開きます。カリフォルニアポピーは、種子が干ばつに何年も耐えることができ、長引く降雨の間にのみ発芽するため、真の生存者です。

自然な場所: 米国の南西部では、春の最初の雨の後、野生の *Eschscholzia californica* が鮮やかな花の海で風景全体を覆っています。

栽培成功:

5月からの早期開花を実現するために、窓辺での3月からの前培養が推奨されます。5月からは屋外で直播もできます。ただし、同じ年に開花する可能性はかなり低いです。細かい種子は光の中で発芽するため、軽く押すだけで、土で覆われることはありません。発芽まで2~3週間ほどかかります。後で株を間引いて、若い植物を 20 ~ 25 cm の距離で分離できます。場所:

カリフォルニアポピーは、日当たりの良い場所と、涼しい冬を乗り切ることができる太い主根を発達させる、栄養の乏しい緩い土壌を好みます。

最高のロケーション:

カリフォルニアポピーは、日当たりの良い場所と、涼しい冬を乗り切ることができる太い主根を発達させる栄養の乏しいゆるい土壌を好みます。

最適なケア:

メンテナンスの労力は非常に少ないです。広げすぎたくない場合は、種ができる前に花を切り落としてください。開花を促進し、開花を長引かせるために、色あせた花を定期的に取り除きます。干ばつが長く続く場合にのみ、庭でポットに毎日水をまく必要があります。9月までに種子は成熟し、来年の播種のために集めて保存することができます。種子は、長さ 10 cm までの円筒形のさやの中にあります。熟すと、莢が長い方を開きます。

冬に: 実はカリフォルニアポピーは多年草ですが、通常は一年草として栽培されています。彼は摂氏-10度までの耐寒性に限界があると考えられています。

SKU: 13254 / Kalifornischer Mohn