



agrecol

SIARCZAN MAGNEZU AgroSUPLO

Płynny nawóz dolistny oraz doglebowy do stosowania w uprawach roślin warzywnych, owocowych oraz ozdobnych – **szczególnie iglaków**. Nawóz zapobiega żółknięciu i brunatnieniu igieł roślin iglastych, a także zapobiega chlorozom liści. Zastosowanie dolistne to najlepszy sposób na uzupełnianie niedoborów magnezu i siarki – składników pokarmowych niezbędnych do prawidłowego wzrostu oraz uzyskania wysokiej jakości plonu. Dobre odżywienie siarką i magnezem zwiększa tolerancję roślin na stres wynikający z niskich i wysokich temperatur, a także suszę. Nawóz ten jest neutralny dla pH gleby, nie zakwasza i nie alkalizuje gleby.

- ✓ **Siarka** – ma pozytywny wpływ na odporność roślin, wspomaga proces fotosyntezy i przyswajania azotu, ogranicza kumulowanie się w roślinach metali ciężkich i azotanów.
- ✓ **Magnez** – jest ważnym składnikiem budulcowym chlorofilu, zielonego barwnika w liściach, który odpowiada za proces fotosyntezy, stymuluje także rozwój systemu korzeniowego.

INSTRUKCJE DOTYCZĄCE STOSOWANIA:

Nawóz stosować w okresach największego zapotrzebowania oraz w przypadku wystąpienia niedoborów. Zabiegi wykonywać 2-3 krotnie w sezonie wegetacyjnym.

STOSOWANIE DOGLEBOWE:

- **Uprawy szklarniowe:** dawka 2-6 ml nawozu w 1 l wody na 1 m².
- **Owoce/warzywa/rośliny ozdobne uprawiane w gruncie:** dawka 2-9 ml nawozu w 1 l wody na 1 m².

STOSOWANIE DOLISTNE:

Odmierzyć 30 ml nawozu i rozpuścić w 1 l wody. Dokładnie wymieszać i opryskiwać rośliny. Jeden litr roztworu wystarcza na około 20 m². Roztwór zużyć bezpośrednio po przygotowaniu.

Uwaga! Nie wykonywać oprysków w czasie dużego nasłonecznienia, wysokiej temperatury oraz wiatru powodującego znoszenie kropeł. Zabieg najlepiej wykonywać wieczorem lub w pochmurne, bezdeszczowe dni.

Stosować wyłącznie w uzasadnionej potrzebie. Nie przekraczać dawki.

Objawy niedoboru siarki i magnezu:

Najłatwiej rozpoznawalnym objawem niedoboru są chlorozy liści, w przypadku siarki na liściach młodych, natomiast w przypadku magnezu na starszych liściach. Wskutek niedoboru magnezu dochodzi również do żółknięcia i brunatnienia igieł. W przypadku niedoboru obu składników pokarmowych plony są zdecydowanie mniejsze i gorszej jakości.

Wieloskładnikowy płynny nieorganiczny nawóz makroskładnikowy (Mg, S) (+5 +10)

Zawartość składników pokarmowych, % (m/m):

- 5% - tlenek magnezu (MgO) rozpuszczalny w wodzie,
- 10% - tritlenek siarki (SO₃) rozpuszczalny w wodzie.

Postać: roztwór.

Wykaz składników: siarczan magnezu siedmiowodny¹ (CAS 10034-99-8)

¹CMC1: Pierwotne surowce i mieszaniny

Przechowywanie:

Przechowywać wyłącznie w szczelnie zamkniętym, oryginalnym pojemniku. Przechowywać w suchym pomieszczeniu, w ciemnym miejscu, w temperaturze od 5°C do +30°C. Nie przechowywać razem z żywnością, napojami i paszami dla zwierząt.

Środki ostrożności:

Chronić przed dziećmi. Nie spożywać. W razie połknięcia niezwłocznie zasięgnąć porady lekarza - pokaż opakowanie lub etykietę. Zanieczyszczone oczy lub skórę przemyć natychmiast dużą ilością wody i zasięgnąć porady lekarza. W przypadku rozlania spłukać dużą ilością wody.

Producent:

 **AGRECOL**

Agrecol sp. z o.o.

98-400 Wieruszów, Mieszary 2

tel.: +48 62 78 32 000

infolinia: + 48 62 72 08 018

www.agrecol.pl

Objętość netto:

50 ml

CE

Data ważności i nr partii: na opakowaniu.



5 902341 120728 >