

bloom! IGLAKI

BOPON iglaki nawóz rozpuszczalny

Wysoko wydajny, wieloskładnikowy nawóz krystaliczny rozpuszczalny w wodzie, przeznaczony do nawożenia wszystkich gatunków drzew i krzewów iglastych. Nawożenie podczas przesadzania młodych roślin zapewnia szybkie zakwaszenie podłoża, co przyczynia się do ich prawidłowego wzrostu i rozwoju. Zasilanie iglaków słabo rosnących wzmacnia je i poprawia ich wygląd. Podwyższona zawartość azotu, oraz żelazo poprawia wybarwienie igieł, a dodatek magnezu zapobiega ich brunatnieniu.

Stosowanie: jedną łyżeczkę nawozu (5 g) rozpuścić w 5 l wody.



Nawożenie należy rozpocząć wczesną wiosną i zakończyć pod koniec sierpnia. W tym czasie nawozić rośliny co 2 tygodnie. Dawkowanie nawozu należy uzależnić od wielkości rośliny (5 g nawozu na każdy metr wysokości) np.:

Wielkość roślin	Dawka
Rośliny o wysokości (średnicy – dla roślin płożących) do 0,5 m	0,5 łyżeczki
Rośliny o wysokości (średnicy – dla roślin płożących) 1 m	1 łyżeczka
Rośliny większe: ilość nawozu zwiększyć proporcjonalnie do wielkości rośliny	

Stosować wyłącznie w uzasadnionej potrzebie. Nie przekraczać dawki.

WIELOSKŁADNIKOWY STAŁY NIEORGANICZNY NAWÓZ MAKROSKŁADNIKOWY

Zawartość składników pokarmowych (m/m): 18 % azot całkowity (N) [w tym 2 % azot amonowy, 16 % azot mocznikowy], 6 % całkowity pięciotlenek fosforu (P_2O_5) (=2,6 % P) [w tym 6 % pięciotlenek fosforu (P_2O_5) rozpuszczalny w wodzie (=2,6 % P)], 18 % tlenek potasu (K₂O) rozpuszczalny w wodzie (=14,9 % K), 2 % tlenek magnezu (MgO) rozpuszczalny w wodzie (=1,2 % Mg), 23 % trójtlenek siarki (SO₃) rozpuszczalny w wodzie (=9,2 % S).

Mikroskładniki całkowite rozpuszczalne w wodzie (m/m): 0,02 % bor (B) w postaci kwasu borowego, 0,002 % miedź (Cu)*, 0,02 % żelazo (Fe)*, 0,01 % mangan (Mn)*, 0,004 % molibden (Mo) w postaci molibdenianu, 0,002 % cynk (Zn)*.

*schelatowane przez EDTA (zakres pH gwarantujący zadowalającą stabilność: 4 – 7)

Granulometria: Mieszanka proszku i bryłek.

Co najmniej 60 % produktu przechodzi przez sito o rozmiarze oczek 1 mm. A pozostałe 40 % przechodzi przez sito o rozmiarze oczek 4 mm. Nawóz może przejściowo zbrylać się w przechowywaniu, jest to jednak proces odwracalny i wystarczy rozkruszenie ręką. Nie ma to znaczenia dla działania nawozu gdyż stosuje się go po rozpuszczeniu w wodzie.

Wykaz składników powyżej 5 % (w przeliczeniu na suchą masę): mocznik¹ (CAS: 57-13-6), siarczan potasu¹ (CAS: 7778-80-5), fosforan monopotasowy¹ (CAS: 7778-77-0), siarczan magnezu¹ (CAS: 14168-73-1), siarczan amonu² (CAS: 7783-20-2)

Gdzie: ¹ – CMC 1 pierwotne surowce i mieszaniny

² – CMC 11 produkty uboczne w rozumieniu dyrektywy 2008/98/WE

Środki ostrożności i przechowywanie: W razie przypadkowego spożycia skonsultować się z lekarzem.

W przypadku dostania się nawozu do oczu przemyć je dużą ilością czystej wody. W razie przypadkowego rozsypania nawóz zebrać na suchą, a następnie zabrudzoną powierzchnię spłukać dużą ilością wody.

Przechowywać z dala od żywności, poza zasięgiem dzieci, w szczególnie zamkniętym opakowaniu, w temperaturze 0°C – 30°C.

Postępowanie z odpadami: przestrzegać aktualnie obowiązujących przepisów.

Ten nawóz zawiera mocznik, który może uwalniać amoniak i wpływać na jakość powietrza. W zależności od miejscowych warunków należy wprowadzić odpowiednie środki zaradcze.

Data ważności i nr serii na opakowaniu.

Producent: BROS sp. z o.o.

ul. Karpią 24, 61-619 Poznań

tel. 61 826 25 12

e-mail: biuro@bros.pl

www.bopon.pl

Zawartość netto:

200 g

