

Kloer Chlor Tabletki (wersje zapachowe: bez zapachu, Pelargonia, Lawenda)

Produkt w postaci tabletek do dezynfekcji wody w basenach, posiada właściwości bakteriobójcze. Wolno rozpuszczalny.

Sposób dozowania: rozpuszczanie tabletek w wodzie basenowej (również przy użyciu pływaków/bojek).

Dawka początkowa (bakteriobójczość, w tym *Legionella pneumophila*): 20 g/2 m³ wody, skuteczność po 6 godzinach.

Dawki kolejne (bakteriobójczość): 20 g/6 m³ wody, skuteczność po 6 godzinach

Uwaga! Dawkę początkową stosuje się poza godzinami pracy basenu. Przed ponownym oddaniem basenu do użytku należy sprawdzić poziom chloru w wodzie odpowiednim zestawem testowym i w przypadku przekroczenia dopuszczalnej wartości poziomu wolnego chloru podejmowane są działania mające na celu jego zmniejszenie. Po dostosowaniu poziomu chloru sprawdza się pH wody i dokonuje niezbędnych korekt, aby mieściło się w granicach pH=7,2-7,8. Zaleca się sprawdzanie stężenia wolnego chloru w wodzie przynajmniej raz na 6 godzin. Użytkownicy mogą korzystać z basenu po ustabilizowaniu się ilości chloru aktywnego na poziomie zalecanym w Rozporządzeniu Ministra Zdrowia.

Obszar zastosowania: Dezynfekcja wody basenowej na basenach prywatnych i publicznych (środek bakteriobójczy).

Produkt przebadano według norm: EN1276, EN13623.

Substancja czynna: Symklozen 98 g/100g



Niebezpieczeństwo

Zawiera: symklozen

Może intensyfikować pożar; utleniacz. Działa szkodliwie po połknięciu. Działa drażniąco na oczy. Może powodować podrażnienie dróg oddechowych. Działa bardzo toksycznie na organizmy wodne, powodując długotrwałe skutki. W kontakcie z kwasami uwalnia toksyczne gazy. Uwaga! Nie stosować razem z innymi produktami. Może wydzielać niebezpieczne gazy (chlor).

W razie konieczności zasięgnięcia porady lekarza należy pokazać pojemnik lub etykietę. Chronić przed dziećmi. Przechowywać z dala od źródeł ciepła, gorących powierzchni, źródeł iskrzenia, otwartego ognia i innych źródeł zapłonu. Nie palić. Nie rozpylać nad otwartym ogniem lub innym źródłem zapłonu. Trzymać z dala od odzieży i innych materiałów zapalnych. Unikać uwolnienia do środowiska. W PRZYPADKU POŁKNIECIA: W przypadku złego samopoczucia skontaktować się z OŚRODKIEM ZATRUĆ/lekarzem. W PRZYPADKU DOSTANIA SIĘ DO OCZU: Ostrożnie płukać wodą przez kilka minut. Wyjąć soczewki kontaktowe, jeżeli są i można je łatwo usunąć. Nadal płukać. W przypadku pożaru: Użyć gaśnica proszkowa/piasek/dwutlenek węgla do gaszenia. Zawartość/pojemnik usuwać do odpowiednio oznakowanych pojemników na odpady zgodnie z krajowymi przepisami.

Pierwsza pomoc: Dbaj o własne bezpieczeństwo. W razie wątpliwości należy powiadomić lekarza i udzielić mu informacji z etykiety lub karty charakterystyki. **Drugi oddechowe:** Przerwij narażenie, przenieś poszkodowanego na świeże powietrze. **Kontakt ze skórą:** Zdjąć zabrudzoną odzież. Omyj dotknięte miejsce dużą ilością wody. Jeżeli nie doszło do poranienia skóry, można użyć mydła. Zapewnij opiekę lekarza, jeżeli utrzymuje się podrażnienie skóry.

Skutki narażenia: Dróg oddechowych, oczu, w przypadku połknięcia: zgodne z klasyfikacją. Skóry: nie są przewidywane.

WARUNKI PRZECHOWYWANIA: Przechowywać w oryginalnym opakowaniu, z dala od światła słonecznego i wilgoci.

Nr pozwolenia: 9924/24 **Data produkcji i seria:** **Trwałość produktu:** 36 miesięcy od daty produkcji

Tabletki występują w gramaturze 20g oraz 200g.

Zawartość opakowania:

Podmiot odpowiedzialny:

Kloer Polska sp. z o.o.

ul. Janowicka 8a, 43-512 Janowice

tel. +48 888 133 730

Z upoważnienia Prezesa
Aleksandra Wilczyńska
Wiceprezes ds. Produktów Biobójczych
/dokument podpisano elektronicznie/