



Tips



© Peter A. Mansfeld - CC-BY-3.0

Callistemon citrinus

 Български	BG	2	 Malti	MT	5
 Dansk	DK	2	 Nederlands	NL	5
 Deutsch	DE	2	 Norsk	NO	6
 English	UK	2	 Polski	PL	6
 Eesti	EE	3	 Português	PT	6
 Suomalainen	FI	3	 Românesc	RO	6
 Français	FR	3	 Svenska	SE	7
 Ελληνική	GR	3	 Slovensky	SK	7
 Gaeilge	IE	4	 Slovenski	SI	7
 íslenskur	IS	4	 Español	ES	7
 Italiano	IT	4	 Český	CZ	8
 Hrvatski	HR	4	 Türkçe	TR	8
 Latviešu	LV	5	 Magyar	HU	8
 Lietuvių kalba	LT	5	 日本語	JP	9



Австралийски препарат за почистване на лампи

Callistemon citrinus

Цилиндрични съцветия и листа с цитрусов аромат

Вечнозеленият лампоочиствач впечатлява с кичестите си четковидни и цилиндрични съцветия с дълги тичинки, които поникват постоянно от късна пролет до есента. Когато се отглежда в саксии и вани, може лесно да се подрязва обратно през пролетта и растежът му може да бъде ограничен до желаната височина. Неговите алтернативни, донякъде кожести листа разкриват, че принадлежи към семейство миртови, са сребристо космати, след като са покълнали и миришат леко на цитрусови плодове, когато са смачкани. Затова в Австралия те често се добавят към чая, за да му придадат освежаващ аромат. **Естествено местоположение:** Родината на храста, известен още като цитронела, е в югоизточните австралийски щати – Нов Южен Уелс, Куинсланд и Виктория. Там обича да расте в блата близо до брега и край скалисти водни течения. **Успешно отглеждане:** Отглеждането от семена на закрито е възможно през цялата година. Просто поръсете фините семена върху влажен субстрат за отглеждане и покрийте семената само тънко с пръст. Покрийте съда с култура с домакинско фолио, което сте осигурили с дупки. Това предпазва почвата от изсушаване. Трябва да отстранявате фолиото за 2 часа на всеки два до три дни. Това предотвратява образуването на мухъл върху растящата почва. Поставете саксията със семена на светло и топло място с 20 до 25° по Целзий и поддържайте почвата влажна, но не мокра. Покълването става след шест до осем седмици. Между другото, по-късно можете да размножите и чрез резници от 10-сантиметрови едногодишни безцветни странични издънки с парче от старото стъбло в основата. **Най-доброто местоположение:** Уредът за почистване на лампи предпочита да стои на слънце на прозорец с южно изложение или през лятото на балкона или в градината, малко защитени от вятъра. **Оптимална грижа:** Поливайте обилно с вода с възможно най-ниско съдържание на вар (дъждовна вода), особено по време на фазата на растеж и цъфтеж, но избягвайте преовлажняване (напр. поради остатъчна вода в чинийката). Най-добре е да снабдявате растението с течен растителен тор в контейнери на всеки 14 дни от късна пролет до есен. Подрежете леко избледнелите клонови назад, за да насърчите поникването на нови цветя. **През зимата:** Пренесете растението на закрито през есента, преди нощните температури да паднат под 10° по Целзий. През зимата саксиите или ваните се поддържат най-добре светли (защото те също са зелени през зимата) и хладни при температури между 5° и 10° по Целзий, тъй като този период на почивка насърчава цъфтежа през следващата година. Сега поливайте по-малко, но се уверете, че кореновата топка не изсъхва. След това от февруари растението може да бъде възможно най-слънчево и топло, така че да започне да цъфти рано.



Australsk lamperenser

Callistemon citrinus

Cylindriske blomsterstande og citrusduftende blade

Den stedsegrønne lamperenser imponerer med sine prangende, børstelignende og cylindriske blomsterstande med deres lange støvdragere, som spirer konstant fra sent forår til efterår. Ved dyrkning i pottter og baljer kan den let beskæres tilbage om foråret, og væksten kan begrænses til den ønskede højde. Dens skiftende, noget læderagtige blade afslører, at den tilhører myrtefamilien, er sølvhårede efter at de er spiret og lugter en smule af citrus, når den knuses. I Australien tilsættes de derfor ofte til te for at give den en forfriskende aroma. **Naturlig beliggenhed:** Busken, også kendt som karminflaskerbørste, er hjemmehørende i de sydøstlige australske stater - New South Wales, Queensland og Victoria. Der vokser den gerne i sumpe nær kysten og langs klippefyldte vandløb. **Succesfuld dyrkning:** Dyrkning fra frø indendørs er muligt hele året rundt. Du skal blot drysse de fine frø på fugtigt vækstsubstrat og kun dække frøene tyndt med jord. Dæk dyrkningskarret til med husholdningsfilm, som du forsyner med huller. Dette beskytter jorden mod udtørring. Du bør fjerne folien i 2 timer hver anden til tredje dag. Dette forhindrer mug i at dannes på den voksende jord. Stil frøpotten et let og varmt sted med 20 til 25° Celsius og hold pottetjorden fugtig, men ikke våd. Spiring sker efter efter seksop til otte uger. Senere kan man i øvrigt også formere sig ved stiklinger fra 10 centimeter lange, et år gamle blomsterløse sideskud med et stykke af den gamle stamme i bunden. **Den bedste beliggenhed:** Lamperenseren står helst i fuld sol på et sydvendt vindue eller om sommeren på altanen eller i haven lidt i læ for vinden. **Optimal pleje:** Vand rigeligt med vand, der er så lavt i kalk som muligt (regnvand), især i vækst- og blomstringsfasen, men undgå vandfyldning (f.eks. på grund af restvand i underkoppen). Det er bedst at forsyne planten med flydende beholderplanteøgning hver 14. dag fra sent forår til efterår. Skær let falmende grene tilbage for at tilskynde nye blomster til at spire. **Om vinteren:** Bring planten indendørs om efteråret, før nattemperaturerne falder til under 10° Celsius. Om vinteren holdes pottter eller baljer bedst lyse (fordi de også er grønne om vinteren) og kølige ved temperaturer mellem 5° og 10° Celsius, fordi denne hvileperiode fremmer blomstring i det kommende år. Vand mindre nu, men sørg for, at rodklumpen ikke tørrer ud. Fra februar kan planten så blive så solrig og varm som muligt igen, så den begynder at blomstre tidligt.



Australischer Lampenputzer

Callistemon citrinus

Zylinderförmige Blütenstände und nach Citrus duftende Blätter

Der immergrüne Lampenputzer besticht durch seine auffälligen, borstenartigen und zylinderförmigen Blütenstände mit ihren langen Staubfäden, die beständig vom späten Frühjahr bis in den Herbst nachtreiben. Bei Topf- und Kübelhaltung kann er im Frühjahr problemlos auch kräftig zurückgeschnitten und so in seinem Wuchs auf die gewünschte Höhe begrenzt werden. Seine wechselständigen, etwas ledrigen Blätter verraten die Zugehörigkeit zu den Myrtengewächsen, sind nach dem Austrieb silbrig behaart und duften beim Zerreiben leicht nach Citrus. In Australien werden Sie daher auch gerne Tee beigefügt, um ihm ein erfrischendes Aroma zu verleihen. **Naturstandort:** Die Heimat des auch Kaminroter Zylinderputzer genannten Strauches liegt in den südöstlichen australischen Bundesstaaten - New South Wales, Queensland und Victoria. Dort wächst er gerne in Sümpfen nahe der Küste und entlang von felsigen Wasserläufen. **Anzucht:** Im Haus ist die Anzucht aus Samen das ganze Jahr über möglich. Streuen Sie das feine Saatgut einfach auf feuchtes Anzuchtsubstrat und bedecken Sie die Samen nur dünn mit Erde. Decken Sie das Anzuchtgefäß mit Klarsichtfolie ab, die Sie mit Löchern versehen. So ist die Erde vor Austrocknung geschützt. Alle zwei bis drei Tage sollten Sie die Folie für 2 Stunden entfernen. Das beugt einer Schimmelbildung auf der Anzuchterde vor. Stellen Sie das Anzuchtgefäß an einen hellen und warmen Ort mit 20 bis 25° Celsius und halten Sie die Anzuchterde feucht, aber nicht nass. Die Keimung erfolgt nach sechs bis acht Wochen. Später können Sie übrigens auch eine Vermehrung durch Stecklinge aus 10 Zentimeter langen, einjährigen blütenlosen Seitentrieben mit einem Stück alten Stammes an der Basis vornehmen. **Standort:** Der Lampenputzer steht am liebsten vollsonnig an einem Südfenster oder im Sommer auch etwas windgeschützt auf dem Balkon oder im Garten. **Pflege:** Wässern Sie vor allem während der Wachstums- und Blühphase reichlich mit möglichst kalkarmem Wasser (Regenwasser), aber vermeiden Sie Staunässe (zum Beispiel durch Restwasser im Untersetzer). Versorgen Sie die Pflanze vom späten Frühjahr bis zum Herbst am besten alle 14 Tage mit flüssigem Kübelpflanzendünger. Stutzen Sie verblühte Zweige leicht zurück, um den Austrieb neuer Blüten zu unterstützen. **Im Winter:** Holen Sie die Pflanze im Herbst ins Haus, bevor die Nachttemperaturen unter 10° Celsius sinken. Im Winter stehen Topf oder Kübel am besten hell (da auch im Winter grün) und kühl bei Temperaturen zwischen 5° und 10° Celsius, weil diese Ruhepause den Blütenaustrieb im kommenden Jahr fördert. Wässern Sie jetzt weniger, aber achten Sie darauf, dass der Wurzelballen nicht austrocknet. Ab Februar kann die Pflanze dann wieder so sonnig und warm wie möglich stehen, damit sie früh mit der Blüte beginnt.



Red Bottle Brush

Callistemon citrinus

Cylinder shaped inflorescences and pleasantly citrus scented leaves

The evergreen Red Bottle Brush impresses with its flashy, brush-like and cylinder shaped inflorescences with long filaments that constantly grow again from late spring until autumn. When kept in a pot or tub, it can easily be pruned strongly to achieve the desired height of the plant. The alternate, leathery leaves - revealing the belonging to the Myrtle plants - are silvery haired after proliferation and have a light aromatic citrus scent when ground. For that, in Australia, the leaves are sometimes added to tea, to create a fresher aroma. **Natural location:** The natural habitat of the bush that is also known as Carmine Top Hat Brush, is in the southeastern states of Australia, that is New South Wales, Queensland and Victoria. There, it can be found in the swamps close the coast and along rocky watercourses. **Successful cultivation:** Seed propagation indoors is possible throughout the year. Spread the seeds on moist potting compost, put just a little compost earth on top and cover the seed container with clear film to prevent the earth from drying out. Don't forget to make some holes in the clear film and take it every second or third day completely off for about 2 hours. That way you avoid mold formation on your potting compost. Place the seed container somewhere bright and warm with a temperature between 20°C and 25° Celsius and keep the earth moist, but not wet. The germination starts after six to eight weeks. Later on, you have also the possibility of propagation from cuttings, by using the 10 cm long, one year old blind side shoots with a piece of the old stem as base. **The best location:** The Red Bottle Brush prefers a sunny spot near a window to the south or a bit wind-sheltered place on your balcony or in the garden. **Optimal care:** During growth and blossoming you should give plenty of lime-deficient water (rain water), but avoid water logging, for instance in the saucer. From late spring until autumn the plant needs fluid fertilizer for tub plants every two weeks. Trim back spent branches to support the new shoots. **In the winter:** In autumn, you have to move your plant indoors before the nightly temperatures sink below 10° Celsius. During winter it is best to be kept bright and cool with temperatures between 5° and 10° Celsius. This break is supportive for next year's budding. Water your plant less, but see that the clogged roots are not drying out. In February, the pot can already be moved to a sunny and warm place for an early blooming.



Austraalia lambipuhastaja

Callistemon citrinus

Silindrikujulised õisikud ja tsitruselõhnalised lehed

Ighaljas lambipuhastaja avaldab muljet oma efektsete, pintsliatoliste ja silindriliste õisikutega pikkade tolmukatega, mis tärkavad pidevalt hiliskevadest sügiseni. Potis ja vannis kasvatades saab teha kevadel hõlpsasti tagasi kärpida ja kasvu piirata soovitud kõrguseni. Selle vahelduvad, pisut nahkjad lehed näitavad, et see kuulub mürtide perekonda, on pärast tärkamist hõbedaselt karvased ja purustamisel lõhnavad kergelt tsitruselise järele. Seetõttu lisatakse Austraalias neid sageli teele, et anda sellele värskendav aroom. **Looduslik asukoht:** Pöösas, tuntud ka kui karminpuhastaja, on pärit Austraalia kaguosariikidest – Uus-Lõuna-Walesist, Queenslandist ja Victoria. Seal meeldib talle kasvada rannikulähedastes soodes ja kiviste vooluveekogude ääres. **Edukas kasvatamine:** Seemnetest siseruumides kasvatamine on võimalik aastaringsest. Lihtsalt puista peened seemned niiskele kasvustraadile ja kata seemned ainult õhukeselt mullaga. Kata kultuurianum toidukilega, mille varustad aukudega. See kaitseb mulda kuivamise eest. Peaksite fooliumi eemaldama 2 tunniks iga kahe kuni kolme päeva järel. See takistab hallituse teket kasvupinnal. Asetage külvipott valgusküllasesse ja sooja kohta, mille temperatuur on 20–25 °C, ning hoidke istutusmuld niiskena, kuid mitte märjana. Idanemine toimub pärast kuutkuni kaheksa nädalat. Muide, hiljem saab pistikutega paljundada ka 10 sentimeetri pikkustest üheaastastest õiteta külgõrsetest, mille põhjas on tükk vana tüve. **Parim asukoht:** Lambipuhastaja eelistab seista lauspäikese käes lõunapoolsel aknal või suvel rõdul või aias, veidi tuule eest varjatult. **Optimaalne hooldus:** Kastke ohtralt võimalikult lubjavee veega (vihmavesi), eriti kasvu- ja õitsemisfaasis, kuid vältige vettimist (nt alustassi jääkvee tõttu). Parim on varustada taime vedela konteinertaimede väetisega iga 14 päeva järel hiliskevadest sügiseni. Kärbi pleekinud oksid veidi tagasi, et soodustada uute lilledede tärkamist. **Talvel:** Viige taim sügisel tuppa, enne kui õine temperatuur langeb alla 10 °C. Talvel on potid või vannid kõige parem hoida heledad (sest ka talvel on need rohelised) ja jahedad temperatuuril 5–10° Celsiuse järgi, sest see puhkeperiood soodustab tuleval aastal õitsemist. Kasta nüüd vähem, aga jälgige, et juurepall ära ei kuivaks. Alates veebruarist saab taim siis taas võimalikult päikesepaisteline ja soe olla, et ta varakult õitsema hakkaks.



Australialainen lampunpuhdistusaine

Callistemon citrinus

Sylinterimäiset kukinnot ja sitruunan tuoksuiset lehdet

Ikivihreä lampunpuhdistusaine tekee vaikutuksen näytävillä, sivellinmäisillä ja sylinterimäisillä kukinnoillaan pitkällä heteillä, jotka itävät jatkuvasti myöhään keväästä syksyyn. Ruukuissa ja tynnyreissä kasvatettaessa se voidaan helposti leikata takaisin keväällä ja sen kasvu voidaan rajoittaa haluttuun korkeuteen. Sen vuorottelevat, hieman nahkeat lehdet paljastavat sen kuuluvan myrttipuheeseen, ovat itämisen jälkeen hopeankarvaisia ja murskattuina tuoksuvat hieman sitruhedelmältä. Austraalias näitä lisätään siksi usein teehen antamaan sille virkistävän aromin. **Luonnollinen sijainti:** Pensas, joka tunnetaan myös nimellä karminpuhastaja, on kotoisin Kaakkois-Australian osavaltioista - New South Walesista, Queenslandista ja Victoria. Siellä se kasvaa mielellään suolla lähellä rannikkoa ja kallioisilla vesistöillä. **Onnistunut viljely:** Kasvatus siemenistä sisätiloissa on mahdollista ympäri vuoden. Ripottele vain hienoja siemeniä kostealle kasvualustalle ja peitä siemenet vain ohuesti mullalla. Peitä viljelyastia kelmulla, johon on tehty reikiä. Tämä suojaaa maaperää kuivumiselta. Poista folio 2 tunnin ajaksi kahden tai kolmen päivän välein. Tämä estää homeen muodostumisen kasvumaahan. Aseta siemenruukku valoisaan ja lämpimään paikkaan, jonka lämpötila on 20–25 °C, ja pidä istutusmaa kosteana, mutta ei märkinä. Itäminen tapahtuu kuuden jälkeenjopa kahdeksan viikkoa. Myöhemmin voi muuten levittää myös pistokkailla 10 senttimetriä pitkistä, vuoden ikäisistä kukattomista sivuversoista, joiden tyvessä on pala vanhaa vartta. **Paras sijainti:** Lampunpuhdistin seisoa mieluiten täydessä auringossa eteläpuoleisella ikkunalla tai kesällä parvekkeella tai puutarhassa tuulelta suojassa. **Optimaalinen hoito:** Kastele runsaalla vedellä, jossa on mahdollisimman vähän kalkkia (sadevesi), erityisesti kasvu- ja kukintavaiheessa, mutta vältä kastamista (esim. lautasessa jääneen veden takia). Kasville on parasta toimittaa nestemäistä säiliökasvilannoitetta 14 päivän välein myöhäiskeväästä syksyyn. Leikkaa haalistuneet oksat hieman takaisin kannustaaksesi uusien kukkien itämiseen. **Talvela:** Tuo kasvi sisätiloihin syksyllä, ennen kuin yölämpötilat laskevat alle 10 astetta. Talvela ruukut tai kylpytynnyrit on parasta pitää valoisina (koska ne ovat myös talvella vihreitä) ja viileinä 5°-10°C lämpötilassa, koska tämä lepoaika edistää kukintaa tulevana vuonna. Kastele nyt vähemmän, mutta varmista, että juuripallo ei kuivu. Helmikuusta lähtien kasvi voi olla taas mahdollisimman aurinkoinen ja lämmin, jotta se kukkii aikaisin.



Callistemon

Callistemon citrinus

Des inflorescences cylindriques et des feuilles parfumées au citrus

Le callistemon sempervirent séduit par ses inflorescences frappantes, cylindriques et en forme de brosses avec ses longues étamines qui repoussent constamment entre fin printemps et automne. Lorsque vous l'entretenez dans un pot ou dans un seau, il peut être fortement taillé sans problème en printemps, et par conséquent, peut être limité à la taille souhaitée. Ses feuilles alternes et un peu comme le cuir trahissent l'appartenance aux Myrtacées, sont velues argentées après la floraison et sont légèrement parfumées au citrus lorsque l'on les triture. En Australie, les feuilles sont souvent ajoutées au thé pour le donner un arôme rafraîchissant. **Emplacement naturel:** La terre natale de cet arbuste, aussi appelé rince-bouteilles, se situe dans les Etats du sud-est de l'Australie - Nouvelle-Galles du Sud, Queensland, et Victoria. Il pousse souvent dans les marais près du littoral et le long de cours d'eau rocheux. **Culture réussie:** La culture des graines à la maison est possible tout au long de l'année. Parsemez les graines sur du substrat humide et recouvrez-les peu avec de la terre. Couvrez le récipient avec une feuille transparente dans laquelle vous faites des trous. Comme ça, le terreau est protégé du dessèchement. Vous devez enlever la feuille pendant deux heures tous les deux ou trois jours. Ceci prévient la formation de moisissures dans le terreau. Mettez le récipient dans un endroit lumineux et chaud de 20° à 25° Celsius et gardez le terreau humide, mais pas mouillé. La germination a lieu après six à huit semaines. Plus tard, vous pouvez faire une reproduction avec des boutures de pousses annuelles et sans fleurs de 10 centimètres de long, en prenant une partie d'un ancien tronc à la base. **Le meilleur emplacement:** Le callistemon préfère être en plein soleil sur une fenêtre donnant au sud ou, en été, dans un endroit qui est aussi protégé du vent sur le balcon ou dans le jardin. **Soins optimaux:** Arrosez surtout pendant la phases de croissance et la floraison avec le plus d'eau peu calcaire possible (eau de pluie) et évitez l'eau stagnante (l'eau résiduelle dans la soucoupe, par exemple). Alimentez la plante de fin printemps jusqu'en automne tous les 14 jours avec de l'engrais liquidet. Taillez légèrement les branches fanées pour aider le bourgeonnement de nouvelles fleurs. **En hiver:** Mettez la plante à la maison en automne avant que les températures tombent en-dessous de 10° Celsius la nuit. En hiver, il est préférable de mettre le pot ou le seau dans un endroit lumineux (car les feuilles sont aussi vertes en hiver) à une température entre 5° et 10° Celsius, car cette période de repos favorise la floraison pour l'année à venir. Arrosez la plante moins, mais veillez à ce que la motte de racines ne se dessèche pas. La plante peut être remise au soleil et au plus chaud possible à partir de février pour qu'elle commence à fleurir tôt.



Αυστραλιανό καθαριστικό λαμπτήρων

Callistemon citrinus

Κυλινδρικές ταξιανθίες και φύλλα με άρωμα εσπεριδοειδών

Το αιθαλέας καθαριστικό λαμπτήρων εντυπωσιάζει με τις επιδεικτικές, βουρτσισμένες και κυλινδρικές ταξιανθίες του με τους μακρούς στήμονες τους, που φυτρώνουν συνεχώς από τα τέλη της άνοιξης έως το φθινόπωρο. Όταν μεγαλώνει σε γλάστρες και μπανιέρες, μπορεί εύκολα να κλαδευτεί ξανά την άνοιξη και η ανάπτυξη του μπορεί να περιοριστεί στο επιθυμητό ύψος. Τα εναλλακτικά, κάπως δερματώδη φύλλα του αποκαλύπτουν ότι ανήκει στην οικογένεια της μυρτιάς, είναι αργυρόχρωμα τριχυτά αφού έχουν φυτρώσει και μυρίζουν ελαφρά εσπεριδοειδή όταν συνθλιβονται. Στην Αυστραλία, επομένως, προστίθενται συχνά στο τσάι για να του δώσουν ένα δροσιστικό άρωμα. **Φυσιική τοποθεσία:** Ο θάμνος, επίσης γνωστός ως καρμίνη, είναι εγγενής στις πολιτείες της νοτιοανατολικής Αυστραλίας - Νέα Νότια Ουαλία, Κοινοίς και Βικτώρια. Εκεί του αρέσει να αναπτύσσεται σε βάλτους κοντά στην ακτή και κατά μήκος βροχωδών υδάτων. **Επιτυχημένη καλλιέργεια:** Η καλλιέργεια από σπόρους σε εσωτερικούς χώρους είναι δυνατή όλο το χρόνο. Απλώς πασπαλίστε τους λεπτούς σπόρους σε υγρό υπόστρωμα ανάπτυξης και καλύψτε τους σπόρους μόνο αραιά με χώμα. Καλύψτε το δοχείο καλλιέργειας με μεμβράνη, την οποία ανοίγετε με τρύπες. Αυτό προστατεύει το έδαφος από το στέγνωμα. Θα πρέπει να αφαιρέσει το αλουμινοχαρτό για 2 ώρες κάθε δύο έως τρεις ημέρες. Αυτό αποτρέπει τη δημιουργία μούχλας στο αναπτυσσόμενο έδαφος. Τοποθετήστε τη γλάστρα σε ένα ελαφρύ και ζεστό μέρος με θερμοκρασία 20 έως 25° Cελσίου και διατηρήστε το χώμα της γλάστρας υγρό αλλά όχι υγρό. Η βλάστηση εμφανίζεται μετά από εξίως και οκτώ εβδομάδες. Παρεμπιπτόντως, αργότερα μπορείτε επίσης να πολλαπλασιάσετε με μοσχεύματα από πλάγιους βλαστούς μήκους 10 εκατοστών, ενός έτους χωρίς άνθη με ένα κομμάτι από το παλιό στέλεχος στη βάση. **Η καλύτερη τοποθεσία:** Ο καθαριστής λαμπτήρων προτιμά να στέκεται στον ήλιο σε ένα παράθυρο με νότιο προσανατολισμό ή, το καλοκαίρι, στο μπαλκόνι ή στον κήπο, κάπως προστατευμένο από τον άνεμο. **Βέλτιστη φροντίδα:** Ποτίστε άφθονο με νερό που έχει όση το δυνατόν χαμηλότερη περιεκτικότητα σε ασβέστη (βρόχινο νερό), ειδικά κατά τη φάση ανάπτυξης και ανθοφορίας, αλλά αποφύγετε την υπερχείλιση (π.χ. λόγω υπολειμματικού νερού στο πιατάκι). Είναι καλύτερο να τροφοδοτείτε το φυτό με υγρό λίπασμα φυτών δοχείων κάθε 14 ημέρες από τα τέλη της άνοιξης έως το φθινόπωρο. Κλαδέψτε ελαφρά τα ξεθωριασμένα κλαδιά πίσω για να ενθαρρύνετε τα νέα λουλούδια να φυτρώσουν. **Το χειμώνα:** Φέρτε το φυτό σε εσωτερικούς χώρους το φθινόπωρο, προτού οι νυχτερινές θερμοκρασίες πέσουν κάτω από τους 10° Cελσίου. Το χειμώνα, οι γλάστρες ή οι μπανιέρες είναι καλύτερα να διατηρούνται φωτεινές (επειδή είναι και πράσινες τον χειμώνα) και δροσερές σε θερμοκρασίες μεταξύ 5° και 10° Cελσίου, επειδή αυτή η περίοδος ανάπαυσης προάγει την ανθοφορία την επόμενη χρονιά. Ποτίστε λιγότερο τώρα, αλλά φροντίστε να μην στεγνώσει η ρίζα. Από τον Φεβρουάριο, το φυτό μπορεί να είναι και πάλι όσο το δυνατόν πιο ηλιόλουστο και ζεστό, ώστε να αρχίσει να ανθίζει νωρίς.



Glantóir lampa hAstráile

Callistemon citrinus

Inflorescences sorcóireach agus duilleoga citris-scented

Téann an glantóir lampa síorghlas i bhfeidhm lena inflorescences seónna, scuab-mhaith agus sorcóireacha lena stamens fada, a fhásann i gcónaí ó dheireadh an earraigh go dtí an fhómhar. Nuair a bhíonn sé ag fás i bpotáil agus tobáin, is féidir é a ghearradh siar go héasca san earrach agus is féidir a fhás a theorannú don airde atá ag teastáil. Léiríonn a dhuilleoga malartacha, atá beagán leathair, go mbaineann sé leis an teaghlach raideog, go bhfuil siad fionnach airgid tar éis dóibh sprouting agus boladh beagán citris nuair a bhrúitear iad. San Astráil mar sin is minic a chuirtear le tae iad chun aroma athnuachana a thabhairt dó. **Suíomh nádúrtha:** Tá an tor, ar a dtugtar scuab buidéal carmine freisin, dúchasach do stáit oirdheisceart na hAstráile - New South Wales, Queensland agus Victoria. Is maith leis fás ansin i seascainn in aice leis an gcósta agus feadh sruthchúrsaí creagach. **Saothrú rathúil:** Is féidir fás ó shíolta taobh istigh ar feadh na bliana. Níl ort ach sprinkle na síolta fineáil ar an tsustráit atá ag fás tais agus clúdaigh na síolta ach go tanáil le hithir. Clúdaigh an soitheach cultúir le scannán cling, a sholáthraíonn tú le poill. Cosnaíonn sé seo an ithir ó thriomú amach. Ba chóir duit an scragall a bhaint ar feadh 2 uair gach dhá nó trí lá. Cuireann sé seo cosc ar mhúlna a fhoirmiú ar an ithir atá ag fás. Cuir an pota síolta in áit éadrom te ag 20 go 25 ° Celsius agus coinnigh an ithir potaithe tais ach ní fliuch. Tarlaíonn péacadh tar éis a sésuas le hocht seachtaine. Teagmhasach, ina dhiaidh sin is féidir leat a iomadaíodh freisin trí gearrthóga ó 10 ceintiméadar ar fad, aon bhliain d'aois shoots taobh gan bláth le píosa den gas d'aois ag an mbonn. **An suíomh is fearr:** Is fearr leis an glantóir lampa seasamh faoi ghrian iomlán ar fhuinneog atá os comhair an deiscirín nó, sa samhradh, ar an mbalcóin nó sa ghairdín, beagán foscadh ón ghaoth. **Cúram is fearr is féidir:** Cuir uisce go flúirseach le huisce atá chomh híseal agus is féidir in aol (uisce báistí), go háirithe le linn na céime fáis agus bláthanna, ach seachain uiscebhuí (m.sh. mar gheall ar uisce iarmharach sa sár). Is fearr leasachán plandaí coimeádán leachtach a sholáthar don phlanda gach 14 lá ó dheireadh an earraigh go dtí an fhómhar. Gearr craobhacha faded beagán siar chun bláthanna nua a spreagadh chun sprout. **Sa gheimhreadh:** Tabhair an planda taobh istigh san fhómhar, sula dtéann teocht san oíche faoi bhun 10 ° Celsius. Sa gheimhreadh, is fearr potaí nó tobáin a choinneáil geal (toisc go bhfuil siad glas sa gheimhreadh freisin) agus fionnuar ag teochtáid idir 5 ° agus 10 ° Celsius, toisc go gcuireann an tréimhe scithe seo bláthanna chun cinn sa bhliain amach romhainn. Uisce níos lú anois, ach déan cinnte nach bhfuil an liathróid fhréamh tirim amach. Ó mhí Feabhra, is féidir leis an bplanda a bheith chomh grianmhar agus te agus is féidir arís ionas go dtosaíonn sé ag bláth go luath.



Ástralskur lampahreinsiefni

Callistemon citrinus

Sívöl blómstrandi og sítrusilmandi laufblöð

Sígræni lampahreinsirinn vekur hrifningu með áberandi, burstakenndum og sívölum blómablómum með löngum stíflum sínum, sem spretta stöðugt frá seint vori til hausts. Þegar ræktað er í pottum og pottum er auðvelt að klippa það aftur á vorin og takmarka vöxt hans við æskilega hæð. Önnur, nokkuð leðurkennd blöðin sýna að hún tilheyrir myrtuættinni, eru silfurhár eftir að þau hafa sprottið og ilma lítillaga af sítrus þegar þau eru mulin. Í Ástralíu er þeim því oft bætt út í te til að gefa því frískandi ilm. **Náttúruleg staðsetning:** Runnin, einnig þekktur sem karmínflöskubursti, er innfæddur í suðausturluta Ástralíu - Nýja Suður-Wales, Queensland og Viktoría. Þar vex það gjarnan í múrum við ströndina og meðfram grýttum vatnsföllum. **Árangursrík ræktun:** Ræktun úr fræjum innandyrá er mögulegt allt árið um kring. Stráð finu fræjunum einfaldlega á rakt vaxandi undirlag og hyljið fræin aðeins þunnt með mold. Hyljið ræktunarílatið með matarfilmu, sem þú útvegur með götum. Þetta verndar jarðvegin gegn þurrkun. Þú ættir að fjarlægja álpappírinn í 2 klukkustundir á tveggja til þriggja daga fresti. Þetta kemur í veg fyrir að mygla myndist á vaxandi jarðvegi. Settu fræpottinn á léttan og heitan stað með 20 til 25 ° Celsius og haltu pottjarðveginum rökum en ekki blautum. Spírun á sér stað eftir sexallt að átta vikur. Tilviljun, síðar er einnig hægt að fjölga með græðlingum úr 10 sentímetra löngum, eins árs gömlum blómalausum hliðarsprotum með stykki af gamla stilknum við botninn. **Besta staðsetningin:** Lampahreinsirinn vill helst standa í fullri sól á suðurglugga eða á sumrin, á svölunum eða í garðinum, nokkuð í skjóli fyrir vindi. **Besta umönnun:** Vökvaðu ríkulega með vatni sem er eins lágt í kalki og mögulegt er (regnvatn), sérstaklega á vaxtar- og blómstrandi fasa, en forðastu vatnslosun (t.d. vegna vatnsleifa í undirskálinni). Best er að útvega plöntunni fljótandi gámaplöntuáburði á 14 daga fresti frá seint vori til hausts. Snyrtu fölnuð greinar örliði til baka til að hvetja ný blóm til að spíra. **A veturna:** Settu plöntuna innandyrá á haustin, áður en næturhiti fer niður fyrir 10 ° á Celsius. Á veturna er best að geyma potta eða potta bjarta (því þeir eru líka grænir á veturna) og kaldur við hitastig á milli 5° og 10° á Celsius, því þessi hvíldartími stuðlar að blómgun á komandi ári. Vökvaðu minna núna, en passaðu að rörtarkúlan þorni ekki. Frá og með febrúar getur plöntan síðan orðið eins sólrík og hlý og hægt er á ný þannig að hún byrji snemma að blómstra.



Callistemo

Callistemon citrinus

Infiorescences dalla forma cilindrica e foglie che profumano di agrumi

Il Callistemo sempreverde si distingue per le sue infiorescences appariscenti a spazzola, dalla forma cilindrica e con lunghi filamenti, che spuntano dalla tarda primavera fino all'autunno. Nella coltivazione in vaso o in un recipiente più grande può essere potato in primavera senza problemi, anche in maniera vigorosa, in questo modo è possibile limitarne la crescita per mantenere l'altezza desiderata. Le sue foglie alterne e leggermente coriacee rivelano l'appartenenza alla famiglia del mirto, alla germinazione sono ricoperte di peluria argentata e, se schiacciate, profumano leggermente di agrumi. In Australia vengono aggiunte al tè, per conferirgli un aroma rinfrescante. **Posizione naturale:** La patria di questo arbusto, chiamato in alcune lingue anche pulitore a cilindro rosso carminio, si trova negli stati federali dell'Australia sud-occidentale: New South Wales, Queensland e Victoria. In quelle zone cresce molto nelle paludi vicino alla costa e lungo i corsi d'acqua rocciosi. **Coltivazione ruscita:** La coltivazione da semi in casa è possibile durante tutto l'anno. Sparpagliate i semi delicati sulla terra di coltivo umida e copriteli solo leggermente con la terra. Coprite il recipiente di coltivazione con pellicola trasparente, sulla quale praticherete dei fori, in questo modo la terra eviterà di seccarsi. Ogni due o tre giorni rimuovete la pellicola per 2 ore, per prevenire la formazione di muffe sulla terra. Collocate il recipiente di coltivazione in un luogo luminoso e caldo, a una temperatura tra i 20° e i 25° C, mantenete la terra umida, ma non bagnata. La germinazione dovrebbe avvenire da sei a otto settimane dopo. In seguito potrete anche praticare la riproduzione per talee dei getti secondari di un anno senza fiori, lunghi 10 centimetri, con un pezzo del vecchio tronco alla base. **La posizione migliore:** Il Callistemo predilige gli ambienti molto soleggiati, magari su una finestra esposta a sud oppure, in estate, anche sul balcone o in giardino al riparo dal vento. **Cura ottimale:** Innaffiatelo soprattutto durante crescita e fioritura con acqua il più possibile povera di calcare (acqua piovana), evitando il ristagno idrico (ad esempio per l'acqua rimanente nel sottovaso). Dall'inizio della primavera all'autunno concimate la pianta preferibilmente ogni 14 giorni, con fertilizzante liquido per piante in vaso. Cimate leggermente i rami fioriti, per favorire la germinazione di nuovi fiori. **In inverno:** In autunno collocate la pianta in casa, prima che le temperature notturne scendano sotto i 10°. In inverno mantenete il vaso o il mastello esposti alla luce (è una pianta sempreverde) e al fresco, a una temperatura fra i 5° e i 10° C, poiché questo riposo favorisce la fioritura dell'anno seguente. In questo periodo innaffiatela meno, ma fate attenzione che il pane di radici non si secchi. Da febbraio la pianta può tornare il più possibile esposta alla luce e al calore, per farle cominciare presto a fiorire.



Australsko sredstvo za čišćenje lampi

Callistemon citrinus

Cilindrični cvatovi i lišće s mirisom citrusa

Zimzelena lampa čistač impresionira svojim kitnjastim, četkastim i cilindričnim cvatovima s dugim prašnicima koji neprestano niču od kasnog proljeća do jeseni. Kada se uzgaja u posudama i kadama, lako se može orezati u proljeće i ograničiti joj rast na željenu visinu. Njegovi naizmjenični, pomalo kožasti listovi otkrivaju da pripada obitelji mirta, srebrnasto su dlakavi nakon što proklju i lagano mirišu na citruse kada se zgnječe. U Australiji se stoga često dodaju čaju kako bi mu dali osvježavajuću aromu. **Zemlja porijekla:** Grm, također poznat kao karmín bottlebrush, porijeklom je iz jugoistočnih australskih država - Novog Južnog Walesa, Queenslanda i Viktorija. Tamo voli rasti u močvarama u blizini obale i uz kamenite vodotoke. **Uspješan uzgoj:** Uzgoj iz sjemena u zatvorenom prostoru moguć je tijekom cijele godine. Jednostavno pospite fino sjeme na vlažnu podlogu za uzgoj i pokrijte sjeme samo tankim slojem zemlje. Posudu s kulturom prekritje prozirnom folijom koju ste opremili rupama. To štiti tlo od isušivanja. Svaka dva do tri dana skinite foliju na 2 sata. Time se sprječava stvaranje plijesni na tlu za uzgoj. Stavite posudu za sjeme na svijetlo i toplo mjesto s 20 do 25° Celzija i održavajte tlo za saksije vlažnim, ali ne mokrim. Kljanje se javlja nakon šest do osam tjedana. Inače, kasnije možete razmnožavati i reznicama od 10 centimetara dugih jednogodišnjih postranih izbojaka bez cvjetova s komadićem stare stabljike pri dnu. **Najbolja lokacija:** Lampa za čišćenje najradije stoji na suncu na prozoru okrenutom prema jugu ili, ljeti, na balkonu ili u vrtu, malo zaklonjena od vjetrova. **Optimalna njega:** Obilno zalijevajte vodom koja ima što manje kamenca (kišnica), osobito tijekom faze rasta i cvatnje, ali izbjegavajte natapanje (npr. zbog zaostale vode u tanjuriću). Najbolje je biljku opskrbljivati tekućim gnojivom u spremniku svakih 14 dana od kasnog proljeća do jeseni. Lagano obrežite izbljedenje grane kako biste potaknuli nicanje novih cvjetova. **U zimi:** Stavite biljku u kuću u jesen, prije no što noćne temperature padnu ispod 10°C. Zimi je posude ili kace najbolje držati svijetlima (jer su i zimi zelene) i hladiti na temperaturama između 5° i 10° Celzija, jer to razdoblje mirovanja potiče cvjetanje u narednoj godini. Sad manje zalijevajte, ali pazite da se korijenska kugla ne osuši. Od veljače biljka može opet biti što sunčanija i toplija kako bi rano počela cvjetati.



Austrālijas lampu tīrītājs

Callistemon citrinus

Cilindriskas ziedkopas un lapas ar citrusaugļu aromātu

Mūžzaļais lampu tīrītājs ir pārstāvis ar savām košajām, otām līdzīgām un cilindriskām ziedkopām ar garajām putekšņlapām, kas pastāvīgi dīgst no vēla pavasara līdz rudenim. Audzējot podos un kubulos, pavasarī to var viegli atzartot un tā augšanu ierobežot līdz vēlamajam augstumam. Tās alternatīvās, nedaudz ādainās lapas atklāj, ka tā pieder pie mirtu dzimtas, pēc sadīguma ir sudrabaini matains un sasmalcina nedaudz smaržo pēc citrusaugļiem. Tāpēc Austrālijā tos bieži pievieno tējai, lai piešķirtu tai atsvaidzinošu aromātu. **Dabiska vieta:** Krūms, kas pazīstams arī kā karmīna pudeļu birste, ir dzimis Austrālijas dienvidaustrumu štatos - Jaundienvidvēlsā, Kvīnslendā un Viktorijā. Tur tai patīk augt purvos pie krasta un gar akmeņainām ūdenstecēm. **Veiksmīga audzēšana:** Audzēšana no sēklīm telpās ir iespējama visu gadu. Vienkārši uzkaisiet smalkās sēklas uz mitra augšanas substrāta un tikai plānā kārtā pārklāiet sēklas ar augsni. Nosedziet kultivēšanas trauku ar pārtikas plēvi, kuru nodrošina ar caurumiem. Tas pasargā augsni no izžūšanas. Jums vajadzētu noņemt foliju 2 stundas ik pēc divām līdz trim dienām. Tas novērš pelējuma veidošanos augošajā augsnē. Novietojiet sēkļu podu gaišā un siltā vietā ar temperatūru 20 līdz 25 ° C un turiet augsni mitru, bet ne mitru. Dīgšana notiek pēc sešiem līdz astoņām nedēļām. Starp citu, vēlāk var pavairot arī ar spraudeņiem no 10 centimetru gariem, gadu veciem bezziedu sānu dzinumiem ar vecā stumbra gabaliņu pie pamatnes. **Labākā atrašanās vieta:** Lampas tīrītājs dod priekšroku stāvēšanai pilnā saulē uz dienvidiem vērsta loga vai vasarā uz balkona vai dārzā, nedaudz aizsargātā no vēja. **Optimāla aprūpe:** Laistiet bagātīgi ar ūdeni, kurā ir pēc iespējas mazāk kalcija (lietus ūdens), īpaši augšanas un ziedēšanas fāzē, taču izvairieties no ūdens aizsērēšanas (piemēram, šķīvī atlikušā ūdens dēļ). Vislabāk ir apgādāt augu ar šķidru konteineru augu mēslojumu ik pēc 14 dienām no vēla pavasara līdz rudenim. Izbalējušos zarus nedaudz apgrieziet atpakaļ, lai veicinātu jaunu ziedu dīgšanu. **Ziemā:** Rudenī novietojiet augu iekštelpās, pirms nakts temperatūra nokrītās zem 10°C. Ziemā podus vai toveri vislabāk turēt gaišus (jo arī ziemā tie ir zaļi) un vēsus temperatūrā no 5° līdz 10° pēc Celsija, jo šis atpūtas periods veicina ziedēšanu nākamajā gadā. Tagad laistiet mazāk, bet pārliecinieties, ka sakņu kamols neizžūst. No februāra augs pēc tam atkal var būt pēc iespējas saulaināks un siltāks, lai tas agri sāktu ziedēt.



Australijas lempu valiklis

Callistemon citrinus

Cilindriski ziedynai ir citrusai kviepiantys lapai

Viszāļu lempu valiklis žāvi savo efektingai, šepetēliu pīmanānciāis ir cilindriniāis žiedynais ilgais kuokeliāis, kurie nuolat dygsta nuo vēlyvo pavasario iki rudens. Auginānt vazonuose ir kubiluose, pavasarj nesunkiai galima atgal genėti ir apriboti jo augimą iki norimo aukščio. Pakaitiniai, kiek odiški jo lapai atskleidžia, kad jis priklauso mirtų šeimai, išdygus yra sidabriškai plaukuotas ir sutraiškytas šiek tiek kviepia citrusais. Todėl Australijoje jie dažnai dedami į arbatą, kad suteiktų jai gairų aromatą. **Natūrali vieta:** Krūmas, dar žinomas kaip karmino butelių šepetys, kilęs iš pietryčių Australijos valstijų – Naujojo Pietų Vėlso, Kvīnslando ir Viktorijā. Ten jis mėgsta augti pelkėse prie kranto ir palei uolėtus vandens telkinius. **Sėkmingas auginimas:** Auginti iš sėklų patalpose galima ištisus metus. Tiesiog pabarstykite smulkias sėklas ant drėgno auginimo substrato ir tik plonai užberkite žemę. Kultūros indą uždenkite maistine plėvele, kurioje yra skylės. Tai apsaugo dirvą nuo išdžiūvimo. Kas dvi ar tris dienas 2 valandas nuimkite foliją. Tai neleidžia augančioje dirvoje susidaryti pelėsiui. Sėklų vazoną pastatykite šviesioje ir šiltoje vietoje, kurios temperatūra yra 20–25 ° C, o vazono žemė turi būti drėgna, bet ne šlapia. Sudygssta po šešių iki aštuonių savaičių. Beje, vėliau galima dauginėti ir auginiais nuo 10 centimetrų ilgio, vienerių metų bežiedžių šoninių ūglių su seno stiebo gabalėliu prie pagrindo. **Geriausia vieta:** Lempos valiklis mieliau stovi saulėje ant lango į pietus arba vasarą balkone ar sode, šiek tiek apsaugotoje nuo vėjo. **Optimali priežiūra:** Gausiai laistykite vandeniu, kuriame yra kuo mažiau kalcijū (lietaus vandeniu), ypač augimo ir žydėjimo fazėje, tačiau venkite vandens užmirkimo (pvz., dėl vandens likučio lėkštėje). Skystomis konteinerinėmis augalų trąšomis augalą geriausia tiekti kas 14 dienų nuo vėlyvo pavasario iki rudens. Išblukusias šakas šiek tiek apkarpykite atgal, kad pasikaitintumėte naujų gėlių dygimą. **Ziemą:** Rudenį įneškite augalą į patalpą, kol nakties temperatūra nenukrenta žemiau 10 ° C. Ziemą vazonus ar kubilus geriausia laikyti šviesius (nes žiemą taip pat žali) ir vėsiai, esant 5°–10° Celsijaus temperatūrai, nes šis poilsio laikotarpis skatina žydėjimą ateinančiais metais. Dabar laistykite mažiau, bet įsitinkinkite, kad šaknies gniužtė neišdžiūtų. Nuo vasario mėnesio augalas vėl gali būti kuo saulėtesnis ir šiltesnis, kad anksti pradėtų žydėti.



Cleaner tal-bozoz Awstraljan

Callistemon citrinus

Fjorituri fjuri cilindrīci u weraq b'riħa tač-čitru

L-aktar nodfa tal-lampa Evergreen jimpresjona bil-fjorituri tal-fjuri li jidhru, qishom xkupilji u cilindrīci bl-istamens twal tagħhom, li jinbtu kontinwament mill-aħħar tar-rebbiegħa sal-harifa. Meta tikber fi qsari u banjijiet, tista 'fačilment tinqata' lura fir-rebbiegħa u t-kabbir tagħha jista 'jkun limitat għall-gholi mixtieq. Il-weraq supplenti tiegħu, kemmxejn tal-gilda jizvelaw li jappartjeni għall-familja tar-riħan, huma xaghri tal-fidda wara li jkunu nibtu u riħa ftit tač-čitru meta mgħaffġa. Fl-Awstralja huma għalhekk spiss mijzuda mat-tē biex jagħtuħ aroma iġienīci. **Post naturali:** L-arbuxxell, magħruf ukoll bħala carmine bottlebrush, huwa indigēnu għall-istati Awstraljani tax-Xlokk - New South Wales, Queensland uRabat. Hemmhekk iħobb jikber fi swamps ħdejn il-kosta u tul kanali tal-ilma tal-blat. **Kultivazzjoni b'suċċess:** It-tkabbir miż-żrieragħ ġewwa huwa possibbli s-sena kollha. Semplīcment roxx iż-żrieragħ fini fuq sottostrat ta 'tkabbir niedi u tkopri ż-żrieragħ biss irqiq bil-hamrija. Għatti l-bastiment tal-kultura b'cling film, li inti tipprowdi b'toqob. Dan jiproteġi l-hamrija milli tinxef. Għandek tneħħi l-fojl għal sagħtejn kull jumejn jew tlett ijiem. Dan jipprevjeni l-iffurmar tal-moffa fuq il-hamrija li qed tikber. Pogġi l-borma taž-żerriegħa f'post haħif u šhun b'20 sa 25 ° Celsius u žomm il-hamrija tal-qsari niedja iżda mhux imxarra. Il-ġerminazzjoni sseħħ wara wara s-sittasa tmien ġimgħat. Incidentalment, aktar tard tista 'wkoll tipprowpa permezz ta' qatgħat minn 10 centimetru twil, rimjiet tal-ġenb mingħajr fjuri ta 'sena b'biċċa taz-zokk il-qadim fil-baži. **L-aħjar post:** It-tindif tal-lampa jippreferi joqgħod fix-xemx šiħa fuq tieqa li thares lejn in-nofsinar jew, fis-sajf, fuq il-gallarija jew fil-ġnien, kemmxejn protett mir-riħ. **Kura ottimali:** Ilma haħna b'ilma li jkun baxx kemm jista 'jkun fil-ġir (ilma tax-xita), speċjalment matul il-faži tat-tkabbir u l-fjoritura, iżda evita li jxaqleb l-ilma (ež. minħabba l-ilma friegħu fil-saucer). L-aħjar huwa li tformi l-impjant b'fertilizzant tal-pjanti tal-kontenitur likwidu kull jum 14 mill-aħħar tar-rebbiegħa sal-harifa. Aqra ftit friegħi faded lura biex thegħġgħ fjuri godda biex jinbtu. **Fix-xitwa:** Gib l-impjant ġewwa fil-harifa, qabel ma t-temperatura bil-lejl jinżlu taħt l-10° Celsius. Fix-xitwa, l-aħjar qsari jew banjijiet jinżammu jleqqu (għax huma wkoll hodur fix-xitwa) u jibred f'temperatura bejn 5 ° u 10 ° Celsius, minħabba li dan il-perjodu ta 'mistrieħ jippromwovi l-fjoritura fis-sena li ġejja. Ilma inqas issa, imma kun žgur li l-għerūq ma jinxeff. Minn Frar, l-impjant jista 'mbagħad jerga' jkun xemx u šhun kemm jista 'jkun sabieħ jibda jiffjorixxi kmieni.



Australische Lampenreiniger

Callistemon citrinus

Cilindriscie bloeiwijzen en bladeren die naar citrus ruiken

De wintergroene lampenreiniger maakt indruk met zijn opvallende, borstelachtige en cilindervormige bloeiwijzen met hun lange meeldraden, die van de late lente tot de herfst continu drijven. In het geval van potten en potten kan deze in het voorjaar ook zonder problemen krachtig worden teruggesnoeid en daarmee in groei beperkt tot de gewenste hoogte. Zijn afwisselende, ietwat leerachtige bladeren geven aan dat hij tot de mirtenfamilie behoort, zilverachtig behaard is na het ontluiken en een beetje naar citrus ruikt bij wrijven. In Australië worden ze daarom ook vaak aan thee toegevoegd om het een verfrissend aroma te geven. **Natuurlijke locatie:** De struik, ook wel bekend als schoorsteenrood cilinderreiniger, komt oorspronkelijk uit de zuidoostelijke Australische staten - New South Wales, Queensland en Victoria. Daar groeit hij graag in moerassen aan de kust en langs rotsachtige waterlopen. **Succesvolle teelt:** Binnen kweken uit zaden is het hele jaar mogelijk. Strooi de fijne zaden gewoon op een vochtig groeisubstraat en bedek de zaden slechts dun met aarde. Dek de kweekbak af met vershoudfolie, die u van gaten heeft voorzien. Dit beschermt de aarde tegen uitdroging. Om de twee tot drie dagen moet u de film gedurende 2 uur verwijderen. Dit voorkomt schimmelvorming op de teeltgrond. Zet de kweekbak op een lichte en warme plaats met 20 à 25 ° Celsius en houd de kweekgrond vochtig, maar niet nat. Kieming vindt plaats na zes tot acht weken. Overigens kun je later ook opkweken door stekken vanaf 10 centimeter lange, eenjarige, bloemloze zij scheuten met een stukje oude stam aan de basis. **De beste locatie:** De lampenreiniger staat het liefst in de volle zon bij een raam op het zuiden of in de zomer een beetje beschut tegen de wind op het balkon of in de tuin. **Optimale verzorging:** Geef vooral tijdens de groei- en bloeifase royaal water met zo min mogelijk kalkarm (regenwater), maar vermijd wateroverlast (bijvoorbeeld door restwater in de schotel). Van het late voorjaar tot de herfst geeft u de plant het beste elke 14 dagen vloeibare kuipplantmest. Snoei dode takken een beetje weg om nieuwe bloemen te helpen verschijnen. **In de winter:** Zet de plant in de herfst binnen, voordat de nachtemperaturen onder de 10 ° Celsius dalen. In de winter zet je de pot of kuip het beste op een lichte plaats (want in de winter is hij ook groen) en koel bij temperaturen tussen de 5 ° en 10 ° Celsius, omdat deze rustperiode de knopvorming in het komende jaar bevordert. Geef nu minder water, maar pas op dat de kluit niet uitdroogt. Vanaf februari kan de plant weer zo zonnig en warm mogelijk staan zodat hij vroeg gaat bloeien.



Australsk lamperens

Callistemon citrinus

Sylindriske blomsterstander og sitrusduftende blader

Den eviggrønne lamperenser imponerer med sine prangende, børstelignende og cylindriske blomsterstander med sine lange støvbærere, som spirer konstant fra sen vår til høst. Ved dyrking i potter og kar kan den enkelt beskæres tilbage om våren og veksten kan begrænses til ønsket højde. Dens alternative, noe læraktige blader avslører at den tilhører myrtfamilien, er sølvhårete etter at de har spiret og lukter litt sitrus når de knuses. I Australia blir de derfor ofte tilsatt te for å gi den en forfriskende aroma. **Naturlig beliggenhet:** Busken, også kjent som carmine bottlebrush, er hjemmehørende i de sørøstlige australske statene - New South Wales, Queensland og Victoria. Der vokser den gjerne i myrer nær kysten og langs steinete vassdrag. **Vellykket dyrking:** Å dyrke fra frø innendørs er mulig hele året. Dryss ganske enkelt de fine frøene på fuktig vekstsubstrat og dekk frøene bare tynt med jord. Dekk kulturkaret med matfilm, som du forsyner med hull. Dette beskytter jorda mot å tørke ut. Du bør fjerne folien i 2 timer annenhver til tredje dag. Dette forhindrer at det dannes mugg på den voksende jorda. Plasser frøpotten på et lett og varmt sted med 20 til 25° Celsius og hold pottejorda fuktig, men ikke våt. Spiring skjer etter etter seksopptil åtte uker. Senere kan du forøvrig også formere ved stiklinger fra 10 centimeter lange, ett år gamle blomsterløse sideskudd med en bit av den gamle stilken i bunnen. **Den beste beliggenheten:** Lamperenser foretrekker å stå i full sol på et sørvendt vindu eller, om sommeren, på balkongen eller i hagen, litt skjermet for vinden. **Optimal omsorg:** Vann rikelig med vann som er minst mulig kalkfattig (regnvann), spesielt i vekst- og blomstringsfasen, men unngå vannmasser (f.eks. på grunn av restvann i tallerkenen). Det er best å forsyne planten med flytende beholderplantegjødsel hver 14. dag fra sen vår til høst. Beskjær falmende greiner litt tilbake for å oppmuntre nye blomster til å spire. **Om vinteren:** Ta planten innendørs om høsten, før nattetemperaturene faller under 10° Celsius. Om vinteren holdes potter eller kar best lyst (fordi de også er grønne om vinteren) og kjølige ved temperaturer mellom 5° og 10° Celsius, fordi denne hvileperioden fremmer blomstring det kommende året. Vann mindre nå, men pass på at rotklumpen ikke tørker ut. Fra februar kan planten da bli så solrik og varm som mulig igjen slik at den begynner å blomstre tidlig.



Lampki czyszczące

Callistemon citrinus

Cylindryczne kwiatostany i liście pachnące cytrusami

Wiecznie zielona szczytka do butelek w kolorze czerwonym zachwyca efektownymi kwiatostanami w kształcie pędzla i cylindra z długimi włoskami, które nieustannie rosną od późnej wiosny do jesieni. Przechowywany w doniczce lub wannie można go łatwo przyciąć, aby uzyskać pożądaną wysokość rośliny. Alternatywne, skórzaste liście - ujawniające przynależność do roślin Myrtle - mają srebrzyste włosy po rozmnożeniu i mają lekki aromatyczny cytrusowy zapach po zmieleniu. W tym celu w Australii czasami dodaje się liście do herbaty, aby uzyskać świeży aromat. **Naturalne położenie:** Naturalne siedlisko krzewu, znanego również jako Carmine Top Hat Brush, znajduje się w południowo-wschodnich stanach Australii, czyli w Nowej Południowej Walii, Queensland i Wiktorii. Tam można go spotkać na bagnach w pobliżu wybrzeża i wzdłuż skalistych cieków wodnych. **Udana uprawa:** Rozmnażanie nasion w pomieszczeniach jest możliwe przez cały rok. Rozłóż nasiona na wilgotnym kompoście doniczkowym, nałóż niewielką ilość ziemi kompostowej i przykryj pojemnik na nasiona przezroczystą folią, aby zapobiec wysychaniu ziemi. Nie zapomnij zrobić dziur w przezroczystej folii i zdejmować ją co drugi lub trzeci dzień na około 2 godziny. W ten sposób unikniesz tworzenia się pleśni na kompoście doniczkowym. Umieść pojemnik na nasiona w miejscu jasnym i ciepłym o temperaturze od 20 ° C do 25 ° Celsiusza i utrzyjmy ziemię wilgotną, ale nie mokrą. Kiełkowanie rozpoczyna się po sześciu do ośmiu tygodniach. Później istnieje również możliwość rozmnażania z sadzonką przy użyciu 10 cm jednorocznych ślepych pędów bocznych z kawałkiem starej łydgi jako podstawy. **Najlepsza lokalizacja:** Czerwona szczytka do butelek preferuje słoneczne miejsce w pobliżu okna od południa lub nieco osłonięte od wiatru miejsce na balkonie lub w ogrodzie. **Optymalna pielęgnacja:** W okresie wzrostu i kwitnienia należy podawać dużo wody z niedoborem wapna (deszczówka), ale unikać gromadzenia się wody, na przykład w spodku. Od późnej wiosny do jesieni roślina potrzebuje co dwa tygodnie płynnego nawozu dla roślin doniczkowych. Przycinaj zużyte gałęzie, aby podprzeć nowe pędy. **W zimę:** Jesienią musisz przenieść roślinę do wnętrza, zanim nocne temperatury spadną poniżej 10 ° Celsjusza. Zimą najlepiej jest być dobrze oświetlonym i chłodnym z temperaturami od 5 ° do 10 ° Celsjusza. Ta przerwa sprzyja przyszłorocznemu pączkowaniu. Mniej podlewaj rośliny, ale uważaj, aby zakrzepłe korzenie nie wysychały. W lutym doniczkę można już przenieść w słoneczne i ciepłe miejsce w celu wczesnego kwitnienia.



Limpador de lâmpadão australiano

Callistemon citrinus

Inflorescências cilíndricas e folhas com aroma cítrico

O limpador de lâmpadas sempre verde impressiona com suas inflorescências vistosas, em forma de pincel e cilíndricas com seus longos estames, que brotam constantemente do final da primavera ao outono. Ao crescer em vasos e banheiras, pode ser facilmente podado na primavera e seu crescimento pode ser limitado à altura desejada. Suas folhas alternas, um tanto coriáceas, revelam que pertence à família da murta, são prateadas e peludas depois de brotadas e cheiram levemente a frutas cítricas quando esmagadas. Na Austrália, eles são frequentemente adicionados ao chá para dar um aroma refrescante. **Localização natural:** O arbusto, também conhecido como escova de garrafa de carmim, é nativo dos estados do sudeste australiano - Nova Gales do Sul, Queensland e Vitória. Lá gosta de crescer em pântanos perto da costa e ao longo de cursos de água rochosos. **Cultivo bem sucedido:** Cultivar a partir de sementes dentro de casa é possível durante todo o ano. Simplesmente polvilhe as sementes finas no substrato de crescimento úmido e cubra as sementes apenas com terra. Cubra o recipiente de cultura com filme plástico, que você fornece com furos. Isso protege o solo de secar. Você deve remover o papel alumínio por 2 horas a cada dois ou três dias. Isso evita a formação de mofo no solo em crescimento. Coloque o vaso de sementes em um local claro e quente com 20 a 25 ° Celsius e mantenha o solo do vaso úmido, mas não molhado. A germinação ocorre depois de seis a oito semanas. Aliás, mais tarde você também pode propagar por estacas de 10 centímetros de comprimento, brotos laterais sem flores de um ano com um pedaço do caule antigo na base. **A melhor localização:** O limpador de lâmpadas prefere ficar a pleno sol numa janela virada a sul ou, no verão, na varanda ou no jardim, um pouco abrigado do vento. **Cuidado ideal:** Regar abundantemente com água com o menor teor de cálcio possível (água da chuva), especialmente durante a fase de crescimento e floração, mas evitar o encharcamento (por exemplo, devido à água residual no pires). É melhor fornecer à planta fertilizante líquido para plantas a cada 14 dias, do final da primavera ao outono. Podar levemente os galhos desbotados para estimular o surgimento de novas flores. **No inverno:** Traga a planta para dentro de casa no outono, antes que as temperaturas noturnas caiam abaixo de 10° Celsius. No inverno, é melhor manter vasos ou vasos claros (porque também são verdes no inverno) e frescos em temperaturas entre 5° e 10° Celsius, porque esse período de descanso favorece a floração no próximo ano. Regue menos agora, mas certifique-se de que a raiz não seque. A partir de fevereiro, a planta pode voltar a ficar o mais ensolarada e quente possível, para que comece a florescer mais cedo.



Curator De Lampi

Callistemon citrinus

Inflorescențe cilindrice și frunze cu miros de citrice

Curățătorul de veșnic verde impresionează prin inflorescențele sale izbitoare, asemănătoare periei și cilindrice, cu staminele lor lungi, care se deplasează continuu de la sfârșitul primăverii până toamna. În cazul oalelor și găleților, acesta poate fi tăiat în mod viguros primăvara fără probleme și astfel limitat în creștere la înălțimea dorită. Frunzele sale alternative, oarecum piele, indică faptul că aparține familiei de mirt, sunt păroase argintii după înmugurire și miros ușor de citrice atunci când sunt frecate. Prin urmare, în Australia sunt adăugați adesea la ceai pentru a-i conferi o aromă răcoritoare. **Locație naturală:** Arbustul, cunoscut și sub numele de substanță de curățare a cilindrilor roșii, este originar din statele sud-estice australiene - New South Wales, Queensland și Victoria. Acolo îi place să crească în mlaștină de lângă coastă și de-a lungul cursurilor de apă stâncose. **Cultivare de succes:** Cultivarea din semințe în interior este posibilă pe tot parcursul anului. Pur și simplu stropiți semințele fine pe un substrat în creștere umed și acoperiți semințele numai subțire cu sol. Acoperiți vasul de cultivare cu folie alimentară, pe care ați prevăzută-o cu găuri. Acest lucru protejează pământul de uscarea. La fiecare două până la trei zile ar trebui să îndepărtați filmul timp de 2 ore. Acest lucru previne formarea mușgaiului pe solul de cultivare. Așezați vasul de cultivare într-un loc luminos și cald, cu 20-25 ° Celsius și mențineți solul de cultivare umed, dar nu umed. Germinarea are loc după șase până la opt săptămâni. De altfel, vă puteți răspândi ulterior prin butași de la lăstari laterali anuali, fără flori, de 10 cm lungime, cu o bucată de trunchi vechi la bază. **Cea mai bună locație:** Curățătorul pentru lămpi preferă să stea în plin soare lângă o fereastră orientată spre sud sau, vara, puțin la adăpost de vânt pe balcon sau în grădină. **Îngrijire optimă:** Mai ales în timpul fazei de creștere și înflorire, apă cu generozitate, cu apă cât mai scăzută în var (apă de ploaie), dar evitați apariția apei (de exemplu din cauza apei reziduale din farfurie). De la sfârșitul primăverii până toamna, cel mai bine este să furnizați plantei cu îngrășămintă vegetale în containere lichide la fiecare 14 zile. Tundeti usor ramurile moarte pentru a ajuta la apariția florilor noi. **În iarnă:** Aduceți planta în interior toamna înainte ca noaptea temperaturii să scadă sub 10 ° Celsius. Iarna, vasul sau cada este cel mai bine plasat într-un loc ușor (deoarece este și verde iarna) și răcoros la temperaturi cuprinse între 5 ° și 10 ° Celsius, deoarece această perioadă de odihnă promovează înmugurirea în anul următor. Udați mai puțin acum, dar aveți grijă să nu lăsați bila de rădăcină să se usuce. Din februarie înainte, planta poate fi din nou cât mai însoțită și caldă, astfel încât să înceapă să înflorească devreme.



Australiskt Lamprengöringsmedel

Callistemon citrinus

Cylindriska blomställningar och blad som luktar citrus

Den vintergröna lamprengöraren imponerar med sina slående, borstliknande och cylindriska blomställningar med sina långa ståndare, som drivs kontinuerligt från sen vår till höst. När det gäller krukor och skopor kan den också klippas kraftigt på våren utan problem och därmed begränsas i tillväxt till önskad höjd. Dess alternativa, något läderartade löv indikerar att den tillhör myrtfamiljen, är silverhårig efter knopp och har en lätt citrusluktnad när den gnuggas. I Australien läggs de därför ofta till te för att ge det en uppfriskande doft. **Naturligt läge:** Busken, även känd som skorstensrengöringscylinder, är införd i de sydöstra australiensiska staterna - New South Wales, Queensland och Victoria. Där växer det gärna i träsken nära kusten och längs steniga vattendrag. **Framgångsrik odling:** Att odla från frön inomhus är möjligt året runt. Stänk helt enkelt de fina frön på ett fuktigt växande underlag och täck fröna bara tunt med jord. Täck odlingskärlet med plastfolie, som du har försett med hål. Detta skyddar jorden från att torka ut. Varannan till var tredje dag ska du ta bort filmen i två timmar. Detta förhindrar att mögel bildas på odlingsjorden. Placera odlingskärlet på en ljus och varm plats med 20 till 25 ° Celsius och håll odlingsjorden fuktig men inte våt. Spiring sker efter sex till åtta veckor. För övrigt kan du också sprida sig senare genom sticklingar från 10 cm långa, blomliga sidoskott med en bit gammal bagage vid basen. **Den bästa platsen:** Lamprengöraren föredrar att stå i full sol vid ett fönster i söderläge eller på sommaren lite skyddad från vinden på balkongen eller i trädgården. **Optimal vård:** Särskilt under tillväxt- och blomningsfasen, vattna generöst med så låg kalk som möjligt (regnvatten), men undvik vattentätning (till exempel på grund av kvarvarande vatten i fatet). Från slutet av våren till hösten är det bäst att förse växten med flytande gödningsmedel för behållare var 14:e dag. Beskär döda grenar något för att hjälpa nya blommor att dyka upp. **På vintern:** Ta med växten inomhus på hösten innan temperaturen sjunker under 10 ° Celsius. På vintern placeras potten eller badkaret bäst på ett ljust ställe (eftersom det också är grönt på vintern) och svalt vid temperaturer mellan 5 ° och 10 ° Celsius, eftersom denna viloperiod främjar spirande under det kommande året. Vattna mindre nu, men se till att rotkulan inte torkar ut. Från och med februari kan växten bli så solig och varm som möjligt igen så att den börjar blomstra tidigt.



Austrálský čistič lámp

Callistemon citrinus

Valcovité súkvetia a listy s citrusovou vôňou

Čistič vřzdyželených lámp zaujme svojimi nápadnými, kefovými a valcovými súkvetiami s dlhými tyčinkami, ktoré neustále pučia od neskorej jari do jesene. Pri pestovaní v črepníkoch a kadiach sa dá na jar jednoducho zrezať a jeho rast obmedziť na požadovanú výšku. Jeho striedavé, trochu kožovité listy prezrádzajú, že patrí do čelade myrtovitých, po vyklíčení sú striebřisto chlpaté a po rozdrvení jemne voňajú po citrusoch. V Austrálii sa preto často pridávajú do čaju, aby mu dodali osviežujúcu vôňu. **Prirodzená poloha:** Krík, známy aj ako karmínová kefka, pochádza z juhovýchodných austrálskych štátov – Nového Južného Walesu, Queenslandu a Viktorie. Tam rád rastie v močiaroch pri pobreží a pri skalnatých vodných tokoch. **Úspešná kultivácia:** Pestovanie zo semien v interiéri je možné po celý rok. Jemné semenka jednoducho nasypete na vlhký pestovateľský substrát a semenka len natenko prikryte zeminou. Kultivačnú nádobu prikryte potravinovou fóliou, ktorú opatríte otvormi. To chráni pôdu pred vysychaním. Fóliu by ste mali odstraňovať na 2 hodiny každé dva až tri dni. To zabraňuje tvorbe plesní na rastúcej pôde. Črepník umiestnite na svetlé a teplé miesto s teplotou 20 až 25 ° C a udržujte pôdu v črepníku vlhkú, ale nie mokrú. Klíčenje nastáva po šiestej až osem týždňov. Mimochodom, neskôr môžete rozmnožovať aj odrezkami z 10 centimetrových, jednorokých bezkvetých bočných výhonkov s kúskom starej stonky na báze. **Najlepšie umiestnenie:** Čistič lámp radšej stojí na plnom slnku na južne orientovanom okne alebo v lete na balkóne či v záhrade, trochu chránený pred vetrom. **Optimálna starostlivosť:** Zalievajte výdatne vodou s čo najnižším obsahom vápna (daždová voda), najmä počas fázy rastu a kvitnutia, ale vyhnite sa podmačaniu (napr. kvôli zvyškovej vode v tanieriku). Od konca jari do jesene je najlepšie každých 14 dní dodávať rastline tekutú hnojivo na kontajnerové rastliny. Vyblednuté konáre mierne ostrihajte späť, aby ste podporili klíčenje nových kvetov. **V zime:** Preneste rastlinu do interiéru na jeseň, kým nočné teploty neklesnú pod 10 ° C. V zime je najlepšie udržiavať hrnce alebo vane svetlé (pretože sú aj v zime zelené) a chladí pri teplotách medzi 5 ° a 10 ° Celzia, pretože toto obdobie odpočinku podporuje kvitnutie v nasledujúcom roku. Teraz zalievajte menej, ale uistite sa, že koreňový bal nevyschne. Od februára potom môže byť rastlina opäť maximálne slnečná a teplá, aby začala skoro kvitnúť.



Avstralsko čistilo za svetilke

Callistemon citrinus

Cilindrična socvetja in listi z vonjem po citrusih

Zimzelena svetilka navdušuje s svojimi čokatimi in valjastimi socvetji z dolgimi prašniki, ki nenehno poganjajo od pozne pomladi do jeseni. Pri gojenju v loncih in kadeh ga spomladi enostavno porežemo in mu omejimo rast na želeno višino. Njegovi nadomestni, nekoliko usnjati listi razkrivajo, da pripada družini mirt, so po vzklju srebro dlakavi in zdrobljeni rahlo dišijo po citrusih. V Avstraliji jih zato pogosto dodajajo čaju, da mu dajo osvežilno aromo. **Naravni habitat:** Grm, znan tudi kot karminska bottlebrush, izvira iz jugovzhodnih avstralskih zveznih držav – Novega Južnega Walesa, Queenslanda in Viktorije. Tam rád raste v močvirjih ob obali in ob kamnitih vodotokih. **Navodila za gojenje:** Gojenje iz semen v zaprtih prostorih je možno vse leto. Preprosto potresite drobna semena na vlažen rastni substrat in semena le na tanko pokrijte z zemljo. Posodo z kulturo pokrijte s folijo za živila, ki jo opremite z luknjami. To štíti tla pred izsušitvijo. Vsake dva do tri dni za 2 uri odstranite folijo. S tem preprečimo nastanek plesni na rastni zemlji. Lonček s semeni postavite na svetlo in toplo mesto s temperaturo od 20 do 25 ° C, zemlja v lončku pa naj bo vlažna, vendar ne mokra. Kaljenje se pojavi po šestih do osem tednov. Mimogrede, pozneje lahko razmnožite tudi s potaknjenci iz 10 centimetrov dolgih enoletnih brezcvetnih stranskih poganjkov s koščkom starega stebela pri dnu. **Najboljša lokacija:** Svetilka najraje stojí na soncu na oknu, obrnjenem proti jugu, poleti pa na balkonu ali na vrtu, nekoliko zaščitena pred vetrom. **Optimalna nega:** Obilno zalivajte z vodo, ki vsebuje čim manj apna (deževnica), zlasti v fazi rasti in cvetenja, vendar se izogibajte zalivanju (npr. zaradi ostankov vode v posodi). Najbolje je, da rastlino od pozne pomladi do jeseni vsakih 14 dni oskrbujete s tekočim rastlinskim gnojilom v posodah. Odcvetele veje rahlo obrežite nazaj, da spodbudite poganjanje novih cvetov. **V zimskem času:** Jeseni rastlino prenesite v prostor, preden nočne temperature padejo pod 10 ° C. Pozimi je najbolje, da so lonci ali kadi na svetlem (ker so tudi pozimi zeleni) in na hladnem pri temperaturah med 5° in 10° Celzija, saj ta čas mirovanja pospešuje cvetenje v prihodnjem letu. Zdaj manj zalivajte, vendar pazite, da se koreninska gruda ne izsuši. Od februara je potem lahko rastlina spet čim bolj sončna in topla, da začne zgodaj cveteti.



Árbol del cepillo

Callistemon citrinus

Inflorescencia en forma de cilindro y hojas con fragancia a limón

El árbol del cepillo, siembre de color verde, seduce con su llamativa inflorescencia con flores en forma de cepillos y sus filamentos alargados, que desde finales de la primavera hasta otoño brotan en un continuo. Si se cultiva el árbol del cepillo en maceta se puede podar bien en primavera y mantener su crecimiento limitado al tamaño deseado. Sus hojas alternas, ligeramente coriáceas desvelan su pertenencia a la familia del Mirto. Las hojas después de brotar son algo vellosas, de color plateado y huelen a limón al frotarlas ligeramente. En Australia se mezclan las hojas con Tee para darle un aroma refrescante. **Ubicación natural:** El lugar natural del arbusto también llamado Limpia tubos, se sitúa al Suroeste de Australia - New South Wales, Queensland y Victoria. Ahí crece en pantanos cerca de la costa y a lo largo de rocosas corrientes de agua. **Cultivo exitoso:** La semilla se puede criar en interior durante todo el año. Esparza las semillas sobre el sustrato húmedo y cúbralas con un poco de tierra. Cubre el recipiente de cultivo con un film transparente y agujeréelo. Así protegerá la tierra de la desecación. Para evitar la putrefacción del sustrato retire el film cada dos o tres días durante 2 horas. Coloque el recipiente de cultivo en un lugar luminoso y cálido entre 20 y 25 grados y mantenga el sustrato húmedo, pero no mojado. La germinación se producirá a las seis a ocho semanas de su plantación. Más adelante puede reproducir el arbusto a través de rebrotes laterales sin hojas, de 10 centímetros y con un trozo del tronco de la base. **La mejor ubicación:** El limpia tubos prefiere lugares soleados, ventanas orientadas al Sur o en verano en un sitio protegido del viento, en la terraza o jardín. **Cuidado óptimo:** Riegue el arbusto en abundancia sobre todo durante el crecimiento y la inflorescencia, con agua sobre en cal (agua de lluvia), pero evite anegación (por ejemplo agua residual en el platillo). Suministre a la planta desde finales de primavera hasta otoño cada 14 días, fertilizante líquido para macetas. Pode las ramas marchitadas ligeramente, para promover el brote de nuevas flores. **En el invierno:** En otoño debe entrar la planta al interior, antes de que las temperaturas nocturnas caigan por debajo de 10°. En invierno se aconseja mantener la planta en un lugar luminoso, ya que también en esta época del año está verde, y con temperaturas de entre 5 a 10 grados. Este periodo de descanso le viene muy bien a la planta y favorece una inflorescencia abundante para el verano siguiente. Rieguelo ahora menos, pero evite la desecación del cepellón. A partir de febrero puede permanecer la planta otra vez, en un lugar lo más soleado y cálido posible, así comenzarán a brotar las flores pronto.



Australský čistič lamp

Callistemon citrinus

Válcová květenství a listy vonící po citrusech

Stálezelený čistič lamp zaujme nápadnými, kartáčovitými a válcovitými květenstvími s dlouhými tyčinkami, které neustále raší od konce jara do podzimu. Při pěstování v květináčích a vanách ji lze snadno na jaře zpět seříznout a její růst omezit na požadovanou výšku. Jeho střídavé, poněkud kožovité listy prozrazují, že patří do čeledi myrtovitých, po vyrašení jsou střibřité chlupaté a po rozdrčení voní po citrusech. V Austrálii se proto často přidávají do čaje, aby mu dodaly osvěžující aroma. **Přirozená poloha:** Keř, známý také jako carmine bottlebrush, pochází z jihovýchodních australských států – New South Wales, Queensland a Viktorie. Tam s oblibou roste v bažinách poblíž pobřeží a podél skalnatých vodních toků. **Úspěšné pěstování:** Pěstování ze semínke v interiéru je možné po celý rok. Jemná semínka jednoduše nasypete na vlhký pěstební substrát a semínka jen tence zasypete zemínou. Kulturační nádobu zakryjte potravinářskou fólií, kterou opatříte otvory. To chrání půdu před vysycháním. Fólii byste měli odstranit na 2 hodiny každé dva až tři dny. Tím se zabrání tvorbě plísní na rostoucí půdě. Umístěte květináč na světlé a teplé místo s teplotou 20 až 25 °C a udržujte půdu v květináči vlhkou, ale ne mokrou. Klíčení nastává po šestá až osm týdnů. Ostatně později můžete množit i řízkováním z 10 centimetrů dlouhých jednoletých postranních výhonů s kouskem starého stonku na bázi. **Nejlepší umístění:** Čistič lamp nejraději stojí na plném slunci na jižně orientovaném okně nebo v létě na balkóně či na zahradě, poněkud chráněný před větrem. **Optimální péče:** Zalévejte hojně vodou s co nejmenším obsahem vápna (dešťová voda), zejména během fáze růstu a květu, ale vyhněte se přemokření (např. kvůli zbytkové vodě v podšálku). Od konce jara do podzimu je nejlepší každých 14 dní dodávat rostlině kapalně hnojivo pro kontejnerové rostliny. Vybledlé větve mírně seřízněte, abyste podpořili rašení nových květů. **V zimě:** Přeneste rostlinu dovnitř na podzim, než noční teploty klesnou pod 10 °C. V zimě je nejlepší udržovat květináče nebo kádě světlé (protože v zimě jsou také zelené) a chladit při teplotách mezi 5 ° a 10 ° Celsia, protože tato doba odpočinku podporuje kvetení v příštím roce. Nyní zalévejte méně, ale ujistěte se, že kořenový bal nevysychá. Od února pak může být rostlina opět co nejvíce slunečná a teplá, aby začala brzy kvést.



Avustralya lamba temizleyici

Callistemon citrinus

Silindirik çiçek salkımları ve narenciye kokulu yapraklar

Yaprak dökmeyen lamba temizleyici, ilkbaharın sonlarından sonbahara kadar sürekli olarak filizlenen uzun organlarındaki gösterişli, fırça benzeri ve silindirik çiçek salkımlarıyla etkileyicidir. Saksı ve küvetlerde yetiştirilirken ilkbaharda kolayca budanabilir ve büyümesi istenilen boyda sınırlandırılabilir. Alternatif, biraz kösele gibi yaprakları, mersin ailesine ait olduğunu, filizlendikten sonra gümüşü tüylü olduğunu ve ezildiğinde hafif narenciye koktuğunu ortaya koyuyor. Avustralya'da bu nedenle genellikle çaya ferahlatıcı bir aroma vermek için eklenirler. **Doğal konum:** Karmin şişe fırçası olarak da bilinen çalı, güneydoğu Avustralya eyaletlerine - Yeni Güney Galler, Queensland ve Victoria. Orada kıyıya yakın bataklıklarda ve kayalık su yollarında büyümeyi sever. **Başarılı yetiştirme:** İç mekanlarda tohumlardan büyüme tüm yıl boyunca mümkündür. İnce tohumları nemli büyüyen alt tabakaya serpin ve tohumları toprakla çok ince bir şekilde örtün. Kültür kabının üzerini delikler açtığınız streç film ile kapatın. Bu, toprağın kurumasını önler. Folyoyu her iki ila üç günde bir 2 saat çıkarmalısınız. Bu, büyüyen toprakta küf oluşumunu önler. Tohum saksısını 20 ila 25°C sıcaklıkta hafif ve sıcak bir yere koyun ve saksı toprağını nemli tutun ama ıslak değil. Çimlenme altından sonra gerçekleşirsekiz haftaya kadar. Bu arada, daha sonra, 10 santimetre uzunluğundaki bir yıllık çiçeksiz yan sürgünlerden, tabanda eski gövdenin bir parçası ile kesimler yaparak da çoğaltabilirsiniz. **En iyi konum:** Lamba temizleyici, güneye bakan bir pencerede veya yaz aylarında balkonda veya bahçede, rüzgardan biraz korunaklı olarak tam güneş altında durmayı tercih eder. **Optimum bakım:** Özellikle büyüme ve çiçeklenme aşamasında mümkün olduğu kadar az kireç içeren suyla (yağmur suyu) bolca sulayın, ancak su birikmesinden kaçının (örn. tabakta kalan su nedeniyle). Bitkiyi ilkbahar sonundan sonbahara kadar her 14 günde bir sıvı kap bitki gübresi vermek en iyisidir. Yeni çiçeklerin filizlenmesini teşvik etmek için solmuş dalları hafifçe budayın. **Kışın:** Bitkiyi sonbaharda, gece sıcaklıkları 10°C'nin altına düşmeden önce iç mekana getirin. Kışın, saksılar veya küvetler en iyi şekilde parlak tutulur (çünkü kışın da yeşildirler) ve 5° ile 10° Santigrat arasındaki sıcaklıklarda serin tutulur, çünkü bu dinlenme süresi bir sonraki yıl çiçeklenmeyi destekler. Şimdi daha az sulayın, ancak kök topunun kurumadığından emin olun. Şubat ayından itibaren bitki, erken çiçeklenmeye başlaması için mümkün olduğu kadar güneşli ve sıcak olabilir.



Ausztrál lámpatisztító

Callistemon citrinus

Hengeres virágzat és citrusillatú levelek

Az örökzöld lámpatisztító mutató, ecetszerű és hengeres virágzatával nyűgöz le hosszú porzóival, amelyek késő tavasztól őszi folyamatosan sarjadnak. Cserépbén, dézsában természetve tavasszal könnyen visszametszhető, növekedése a kívánt magasságra korlátozható. Változó, kissé borszerű levelei arról árulkodnak, hogy a mirtuszfélek családjába tartozik, kihajtásuk után ezüstösen szőrös, összetörve pedig enyhe citrusillatú. Ausztráliában ezért gyakran adják a teahez, hogy frissítő aromát adjanak. **Természetes elhelyezkedés:** A cserje, más néven karmin palackkefe, őshonos Ausztrália délkeleti államaiban - Új-Dél-Walesben, Queenslandben és Victoria. Ott szívesen nő a parthoz közeli mocsarakban és a sziklás vízfolyások mentén. **Sikeres termesztés:** A beltéri magvak termesztése egész évben lehetséges. Egyszerűen szórja a finom magvakat a nedves természetföldre, és csak vékonyan takarja be a magokat talajjal. Fedje le a tenyészedényt ragasztófoliával, amelyet lyukakkal lát el. Ez megvédi a talajt a kiszáradástól. A fóliát két-három naponta 2 órára le kell venni. Ez megakadályozza a penészképződést a növekvő talajon. Helyezze a magcserepet világos és meleg helyre, ahol a hőmérséklet 20-25°C, és a virágföldet tartsa nedvesen, de ne nedvesen. A csírázás hat után következnek belegfeljebb nyolc hétig. A későbbiekben egyébként 10 centiméter hosszú, egyéves virágtalan oldalhajtásokról dugványokkal is szaporítható, tövénél a régi szár egy darabjával. **A legjobb hely:** A lámpatisztító szívesebben áll napsütésben déli fekvésű ablakon, vagy nyáron az erkélyen vagy a kertben, a szélől védve. **Optimális gondozás:** Bőségesen öntözze a lehető legmérszégényebb vízzel (esővíz), különösen a növekedési és virágzási szakaszban, de kerülje el a vizesedést (például a csészéaljban lévő maradék víz miatt). A legjobb, ha a növényt késő tavasztól őszi 14 naponta folyékony konténeres műtrágyával látjuk el. Enyhén metssze vissza a kifakult ágakat, hogy ösztönözze az új virágok kihajtását. **Télen:** Vidd be a növényt ősszel, mielőtt az éjszakai hőmérséklet 10 Celsius fok alá csökken. Télen a cserepeket vagy dézsákat a legjobb, ha világosban (mert télen zöldek is) és 5°C és 10°C közötti hűvös helyen tartják, mert ez a pihenőidő elősegíti a következő évi virágzást. Most kevesebbet öntözzünk, de ügyeljünk arra, hogy a gyökérgolyó ne száradjon ki. Februártól újra a lehető legnaposabb és melegebb lehet a növény, hogy korán virágozzon.

• • • • •



ハナマキ

Callistemon citrinus

円筒状で心地よい柑橘系の香りを放つ花

常緑樹のこの植物は春の晩から秋にかけて成長を続け、印象的なブラシ状の花を咲かせます。鉢植えにすることで、好きな高さに簡単に剪定が可能です。ギンバイカに属するこの植物の葉は皮質で心地よい柑橘系の香りを放ちます。そのため、オーストラリアではこの葉をお茶などに加えて楽しめます。

自然な場所:

生息地はニューサウスウェールズ州、クイーンズランド州、ビクトリア州のオーストラリア南東部です。海岸近くの沼地や岩場で見られます。

栽培成功:

種子繁殖は室内で年間を通して可能です。湿った用土に種をまき、その上から少量の用土をかぶせます。乾燥を防ぐためサランラップなどの透明フィルムでカバーします。透明フィルムには空気穴をいくつかあけ、2~3日に1回は約2時間、完全にフィルムを鉢から外します。そうすることで、カビの発生を防ぎます。20°C~25°Cの明るく暖かい場所に置き、用土は湿った状態に保ちます。6~8週間後に発芽します。1年後には10cmほどの若い枝を使って接木で増やす事も可能です。

最高のロケーション: 南向きの日当たりの良い場所やベランダまたは庭の風の当たらない場所を好みます。

最適なケア:

成長期や開花期には石灰の含有量が少ない水(雨水)をたくさん与えますが、鉢の受皿に水が溜まるのは避けます。春から秋にかけては液体肥料を2週間ごとに与えます。成長を促すために剪定を行います。

冬に:

秋ごろ夜間の気温が10°C以下になる前に鉢を屋内に移動します。冬は5°C~10°Cくらいの明るい場所に保管するのが最適です。この時期にしっかり休ませることが来年の発芽につながります。水やりは少なめにしますが、根が乾燥しないように注意します。2月には、日当たりの良い暖かい場所に鉢を移動することができます。

SKU: 12326 / Australischer Lampenputzer