



SAFLAX®



Tips



Forest and Kim Starr - CC-BY-3.0

Musa X paradisiaca

	 Български	BG	 2		 Malti	MT	 5
	 Dansk	DK	 2		 Nederlands	NL	 5
	 Deutsch	DE	 2		 Norsk	NO	 6
	 English	UK	 2		 Polski	PL	 6
	 Eesti	EE	 3		 Português	PT	 6
	 Suomalainen	FI	 3		 Românesc	RO	 6
	 Français	FR	 3		 Svenska	SE	 7
	 Ελληνική	GR	 3		 Slovensky	SK	 7
	 Gaeilge	IE	 4		 Slovenski	SI	 7
	 íslenskur	IS	 4		 Español	ES	 7
	 Italiano	IT	 4		 Český	CZ	 8
	 Hrvatski	HR	 4		 Türkçe	TR	 8
	 Latviešu	LV	 5		 Magyar	HU	 8
	 Lietuvių kalba	LT	 5		 日本語	JP	 9



Голям живовляк

Musa X paradisiaca

Моята собствена бананова плантация

Многогодишният, бавно растящ ядлив банан достига зрялост на цъфтеж на височина от два до три метра и на възраст от три години. Цветовете излизат от центъра на стъблото с червена здрава пъпка, от която излизат вихри от бели цветя, докато цветната дръжка продължава да се удължава. Златистожълтите плодове са без семена. Плододаващото псевдостъбло, образувано само от листните обвивки, след това умира, но от корена растат нови издънки. Първоначално от Югоизточна Азия, истинският плодов банан е една от оригиналните форми на съвременния плодов банан. В старите енциклопедии са били познати и под името райска смокиня или маркуча ябълка. Знаете ли, че живовлякът расте в посока обратна на слънцето и така запазва формата си. **Естествено местоположение:** Бананът произхожда от островите в Югоизточна Азия. **Успешно отглеждане:** Отглеждането от семена на закрито е възможно през цялата година. За да се повиши кълняемостта на семената, те трябва първо да се нагрубят с шкурка или пила и след това да се оставят да набъбнат във вода при стайна температура за 12 часа. След това натиснете семето във влажната саксийна почва и само леко покрийте семето с саксийна почва. Опънете хранително фолио върху съда с култура и пробийте няколко дупки във фолиото. Това предпазва почвата от изсушаване. Поставете саксията със семена на светло и топло място с 25 до 30° по Целзий (напр. над нагревателя) и поддържайте почвата влажна, но не мокра. Тогава обикновено са необходими около три до десет седмици, за да покълнат. **Най-доброто местоположение:** За да може вашият банан да завърже плодове, най-добре е да стои на светло място с повишена влажност и не под 16° по Целзий. Може да лети и на открито на полусенчесто и топло място. Защитените от вятър места в близост до топлозадържаща стена са идеални. Силните ветрове често разкъсват листата, което прави банана малко по-малко привлекателен. **Оптимална грижа:** Младите растения се прехвърлят най-добре в голяма кофа след шест до осем седмици. За по-добър растеж трябва да добавите 25% пясък към почвата. Нуждата от вода е голяма през летните месеци - но избягвайте преовлажняване, за да не повредите месестите корени. От април до октомври се препоръчва торене с течен тор за растения на всеки две седмици. **През зимата:** Бананите зимуват най-добре при 15° до 18° по Целзий - температурата никога не трябва да пада под 10° по Целзий. Редовното пръскане с вода, която е възможно без варовик, предпазва от нашествия на вредители. Новият растеж започва отново през април.



Stor plantain

Musa X paradisiaca

Min egen bananplantage

Den flerårige, langsomt voksende spiselige banan når blomstrende modenhed i en højde på to til tre meter og en alder på tre år. Blomsterne kommer frem fra midten af stilken med en rød kraftig knop, hvorfra der kommer hvirvler af hvide blomster ud, mens blomsterstilkene fortsætter med at blive længere. De gyldengule frugter er uden frø. Den frugtende pseudostamme, der kun dannes af bladskeuderne, dør derefter, men nye skud vokser fra roden. Oprindeligt fra Sydøstasien er den ægte frugtbanan en af de oprindelige former for den moderne frugtbanan. I gamle leksika var de også kendt under navnet paradisisgen eller huseæble. Vidste du, at plantains er relateret til dinkvokse i retning af solen og dermed bevare deres form. **Naturlig beliggenhed:** Bananen har sin oprindelse i de sydøstasiatiske øer. **Succesfuld dyrkning:** Dyrkning fra frø indendørs er muligt hele året rundt. For at øge spireevnen af frøene bør de først gøres ru med sandpapir eller en fil og derefter lades svulme op i vand ved stuetemperatur i 12 timer. Skub derefter frøet ind i fugtig pottejord og kun let dække frøene med pottejord. Stræk husholdningsfilm over dyrkningskarret og prik et par huller i filmen. Dette beskytter jorden mod udtørring. Stil frøpotten et let og varmt sted med 25 til 30° Celsius (f.eks. over varmeren), og hold pottejorden fugtig, men ikke våd. Det tager så normalt omkring tre til ti uger at spire. **Den bedste beliggenhed:** For at din banan kan sætte frugt, er det bedst at stå et lyst sted med øget luftfugtighed og ikke under 16° Celsius. Den kan også tilbringe sommeren udendørs på et halvskygget og varmt sted. Vindbeskyttede steder nær en varmemholdende væg er ideelle. Stærk vind river ofte bladene, hvilket gør bananen lidt mindre attraktiv. **Optimal pleje:** Unge planter overføres bedst til en stor spand efter seks til otte uger. For bedre vækst bør du tilføje 25% sand til jorden. Vandbeholdet er højt i sommermånederne - men undgå vandfyldning for ikke at skade de kødfulde rødder. Det anbefales at gøde med flydende karplantegødning hver anden uge fra april til oktober. **Om vinteren:** Bananer går bedst i dvale ved 15° til 18° Celsius - temperaturen må aldrig falde under 10° Celsius. Regelmæssig sprøjtning med vand, der er så kalkfrit som muligt, beskytter mod skadedyrsangreb. Ny vækst starter igen i april.



Große Essbanane

Musa X paradisiaca

Meine eigene Bananenplantage

Die mehrjährige, langsam wachsende Essbanane erreicht ihre Blühreife bereits bei einer Höhe von zwei bis drei Metern und einem Alter von drei Jahren. Die Blüten entwachsen der Stammitte mit einer roten dicken Knospe, aus der sich Wirbel weißer Blüten entfalten, während der Blütenstiel sich immer weiter verlängert. Die goldgelben Früchte sind samenlos. Der fruchttragende Scheinstamm, der nur aus den Blattscheiden gebildet wird, stirbt dann ab, aber aus der Wurzel erwachsen neue Schößlinge. Die ursprünglich aus Südostasien stammende echte Fruchtbanane ist eine der Ursprungsformen der modernen Fruchtbanane. In alten Encyclopädien kannte man sie auch unter dem Namen Paradiesfeige oder Schlauchapfel. Wussten Sie, dass Essbananen sich mit Ihrer Wuchsrichtung der Sonne entgegen krümmen und damit ihre Form erhalten. **Naturstandort:** Ihren Ursprung hat die Banane in der südostasiatischen Inselwelt. **Anzucht:** Im Haus ist die Anzucht aus Samen das ganze Jahr über möglich. Um die Keimfähigkeit der Samen zu erhöhen, sollten sie zunächst mit Sandpapier oder einer Feile angeraut werden und danach für 12 Stunden in Wasser bei Raumtemperatur anquellen können. Drücken Sie den Samen dann in die feuchte Anzuchterde und bedecken Sie das Saatgut nur leicht mit Anzuchtsubstrat. Spannen Sie Klarsichtfolie über das Anzuchtgefäß und stechen Sie einige Löcher in die Folie. So ist die Erde vor Austrocknung geschützt. Stellen Sie das Anzuchtgefäß an einen hellen und warmen Ort mit 25 bis 30° Celsius (zum Beispiel über die Heizung) und halten Sie die Anzuchterde feucht, aber nicht nass. Bis zur Keimung dauert es dann gewöhnlich ungefähr drei bis zehn Wochen. **Standort:** Damit Ihre Essbanane Früchte ansetzen kann, steht sie am besten hell bei erhöhter Luftfeuchtigkeit und nicht unter 16° Celsius. Den Sommer kann sie auch im Freien an einem halbschattigen und warmen Platz verbringen. Ideal sind windgeschützte Standorte in der Nähe einer wärmespeichernden Mauer. Starker Wind zerreißt oft die Blätter, was die Banane etwas unansehnlicher macht. **Pflege:** Jungpflanzen werden am besten nach sechs bis acht Wochen in einen großen Kübel umgesetzt. Für ein besseres Wachstum sollten Sie der Erde 25% Sand beimischen. Der Wasserbedarf ist in den Sommermonaten hoch - vermeiden Sie aber Staunässe, um die fleischigen Wurzeln nicht zu schädigen. Eine Düngung mit flüssigem Kübelpflanzendünger im Abstand von zwei Wochen ist von April bis Oktober empfehlenswert. **Im Winter:** Am besten überwintert die Banane hell bei 15° bis 18° Celsius - unter 10° Celsius sollte die Temperatur keinesfalls fallen. Regelmäßiges Besprühen mit möglichst kalkfreiem Wasser schützt vor Schädlingsbefall. Der Neuaustrieb setzt im April wieder ein.



Common Banana

Musa X paradisiaca

My own Banana plantation

The perennial and slow-growing Common Banana reaches flowering maturity after three years with a height of two to three meters. The flowers come out of the center of the stem with big reddish buds that deploy a swirl of white blossoms, while the flower stalk keeps constantly growing. The yellow fruits are seedless. The fruit-bearing pseudo-stem that is solely formed by leaf sheaths, will die off, but new seedlings will sprout from the root. The in South East Asia originating Common Banana is one of the aboriginal forms of today's Fruit Banana. In old encyclopaedias it is also known by other names, such as Dessert Banana. Did you know that the banana gets its bend form because it grows towards the sun? **Natural location:** Originally the Common Banana comes from the Island regions of South East Asia. **Successful cultivation:** Seed propagation indoors is possible throughout the year. To increase the germinability, you can slightly roughen the seed with a soft file or a piece of sandpaper and place it in warm water for about 12 hours for priming. Then, press the seeds into moist potting compost, put just a little compost earth on top and cover the seed container with clear film to prevent the earth from drying out. Don't forget to make some holes in the clear film and take it every second or third day completely off for about 2 hours. That way you avoid mold formation on your potting compost. Place the seed container somewhere bright and warm (for instance near a heater) with a temperature between 25°C and 30°C and keep the earth moist, but not wet. Depending on the propagation temperature, the first seedlings will come up after three to ten weeks. **The best location:** The Common Banana is best kept at a bright place with a high humidity and a minimum temperature of 16° Celsius. In the summer time it can also be placed outdoors in a half-shaded and warm spot. Wind-protected places near a heat-preserving wall are perfect. Strong wind can tear the leaves and spoils the look of your banana plant. **Optimal care:** Young plants are best potted in a big tub after six to eight weeks. To enhance growth you should mix the earth with 25% sand. During summer, the Common Banana needs plenty of water - but avoid waterlogging so the fleshy roots don't take any damage. From April until October it is advisable to give fluid fertilizer for tub plants every two weeks. **In the winter:** The Common Banana hibernates best at a bright place with a temperature around 15° to 18° Celsius. It doesn't tolerate temperatures below 10° Celsius. To prevent pest infestation you should spray the plant regularly with lime-deficient water. In April it will sprout again.



Suur jahubanaan Musa X paradisiaca Minu enda banaaniistandus

Mitmeaastane, aeglaselt kasvav söödav banaan saab öitsemisküpseks kahe-kolme meetri kõrgusel ja kolmeaastaselt. Lilled väljuvad varre keskelt punase jämeda pungaga, millest väljuvad valgete õite keirised, samal ajal kui õievars pikeneb. Kuldkollased viljad on seemneteta. Vaid lehekodariketest moodustunud viljaline pseudostem isis hukkub, kuid juurest kasvavad uued võrsed. Algselt Kagu-Aasiast pärit tõeline puuviljabanaan on tänapäevase puuviljabanaani üks algupäraseid vorme. Vanades entsüklopeediatest tunti neid ka paradiisi viigimarja või voolikuõuna nime all. Kas teadsite, et jahubanaanid on seotud teiekasvavad päikese suunas ja säilitavad seeläbi oma kuju. **Looduslik asukoht:** Banaanid pärilolu on Kagu-Aasia saartel. **Edukas kasvatamine:** Seemnetest siseruumides kasvatamine on võimalik aastaringselt. Seemnete idanemisvõime suurendamiseks tuleks need esmalt liivapaberi või viiliga karestada ja seejärel 12 tunniks toatemperatuuril vette paisuda. Seejärel suruge seeme sisse niisket potimuld ja katke seemned ainult kergelt poimullaga. Venitage kultuurianuma kohale toidukile ja torkake kilesse mõned augud. See kaitseb mulda kuivamise eest. Asetage külvipott valgusküllasesse ja sooja kohta, kus on 25–30 °C (nt küttekeha kohale) ja hoidke istutusmuld niiske, kuid mitte märjana. Tavaliselt kulub idanemiseks umbes kolm kuni kümme nädalat. **Parim asukoht:** Selleks, et banaan hakkaks vilja kandma, on kõige parem seista valgusküllases kohas, kus on kõrge õhuniiskus ja mitte alla 16 °C. Suvitada võib ka õues poolvarjulises ja soojas kohas. Ideaalsed on tuule eest kaitstud kohad soojust hoidva seina lähedal. Tugev tuul rebib sageli lehti, muutes banaani vähem atraktiivseks. **Optimaalne hooldus:** Noored taimed viiakse kõige paremini suurde ämbrisse kuue kuni kaheksa nädala pärast. Parema kasvu tagamiseks tuleks mulda lisada 25% liiva. Suvekuudel on veevajadus suur, kuid vältige vettimist, et mitte kahjustada lihavaid juuri. Vätada vedela vannitaimeväetisega iga kahe nädala järel aprillist oktoobrini. **Talvel:** Banaanid magavad talveunes kõige paremini 15–18 °C juures – temperatuur ei tohiks kunagi langeda alla 10 °C. Regulaarne pritsimine võimalikult lubjavaba veega kaitseb kahjurite nakatumise eest. Uus kasv algab uuesti aprillil.



Iso jauhobanaani Musa X paradisiaca Oma banaaniviljelmäni

Monivuotinen, hitaasti kasvava syötävä banaan saavuttaa kukinnan 2–3 metrin korkeudessa ja kolmen vuoden iässä. Kukat nousevat ulos varren keskelt punaisella jäykällä silmulla, josta nousee valkoisten kukkien pyörteitä kukkavarren pitkittyessä. Kullankeltaiset hedelmät ovat siemenettömiä. Ainoastaan lehtien tupeista muodostuva hedelmällinen pseudosarsi kuolee sitten, mutta juuresta kasvaa uusia versoja. Alun perin Kaakkois-Aasiasta kotoisin oleva todellinen hedelmäbanaan on yksi nykyaikaisen hedelmäbanaanin alkuperäisistä muodoista. Vanhoissa tietosanakirjoissa ne tunnettiin myös nimellä paratiisi viikuna tai letkuomena. Tiesitkö, että jauhobanaanit liittyvät sinunkasvavat auringon suuntaan ja säilyttävät siten muotonsa. **Luonnollinen sijainti:** Banaan on peräisin Kaakkois-Aasian saarilta. **Onnistunut viljely:** Kasvatus siemenistä sisätiloissa on mahdollista ympäri vuoden. Siementen itämiskyvyn lisäämiseksi ne tulee ensin karhenta hiekkapaperilla tai viilalla ja antaa sitten turvota veteen huoneenlämmössä 12 tuntia. Työnnä sitten siemen sisään kosteaa istutusmaata ja peitä siemenet vain kevyesti istutusmultalla. Venytä elintarvikekalvo viljelyastian päälle ja pistele kalvoon muutamia reikiä. Tämä suojaa maaperää kuivumiselta. Aseta siemenruukku valoisaan ja lämpimään paikkaan, jossa lämpötila on 25–30 °C (esim. lämmittimen päälle) ja pidä ruukku kosteana, mutta ei märkänä. Itäminen kestää yleensä noin kolmesta kymmeneen viikkoa. **Paras sijainti:** Jotta banaanisi kypsyisi, on parasta seistä valoisassa paikassa, jossa on lisääntynyt kosteus eikä alle 16 °C. Se voi myös viettää kesän ulkona puolivarjoisessa ja lämpimässä paikassa. Tuulelta suojatut paikat lämpöä pidättävän seinän lähellä ovat ihanteellisia. Voimakas tuuli repii usein lehtiä, mikä tekee banaanista vähemmän houkuttelevan. **Optimaalinen hoito:** Nuoret kasvit siirretään parhaiten suureen ämpäriin kuuden tai kahdeksan viikon kuluttua. Paremman kasvun saavuttamiseksi lisää 25% hiekkaa maaperään. Kesäkuukausina veden tarve on korkea – mutta vältä kastumista, jotta lihaist juuret eivät vahingoitu. Lannoitus nestemäisellä kylväkasvien lannoitteella kahden viikon välein on suositeltavaa huhtikuusta lokakuuhun. **Talvella:** Banaanit talvehtivat parhaiten 15–18 celsiusasteessa – lämpötila ei saa koskaan laskea alle 10 astetta. Säännöllinen ruiskutus mahdollisimman kalkkittomalla vedellä suojaa tuholaasilta. Uusi kasvu alkaa taas huhtikuussa.



Banane plantain Musa X paradisiaca Ma propre plantation de bananes

La banane plantain vivace et à croissance lente arrive à sa floraison lorsqu'elle mesure deux à trois mètres et a trois ans. Les fleurs se développent au milieu du tronc avec ses gros bourgeons rouges à partir desquels des centaines de fleurs blanches poussent. Pendant que la tige se prolonge de plus en plus, les fruits dorés sont exempts de graines. Le pseudo-tronc, qui porte des fruits, meurt, mais des nouvelles pousses croissent des racines. La banane, qui est originaire d'Asie du Sud-Est, est l'une des formes originales de la banane moderne. On peut aussi trouver la banane sous le nom de figuier du paradis. Saviez-vous que la banane plantain obtient sa forme en courbant dans le sens inverse du soleil. **Emplacement naturel:** La banane plantain est originaire des îles de l'Asie du Sud-Est. **Culture réussie:** La culture des graines à la maison est possible tout au long de l'année. Pour améliorer la faculté germinative des graines, il faut d'abord les rendre rugueuses avec du papier de verre ou une lime, puis les mettre dans de l'eau à température ambiante pendant douze heures. Mettez les graines dans du terreau humide et recouvrez-les légèrement avec du substrat. Couvrez le récipient avec une feuille transparente dans laquelle vous faites des trous. Comme ça, le terreau est protégé du dessèchement. Mettez le récipient dans un endroit lumineux et chaud de 25° à 30° (sur le radiateur, par exemple) Celsius et gardez le terreau humide, mais pas mouillé. En général, il faut attendre environ trois à dix semaines. **Le meilleur emplacement:** Pour que votre bananier puisse développer des fruits, il faut le mettre de préférence dans un endroit avec des taux d'humidité de l'air élevés et dont la température ne tombe pas en-dessous de 16° Celsius. Il peut aussi passer l'été dans un emplacement mi-ombragé et chaud. Les emplacements protégés du vent et près d'un mur accumuleur de chaleur sont idéaux. Les vents forts arrachent souvent les feuilles, ce qui rend le bananier un peu moins agréable à regarder. **Soins optimaux:** Les jeunes plantes doivent être rempotées dans un gros pot après six à huit semaines. Pour avoir une meilleure croissance, vous devez mélanger le terreau avec 25% de sable. Le besoin en eau est fort en été, mais évitez l'eau stagnante, afin de ne pas endommager les racines charnues. Il est conseillé d'engraisser la plante toutes les deux semaines d'avril à octobre avec de l'engrais liquide pour plantes en pot. **En hiver:** La banane hiverne le mieux dans un endroit lumineux de 15° à 18° Celsius, la température ne doit jamais tomber en-dessous de 10° Celsius. Une aspersion régulière avec de l'eau le moins calcaire possible empêche les infestations parasites. Le nouveau bourgeonnement arrive en avril.



Μεγάλο πλατάνο Musa X paradisiaca Η δική μου φυτεία μπανάνας

Η πολυετής, βραδέως αναπτυσσόμενη εδώδιμη μπανάνα φτάνει στην ωριμότητα της ανθοφορίας σε ύψος δύο έως τριών μέτρων και ηλικία τριών ετών. Τα άνθη αναδύονται από το κέντρο του στελέχους με ένα κόκκινο εύσωμο μπουμπούκι από το οποίο αναδύονται στροβιλιζόμενοι λευκοί λουλουδιών ενώ ο μίσχος του λουλουδιού συνεχίζει να επιμηκύνεται. Οι χρυσοκίτρινοι καρποί είναι άσποροι. Το καρποφόρο ψευδοστέλεχος, που σχηματίζεται μόνο από τα έλκτρα των φύλλων, στη συνέχεια πεθαίνει, αλλά νέοι βλαστοί αναπτύσσονται από τη ρίζα. Με κατανάλωση από τη Νοτιοανατολική Ασία, η πραγματική μπανάνα φρούτων είναι μια από τις πρωτότυπες μορφές της σύγχρονης μπανάνας φρούτων. Στις παλιές εγκυκλοπαίδειες ήταν γνωστά και με το όνομα παράδεισος σύκο ή μήλο λάστιχου. Γνωρίζετε ότι τα πλατάνια σχετίζονται με το δικό σας αναπτύσσονται προς την κατεύθυνση του ήλιου και έτσι διατηρούν το σχήμα τους. **Φυσική τοποθεσία:** Η μπανάνα έχει τις ρίζες της στα νησιά της Νοτιοανατολικής Ασίας. **Επιτυχημένη καλλιέργεια:** Η καλλιέργεια από σπόρους σε εσωτερικούς χώρους είναι δυνατή όλο το χρόνο. Για να αυξηθεί η βλαστική ικανότητα των σπόρων, πρέπει πρώτα να τραχυνθούν με γυαλόχαρτο ή λίμα και μετά να φουσκώσουν σε νερό σε θερμοκρασία δωματίου για 12 ώρες. Στη συνέχεια σπρώξτε τον σπόρο προς τα μέσα υγρό χώμα γλάστρας και καλύψτε μόνο ελαφρά τους σπόρους με χώμα γλάστρας. Τεντώστε μεμβράνη πάνω από το δοχείο καλλιέργειας και ανοίξτε μερικές τρύπες στη μεμβράνη. Αυτό προστατεύει το έδαφος από το στέγνωμα. Τοποθετήστε τη γλάστρα σε ένα ελαφρύ και ζεστό μέρος σε θερμοκρασία 25 έως 30° Κελσίου (π.χ. πάνω από τη θερμάστρα) και διατηρήστε το χώμα της γλάστρας υγρό αλλά όχι υγρό. Στη συνέχεια συνήθως χρειάζονται περίπου τρεις έως δέκα εβδομάδες για να βλαστήσει. **Η καλύτερη τοποθεσία:** Για να καρποφορήσει η μπανάνα σας, καλύτερα να στέκεστε σε φωτεινό μέρος με αυξημένη υγρασία και όχι κάτω από 16° Κελσίου. Μπορεί επίσης να περάσει το καλοκαίρι σε εξωτερικό χώρο σε ημισκιά και ζεστό μέρος. Οι θέσεις που προστατεύονται από τον άνεμο κοντά σε τοίχο συγκράτησης θερμότητας είναι ιδανικές. Οι δυνατοί άνεμοι συχνά σκίζουν τα φύλλα, κάνοντας τη μπανάνα λίγο λιγότερο ελκυστική. **Βέλτιστη φροντίδα:** Τα νεαρά φυτά μεταφέρονται καλύτερα σε ένα μεγάλο κουβά μετά από έξι έως οκτώ εβδομάδες. Για καλύτερη ανάπτυξη θα πρέπει να προσθέσετε 25% άμμο στο έδαφος. Η απαίτηση σε νερό είναι υψηλή τους καλοκαιρινούς μήνες – αλλά αποφύγετε την υπερχειλίση για να μην καταστρέψετε τις σαρκώδεις ρίζες. Η λίπανση με υγρό λίπασμα φυτών σκάφους κάθε δύο εβδομάδες συνιστάται από τον Απρίλιο έως τον Οκτώβριο. **Το χειμώνα:** Οι μπανάνες πέφτουν σε χειμέρα νάρκη στους 15° έως 18° Κελσίου – η θερμοκρασία δεν πρέπει ποτέ να πέσει κάτω από τους 10° Κελσίου. Ο τακτικός ψεκασμός με νερό όσο το δυνατόν πιο απαλλαγμένο από ασβέστη προστατεύει από την προσβολή από παράσιτα. Νέα ανάπτυξη ξεκινά ξανά τον Απρίλιο.



Slánlus mór

Musa X paradisiaca

Mo phlandáil banana féin

Sroicheann an banana inite ilbhliantúil, a fhásann go mall, aibíocht bláthanna ag airde idir dhá nó trí mhéadar agus aois trí bliana. Eascraíonn na bláthanna as lár an ghais le bachlógh gharbh dearg as a n-eascraíonn bláthanna bána agus an gas bláthanna ag síneadh i gcónaí. Tá na torthaí buí órga gan síolta. Faigheann an pseudostem torthúla, a fhoirmítear ó sheaths na nduilleog amháin, bás ansin, ach fásann shoots nua ón bhféamh. Ó Oirdheisceart na hÁise ó dhúchas, tá an banana torthaí fíor ar cheann de na foirmeacha bunaidh den banana torthaí nua-aimseartha. I seanchiclipéid tugadh orthu freisin faoin ainm Paradise fig nó hose apple. An raibh a fhios agat go bhfuil slánlusanna gaolmhar le doag fás i dtreo na gréine agus mar sin a choinneáil ar a gcruth. **Suíomh nádúrtha:** Tá bunús leis an banana in oileáin Oirdheisceart na hÁise. **Saothrú rathúil:** Is féidir fás ó shíolta taobh istigh ar feadh na bliana. D'fhonn cumas phéacadh na síolta a mhéadú, ba chóir iad a garbh ar dtús le páirín nó comhad agus ansin iad a fhágáil in uisce ag teocht an tseomra ar feadh 12 uair an chloig. Ansin brúigh an síol isteachan ithir potaithe tais agus gan ach a chlúdach go héadrom na síolta le potting ithir. Sin an scannán cumhdaithe thar an soithéach cultúir agus cuir cúpla poll sa scannán. Cosnaíonn sé seo an ithir ó thriomú amach. Cuir an pota síolta in áit éadrom agus te ag 25 go 30 ° Celsius (m.sh. thar an téitheoir) agus coinnigh an ithir potaithe tais ach gan a bheith fluich. De ghnáth tógann sé idir trí nó deich seachtaine chun péacadh a dhéanamh. **An suíomh is fearr:** D'fhonn do banana torthaí a shocrú, is fearr é a sheasamh in áit gheal le méadú ar thaise agus nach bhfuil faoi bhun 16 ° Celsius. Is féidir leis an samhradh a chaitheamh lasmuigh freisin in áit leath-shady agus te. Tá suíomhanna gaoithe-chosanta in aice le balla coinneála teasa iontach. Is minic a scarann gaotha láidre na duilleoga, rud a fhágann nach bhfuil an banana chomh tarraingteach. **Cúram is fearr is féidir:** Is fearr plandaí óga a aistriú chuig buicéad mór tar éis sé go hocht seachtaine. Le haghaidh fás níos fearr ba chóir duit gaineamh 25% a chur leis an ithir. Bíonn an riachtanas uisce ard i míonna an tsamhraidh - ach seachain uiscebhail ionas nach ndéanfar damáiste do na fréamhacha méithe. Moltar fertilizing le leasachán plandaí tub leachtach gach coicíis ó Aibreán go Deireadh Fómhair. **Sa gheimhreadh:** Is fearr le bananaí codladh geimhridh ag 15 ° go 18 ° Celsius - níl cheart go dtitfeadh an teocht faoi 10 ° Celsius riamh. Cosnaíonn spraeáil rialta le huisce atá chomh saor ó aol agus is féidir in aghaidh lotnaidí. Tosaíonn fás nua arís i mí Aibreáin.



Stór grisja

Musa X paradisiaca

Mín eigin bananaplanta

Ævarandi, hægvaxta aeti bananinn nær blómstrandí þroska í tveggja til þriggja metra hæð og þriggja ára aldur. Blómin koma upp úr miðju stílsins með rauðum stífum brum sem koma upp úr þýrlum af hvítum blómum á meðan blómstilkurinn heldur áfram að lengjast. Gullgulu ávextir eru frælausir. Ávaxtagervistofninn, sem myndast aðeins úr laufslíðum, deyr síðan, en nýir sprotar vaxa frá rótinni. Upprunalega frá Suðaustur-Asíu, alvöru ávaxtabananinn er ein af upprunalegu gerðum nútíma ávaxtabanana. Í gömlum alfræðiorðabókum voru þær einnig þekktar undir nafninu paradísarfíkja eða slönguepli. Vissir þú að plantains eru skyldar þínumvaxa í átt að sólinni og halda þannig lögum sinni. **Náttúruleg staðsetning:** Bananinn á uppruna sinn á eyjum í Suðaustur-Asíu. **Árangursrík ræktun:** Ræktun úr fræjum innandyrar er mögulegt allt árið um kring. Til þess að auka spírunargetu fræanna þarf fyrst að grófa þau með sandpappír eða skrá og láta síðan bólgna í vatni við stofuhita í 12 klst. Þrýstu síðan fræinu innraka pottamoldin og hylja fræin aðeins með pottamold. Teygðu matarfilmu yfir ræktunarilátið og stingdu nokkrum göt á filmuna. Þetta verndar jarðveginn gegn þurrkun. Settu fræpottinn á léttan og heitan stað með 25 til 30° Celsius (t.d. yfir hitara) og haltu pottjarðveginum rökum en ekki blautum. Það tekur síðan að jafnaði um þrjár til tíu vikur að spíra. **Besta staðsetningin:** Til þess að bananinn þinn geti sett ávöxt er best að standa á björtum stað með auknum raka og ekki undir 16° á Celsius. Það getur líka eytt sumrinu utandyrar á hálfskuggalegum og hlýjum stað. Vindvarðir staðir nálægt varmavegg eru tilvalin. Sterkir vindar rífa oft blöðin, sem gerir bananinn aðeins minna aðlaðandi. **Besta umönnun:** Best er að flytja ungur plöntur í stóra fötu eftir sex til átta vikur. Fyrir betri vöxt ættir þú að bæta 25% sandi í jarðveginn. Vatnsþörfin er mikil yfir sumarmánuðina - en forðastu vatnslosun til að skemma ekki holdugar ræturnar. Mælt er með að frjövga með fljótandi pottplöntuáburði á tveggja vikna fresti frá apríl til október. **Á veturna:** Bananar leggjast best í dvala við 15° til 18° Celsius - hitastigið ætti aldrei að fara niður fyrir 10° Celsius. Regluleg úða með vatni sem er eins kalklaust og hægt er verndar gegn meindýraárárs. Nýr vöxtur hefst aftur í apríl.



Banano

Musa X paradisiaca

La mia piantagione di banane

Il banano è una pianta pluriennale a crescita lenta, che raggiunge la maturità ad un'altezza da due a tre metri e all'età di tre anni. I fiori crescono enormemente partendo dal centro del tronco, da uno spesso bocciolo di colore rosso, da cui nascono cascate di fiori bianchi, il cui gambo si allunga continuamente, i frutti giallo acceso sono senza semi. Il falso tronco che porta i frutti, formato solo dai lunghi piccioli delle foglie, in seguito muore, dalle radici spuntano però nuovi polloni. Il vero banano da frutto originario del sud-est asiatico è una delle forme originarie del banano di oggi. Nelle vecchie enciclopedie questa pianta si poteva trovare anche alla voce fico del paradiso o mela a budello. I frutti di banana crescendo si incurvano seguendo la direzione del sole, da qui si determina la loro forma. **Posizione naturale:** L'areale del Banano si trova sulle isole del sud-est asiatico. **Coltivazione riuscita:** La coltivazione da semi in casa è possibile durante tutto l'anno. Per aumentare la germinabilità dei semi, strofinateli per prima cosa con carta vetrata o con una lima, poi lasciateli immersi per 12 ore in acqua a temperatura ambiente affinché si gonfino. Collocate i semi sulla terra di coltivo umida e copriteli solo leggermente con il substrato. Coprite il recipiente di coltivazione con pellicola trasparente, sulla quale praticherete dei fori, in questo modo la terra eviterà di seccarsi. Collocate il recipiente di coltivazione in un luogo luminoso e caldo, a una temperatura fra i 25° e i 30°C (ad esempio sopra una fonte di riscaldamento) e mantenete la terra umida, ma non bagnata. La germinazione avviene di norma da tre a dieci settimane dopo. **La posizione migliore:** Affinché il vostro Banano possa sviluppare dei frutti è necessario collocarlo in un ambiente luminoso, con un'elevata umidità dell'aria e una temperatura non inferiore ai 16° C. Può trascorrere l'estate anche all'aperto, in un punto a mezz'ombra e caldo. L'ideale è una posizione al riparo dal vento, vicino a un muro che emani calore. Il vento forte spesso causa la rottura delle foglie, cosa che rende l'aspetto del Banano piuttosto malridotto. **Cura ottimale:** Le giovani piante dovrebbero essere trapiantate dopo sei-otto settimane in una grande tinozza. Per una migliore crescita è preferibile mischiare la terra con un 25% di sabbia. Il fabbisogno di acqua durante i mesi estivi è alto, ma fate attenzione ad evitare i ristagni idrici, per non danneggiare le radici carnose. Nel periodo da aprile a ottobre è consigliabile concimare il Banano ogni due settimane con fertilizzante liquido per piante da vaso. **In inverno:** Il Banano predilige per lo svernamento un ambiente luminoso, a una temperatura fra i 15° e i 18° C, in nessun caso la temperatura dovrebbe scendere sotto i 10° C. Spruzzare regolarmente la pianta con acqua il più possibile priva di calcare protegge dalle infestazioni di parassiti. La nuova germinazione avviene in aprile.



Veliki trputac

Musa X paradisiaca

Moja vlastita plantaža banana

Višegodišnja spororastuća jestiva banana dostiže zrelost cvatnje na visini od dva do tri metra i dobi od tri godine. Cvjetovi izbijaju iz središta stabljike s crvenim debelim pupoljkom iz kojeg izviru vrtlozi bijelih cvjetova dok se cvjetna stabljika produžuje. Zlatnožuti plodovi su bez sjemenki. Plodna lažna stabljika, nastala samo od lisnih ovoja, tada odumire, ali iz korijena rastu novi izdanci. Podrijetlom iz jugoistočne Azije, prava voćna banana jedan je od izvornih oblika moderne voćne banane. U starim enciklopedijama bile su poznate i pod nazivom rajska smokva ili jabuka. Jeste li znali da su trputci srodni vašemrastu u smjeru sunca i tako zadržavaju svoj oblik. **Zemlja porijekla:** Banana potječe s otoka jugoistočne Azije. **Uspješan uzgoj:** Uzgoj iz sjemena u zatvorenom prostoru moguć je tijekom cijele godine. Da bi se povećala klijavost sjemena, potrebno ga je najprije nahranjavati brusnim papirom ili turpijom, a potom ostaviti da bubri u vodi sobne temperature 12 sati. Zatim gurnite sjeme unutražlavnom tlu za posude i samo lagano prekrijte sjeme zemljom za posude. Razvucite prozrnu foliju preko posude s kulturom i probušite nekoliko rupica u foliju. To štiti tlo od isušivanja. Stavite posudu za sjeme na svijetlo i toplo mjesto s 25 do 30°C (npr. iznad grijalice) i održavajte tlo u posudi vlažnim, ali ne mokrim. Zatim je obično potrebno oko tri do deset tjedana da proklija. **Najbolja lokacija:** Kako bi vaša banana zametnula plodove, najbolje je da stoji na svijetlom mjestu s povećanom vlagom i ne ispod 16°C. Može ljetovati i na otvorenom u polusjenovitom i toplom mjestu. Idealna su mjesta zaštićena od vjetrova u blizini zida za zadržavanje topline. Jaki vjetrovi često trgaju lišće, pa bananu čini malo manje privlačnom. **Optimalna njega:** Mlade biljke najbolje je prenijeti u veliku kantu nakon šest do osam tjedana. Za bolji rast potrebno je dodati 25% pijeska u tlo. Potreba za vodom velika je u ljetnim mjesecima - ali izbjegavajte natapanje kako ne biste oštetili mesnato korijenje. Gnojidba tekućim gnojivom za biljke svaka dva tjedna preporučuje se od travnja do listopada. **U zimi:** Banane najbolje hiberniraju na 15° do 18° Celzijusa - temperatura nikada ne smije pasti ispod 10° Celzijevih. Redovito prskanje vodom koja je što je moguće bez kalcija štiti od napada štetnika. Novi rast ponovno počinje u travnju.



Lielais ceļmallapa Musa X paradisiaca Mana banānu plantācija

Daudzgadīgs, lēni augošais ēdamais banāns sasniedz ziedēšanas briedumu divu līdz trīs metru augstumā un trīs gadu vecumā. Ziedi iznirst no stublāja vidus ar sarkanu, resnu pumpuru, no kura izplūst baltu ziedu virpuļi, kamēr zieda kāts turpina pagarināties. Zeltaini dzeltenie augļi ir bez sēklām. Augļu pseudostēma, kas veidojas tikai no lapu apvalkiem, pēc tam atmirst, bet no saknes izaug jauni dzinumi. Sākotnēji no Dienvidaustrumāzijas, īstais augļu banāns ir viena no mūsdienu augļu banāna oriģinālajām formām. Vecajās enciklopēdijās tie bija pazīstami arī ar nosaukumu paradīzes vīģe vai šļūtenes ābols. Vai zinājat, ka ceļmallapas ir saistītas ar jūsu aug saules virzienā un tādējādi saglabā savu formu.

Dabiska vieta: Banānu izcelsme ir Dienvidaustrumāzijas salās. **Veiksmīga audzēšana:** Audzēšana no sēklām telpās ir iespējama visu gadu. Lai palielinātu sēklu dīgspēju, tās vispirms jāraupina ar smilšpapīru vai vili un pēc tam 12 stundas jāatstāj uzbriest ūdenī istabas temperatūrā. Pēc tam iespieties sēklumitru podiņzemi un tikai viegli pārklāiet sēklas ar stādīšanas augsni. Izstiepiet pārtikas plēvi virs kultivēšanas trauka un ieduriet plēvē dažus caurumus. Tas pasargā augsni no izžušanas. Novietojiet sēklu podu gaišā un siltā vietā ar temperatūru 25 līdz 30°C (piemēram, virs sildītāja) un turiet augsni mitru, bet ne mitru. Pēc tam dīgspēja parasti aizņem apmēram trīs līdz desmit nedēļas. **Labākā atrašanās vieta:** Lai jūsu banāns sastādītu augļus, vislabāk ir stāvēt gaišā vietā ar paaugstinātu mitrumu un ne zemāku par 16°C. Vasaru var pavadīt arī ārā pusēnā un siltā vietā. No vēja aizsargātas vietas pie siltumu saglabājošas sienas ir ideālas. Spēcīgs vējš bieži saplēš lapas, padarot banānu nedaudz mazāk pievilcīgu. **Optimālā aprūpe:** Jaunos augus vislabāk pārnest uz lielu spaini pēc sešām līdz astoņām nedēļām. Labākai augšanai augsnei jāpievieno 25% smilšu. Vasaras mēnešos ūdens nepieciešamība ir liela, taču izvairieties no aizsērēšanas, lai nesabojātu galīgās saknes. Mēslošana ar šķidro vannu augu mēslojumu ir ieteicama reizi divās nedēļās no aprīļa līdz oktobrim. **Ziemā:** Banāni vislabāk pārziemo pie 15° līdz 18° pēc Celsija – temperatūra nekad nedrīkst būt zemāka par 10° pēc Celsija. Regulāra izsmidzināšana ar ūdeni, kas ir pēc iespējas bez kaļķa, aizsargā pret kaitēkļu invāziju. Aprīlī atkal sākas jauna izaugsme.



Didysis gyslotis Musa X paradisiaca Mano nuosava bananu plantacija

Daugiametis, lētai augstais valgomais banāns pasiekia žydėjimo brandą dviejų – trijų metrų aukštyje ir trejų metų amžiaus. Gėlės išnyra iš stiebo vidurio su raudonu stambaus pumpuru, iš kurio išnyra baltų sūkuriai, o žiedkotelis toliau ilgėja. Aukso geltonumo vaisiai be sėklų. Vaisinis pseudostemas, susidaręs tik iš lapų makštelių, vėliau žūva, tačiau iš šaknies išauga nauji ūgliai. Iš Pietryčių Azijos kilęs tikrasis vaisinis bananas yra viena iš originalių šiuolaikinio vaisinio banano formų. Senosiose enciklopedijose jie taip pat buvo žinomi rojaus figos arba žarnos obuolio pavadinimu. Ar žinojote, kad gyslotiai yra susiję su jūsuoga saulės kryptimi ir taip išlaiko savo formą. **Natūrali vieta:** Bananų kilmė yra Pietryčių Azijos salose. **Sėkmingas auginimas:** Auginti iš sėklų patalpose galima ištisus metus. Norint padidinti sėklų daigumą, pirmiausia jas reikia šiurkštinti švitiniu popieriumi arba dilde, o po to 12 valandų palikti brinkti kambario temperatūros vandenyje. Tada įstumkite sėklą drėgną vazoną žemę ir tik šiek tiek užberkite sėklas vazono žeme. Ant kultivavimo indo užtieskite maistinę plėvelę ir įdarykite kelias skylutes. Tai apsaugo dirvą nuo išdžiūvimo. Sėklų vazoną pastatykite šviesioje ir šiltoje 25–30 °C temperatūroje (pvz., virš šildytuvo) ir laikykite vazono dirvą drėgną, bet ne šlapia. Tada paprastai sudygsta maždaug nuo trijų iki dešimties savičių. **Geriausia vieta:** Kad jūsų bananas dėtų vaisius, geriausia stovėti šviesioje vietoje su padidinta drėgmė ir ne žemesnėje kaip 16°C temperatūroje. Vasarą gali praleisti ir lauke pusiau pavėsingoje ir šiltoje vietoje. Idealiai tinka nuo vėjo apsaugotos vietos prie šilumų laikančios sienos. Stiprus vėjas dažnai drasko lapus, todėl bananas tampa mažiau patrauklus. **Optimali priežiūra:** Jaunus augalus geriausia perkelti į didelį kibirą po šešių iki aštuonių savičių. Norėdami geriau augti, į dirvą įpilkite 25% smėlio. Vasaros mėnesiais vandens poreikis yra didelis, tačiau venkite užmirkimo, kad nepažeistumėte mėsingų šaknų. Tręšti skystomis kubilo augalų trąšomis rekomenduojama kas dvi savaites nuo balandžio iki spalio. **Ziemą:** Bananai geriausiai žiemoja 15–18 °C temperatūroje – temperatūra niekada neturėtų nukristi žemiau 10 °C. Reguliarus purškimas kuo bekalkesniu vandeniu apsaugo nuo kenkėjų užkrėtimo. Naujas augimas vėl prasideda balandžio mėnesį.



Pjantagġini kbar Musa X paradisiaca Il-pjantagġun tal-banana tiegħi stress

Il-banana li tittiekel perenni, li tikber bil-mod tilhaq il-maturitā tal-fjoritura f'għoli ta' 'zewġ sa tliet metri u e'ta' ta' tliet snin. Il-fjuri joħorġu miċ-ċentru taz-zokk b'bud aħmar stout li minnu joħorġu dawriet ta' fjuri bojod filwaqt li iz-zokk tal-fjura jkompli jitwal. Il-frott isfar dehbi huwa bla żerriegħa. Il-pseudostem tal-frott, iffurmat biss mill-ġhantijiet tal-weraq, imbagħad imut, iżda rimjiet godda jikbru mill-għerq. Oriġinarjament mill-Asja tax-Xlokk, il-banana tal-frott reali hija waħda mill-forom oriġinali tal-banana moderna tal-frott. Fl-enciklopediji antiki kienu magħrufa wkoll taħt l-isem tat-tin tal-ġenna jew tat-tuffieħ tal-manka. Kont taf li l-pjantagġini huma relatati ma tiegħek jikbru fid-direzzjoni tax-xemx u b'hekk iżommu l-forma tagħhom. **Post naturali:** Il-banana għandha l-oriġini tagħha fil-ġeġjer tal-Asja tax-Xlokk. **Kultivazzjoni b'suċċess:** It-tkabbir miż-żrieragħ ġewwa huwa possibbli s-sena kollha. Sabiex tiżdied il-kapaċitā tal-ġerminazzjoni taż-żrieragħ, l-ewwel għandhom jiġu mħarrka b'karta sandpaper jew fajl u mbagħad jithallew jinteffhu fl-ilma f'temperatura tal-kamra għal 12-il siegħa. Imbagħad imbotta ż-żerriegħa ġewwa il-hamrija tal-qさり niedja u tkopri biss iż-żerriegħa b'hamrija tal-qさり. Stretch cling film fuq il-bastiment tal-kultura u poka f'tit toqob fil-film. Dan jipproteġi l-hamrija milli tinxf. Poġġi l-borma taż-żerriegħa f'post faħf u shun b'25 sa 30 ° Celsius (eż. fuq il-heater) u zomm il-hamrija tal-qさり niedja iżda mhux imxarra. Imbagħad normalment jieħu madwar tlieta sa għaxar giġgħat biex jiġġermi. **L-aħjar post:** Sabiex il-banana tiegħek tagħmel il-frott, huwa aħjar li toqgħod f'post qawwi b'umditā miżjuda u mhux inqas minn 16 ° Celsius. Jista' wkoll iqatta' s-sajf barra f'post semi-dellija u shun. Postijiet protetti mir-riħ f'dejn fajt li jzomm is-shana huma ideali. Irjieħ qawwija f'fina drabi jgħattni l-weraq, u jagħmlu l-banana f'tit inqas attraenti. **Kura ottimali:** Pjanti żgħar huma l-aħjar trasferiti għal barmil kbir wara sitt sa tmien giġgħat. Għal tkabbir aħjar għandek iżzid 25% ramel mal-hamrija. Il-htieġa ta' l-ilma hija għolja fix-xhur tas-sajf - iżda evita l-ilma biex ma ssirx ħsara lil-għeruq imlaħħam. Il-fertilizzazzjoni b'fertilizzant likwidu tal-pjanti tat-tub kull giġgħatejn hija rakkomandata minn April sa Ottubru. **Fix-xitwa:** Il-banana hibernata l-aħjar f'temperatura ta' 15 ° sa 18 ° Celsius - it-temperatura m'għandha qatt taqta' taħt l-10 ° Celsius. Il-bexx regolari b'ilma li jkun ħieles mill-ġir kemm jista' jkun jipproteġi kontra l-infestazzjoni tal-pesti. Tkabbir għid jerga' jibda f'April.



Grote Banaan Musa X paradisiaca Mijn eigen bananenplantage

De meerjarige, langzaam groeiende banaan bereikt zijn bloeipunt op een hoogte van twee tot drie meter en is drie jaar oud. De bloemen ontgroeien het midden van de stam met een dikke rode knop, waaruit wervelingen van witte bloemen ontstaan, terwijl de bloemstengel steeds langer wordt. De goudgele vruchten zijn pitloos. De vruchtdragende pseudo-stam, die alleen uit de bladscheden wordt gevormd, sterft dan af, maar vanuit de wortels groeien nieuwe scheuten. De echte fruitbanaan, die oorspronkelijk uit Zuidoost-Azië komt, is een van de oorspronkelijke vormen van moderne fruitbananen. In oude encyclopediën waren ze ook bekend onder de naam van de paradijsvijg of de buisappel. Wist je dat bananen met hun groeirichting naar de zon toe buigen en zo hun vorm behouden. **Natuurlijke locatie:** De banaan vindt zijn oorsprong in de Zuidoost-Aziatische eilandenwereld. **Succesvolle teelt:** Binnen weken uit zaden is het hele jaar mogelijk. Om de kiemkracht van de zaden te vergroten, moeten ze eerst worden opgeruwd met schuurpapier of een vijl en daarna 12 uur laten weken in water op kamertemperatuur. Druk het zaad vervolgens in de vochtige potgrond en bedek het zaad slechts licht met groeistrukt. Rek vershoudfolie over de kweekbak en prik een paar gaatjes in de folie. Dit beschermt de aarde tegen uitdroging. Zet de kweekbak op een lichte en warme plaats met 25 tot 30 ° Celsius (bijvoorbeeld boven de kachel) en houd de kweekgrond vochtig, maar niet nat. Het duurt meestal ongeveer drie tot tien weken voordat het ontkiemt. **De beste locatie:** Zodat uw banaan vrucht kan zetten, kunt u het beste op een lichte plaats met verhoogde luchtvochtigheid staan en niet onder de 16 ° Celsius. Ze kan de zomer ook buiten doorbrengen op een gedeeltelijk schaduwrijke en warme plek. Beschutte locaties nabij een warmtekeermuur zijn ideaal. Sterke wind scheurt vaak de bladeren, waardoor de banaan iets minder aantrekkelijk wordt. **Optimale verzorging:** Jonge planten kunnen het beste na zes tot acht weken in een grote container worden gezet. Voor een betere groei moet u 25% zand aan de grond toevoegen. De behoefte aan water is hoog in de zomermaanden, maar vermijd wateroverlast om de vlezige wortels niet te beschadigen. Bemesting met vloeibare potplantenmest om de twee weken is aan te raden van april tot oktober. **In de winter:** Het is het beste om de banaan licht te overwinteren bij 15 ° tot 18 ° Celsius - de temperatuur mag nooit onder de 10 ° Celsius komen. Regelmatig sproeien met kalkvrij water beschermt mogelijk tegen ongedierte. De nieuwe shoot begint in april weer.



Stor plantain Musa X paradisiaca Min egen bananplantasje

Den flerårige, saktevoksende spiselige bananen når blomstrende modenhet i en høyde på to til tre meter og en alder på tre år. Blomstene kommer ut fra midten av stilken med en rød kraftig knopp som dukker opp virvler av hvite blomster mens blomsterstilken fortsetter å forlenges. De gyldengule fruktene er frøfrie. Den fruktende pseudostammen, dannet bare fra bladskjedene, dør deretter, men nye skudd vokser fra roten. Opprinnelig fra Sørøst-Asia, er den ekte fruktbananen en av de opprinnelige formene for den moderne fruktbananen. I gamle oppslagsverk var de også kjent under navnet paradisiaken eller hoseeple. Visste du at plantains er relatert til dinvokse i retning mot solen og dermed beholde formen. **Naturlig beliggenhet:** Bananen har sin opprinnelse i de sørøstasiatiske øyene. **Vellykket dyrking:** Å dyrke fra frø innendørs er mulig hele året. For å øke spireevnen til frøene bør de først gjøres ru med sandpapir eller fil og deretter la de svelle i vann ved romtemperatur i 12 timer. Trykk deretter inn frøet den fuktige pottejorda og kun lett dekk frøene med pottejord. Strekk matfilm over kulturkaret og stikk noen hull i filmen. Dette beskytter jorda mot å tørke ut. Plasser frøpotten på et lett og varmt sted med 25 til 30° Celsius (f.eks. over varmeren) og hold pottejorda fuktig, men ikke våt. Det tar da vanligvis rundt tre til ti uker å spire. **Den beste beliggenheten:** For at bananen din skal sette frukt, er det best å stå på et lyst sted med økt luftfuktighet og ikke under 16° Celsius. Den kan også tilbringe sommeren utendørs på et halvskyggefullt og varmt sted. Vindbeskyttede steder nær en varmeholdende vegg er ideelle. Sterk vind river ofte bladene, noe som gjør bananen litt mindre attraktiv. **Optimal omsorg:** Unge planter overføres best til en stor bøtte etter seks til åtte uker. For bedre vekst bør du legge til 25% sand til jorden. Vannbehovet er høyt i sommermånedene – men unngå vannfylling for ikke å skade de kjøttfulle røttene. Gjødsling med flytende karplantegjødsel annenhver uke anbefales fra april til oktober. **Om vinteren:** Bananer går best i dvale ved 15° til 18° Celsius - temperaturer bør aldri falle under 10° Celsius. Regelmessig sprøyting med mest mulig kalkfritt vann beskytter mot skadedyrangrep. Ny vekst starter igjen i april.



Duży Banan Musa X paradisiaca Moja własna plantacja bananów

Odwieczny i wolno rosnący banan zwyczajny osiąga dojrzałość kwitnienia po trzech latach, osiągając wysokość od dwóch do trzech metrów. Kwiaty wychodzą ze środka łodygi z dużymi czerwonymi pąkami, które wypuszczają wir białych kwiatów, podczas gdy łodyga kwiatowa stale rośnie. Żółte owoce są bezpestkowe. Owocująca pseudo-łodyga, która jest utworzona wyłącznie przez osłonki liści, obumrze, ale nowe sadzonki wyrosną z korzenia. Pochodzący z Azji Południowo-Wschodniej banan zwyczajny jest jedną z pierwotnych form dzisiejszego banana owocowego. W starych encyklopediach znany jest również pod innymi nazwami, np. Deser Banan. Czy wiesz, że banan nabiera kształtu wygiętego, ponieważ rośnie w kierunku słońca?! **Naturalne położenie:** Pierwotnie banan zwyczajny pochodzi z wyspiarskich regionów Azji Południowo-Wschodniej. **Udana uprawa:** Rozmnażanie nasion w pomieszczeniach jest możliwe przez cały rok. Aby zwiększyć zdolność kiełkowania, można lekko zmatowić nasiona miękkim pilnikiem lub kawałkiem papieru ściernego i umieścić je w cieplej wodzie na około 12 godzin w celu zagruntowania. Następnie wciśnij nasiona do wilgotnego kompostu doniczkowego, nałóż niewielką ilość ziemi kompostowej na wierzch i przykryj pojemnik na nasiona przezroczystą folią, aby zapobiec wysychaniu ziemi. Nie zapomnij zrobić dziur w przezroczystej folii i zdejmuj ją co drugi lub trzeci dzień na około 2 godziny. W ten sposób unikniesz tworzenia się pleśni na kompoście doniczkowym. Umieść pojemnik na nasiona w miejscu jasnym i ciepłym (na przykład w pobliżu grzejnika) o temperaturze od 25 ° C do 30 ° C i utrzymuj ziemię w stanie wilgotnym, ale nie mokrym. W zależności od temperatury rozmnażania pierwsze sadzonki wyrosną po trzech do dziesięciu tygodniach. **Najlepsza lokalizacja:** Banan zwyczajny najlepiej przechowywać w jasnym miejscu o dużej wilgotności i minimalnej temperaturze 16 ° Celsjusza. Latem można ją również umieszczać na zewnątrz w półcienistym i ciepłym miejscu. Miejsca chronione przed wiatrem w pobliżu ściany chroniącej przed ciepłem są idealne. Silny wiatr może rozerwać liście i zepsuć wygląd bananowca. **Optymalna pielęgnacja:** Młode rośliny najlepiej sadzić w dużej wannie po sześciu do ośmiu tygodniach. Aby przyspieszyć wzrost, należy zmieszać ziemię z 25% piaskiem. Latem banan zwyczajny potrzebuje dużo wody - ale unikaj podlewania, aby mięsiste korzenie nie zostały uszkodzone. Od kwietnia do października zaleca się co dwa tygodnie podawać płynny nawóz dla roślin doniczkowych. **W zimie:** Banan zwyczajny najlepiej hibernuje w jasnym miejscu o temperaturze od 15 ° do 18 ° Celsjusza. Nie toleruje temperatur poniżej 10 ° Celsjusza. Aby zapobiec inwazji szkodników, należy regularnie spryskiwać roślinę wodą z niedoborem wapna. W kwietniu ponownie wykiełkuje.



Grande banana Musa X paradisiaca Minha própria plantação de banana

A banana comestível perene e de crescimento lento atinge a maturidade da floração a uma altura de dois a três metros e aos três anos de idade. As flores emergem do centro do caule com um botão vermelho robusto do qual emergem redemoinhos de flores brancas enquanto o pedúnculo continua a se alongar. Os frutos amarelos dourados são sem sementes. O pseudocaule frutífero, formado apenas pelas bainhas das folhas, morre, mas novos brotos crescem a partir da raiz. Originária do Sudeste Asiático, a verdadeira banana-fruta é uma das formas originais da moderna banana-fruta. Em enciclopédias antigas, eles também eram conhecidos sob o nome de figo do paraíso ou maçã de mangueira. Você sabia que as bananas estão relacionadas com o seucrescem na direção do sol e, assim, mantêm sua forma. **Localização natural:** A banana tem sua origem nas ilhas do Sudeste Asiático. **Cultivo bem sucedido:** Cultivar a partir de sementes dentro de casa é possível durante todo o ano. Para aumentar a capacidade de germinação das sementes, devem primeiro ser lixadas com lixa ou lima e depois deixadas a inchar em água à temperatura ambiente durante 12 horas. Em seguida, empurre a semente para dentro do solo úmido para vasos e cubra apenas levemente as sementes com terra para vasos. Estique o filme plástico sobre o recipiente de cultura e faça alguns furos no filme. Isso protege o solo de secar. Coloque o vaso de sementes em um local claro e quente com 25 a 30° Celsius (por exemplo, sobre o aquecedor) e mantenha o solo do vaso úmido, mas não molhado. Em seguida, geralmente leva cerca de três a dez semanas para germinar. **A melhor localização:** Para que sua banana dê frutos, é melhor ficar em um local claro, com umidade elevada e não abaixo de 16° Celsius. Também pode passar o verão ao ar livre em um local semi-sombreado e quente. Locais protegidos do vento perto de uma parede de retenção de calor são ideais. Os ventos fortes costumam rasgar as folhas, tornando a bananeira um pouco menos atraente. **Cuidado ideal:** As plantas jovens são melhor transferidas para um balde grande após seis a oito semanas. Para um melhor crescimento, você deve adicionar 25% de areia ao solo. A necessidade de água é alta nos meses de verão - mas evite o alagamento para não danificar as raízes carnudas. A fertilização com fertilizante líquido para plantas de banheira a cada duas semanas é recomendada de abril a outubro. **No inverno:** As bananas hibernam melhor entre 15° e 18° Celsius - a temperatura nunca deve cair abaixo de 10° Celsius. A pulverização regular com água o mais livre possível de cal protege contra a infestação de pragas. Novo crescimento começa novamente em abril.



Banana Mare Musa X paradisiaca Propria mea plantație de banane

Banana perenă, cu creștere lentă, atinge punctul său de înflorire la o înălțime de doi până la trei metri și are trei ani. Florile depășesc centrul trunchiului cu un mugur gros roșu, din care se dezvoltă vârfuri de flori albe, în timp ce tulpina de flori continuă să se lungească. Fructele galbene aurii sunt fără semințe. Pseudo-tulpina roditoare, care se formează numai din învelișul frunzelor, moare, dar din rădăcină cresc lăstari noi. Originar din Asia de Sud-Est, adevărata banană de fructe este una dintre formele originale ale bananelor moderne de fructe. În vechile enciclopedii erau cunoscute și sub numele de smochinul paradisului sau mărlul tubular. Știați că bananele se curbează spre soare cu direcția lor de creștere și astfel își mențin forma. **Locație naturală:** Banana își are originea în lumea insulelor din sud-estul Asiei. **Cultivare de succes:** Cultivarea din semințe în interior este posibilă pe tot parcursul anului. Pentru a crește capacitatea de germinare a semințelor, acestea trebuie mai întâi asprite cu smirghel sau cu o pilă și apoi lăstate să se înmoaie în apă la temperatura camerei timp de 12 ore. Apoi, apăsați sămânța în solul umed de ghiveci și acoperiți semințele doar ușor cu substrat în creștere. Întindeți folia alimentară peste recipientul de cultivare și introduceți câteva găuri în film. Acest lucru protejează pământul de uscare. Așezați vasul de cultivare într-un loc luminos și cald, cu 25 până la 30 ° Celsius (de exemplu, deasupra încălzitorului) și păstrați solul de cultivare umed, dar nu umed. De obicei, durează aproximativ trei până la zece săptămâni pentru germinare. **Cea mai bună locație:** Pentru ca banana dvs. să poată produce fructe, cel mai bine este să stați într-un loc ușor cu umiditate crescută și nu sub 16 ° Celsius. De asemenea, poate petrece vara în aer liber într-un loc parțial umbrat și cald. Locațiile adăpostite lângă un zid de susținere a căldurii sunt ideale. Vânturile puternice rup adesea frunzele, făcând banana puțin mai atractivă. **Îngrijire optimă:** Plantele tinere sunt cel mai bine mutate într-un recipient mare după șase până la opt săptămâni. Pentru o creștere mai bună, ar trebui să adăugați 25% nisip la sol. Nevoia de apă este mare în lunile de vară - dar evitați înghițirea apei pentru a nu deteriora rădăcinile carnoase. O fertilizare cu îngrășământ lichid pentru plante în ghiveci la fiecare două săptămâni este recomandată din aprilie până în octombrie. **În iarnă:** Cel mai bine este să iernăm ușor banana la 15 ° până la 18 ° Celsius - temperatura nu trebuie să scadă niciodată sub 10 ° Celsius. Pulverizarea regulată cu apă lipsită de var protejează posibil împotriva infestării dăunătorilor. Noua filmare începe din nou în aprilie.



Stor Banan

Musa X paradisiaca

Min egen bananplantage

Den fleråriga, långsamt växande bananen når sin blomningspunkt på en höjd av två till tre meter och är tre år gammal. Blommorna växer ut i mitten av stammen men i tjock röd knopp, från vilken virvlar av vita blommor utvecklas, medan blommestjälken fortsätter att förlängas. De guldgula frukterna är frölösa. Den fruktbara delen pseudostammen, som bara bildas av bladmantlarna, dör sedan, men nya skott växer från rötterna. Den riktiga fruktbanan, som ursprungligen kommer från Sydostasien, är en av de ursprungliga formerna av moderna fruktbananer. I gamla uppslagsverk var de också kända under namnet paradisiaken eller det rörformiga äpplet. Visste du att bananer böjer sig mot solen med sin tillväxtriktning och därmed bibehåller sin form. **Naturligt läge:** Bananen har sitt ursprung i den sydasiatiska övärlden. **Framgångsrik odling:** Att odla från frön inomhus är möjligt året runt. För att öka fröns groingskapacitet bör de först grovas med sandpapper eller en fil och sedan får blötläggas i vatten vid rumstemperatur i 12 timmar. Pressa sedan in fröet i den fuktiga krukvägen och täck fröet bara lätt med pottsubstrat. Sträck folie över odlingsbehållaren och sticka några hål i filmen. Detta skyddar jorden från att torka ut. Placera odlingskärlet på en ljus och varm plats med 25 till 30 ° C (till exempel ovanför värmaren) och håll odlingsjorden fuktig men inte våt. Det tar vanligtvis cirka tre till tio veckor för spiring. **Den bästa platsen:** Så att din banan kan sätta frukt är det bäst att stå på ett ljust ställe med ökad luftfuktighet och inte under 16 ° C. Hon kan också tillbringa sommaren utomhus på en delvis skuggad och varm plats. Skyddade platser nära en värmebeständig vägg är idealiska. Kraftiga vindar sliter ofta bladen, vilket gör bananen lite mindre attraktiv. **Optimal vård:** Unga växter flyttas bäst i en stor behållare efter sex till åtta veckor. För bättre tillväxt bör du lägga till 25% sand i jorden. Behovet av vatten är stort under sommarmånaderna - men undvik vattentätning för att inte skada de köttiga rötterna. En gödning med flytande krukväxtgödsel varannan vecka rekommenderas från april till oktober. **På vintern:** Det är bäst att övervintra bananen lätt vid 15 ° till 18 ° Celsius - temperaturen bör aldrig sjunka under 10 ° Celsius. Regelbunden sprutning med så kalkfritt vatten som möjligt skyddar mot skadedjursangrepp. Den nya filmen börjar igen i april.



Plantain veľký

Musa X paradisiaca

Moja vlastná banánová plantáž

Trvácny, pomaly rastúci banánovník jedlý dosahuje kvitnúcu zrelosť vo výške dva až tri metre a veku troch rokov. Kvety vychádzajú zo stredu stonky s červeným pevným púčikom, z ktorého vychádzajú vŕby bielych kvetov, zatiaľ čo kvetná stopka sa stále predlžuje, zlatozlté plody sú bez semien. Plodná pseudostonka, vytvorená len z listových pošiev, potom odumiera, ale z koreňa vyrastajú nové výhonky. Pôvodom z juhovýchodnej Ázie je pravý ovocný banán jednou z pôvodných foriem moderného ovocného banánu. V starých encyklopédiách boli známe aj pod názvom rajská figa alebo hadicové jablko. Vedeli ste, že plantajny súvisia s vašourastú v smere slnka a tým si zachovávajú svoj tvar. **Prirodzená poloha:** Banán má svoj pôvod na ostrovoch juhovýchodnej Ázie. **Úspešná kultivácia:** Pestovanie zo semien v interiéri je možné po celý rok. Aby sa zvýšila klíčivosť semien, mali by sa najskôr zdrsníť brúsny papierom alebo pilníkom a potom nechať 12 hodín napučať vo vode pri izbovej teplote. Potom zatlačte semienko dovnútra do črepníkov zeme a semená len zľahka zasypte črepníkovou zeminou. Natiahnite priľnavú fóliu na nádobu s kultúrou a urobte do nej niekoľko otvorov. To chráni pôdu pred vysychaním. Umiestnite kvetnák na svetlé a teplé miesto s teplotou 25 až 30 ° C (napríklad nad ohrievačom) a zeminu udržiavajte vlhkú, ale nie mokrá. Klíčenie potom zvyčajne trvá približne tri až desať týždňov. **Najlepšie umiestnenie:** Aby váš banán nasadil ovocie, je najlepšie stáť na svetlom mieste so zvýšenou vlhkosťou a nie pod 16 ° Celzia. Leto môže tráviť aj vonku na polotienistom a teplom mieste. Ideálne sú miesta chránené pred vetrom v blízkosti tepelne akumulujúcej steny. Silný vietor často trhá listy, vďaka čomu je banán o niečo menej atraktívny. **Optimálna starostlivosť:** Mladé rastliny je najlepšie preniesť do veľkého vedra po šiestich až ôsmich týždňoch. Pre lepšiu rast by ste mali do pôdy pridať 25% piesku. Potreba vody je v letných mesiacoch vysoká - vyhnite sa však podmačaniu, aby ste nepoškodili dužinaté korene. Od apríla do októbra sa odporúča hnojenie tekutým hnojivom na rastliny každé dva týždne. **V zime:** Banány sa najlepšie ukladajú na zimný spánok pri teplote 15 ° až 18 ° Celzia - teplota by nikdy nemala klesnúť pod 10 ° Celzia. Pravidelný postrek vodou, ktorá je čo najmenej vápenná, chráni pred napadnutím škodcami. Nový rast začína opäť v apríli.



Veliki trpotec

Musa X paradisiaca

Moja lastna plantaža banan

Trajna, počasí rastoča užitna banana doseže zrelost cvetenja pri višini dveh do treh metrov in starosti treh let. Cvetovi poženejo iz središča stebila z rdečim močnim popkom, iz katerega poženejo vrtinci belih cvetov, medtem ko se cvetno steblo še podaljšuje. Zlato rumeni plodovi so brez semen. Plodno psevdosteblo, ki nastane le iz listnih ovojev, nato odmre, a iz korenine poženejo novi poganjki. Prava sadna banana izvira iz jugovzhodne Azije in je ena od izvirnih oblik sodobne sadne banane. V starih enciklopedijah so jih poznali tudi pod imenom rajska figa ali črno jabolko. Ste vedeli, da so trpotci povezani z vašim rastem v smeri sonca in tako ohranjajo svojo obliko. **Naravni habitat:** Banana izvira iz otokov jugovzhodne Azije. **Navodila za gojenje:** Gojenje iz semen v zaprtih prostorih je možno vse leto. Da bi povečali kalivost semen, jih najprej nahrapavimo z brusnim papirjem ali pilico in nato pustimo 12 ur nabrekli v vodi pri sobni temperaturi. Nato potisnite semevalžno zemljo v lončkih in le rahlo prekrijte semena z zemljo v lončkih. Preko posode s kulturo napnite živilsko folijo in v folijo prebodite nekaj lukenj. To ščiti tla pred izsušitvijo. Lonček s semeni postavite na svetlo in toplo mesto s temperaturo od 25 do 30 ° C (npr. nad grelnikom), zemlja v lončku pa naj bo vlažna, vendar ne mokra. Potem običajno traja približno tri do deset tednov, da vzklije. **Najboljša lokacija:** Da bo vaša banana obrodila, je najbolje, da stoji na svetlem mestu s povečano vlažnostjo in ne pod 16 ° C. Poletje lahko preživi tudi na prostem v polsenčnem in toplem prostoru. Pred vetrom zaščitena mesta v bližini stene za ohranjanje toplote so idealna. Močni vetrovi pogosto trgajo liste, zaradi česar je banana nekoliko manj privlačna. **Optimalna nega:** Mlade rastline je najbolje prenesti v veliko vedro po šestih do osmih tednih. Za boljšo rast morate v zemljo dodati 25% peska. Potreba po vodi je v poletnih mesecih velika - vendar se izogibajte zalivanju, da ne poškodujete mesnatih korenin. Od aprila do oktobra je priporočljivo gnojiti s tekočim gnojilom vsaka dva tedna. **V zimskem času:** Banane najbolje prezimijo pri 15 ° do 18 ° C - temperatura nikoli ne sme pasti pod 10 ° C. Pred napadom škodljivcev ščiti redno škropljenje z vodo, ki je čim manj vodnega kamna. Nova rast se ponovno začne aprila.



Platanera

Musa X paradisiaca

Mi propia plantación de plátanos

El platanero es plurianual, de crecimiento lento, y alcanza su inflorescencia a una altura de dos a tres metros y con una edad de tres años. La florescencia crece desde el medio del tronco, con un capullo gordo de color rojo del cual nacen las flores blancas, mientras que el pedúnculo sigue creciendo. Los frutos dorados no contienen semillas. El tronco que contiene los frutos muere, pero desde la raíz vuelven a brotar nuevos rebrotes. El platanero proveniente del sudeste de Asia y es variante originaria de la fruta de plátano moderna. En enciclopedias antiguas se conocía al plátano como higo del paraíso o como manzana manguera. ¿Sabías que los plátanos se retuercen buscando el sol y por ello toman su forma? **Ubicación natural:** El plátano tiene su origen en el archipiélago del sudeste asiático. **Cultivo exitoso:** La semilla se puede criar en interior durante todo el año. Grane las semillas con papel de lijar y manténgalas durante 12 horas en agua a temperatura ambiente, para hidratarlas. Este procedimiento aumentará la germinación de las mismas. Entierre las semillas en sustrato húmedo y cúbralas ligeramente con el mismo sustrato. Cubra el recipiente de cultivo con un film transparente y agujeréelo. Así protegerá la tierra de la desecación. Para evitar la putrefacción del sustrato retire el film cada dos o tres días durante 2 horas. Coloque el recipiente de cultivo en un lugar luminoso y cálido entre 25 y 30 grados (por ejemplo, encima de un radiador) y mantenga el sustrato húmedo, pero no mojado. La germinación se produce a las tres a diez semanas. **La mejor ubicación:** Para que su platanero desarrolle frutos comestible debe asegurarse que mantiene la planta en un lugar luminoso, con humedad elevada y no por debajo de 16 grados. Durante el verano manténgalo en exterior en semi sombra y en un sitio cálido. Son ideales los lugares próximos a una pared que retenga calor. El viento fuerte puede desgarrar las hojas, lo que hace parecer al platanero menos vistoso. **Cuidado óptimo:** Las plántulas se trasplantan después de seis a ocho semanas a un macetero grande. Para un mejor crecimiento se debe añadir al suelo un 25% de arena. La demanda de agua es alta en los meses de verano, pero evita el anegamiento para no dañar las raíces. De abril a octubre, cada dos semanas se recomienda suministrarle a la planta fertilizante líquido para plantas en maceta. **En el invierno:** El platanero pasa el invierno mejor en un sitio luminoso y con temperaturas de entre 15 y 18 grados, la temperatura no debe descender por debajo de 10 grados. Rocíe con regularidad con agua libre de cal, para proteger la planta contra plagas. El brote nuevo se producirá en abril.



Jitrocel velký

Musa X paradisiaca

Moje vlastní banánová plantáž

Vytrvalý, pomalu rostoucí banánovník jedlý dosahuje kvetoucí zralosti ve výšce dvou až tří metrů a stárí tři let. Květy vycházejí ze středu stonku s červeným statným pupenem, ze kterého vycházejí víry bílých květů, zatímco květní stopka se stále prodlužuje, zlatožluté plody jsou bez pecek. Plodný pseudostonek, vytvořený pouze z listových pochev, pak odumírá, ale z kořene vyrůstají nové výhony. Právý ovocný banán původem z jihovýchodní Asie je jednou z původních forem moderního ovocného banánu. Ve starých encyklopediích byly známe také pod názvem rajsý fík nebo hadicové jablko. Věděli jste, že jitrocele souvisí s vašímrostou ve směru slunce a tím si zachovávají svůj tvar. **Přirozená poloha:** Banán má svůj původ na ostrovech jihovýchodní Asie. **Úspěšné pěstování:** Pěstování ze semínek v interiéru je možné po celý rok. Aby se zvýšila klíčivost semen, měla by se nejprve zdrsňit brusným papírem nebo pilníkem a poté nechat 12 hodin nabobtnat ve vodě při pokojové teplotě. Poté semínka zatlačte dovnitř vlhkou zeminu a semena pouze lehce zakryjte zeminou. Natáhněte přilnavou fólii přes kultivační nádobu a propíchněte do fólie několik otvorů. To chrání půdu před vysycháním. Umístěte květináč na světlé a teplé místo s teplotou 25 až 30 °C (např. nad topení) a udržujte zeminu v květináči vlhkou, ale ne mokrou. Klíčení pak obvykle trvá asi tři až deset týdnů. **Nejlepší umístění:** Aby váš banán nasadil ovoce, je nejlepší stát na světlém místě se zvýšenou vlhkostí a ne pod 16° Celsia. Léto může trávit i venku na polostinném a teplém místě. Ideální jsou místa chráněná před větrem v blízkosti tepelně izolační stěny. Silný vítr často trhá listy, takže banán je o něco méně atraktivní. **Optimální péče:** Mladé rostliny je nejlepší přenést do velkého kbelíku po šesti až osmi týdnech. Pro lepší růst byste měli do půdy přidat 25% písku. Potřeba vody je v letních měsících vysoká – vyhněte se však přemokření, abyste nepoškodili dužnaté kořeny. Od dubna do října se doporučuje hnojení kapalným hnojivem na rostliny každé dva týdny. **V zimě:** Banány nejlépe hibernují při 15° až 18° Celsia – teplota by nikdy neměla klesnout pod 10° Celsia. Pravidelný postřik vodou, která je pokud možno bez vápna, chrání před napadením škůdci. Nový růst začíná opět v dubnu.



Büyük muz

Musa X paradisiaca

Kendi muz tarlam

Çok yıllık, yavaş büyüyen yenilebilir muz, iki ila üç metre yükseklikte ve üç yaşında çiçeklenme olgunluğuna ulaşır. Çiçekler gövdenin ortasından kırmızı kalın bir tomurcukla çıkar ve çiçek sapı uzamaya devam ederken içinden beyaz çiçek girdapları çıkar. Altın sarısı meyveler çekirdeksizdir. Yalnızca yaprak kılıflarından oluşan meyve veren psödotem daha sonra ölür, ancak kökten yeni sürgünler çıkar. Aslen Güneydoğu Asya'dan gelen gerçek meyve muz, modern meyve muzunun orijinal biçimlerinden biridir. Eski ansiklopedilerde cennet inciri veya hortum elması adıyla da biliniyorlardı. Plantainlerin sizinle akraba olduğunu biliyor muydunuz? Güneş yönünde büyürler ve böylece şekillerini korurlar. **Doğal konum:** Muzun kökeni Güneydoğu Asya adalarındadır. **Başarılı yetiştirme:** İç mekanlarda tohumlardan büyüme tüm yıl boyunca mümkündür. Tohumların çimlenme kapasitesini artırmak için önce zımpara veya törpü ile pürüzlendirilmeli ve ardından oda sıcaklığındaki suda 12 saat şişmeye bırakılmalıdır. Sonra tohumu içeri itinmeli sakı toprağı ve tohumları sakı toprağı ile hafifçe örtün. Kültür kabının üzerine streç film çekin ve filmde birkaç delik açın. Bu, toprağın kurumasını önler. Tohum sakısını 25 ila 30°C sıcaklıkta hafif ve sıcak bir yere koyun (örn. ısıtıcının üzerine) ve sakı toprağını nemli tutun ama ıslak değil. Daha sonra çimlenmesi genellikle yaklaşık üç ila on hafta sürer. **En iyi konum:** Muzunuzun meyve vermesi için, nemli yüksek ve 16°C'nin altında olmayan aydınlık bir yerde bekletmeniz en iyisidir. Ayrıca yazı açık havada yarı gölge ve sıcak bir yerde geçirebilir. Isı tutma duvarının yakınındaki rüzgar korumalı yerler idealdir. Güçlü rüzgarlar genellikle yaprakları yırtarak muzun biraz daha az çekici hale getirir. **Optimum bakım:** Genç bitkiler en iyi şekilde altı ila sekiz hafta sonra büyük bir kovaya aktarılır. Daha iyi büyüme için toprağa %25 kum eklemelisiniz. Yaz aylarında su ihtiyacı yüksektir - ancak etli köklere zarar vermek için su birikmesinden kaçın. Nisan'dan Ekim'e kadar iki haftada bir sıvı küvet bitki gübresi ile gübreleme önerilir. **Kışın:** Muz en iyi 15° ila 18°C sıcaklıkta kış uykusuna yatar - sıcaklık asla 10°C'nin altına düşmemelidir. Mümkün olduğunca kireçsiz su ile düzenli püskürtme, haşere istilasına karşı koruma sağlar. Nisan ayında yeni büyüme yeniden başlar.



Nagy útifű

Musa X paradisiaca

Saját banánültetvényem

Az évelő, lassan nőő ehető banán két-három méteres magasságban éri el a virágzási érettséget és hároméves kort. A virágok a szár közepéből emelkednek ki egy vörös, vaskos bimbóval, amelyből fehér virágok örvénylenek, miközben a virágszár tovább nyúlik. Az aranysárga termések magtalanok. A csak a levélhüvelyekből képződött termő pszeudostem ekkor elhal, de a gyökérből új hajtások nőnek ki. Az eredetileg Délkelet-Ázsiából származó valódi gyümölcsbanán a modern gyümölcsbanán egyik eredeti formája. A régi enciklopédiákban paradicsomi füge vagy tömlőalma néven is ismerték. Tudtad, hogy az útifű rokon az Óna nap irányába nőnek, és így megtartják alakjukat. **Természetes elhelyezkedés:** A banán eredete a délkelet-ázsiai szigetekről származik. **Sikeres termesztés:** A beltéri magvak termesztése egész évben lehetséges. A magvak csírázókéességének növelése érdekében először csiszolópapírral vagy reszelővel érdesíteni kell, majd 12 órán át szobahőmérsékleten vízben megduzzadni. Ezután nyomja be a magot nedves virágföldet, és csak enyhén takarja be virágfölddel a magokat. Nyújtson ragasztó fóliát a tenyészédényre, és szúrjon ki néhány lyukat a fóliába. Ez megvédi a talajt a kiszáradástól. Helyezze a magcserepet világos és meleg, 25-30°C-os helyre (például a fűtőberendezés fölé), és tartsa nedvesen, de ne nedvesen a virágföldet. Ezután általában körülbelül három-tíz hétig tart a csírázás. **A legjobb hely:** Annak érdekében, hogy a banán megtermeljen, a legjobb, ha világos, megnövekedett páratartalmú helyen áll, és nem lehet 16 Celsius-fok alatt. A nyarat a szabadban is töltheti, félárnyékos, meleg helyen. A szélvédett helyek a hőtartó fal közelében ideálisak. Az erős szél gyakran letépi a leveleket, így a banán egy kicsit kevésbé vonzó. **Optimális gondozás:** A fiatal növényeket legjobb hat-nyolc hét elteltével egy nagy vödörbe helyezni. A jobb növekedés érdekében 25% homokot kell hozzáadni a talajhoz. A nyári hónapokban nagy a vízigény – de kerüljük a felvizesedést, hogy ne károsítsuk a húsos gyökereket. Áprilistól októberig ajánlott kététhetente folyékony kádas növényi műtrágyával trágyázni. **Télen:** A banán a legjobban 15-18 Celsius fokon hibernál – a hőmérséklet soha nem eshet 10 Celsius-fok alá. A lehető legmérszentesebb vízzel történő rendszeres permetezés véd a kártevőktől. Áprilisban újra beindul az új növekedés.

: : : : :



コモンバナナ

Musa X paradisiaca

私のバナナの苗

多年生でゆっくりと成長します。3年後には高さが2~3mのになり、成熟して花を咲かせます。幾重にもなる白い花と赤い芽が幹の中央から伸び、茎は絶えず成長を続けます。黄色い実には種はありません。葉鞘でのみ形成された偽茎は枯れますが、根から新たに発芽します。東南アジアの原産のコモンバナナは、現在の一般的な食用バナナのもとになっています。古い百科事典では、デザートバナナのような他の名称でも扱われています。太陽に向かって成長するのでバナナは曲がった形になるとご存知でしたか？!

自然な場所: もともとは、東南アジアの島地域が原産です。

栽培成功:

種子繁殖は室内で年間を通して可能です。発芽率を高める方法として、柔らかめのサンドペーパーなどで種の表面を粗面化し、温水に12時間浸します。湿った用土に種をまき、その上から少量の用土をかぶせます。乾燥を防ぐためサランラップなどの透明フィルムでカバーします。透明フィルムには空気穴をいくつかあけ、2~3日に1回は約2時間、完全にフィルムを鉢から外します。そうすることで、カビの発生を防ぎます。25°C~30°Cの明るく暖かい(暖房のそばなど)場所に置き、用土は湿った状態に保ちます。温度によりますが、通常は3~10週間で発芽します。

最高のロケーション:

16°Cくらいの明るく湿気が多い場所での保管が最良です。夏の間は屋外の暖かい半日陰でも保管できます。防風された蓄熱壁のそばが最適です。強風で葉が裂けてしまうと、バナナの外観が損なわれます。

最適なケア:

若い苗木は、6~8週間後に大きめの鉢に植え替えをするのが最良です。成長を促進するには、土壌に25%の砂を混ぜる必要があります。夏にはたくさんの水が必要です。しかし、根を痛めないために水浸しに注意します。4月~10月の間は鉢植え植物用の肥料を2週間ごとに与える事をお勧めします。

冬に:

冬越しは15°C~18°Cくらいの明るい場所に保管します。摂氏10度以下の環境には耐えられません。害虫の侵入を防ぐため、定期的に石灰含有量の少ない水で葉水をします。4月には再び発芽します。

SKU: 12979 / Große Essbanane