



SAFLAX®



Tips



© Sage Ross - CC-BY-SA-3.0

Acer buergerianum

	 Български	BG		2		 Malti	MT		5
	 Dansk	DK		2		 Nederlands	NL		5
	 Deutsch	DE		2		 Norsk	NO		6
	 English	UK		2		 Polski	PL		6
	 Eesti	EE		3		 Português	PT		6
	 Suomalainen	FI		3		 Românesc	RO		6
	 Français	FR		3		 Svenska	SE		7
	 Ελληνική	GR		3		 Slovensky	SK		7
	 Gaeilge	IE		4		 Slovenski	SI		7
	 íslenskur	IS		4		 Español	ES		7
	 Italiano	IT		4		 Český	CZ		8
	 Hrvatski	HR		4		 Türkçe	TR		8
	 Latviešu	LV		5		 Magyar	HU		8
	 Lietuvių kalba	LT		5		 日本語	JP		9



Триъбец клен

Acer buergerianum

Красива малка форма на листа / бонсай на открито

Широколистният триъбец е истинска рядкост от източен Китай, чиито сравнително малки листа имат три върха. Когато поникнат, те първо стават светлооранжеви, а след това зелени в течение на годината, като накрая се променят в есенния цвят спектър от оранжево-червен до огненочервен. **Естествено местоположение:** Естественният ареал на триъбеца се простира от Китай през Тайван до Япония, където расте от брега до 1500 метра над морското равнище. **Успешно отглеждане:** Отглеждането е възможно цялгодишно. За да се увеличи кълняемостта на семената, първо трябва да се поставят в хладилника за една седмица за стратификация. След това оставете семената да се намокнат в топла вода за 24 часа и след това ги поставете на половин сантиметър дълбочина във влажен субстрат за отглеждане или добра почва за бонсай. Покрийте съда с култура с домакинско фолио, което сте осигурили с дупки. Това предпазва почвата от изсушаване. Трябва да отстранявате фолиото за 2 часа на всеки два до три дни. Това предотвратява образуването на мухъл върху растящата почва. Поставете саксията със семена на светло и топло място с 20 до 25° по Целзий и поддържайте почвата влажна, но не мокра. Тъй като семената покръват бавно и доста нередовно, **Най-доброто местоположение:** За разлика от европейския клен, триъбният клен обича да бъде защитен от вятъра на частична сянка и трябва поне да бъде защитен от пряко обедно слънце. **Оптимална грижа:** Вашият Acer buergerianum изисква много вода, въпреки че трябва да избягвате преовлажняване. Торете с течен тор за бонсай на интервали от две седмици от началото на поникването на листата до началото на оцветяването на листата през есента. С млади дървета можете да постигнете дебел ствол, здрави клонови и фини разклонения, като позволите на новите издънки да растат до 8 - 10 чифта листа и след това отрежете обратно до един или два чифта листа. Всички стилови форми с изключение на формата на метла са възможни. Вашият клен ще развие силен растеж на корените и трябва да се пресажда всяка година, но поне на всеки две години, с подрязване на корените в началото на пролетта. **През зимата:** Триъбният клен е ограничен устойчив и трябва да бъде добре защитен, особено когато е млад до четвъртата година и когато се очакват температури под -10° по Целзий. Поливайте и през зимата в дните без замръзване, но по-рядко.



Trident ahorn

Acer buergerianum

Smuk lille bladform / udendørs bonsai

Den løvfældende trefork ahorn er en ægte sjældenhed fra det østlige Kina, hvis relativt små blade har tre spidser. Når de spirer, bliver de først lysorange og derefter grønne i løbet af året og skifter til sidst til et efterårsfarvespektrum fra orangerød til flammerød. **Naturlig beliggenhed:** Trident ahornens naturlige udbredelse strækker sig fra Kina gennem Taiwan til Japan, hvor den vokser fra kysten til 1500 meter over havets overflade. **Succesfuld dyrkning:** Dyrkning er mulig hele året rundt. For at øge spireevnen af frøene skal de først stilles i køleskabet i en uge til stratificering. Lad derefter frøene trække i stuevarmt vand i 24 timer og læg dem derefter en halv centimeter dybt i fugtigt vækstsustrat eller god bonsai-jord. Dæk dyrkningskarret til med husholdningsfilm, som du forsyner med huller. Dette beskytter jorden mod udtørring. Du bør fjerne folien i 2 timer hver anden til tredje dag. Dette forhindrer mug i at dannes på den voksende jord. Stil frøpotten et let og varmt sted med 20 til 25° Celsius og hold pottejorden fugtig, men ikke våd. Da frøene spirer langsomt og ret uregelmæssigt, **Den bedste beliggenhed:** I modsætning til den europæiske ahorn, kan treforken godt lide at være i læ for vinden i halvskygge og bør i det mindste beskyttes mod direkte middagssol. **Optimal pleje:** Din Acer buergerianum kræver masser af vand, selvom du bør undgå vandfyldning. Gød med flydende bonsai-gødning med to ugers mellemrum fra begyndelsen af bladspirer til begyndelsen af bladfarvning om efteråret. Med unge træer kan du opnå en tyk stamme, stærke grene og fin forgrening ved at lade nye skud vokse til 8 - 10 bladpar og derefter klippe tilbage til et eller to blade. Alle stilformer undtagen kostformen er mulige. Din ahorn vil udvikle kraftig rodvækst og bør ompottes årligt, men mindst hvert andet år, med rodbeskæring i det tidlige forår. **Om vinteren:** Trident ahornen er hårdfør i begrænset omfang og bør være godt beskyttet, især når den er ung op til det fjerde år, og når temperaturen forventes at falde til under -10° Celsius. Vand også om vinteren på frosthøje dage, men sjældnere.



Dreispißzahorn

Acer buergerianum

Hübsche kleine Blattform / Freiland-Bonsai

Der laubabwerfende Dreispißzahorn ist eine echte Rarität aus Ostchina, dessen relativ kleine Blätter drei Spitzen aufweisen. Beim Austrieb färben sie sich von zunächst hell orange und dann im Laufe des Jahres grün, um letztendlich in ein herbstliches Farbspektrum von orangerot bis flammenrot überzugehen. **Naturstandort:** Das natürliche Verbreitungsgebiet des Dreispiß-Ahorn reicht von China über Taiwan bis nach Japan, wo er von der Küste bis auf 1500 Meter Höhe wächst. **Anzucht:** Die Anzucht ist das ganze Jahr über möglich. Um die Keimfähigkeit der Samen zu erhöhen, sollten sie zunächst eine Woche im Kühlschrank zur Stratifizierung verbringen. Lassen Sie die Samen dann noch für 24 Stunden in raumwarmem Wasser vorquellen und setzen Sie danach einen halben Zentimeter tief in feuchtes Anzuchtsubstrat oder gute Bonsaierde. Decken Sie das Anzuchtgefäß mit Klarsichtfolie ab, die Sie mit Löchern versehen. So ist die Erde vor Austrocknung geschützt. Alle zwei bis drei Tage sollten Sie die Folie für 2 Stunden entfernen. Das beugt einer Schimmelbildung auf der Anzuchterde vor. Stellen Sie das Anzuchtgefäß an einen hellen und warmen Ort mit 20 bis 25° Celsius und halten Sie die Anzuchterde feucht, aber nicht nass. Da die Samen langsam und eher unregelmäßig keimen, erscheinen die ersten Sämlinge zumeist erst nach acht bis zwölf Wochen. **Standort:** Im Gegensatz zum europäischen Ahorn steht der Dreispiß-Ahorn gern windgeschützt im Halbschatten und sollte zumindest vor direkter Mittagssonne geschützt werden. **Pflege:** Ihr Acer buergerianum verlangt reichlich nach Wasser, wobei Sie Staunässe vermeiden sollten. Düngen Sie vom Beginn des Blattaustriebs bis zum Einsetzen der Blattfärbung im Herbst mit flüssigem Bonsaidünger im Abstand von zwei Wochen. Bei jungen Bäumen erreichen Sie einen dicken Stamm, kräftige Äste und eine feine Verzweigung, indem Sie neue Triebe bis auf 8 - 10 Blattpaare heranwachsen lassen und dann bis auf ein bis zwei Blattpaare zurückschneiden. Alle Stilformen außer der Besenform sind möglich. Ihr Ahorn wird ein kräftiges Wurzelwachstum entwickeln und sollte am besten jährlich, mindestens aber alle zwei Jahre mit Wurzelschnitt im zeitigen Frühjahr umgetopft werden. **Im Winter:** Der Dreispiß-Ahorn ist begrenzt winterhart und sollte gerade im Jugendstadium bis zum vierten Jahr und bei erwarteten Temperaturen unter -10° Celsius gut geschützt werden. Gießen Sie auch im Winter an frosthfreien Tagen, aber seltener.



Bonsai - Three Toothed Maple

Acer buergerianum

Small and neatly shaped leaves / Outdoor Bonsai

The deciduous Three Toothed Maple is a real curiosity from East China that develops rather small leaves with three tips. While sprouting, the leaves take on an initially bright orange colour, which turns into green during the year, and in autumn the tree displays a whole colour spectrum from orange-red to fiery-red coloured leaves. **Natural location:** The natural habitat of the Three Toothed Maple stretches from China to Taiwan and further until Japan, where it grows from coastal areas until up to 1500 meters above sea level. **Successful cultivation:** Seed propagation indoors is possible throughout the year. To increase the germinability, you should initially keep the seeds in the refrigerator for about a week for stratification - then place them for another 24 hours in a bowl with lukewarm water for priming. After that, plant the seeds about 0,5 cm deep into moist potting compost or proper bonsai earth. Cover the seed container with clear film to prevent the earth from drying out, but don't forget to make some holes in the clear film and take it every second or third day completely off for about 2 hours. That way you avoid mold formation on your potting compost. Place the seed container somewhere bright and warm with a temperature between 20°C and 25° Celsius and keep the earth moist, but not wet. Since the seeds germinate rather slow and intermittently, it usually takes about eight to twelve weeks until the first seedlings come up. **The best location:** Other than the European Maple, the Acer buergerianum likes to be kept in a half-shaded and wind-protected place - at least it should be sheltered from the strong midday sun. **Optimal care:** The tree needs to be watered plentiful, but without waterlogging. From the start of the leaf formation until the beginning of the autumn coloration, you may provide your bonsai with fluid fertilizer for bonsai plants every two weeks. To develop a firm stem, strong branches and a neat ramification in young trees, you should always let the new shoots grow eight to ten leaf pairs, before pruning back to only one or two pairs. Every bonsai type except the broom shape are possible for cultivation. The Three Toothed Maple develops a strong rooting and should be repotted preferably every year, at least every two years - shift the plant in early spring after a brief root cutting to a new pot. **In the winter:** The Three Toothed Maple is only limited frost-hard and, especially young plants until four years of age, should be properly protected in areas with winter temperatures below -10° Celsius. Keep watering the plant, but only modestly and only on frost-free days.



Trident vaher Acer buergerianum Päris väike lehekuju / välibonsai

Ida-Hiinast pärit lehtkolmik vaher on tõeline haruldus, mille suhteliselt väikestel lehtedel on kolm teravikku. Kui nad tärkavad, muutuvad nad aasta jooksul esmalt heleoranžiks ja seejärel roheliseks, muutudes lõpuks sügiseks värvspektri oranžikaspunasest leekpunaseks. **Looduslik asukoht:** Trident vahtra looduslik levila ulatub Hiinast läbi Taiwanini kuni Jaapanini, kus ta kasvab rannikust kuni 1500 meetri kõrgusele merepinna. **Edukas kasvatamine:** Kasvatamine on võimalik aastaringselt. Seemnete idanemisvõime suurendamiseks tuleks need kõigepealt nädalaks kihistumiseks külmkappi panna. Seejärel lase seemnetel 24 tundi toasoojas vees liguneda ja aseta siis poole sentimeetri sügavusele niiskesse kasvusubstraati või heasse bonsaimulda. Kata kultuurianum toidukilega, mille varustad aukudega. See kaitseb mulda kuivamise eest. Peaksite fooliumi eemaldama 2 tunniks iga kahe kuni kolme päeva järel. See takistab hallituse teket kasvupinnal. Asetage külvipott valgusküllasesse ja sooja kohta, mille temperatuur on 20–25 °C, ning hoidke istutusmuld niiskena, kuid mitte märjana. Kuna seemned idanevad aeglaselt ja üsna ebaregulaarselt, **Parim asukoht:** Vastupidiselt euroopa vahtrale meeldib kolmikvahtrale tuule eest varjatud poolvarjus ja seda tuleks kaitsta vähemalt otsese keskpäevase päikese eest. **Optimaalne hooldus:** Teie Acer buergerianum vajab palju vett, kuigi peaksite vältima vettimist. Vätada bonsai vedelväetisega kahenädalaste intervallidega lehtede tärmakase algusest lehtede värvumise alguseni sügisel. Noorte puudega saavutate jämeda tüve, tugevad oksad ja peene hargnemise, kui lasete uutel võrsetel kasvada 8–10 paari lehtedeni ja lõigates seejärel tagasi ühe või kahe lehepaarini. Võimalikud on kõik stiilivormid peale harjavormi. Teie vahter kasvab jõuliselt ja seda tuleks ümber istutada igal aastal, kuid vähemalt iga kahe aasta tagant, juurte pügamisega varakevadel. **Talvel:** Trident vahter on piiratud määral vastupidav ja seda tuleks hästi kaitsta, eriti kui ta on noor kuni neljanda aastani ja kui temperatuur langeb eeldatavasti alla -10 °C. Kasta ka talvel külmavabadel päevadel, kuid harvemini.



Trident vaahtera Acer buergerianum Melko pieni lehtien muotoinen / ulkoilmabonsai

Lehtimäinen kolmihammasvaahtera on todellinen harvinaisuus Itä-Kiinasta, jonka suhteellisen pienissä lehdissä on kolme kärkeä. Itäessään ne muuttuvat ensin vaalean oransseiksi ja sitten vihreiksi vuoden mittaan ja lopulta muuttuvat syksyisiksi värikirjoiksi oranssinpunaisesta liekinpunaiseksi. **Luonnollinen sijainti:** Trident-vaahteran luonnollinen levinneisyysalue ulottuu Kiinasta Taiwanin kautta Japaniin, jossa se kasvaa rannikolta 1500 metriin merenpinnan yläpuolelle. **Onnistunut viljely:** Viljely on mahdollista ympäri vuoden. Siementen itämiskykyyn lisäämiseksi ne tulee ensin laittaa jääkaappiin viikoksi kerrostumista varten. Anna siementen liota huoneenlämpöisessä vedessä 24 tuntia ja laita ne sitten puolen sentin syvyyteen kosteaan kasvualustaan tai hyvään bonsai-maahan. Peitä viljelyastia kelmalla, johon on tehty reikiä. Tämä suojaaa maaperää kuivumiselta. Poista folio 2 tunnin ajaksi kahden tai kolmen päivän välein. Tämä estää homeen muodostumisen kasvumaahan. Aseta siemenruukku valoisaan ja lämpimään paikkaan, jonka lämpötila on 20–25 °C, ja pidä istutusmaa kosteana, mutta ei märkänä. Koska siemenet itävät hitaasti ja melko epäsäännöllisesti, **Paras sijainti:** Toisin kuin eurooppavaahtera, kolmihampainen vaahtera pitää tuulelta suojaassa osittain varjossa ja sitä tulee suojata ainakin suoralta keskipäivän auringolta. **Optimaalinen hoito:** Acer buergerianumissasi tarvitaan runsaasti vettä, mutta sinun tulee välttää veden kastumista. Lannoita nestemäisellä bonsai-lannoitteella kahden viikon välein lehtien itämisen alusta lehtien värjäytymisen alkamiseen syksyllä. Nuorilla puilla voit saavuttaa paksun rungon, vahvat oksat ja hienon haarautumisen antamalla uusien versojen kasvua 8–10 lehtipariksi ja leikkaamalla sitten yhdeksi tai kahdeksi lehtipariksi. Kaikki tyyliuudot luutamuotoa lukuun ottamatta ovat mahdollisia. Vaahteraksi kehittää voimakasta juurikasvua, ja se tulisi istuttaa uudelleen vuosittain, mutta vähintään kahden vuoden välein, ja juuret karsitaan aikaisin keväällä. **Talvella:** Trident-vaahtera on rajoitetusti kestävä, ja sitä tulee suojata hyvin, varsinkin kun se on nuori neljään vuoteen asti ja kun lämpötilan odotetaan laskevan alle -10 °C. Kastele myös talvella pakkaspäivinä, mutta harvemmin.



Erable trident Acer buergerianum Des petites feuilles jolies / Bonsai de jardin

L'érable trident à feuilles caduques est une vraie rareté de l'est de la Chine dont les feuilles relativement petites poussent de trois sommets. Lors de la pousse, elles se colorent d'abord en orange clair, puis en vert au cours des années, afin de passer à une couleur rouge-orange à rouge feu pendant l'automne. **Emplacement naturel:** L'aire de distribution naturelle de l'érable trident se répand de la Chine et du Taiwan jusqu'au Japon, où il grandit de la côte jusqu'à des altitudes de 1 500 mètres. **Culture réussie:** La culture des graines est possible tout au long de l'année. Pour améliorer la faculté germinative des graines, vous devez d'abord mettre les graines dans le réfrigérateur pendant une semaine pour passer la stratification. Ensuite, laissez les graines dans de l'eau à température ambiante pendant 24 heures, puis mettez-les dans du substrat humide ou de la bonne terre pour bonsai à 0,5 cm de profondeur. Couvrez le récipient avec une feuille transparente dans laquelle vous faites des trous. Comme ça, le terreau est protégé du dessèchement. Vous devez enlever la feuille pendant deux heures tous les deux ou trois jours. Ceci prévient la formation de moisissures dans le terreau. Mettez le récipient dans un endroit lumineux et chaud de 20° à 25° Celsius et gardez le terreau humide, mais pas mouillé. Comme les graines germent lentement et plutôt irrégulièrement, les premiers semis apparaissent seulement après huit à douze semaines en général. **Le meilleur emplacement:** Contrairement à l'érable européen, l'érable trident aime des emplacements mi-ombragés et protégés du vent et doit au moins être protégé des rayonnements directs du soleil du midi. **Soins optimaux:** Votre érable trident exige beaucoup d'eau, mais vous devez éviter l'eau stagnante. Engraissez-le toutes les deux semaines du début de la pousse des feuilles jusqu'à la coloration des feuilles en automne avec de l'engrais liquide pour bonsai. Chez les jeunes arbres, vous obtenez un tronc dense, des branches puissantes, et une ramification fine en laissant des nouvelles pousses grandir jusqu'à ce qu'elles aient 8-10 paires de feuilles, puis en les raccourcissant d'une ou deux paires de feuilles. Il est possible de façonner l'arbre dans n'importe quel style exceptée la forme de balai. Votre érable développera une forte croissance racinaire et doit être rempoté de préférence tous les deux ans minimum en printemps et avec une taille des racines. **En hiver:** La rusticité de l'érable trident est limitée et doit être bien protégé à des températures prévues inférieures à -10° Celsius jusqu'à la quatrième année. Arrosez la plante aussi pendant les jours sans gel en hiver, mais moins souvent.



Τρίαίνα σφενδάμι Acer buergerianum Όμορφο μικρό σχήμα φύλλου / μπονσάι εξωτερικού χώρου

Ο φυλλοβόλος τρίαίντας σφένδαμος είναι μια πραγματική σπανιότητα από την ανατολική Κίνα, του οποίου τα σχετικά μικρά φύλλα έχουν τρία σημεία. Όταν φυτρώνουν, αρχικά γίνονται ανοιχτό πορτοκαλί και στη συνέχεια πράσινα κατά τη διάρκεια του έτους, αλλάζουν τελικά σε ένα φθινοπωρινό χρωματικό φάσμα από πορτοκαλοκόκκινο σε κόκκινο της φλόγας. **Φυσική τοποθεσία:** Η φυσική περιοχή του σφενδάμου Trident εκτείνεται από την Κίνα μέσω της Ταϊβάν έως την Ιαπωνία, όπου αναπτύσσεται από την ακτή έως τα 1500 μέτρα πάνω από την επιφάνεια της θάλασσας. **Επιτυχημένη καλλιέργεια:** Η καλλιέργεια είναι δυνατή όλο το χρόνο. Για να αυξηθεί η βλαστική ικανότητα των σπόρων, θα πρέπει πρώτα να τοποθετηθούν στο ψυγείο για μια εβδομάδα για στρωματοποίηση. Στη συνέχεια, αφήστε τους σπόρους να μουλιάσουν σε ζεστό νερό του δωματίου για 24 ώρες και στη συνέχεια τοποθετήστε τους σε βάθος μισού εκατοστού σε υγρό υπόστρωμα ανάπτυξης ή σε καλό χώμα μπονσάι. Καλύψτε το δοχείο καλλιέργειας με μεμβράνη, την οποία ανοίγετε με τρύπες. Αυτό προστατεύει το έδαφος από το στέγνωμα. Θα πρέπει να αφαιρείτε το αλουμινόχαρτο για 2 ώρες κάθε δύο έως τρεις ημέρες. Αυτό αποτρέπει τη δημιουργία μούχλας στο αναπτυσσόμενο έδαφος. Τοποθετήστε τη γλάστρα σε ένα ελαφρύ και ζεστό μέρος με θερμοκρασία 20 έως 25° Κελσίου και διατηρήστε το χώμα της γλάστρας υγρό αλλά όχι υγρό. Επειδή οι σπόροι βλασταίνουν αργά και μάλλον ακανόνιστα, **Η καλύτερη τοποθεσία:** Σε αντίθεση με τον ευρωπαϊκό σφενδάμι, ο σφένδαμος της τρίαίνας αρέσει να προστατεύεται από τον άνεμο σε μερική σκιά και θα πρέπει τουλάχιστον να προστατεύεται από τον άμεσο μεσημεριανό ήλιο. **Βέλτιστη φροντίδα:** Το Acer buergerianum σας απαιτεί άφθονο νερό, αν και θα πρέπει να αποφύγετε την υπερχείλιση. Λιπάνετε με υγρό λίπασμα μπονσάι σε διαστήματα δύο εβδομάδων από την αρχή της βλάστησης των φύλλων έως την έναρξη του χρωματισμού των φύλλων το φθινόπωρο. Με νεαρά δέντρα, μπορείτε να επιτύχετε έναν χοντρό κορμό, δυνατά κλαδιά και λεπτή διακλάδωση επιτρέποντας στους νέους βλαστούς να μεγαλώσουν σε 8 - 10 ζεύγη φύλλων και στη συνέχεια κόβοντας ξανά σε ένα ή δύο ζευγάρια φύλλα. Όλες οι μορφές στυλ εκτός από τη φόρμα σκούπας είναι δυνατές. Το σφενδάμι σας θα αναπτύξει έντονη ανάπτυξη ριζών και θα πρέπει να μεταφτερεύεται ετησίως, αλλά τουλάχιστον κάθε δύο χρόνια, με κλάδεμα ρίζας στις αρχές της άνοιξης. **Το χειμώνα:** Ο σφένδαμος Trident είναι ανθεκτικός σε περιορισμένο βαθμό και θα πρέπει να προστατεύεται καλά, ειδικά όταν είναι νέος μέχρι το τέταρτο έτος και όταν οι θερμοκρασίες αναμένεται να πέσουν κάτω από τους -10° Κελσίου. Ποτίστε επίσης το χειμώνα τις μέρες χωρίς παγετό, αλλά λιγότερο συχνά.



Maple Trident

Acer buergerianum

Cruth deas beag duille / bonsai amuigh faoin aer

Is fíor-ghann é an maple trident dhuillsilteach ó oirthear na Síne, a bhfuil trí phointe ag a duilleoga measartha beag. Nuair a fhásann siad, casann siad oráiste éadrom ar dtús agus ansin glas i rith na bliana, ag athrú go speictream datha an fhómhair ó oráiste-dearg go dearg lasair. **Suíomh nádúrtha:** Síneann raon nádúrtha maple Trident ón tSín trí Taiwan go dtí an tSeapáin, áit a bhfásann sé ón gcósta go 1500 méadar os cionn leibhéal na farraige. **Saothrú rathúil:** Is féidir saothrú ar feadh na bliana. D'fhonn cumas phéacadh na síolta a mhéadú, ba chóir iad a chur ar dtús sa chuisneoir ar feadh seachtaine le haghaidh srathaithe. Ansin lig na síolta soak in uisce te seomra ar feadh 24 uair an chloig agus ansin iad a chur leath ceintiméadar domhain i tsustráit fás tais nó ithir bonsai maith. Clúdaigh an soitheach cultúir le scannán cling, a sholáthraíonn tú le poill. Cosnaíonn sé seo an ithir ó thriomh amach. Ba chóir duit an scragall a bhaint ar feadh 2 uair gach dhá nó trí lá. Cuireann sé seo cosc ar mhúla a fhoirmiú ar an ithir atá ag fás. Cuir an pota síolta in áit éadrom te ag 20 go 25 ° Celsius agus coinnigh an ithir potaithe tais ach ní fliuch. Ós rud é go bpéacann na síolta go mall agus go neamhrialta, **An suíomh is fearr:** I gcodarsnacht leis an maple Eorpach, is maith leis an maple trident a bheith foscadh ón ghaoth i scáth páirteach agus ba chóir ar a laghad a chosaint ó ghrian díreach meán lae. **Cúram is fearr is féidir:** Tá go leor uisce ag teastáil ó do Acer buergerianum, cé gur chóir duit uisce a sheachaint. Fertilize le leasachán bonsai leachtach ag eatraimh dhá sheachtain ó thús sprouting duille go dtí tosú dathú na duilleoga san fhómhar. Le crainn óga, is féidir leat stoc tiubh, brainsí láidre agus brainseach mín a bhaint amach trí ligeán do shoots nua fás go 8 - 10 péire duilleoga agus ansin gearradh siar go dtí péire duilleoga amháin nó dhó. Is féidir le gach foirm stíl ach amháin an fhoirm broom. Forbróidh do mhailpe fás fréimhe briomhar agus ba chóir é a repotted go bliantúil, ach ar a laghad gach dhá bhliain, le bearradh fréimhe go luath san earrach. **Sa gheimhreadh:** Tá an maple Trident crua go pointe teoranta agus ba chóir é a chosaint go maith, go háirithe nuair a bhíonn sé óg suas go dtí an ceathrú bliain agus nuair a mheastar go dtitfidh an teocht faoi -10 ° Celsius. Chomh maith leis sin uisce sa gheimhreadh ar laethanta saor ó sioc, ach níos lú go minic.



Trident hlynur

Acer buergerianum

Frekar lítið laufform / bonsai úti

Ljófandi þríandhlynur er algjör sjaldgæfur frá austurhluta Kína, en tiltölulega lítil blöð hans eru með þrjá punkta. Þegar þær spretta verða þær fyrst ljósappelsínugul og síðan grænar yfir árið og breytast loks í haustlitir úr appelsínuraudu í lograutt. **Náttúruleg staðsetning:** Náttúrulegt útbreiddslusvæði Trident-hlynsins nær frá Kína í gegnum Taívan til Japan, þar sem hann vex frá ströndinni í 1500 metra hæð yfir sjávarmáli. **Árangursrík ræktun:** Ræktun er möguleg allt árið um kring. Til að auka spírunargetu fræanna ætti fyrst að setja þau í kalli í viku til lagskiptingar. Látið síðan fræin liggja í bleyti í herbergisheitu vatni í sólarhring og setjið þau svo hálf sentímetra djúpt í rakt vaxtarlag eða góðan bonsai jarðveg. Hyljið ræktunarilátið með matarfilmu, sem þú útvegar með götum. Þetta verndar jarðveginn gegn þurrkun. Þú ættir að fjarlægja álpappírinn í 2 klukkustundir á tveggja til þriggja daga fresti. Þetta kemur í veg fyrir að mygla myndist á vaxandi jarðvegi. Settu fræpottinn á léttan og heitan stað með 20 til 25 ° Celsius og haltu pottajarðveginum rökum en ekki blautum. Þar sem fræin spíra hægt og frekar óreglulega, **Besta staðsetningin:** Ófugt við evrópska hlyninn vill þríhyrningurinn helst vera í skjóli fyrir vindi í hálfskugga og ætti að minnsta kosti að vera verndaður fyrir beinni hádegissól. **Besta umönnun:** Acer buergerianum þitt þarf nóg af vatni, þó þú ættir að forðast vatnsrennsli. Frjógvaðu með fljótandi bonsai áburði með tveggja vikna millibili frá upphafi laufspírunar þar til laufflitun hefst að hausti. Með ungum trjám er hægt að ná þykum stofni, sterkum greinum og finum greinum með því að leyfa nýjum sprotum að vaxa upp í 8 - 10 blaðapör og klippa svo aftur í eitt eða tvö laufapör. Öll stílform nema kústformið eru möguleg. Hlynurinn þinn mun þróa með sér kröftugan rótarvöxt og ætti að planta hann aftur árlega, en að minnsta kosti á tveggja ára fresti, með rötarklippingu snemma á vorin. **Á veturna:** Trident hlynur er harðgerður að takmörkuðu leyti og ætti að vera vel varinn, sérstaklega þegar hann er ungur fram á fjórða árið og þegar búist er við að hiti fari niður fyrir -10° á Celsius. Vökva einnig á veturna á frostlausum dögum en sjaldnar.



Acero tridente

Acer buergerianum

Piccole foglie dalla forma graziosa / Bonsai da esterno

L'Acero tridente deciduo è una vera rarità che viene dalla Cina orientale, le cui foglie relativamente piccole presentano tre punte. Allo sbocciare si tingono prima di arancio chiaro e poi, nel corso degli anni, di verde, per poi terminare in una gamma di colori autunnali che va dal rosso-arancio al rosso fuoco. **Posizione naturale:** L'areale dell'Acero tridente va dalla Cina a Taiwan passando per il Giappone, dove cresce dalla costa fino a 1500 metri di altezza. **Coltivazione riuscita:** La coltivazione da semi in casa è possibile durante tutto l'anno. Per aumentare la germinabilità dei semi, lasciateli per una settimana in frigorifero per portarli alla stratificazione, poi immergeteli per 24 ore in un recipiente con acqua a temperatura ambiente. In seguito collocate i semi a circa mezzo centimetro di profondità nel substrato di coltivo umido o in una buona terra per bonsai. Coprite il recipiente di coltivazione con pellicola trasparente, sulla quale praticherete dei fori, in questo modo la terra eviterà di seccarsi. Ogni due o tre giorni rimuovete la pellicola per 2 ore, per prevenire la formazione di muffe sulla terra. Collocate il recipiente di coltivazione in un luogo luminoso e caldo, a una temperatura fra i 20° e i 25°C e mantenete il substrato umido, ma non bagnato. I semi germinano lentamente e in maniera irregolare, le prime piantine compariranno da otto a dodici settimane dopo. **La posizione migliore:** Al contrario dell'Acero europeo, l'Acero tridente predilige gli ambienti a mezz'ombra e al riparo dal vento e andrebbe protetto dal sole diretto di mezzogiorno. **Cura ottimale:** Il vostro Acer buergerianum ha bisogno di molta acqua, evitando i ristagni idrici. Dalla prima comparsa delle foglie fino alla colorazione delle stesse in autunno concimate ogni due settimane con fertilizzante liquido per bonsai. Nei giovani alberi assisterete alla formazione di un tronco spesso, rami robusti e ramificazioni delicate, sulle quali lascerete crescere 8-10 coppie di foglie, per poi tagliare 1-2 coppie. Si possono realizzare tutti gli stili di bonsai, eccetto la scopa rovesciata. Il vostro Acero radicherà in maniera robusta e dovrebbe essere trapiantato ogni anno - al massimo ogni due - all'inizio della primavera. **In inverno:** Il vostro Acero tridente è limitatamente resistente al freddo e dovrebbe essere protetto, soprattutto in età giovane e fino al quarto anno, evitando temperature che scendano sotto i -10° C. Innaffiate anche in inverno nei giorni senza gelate, ma meno.



Trozubi javor

Acer buergerianum

Lijep mali oblik lišća / vanjski bonsai

Listopadni trozubi javor prava je rijetkost iz istočne Kine, čiji relativno mali listovi imaju tri šiljka. Kad niknu, prvo postanu svijetlonarančaste, a zatim tijekom godine zelene, da bi se konačno promijenile u jesenski spektar boja od narančasto-crvene do plameno crvene. **Zemlja porijekla:** Prirodno područje rasprostranjenosti javora Tridenta proteže se od Kine preko Tajvana do Japana, gdje raste od obale do 1500 metara nadmorske visine. **Uspješan uzgoj:** Uzgoj je moguć tijekom cijele godine. Kako bi se povećala sposobnost klijanja sjemena, prvo ih treba staviti u hladnjak na tjedan dana radi stratifikacije. Zatim ostavite sjeme da se namače u sobno toploj vodi 24 sata, a zatim ga stavite pola centimetra duboko u vlažan supstrat za uzgoj ili dobru zemlju za bonsai. Posudu s kulturom prekrijte prozirnom folijom koju ste opremili rupama. To štiti tlo od isušivanja. Svaka dva do tri dana skinite foliju na 2 sata. Time se sprječava stvaranje plijesni na tlu za uzgoj. Stavite posudu za sjeme na svijetlo i toplo mjesto s 20 do 25° Celzija i održavajte tlo za saksije vlažnim, ali ne mokrim. Budući da sjeme sporo i prilično nepravilno klija, **Najbolja lokacija:** Za razliku od europskog javora, trozubi javor voli biti zaklonjen od vjetera u polusjeni i trebao bi biti barem zaštićen od izravnog podnevnog sunca. **Optimalna njega:** Vaš Acer buergerianum zahtijeva puno vode, iako biste trebali izbjegavati natapanje. Gnojite tekućim gnojivom za bonsai u razmacima od dva tjedna od početka nicanja lišća do početka bojanja lišća u jesen. Kod mladih stabala možete postići debelo deblo, jake grane i fino grananje tako da dopustite novim izbojcima da izrastu do 8 - 10 pari lišća, a zatim ih porežete na jedan ili dva para lišća. Mogući su svi stilski oblici osim oblika metle. Vaš će javor razviti snažan rast korijena i treba ga presađivati jednom godišnje, ali barem svake dvije godine, uz orezivanje korijena u rano proljeće. **U zimi:** Javor trozupac je ograničeno otporan i treba ga dobro zaštititi, posebno dok je mlad do četvrte godine i kada se očekuju temperature ispod -10°C. Zalijevajte i zimi u danima bez mraza, ali rjeđe.



Trident klāva

Acer buergerianum

Diezgan maza lapu forma / āra pundurkociņš

Lapkoku trīsklāvu klāva ir īsts retums no Ķīnas austrumiem, kuras salīdzinoši mazajām lapām ir trīs punkti. Kad tie uzdzīst, tie gada laikā vispirms kļūst gaiši oranži un pēc tam zaļi, beidzot pārejot uz rudens krāsu spektru no oranžsarkanā uz liesmas sarkano. **Dabiska vieta:** Trident klāvas dabiskais areāls sniedzas no Ķīnas caur Taivānu līdz Japānai, kur tā aug no krasta līdz 1500 metriem virs jūras līmeņa. **Veiksmīga audzēšana:** Audzēšana iespējama visu gadu. Lai palielinātu sēklu dīgspēju, tās vispirms uz nedēļu jānovieto ledusskapī stratifikācijai. Pēc tam jālieto sēklām 24 stundas mērcēt istabas siltā ūdenī un pēc tam ievietojiet tās puscentimetra dziļumā mitrā augšanas substrātā vai labā pundurkociņa augsnē. Nosedziet kultivēšanas trauku ar pārtikas plēvi, kuru nodrošina ar caurumiem. Tas pasargā augsni no izžūšanas. Jums vajadzētu noņemt foliju 2 stundas ik pēc divām līdz trim dienām. Tas novērš pelējuma veidošanos augošajā augsnē. Novietojiet sēklu podu gaišā un siltā vietā ar temperatūru 20 līdz 25 ° C un turiet augsni mitru, bet ne mitru. Tā kā sēklas dīgst lēni un diezgan neregulāri, **Labākā atrašanās vieta:** Pretstatā Eiropas klāvai trīsklāvai patīk būt aizsargātai no vēja daļēji ēnā, un to vajadzētu pasargāt vismaz no tiešiem pusdienas saules stariem. **Optimāla aprūpe:** Jūsu Acer buergerianum ir nepieciešams daudz ūdens, lai gan jums vajadzētu izvairīties no ūdens aizsērēšanas. Mēslojiet ar šķidro pundurkociņa mēslojumu ar divu nedēļu intervālu no lapu dīgšanas sākuma līdz lapu krāsošanas sākumam rudenī. Ar jauniem kokiem jūs varat sasniegt biezu stumbru, spēcīgus zarus un smalku zarojumu, ļaujot jauniem dzinumiem izaugt līdz 8–10 lapu pāriem un pēc tam nogriežot līdz vienam vai diviem lapu pāriem. Ir iespējamas visas stila formas, izņemot slotas formu. Jūsu klāvai attīstīsies spēcīga sakņu augšana, un tā ir jāpārstāda katru gadu, bet vismaz reizi divos gados, saknes apgriežot agrā pavasarī. **Ziemā:** Trident klāva ir ierobežotā mērā izturīga, un tā ir labi jāaizsargā, it īpaši, ja tā ir jauna līdz ceturtajam gadam un kad ir sagaidāms, ka temperatūra pazemināsies zem -10°C. Arī laistīt ziemā bezsalas dienās, bet retāk.



Trišakis klevas

Acer buergerianum

Gražus lapelio formas / lauko bonsai

Lapuotis trišakis klevas – tikra retenybē iš rytų Kinijos, kurio santykinai maži lapai turi tris taškus. Išdygę jie iš pradžių pasidaro šviesiai oranžiniai, o paskui žali per metus, galiausiai pasikeičia į rudenišką spalvų spektrą nuo oranžinės raudonos iki liepsnos raudonumo. **Natūrali vieta:** Natūralus Trident klevo arealas tęsiasi nuo Kinijos per Taivaną iki Japonijos, kur jis auga nuo kranto iki 1500 metrų virš jūros lygio. **Sėkmingas auginimas:** Galima auginti ištisus metus. Norint padidinti sėklų daigumą, pirmiausia jas reikėtų savaitei padėti į šaldytuvą stratifikacijai. Tada palikite sėklas 24 valandas mirkyti kambario šiltoje vandenyje, o tada įdėkite jas pusės centimetro gilyje į drėgną auginimo substratą arba gerą bonsų žemę. Kultūros indą uždenkite maistine plėvele, kurioje yra skylės. Tai apsaugo dirvą nuo išdžiūvimo. Kas dvi ar tris dienas 2 valandas nuimkite foliją. Tai neleidsia augančioje dirvoje susidaryti pelėsiui. Sėklų vazoną pastatykite šviesioje ir šiltoje vietoje, kurios temperatūra yra 20–25 ° C, o vazono žemė turi būti drėgna, bet ne šlapia. Kadangi sėklos dygsta lėtai ir gana netaisyklingai, **Geriausią vietą:** Priešingai nei europinis klevas, trišakis klevas mėgsta būti apsaugotas nuo vėjo daliniame pavėsyje ir turėtų būti apsaugotas bent nuo tiesioginių vidurdienio saulės spindulių. **Optimali priežiūra:** Jūsų Acer buergerianum reikia daug vandens, tačiau turėtumėte vengti vandens užmirkimo. Trešči skystomis bonsų trąšomis kas dvejų savaičių intervalą nuo lapų dygimo pradžios iki lapų dažymo pradžios rudenį. Su jaunu medžiais galite pasiekti storą kamieną, tvirtas šakas ir puikų šakotumą, leisdami naujiems ūgliams užaugti iki 8–10 porų lapų ir tada nupjauant iki vienos ar dvejų porų lapų. Galimos visos stiliaus formos, išskyrus šluotos formą. Jūsų klevo šaknys augs energingai ir turėtų būti persodinamos kasmet, bet bent kas dvejus metus, o šaknis genėti ankstyvą pavasarį. **Žiemą:** Trident klevas yra ribotai atsparus ir turėtų būti gerai apsaugotas, ypač kai jis yra jaunas iki ketvirtų metų ir kai numatoma, kad temperatūra nukris žemiau -10 ° C. Taip pat laistykite žiemą neužšalantiomis dienomis, bet rečiau.



Aggru Trident

Acer buergerianum

Forma ta' weraq pjuttost žghira / Bonsai ta' barra

L-aggru trident jwaqqghu l-weraq huwa rarità reali miċ-Ċina tal-Lvant, li l-weraq relattivament żgħar tagħha għandhom tliet punti. Meta jinbtu, l-ewwel isiru oranġjo ċar u mbagħad aħdar matul is-sena, fl-aħħar jinbidlu għal spettru ta 'kuluri tal-ħarifa minn oranġjo-aħmar għal aħmar fjamma. **Post naturali:** Il-firxa naturali tal-aggru Trident testendi miċ-Ċina permezz tat-Tajwan sal-Gappun, fejn tikber mill-kosta sa 1500 metru 'l fuq mil-livell tal-baħar. **Kultivazzjoni b'suċċess:** Il-kultivazzjoni hija possibbli s-sena kollha. Sabiex tiżdied il-kapaċità tal-germinazzjoni taż-żrieragħ, l-ewwel għandhom jitqiegħdu fil-frigġ għal ġimgħa tal-istratifikazzjoni. Imbagħad halli ż-żrieragħ jixxarrab f'ilma shun tal-kamra għal 24 siegħa u mbagħad poġġihom nofs ċentimetru fond f'sottostrat ta 'tkabbir niedja jew ħamrija tajba tal-bonsai. Għatti l-bastiment tal-kultura b'cling film, li inti tipprowdi b'toqob. Dan jipproteġi l-ħamrija milli tinxf. Għandek tneħħi l-fojl għal sagħtejn kull jumejn jew tlett ijiem. Dan jipprevjeni l-iffurmar tal-moffa fuq il-ħamrija li qed tikber. Poġġi l-borma taż-żerriegħa f'post ħafif u shun b'20 sa 25 ° Celsius u żomm il-ħamrija tal-qsa niedja izda mhux imxarra. Peress li ż-żrieragħ jiġġerminaw bil-mod u pjuttost irregolari, **L-aħjar post:** B'kuntrast mal-aggru Ewropew, l-aggru trident jhobb ikun protett mir-riħ fid-dell parzjali u għandu mill-inqas ikun protett mix-xemx diretta ta ' nofs in-nhar. **Kura ottimali:** Acer buergerianum tiegħek jeħtieġ ħafna ilma, għalkemm għandek tevita l-ilma. Fertilizza b'fertilizzant bonsai likwidu f'intervalli ta ' ġimgħat għal mill-bidu tat-tnixxija tal-weraq sal-bidu tal-kulur tal-weraq fil-ħarifa. Bis-siġar żgħar, tista 'tikseb zokk oħxon, ferġat b'saħħithom u ferġat fini billi thalli rimjiet godda jikbru għal 8 - 10 pari ta ' weraq u mbagħad taqta 'lura għal wieħed jew żewġ pari ta ' weraq. Il-forom kollha tal-istil hliet il-forma tal-gummar huma possibbli. L-aggru tiegħek se jżviluppa tkabbir qawwi tal-għeruq u għandu jiġi rapped kull sena, izda mill-inqas kull sentejn, bi żbir tal-għeruq fil-bidu tar-rebbiegħa. **Fix-xitwa:** L-aggru Trident jifilhu sa ċertu punt u għandu jkun protett sew, speċjalment meta jkun żgħir sar-raba' sena u meta t-temperaturi mistennija jinżlu taħt -10° Celsius. L-ilma wkoll fix-xitwa fi għranet mingħajr għata, izda inqas spiss.



Bonsai - Drietandesdoorn

Acer buergerianum

Vrij kleine bladvorm / bonsai voor buiten

De bladverliezende driehoekige esdoorn is een echte zeldzaamheid uit Oost-China, waarvan de relatief kleine bladeren drie punten hebben. Bij het ontkiemen verkleuren ze van aanvankelijk lichtoranje naar groen in de loop van het jaar en veranderen ze uiteindelijk in een herfstkleurenspectrum van oranjerood naar vuurrood. **Natuurlijke locatie:** Het natuurlijke verspreidingsgebied van de driekantige esdoorn strekt zich uit van China via Taiwan tot Japan, waar hij vanaf de kust groeit tot een hoogte van 1500 meter. **Succesvolle teelt:** Teelt is het hele jaar mogelijk. Om de kiemkracht van de zaden te vergroten, moeten ze voor stratificatie eerst een week in de koelkast staan. Laat de zaden 24 uur weken in warm water en zet ze dan een halve centimeter diep in vochtig groeimedium of goede bonsaigrond. Dek de kweekbak af met vershoudfolie, die u van gaten heeft voorzien. Dit beschermt de aarde tegen uitdroging. Om de twee tot drie dagen moet u de film gedurende 2 uur verwijderen. Dit voorkomt schimmelvorming op de teeltgrond. Zet de kweekbak op een lichte en warme plaats met 20 à 25 ° Celsius en houd de kweekgrond vochtig, maar niet nat. Omdat de zaden langzaam en nogal onregelmatig ontkiemen, **De beste locatie:** In tegenstelling tot de Europese esdoorn staat de driehoekige esdoorn graag beschermt tegen de wind in de halfschaduw en moet hij in ieder geval worden beschermd tegen directe middagzon. **Optimale verzorging:** Uw Acer buergerianum heeft veel water nodig, maar u moet wateroverlast vermijden. Bemest elke twee weken met vloeibare bonsaimest vanaf het begin van de bladscheut tot het begin van de bladkleuring in de herfst. Met jonge bomen kun je een dikke stam, sterke takken en fijne takken krijgen door nieuwe scheuten te laten uitgroeien tot 8-10 paar bladeren en vervolgens terug te snijden tot een of twee paar bladeren. Alle stijlen behalve de bezemvorm zijn mogelijk. Je esdoorn zal een sterke wortelgroei ontwikkelen en moet jaarlijks, maar minstens om de twee jaar, worden verpot, met wortelsnoei in het vroege voorjaar. **In de winter:** De driekantige esdoorn is in beperkte mate winterhard en zou goed beschermd moeten worden, vooral in de jeugdfase tot en met het vierde jaar en wanneer de temperatuur naar verwachting onder de -10 ° Celsius zal liggen. Geef op vorstvrije dagen ook in de winter water, maar minder vaak.



Trident lønn Acer buergerianum Ganske liten bladform / utendørs bonsai

Den løvfellende treforklønnen er en ekte sjeldenhet fra det østlige Kina, hvis relativt små blader har tre punkter. Når de spirer, blir de først lysoransje og deretter grønne i løpet av året, og endres til slutt til et høstlig fargespekter fra oransjerødt til flammerødt. **Naturlig beliggenhet:** Trident-lønnens naturlige rekkevidde strekker seg fra Kina gjennom Taiwan til Japan, hvor den vokser fra kysten til 1500 meter over havet. **Vellykket dyrking:** Dyrking er mulig hele året. For å øke spireevnen til frøene bør de først plasseres i kjøleskapet i en uke for stratifisering. La så frøene trekke i romvarmt vann i 24 timer og legg dem deretter en halv centimeter dypt i fuktig vekstsubstrat eller god bonsaijord. Dekk kulturkaret med matfilm, som du forsyner med hull. Dette beskytter jorda mot å tørke ut. Du bør fjerne folien i 2 timer annenhver til tredje dag. Dette forhindrer at det dannes mugg på den voksende jorda. Plasser frøpotten på et lett og varmt sted med 20 til 25° Celsius og hold pottejorda fuktig, men ikke våt. Siden frøene spirer sakte og ganske uregelmessig, **Den beste beliggenheten:** I motsetning til europeisk lønn liker treforklønnen å stå i ly for vinden i halvskygge og bør i det minste beskyttes mot direkte middagssol. **Optimal omsorg:** Acer buergerianum krever rikelig med vann, selv om du bør unngå vannlogging. Gjødsele med flytende bonsai-gjødsele med to ukers mellomrom fra begynnelsen av bladspirer til begynnelsen av bladfarging om høsten. Med unge trær kan du oppnå en tykk stamme, sterke greiner og fin forgrening ved å la nye skudd vokse til 8 - 10 bladpar og deretter kutte tilbake til ett eller to bladpar. Alle stilformer unntatt kostformen er mulige. Lønnen din vil utvikle kraftig rotvekst og bør plantes om årlig, men minst hvert annet år, med rotbeskjæring tidlig på våren. **Om vinteren:** Tridentlønnen er i begrenset grad hardfør og bør beskyttes godt, spesielt når den er ung til det fjerde året og når temperaturen forventes å synke under -10° Celsius. Vann også om vinteren på frostfrie dager, men sjeldnere.



Bonsai - Klon Trójzębny Acer buergerianum Dość mały kształt liścia / bonsai na zewnątrz

Liściasty klon trójzębny to prawdziwa ciekawostka ze wschodnich Chin, która ma raczej małe liście z trzema końcówkami. Podczas kiełkowania liście nabierają początkowo jaskrawopomarańczowego koloru, który w ciągu roku zmienia się w zielony, a jesienią drzewo ma całe spektrum kolorów od pomarańczowo-czerwonych do ognistoczerwonych. **Naturalne położenie:** Naturalne siedlisko klonu trójzębnego rozciąga się od Chin po Tajwan i dalej aż do Japonii, gdzie rośnie od obszarów przybrzeżnych do 1500 metrów nad poziomem morza. **Udana uprawa:** Rozmnażanie nasion w pomieszczeniach jest możliwe przez cały rok. Aby zwiększyć zdolność kiełkowania, należy początkowo przechowywać nasiona w lodówce przez około tydzień w celu rozwarstwienia - następnie umieścić je na kolejne 24 godziny w misce z letnią wodą w celu zagruntowania. Następnie posadź nasiona na głębokość około 0,5 cm w wilgotnym kompoście doniczkowym lub odpowiedniej ziemi bonsai. Przykryj pojemnik na nasiona przezroczystą folią, aby ziemia nie wyschła, ale nie zapomnij zrobić dziur w przezroczystej folii i zdejmuj ją co drugi lub trzeci dzień na około 2 godziny. W ten sposób unikniesz tworzenia się pleśni na kompoście doniczkowym. Umieść pojemnik na nasiona w miejscu jasnym i ciepłym o temperaturze od 20 ° C do 25 ° Celsjusza i utrzymuj ziemię wilgotną, ale nie mokrą. Ponieważ nasiona kiełkują raczej wolno i sporadycznie, **Najlepsza lokalizacja:** Oprócz klonu europejskiego, Acer buergerianum lubi być trzymany w miejscu częściowo zacienionym i osłoniętym od wiatru - przynajmniej powinien być osłonięty przed silnym południowym słońcem. **Optymalna pielęgnacja:** Drzewo musi być obficie podlewane, ale bez podlewania. Od początku formowania się liści do początku jesiennej wybarwienia możesz co dwa tygodnie dostarczać bonsai płynny nawóz dla roślin bonsai. Aby uzyskać mocną łodygę, mocne gałęzie i zgrabne rozgałęzienie u młodych drzew, należy zawsze pozwolić nowym pędom wyrosnąć do ośmiu do dziesięciu par liści, a następnie przyciąć je z powrotem do jednej lub dwóch par. Każdy rodzaj bonsai oprócz kształtu miotły jest możliwy do uprawy. Klon trójzębny rozwija silne ukorzenienie i powinien być przesadzany co roku, przynajmniej co dwa lata - przesadzaj roślinę wczesną wiosną po krótkim ścięciu korzeni do nowej doniczki. **W zimą:** Klon trójzębny jest mało odporny na mróz i szczególnie młode rośliny do czwartego roku życia powinny być odpowiednio chronione na obszarach o temperaturach zimowych poniżej - 10 ° Celsjusza. Podlewać roślinę tylko skromnie i tylko w dni bez mrozu.



Bordo tridente Acer buergerianum Bonita forma de folha/bonsai ao ar livre

O bordo tridente decíduo é uma verdadeira raridade do leste da China, cujas folhas relativamente pequenas têm três pontas. Quando brotam, primeiro ficam laranja claro e depois verdes ao longo do ano, finalmente mudando para um espectro de cores outonais de vermelho alaranjado para vermelho chama. **Localização natural:** A extensão natural do bordo Trident se estende da China através de Taiwan até o Japão, onde cresce desde a costa até 1.500 metros acima do nível do mar. **Cultivo bem sucedido:** O cultivo é possível durante todo o ano. Para aumentar a capacidade de germinação das sementes, elas devem primeiro ser colocadas na geladeira por uma semana para estratificação. Em seguida, deixe as sementes de molho em água morna por 24 horas e, em seguida, coloque-as com meio centímetro de profundidade em substrato de crescimento úmido ou bom solo de bonsai. Cubra o recipiente de cultura com filme plástico, que você fornece com furos. Isso protege o solo de secar. Você deve remover o papel alumínio por 2 horas a cada dois ou três dias. Isso evita a formação de mofo no solo em crescimento. Coloque o vaso de sementes em um local claro e quente com 20 a 25 ° Celsius e mantenha o solo do vaso úmido, mas não molhado. Como as sementes germinam lenta e irregularmente, **A melhor localização:** Em contraste com o bordo europeu, o bordo tridente gosta de ser protegido do vento em sombra parcial e deve pelo menos ser protegido do sol direto do meio-dia. **Cuidado ideal:** Seu Acer buergerianum requer muita água, embora você deva evitar o encharcamento. Fertilize com fertilizante bonsai líquido em intervalos de duas semanas desde o início da brotação das folhas até o início da coloração das folhas no outono. Com árvores jovens, você pode obter um tronco grosso, galhos fortes e ramificações finas, permitindo que novos brotos cresçam até 8 a 10 pares de folhas e depois cortando para um ou dois pares de folhas. Todas as formas de estilo, exceto a forma de vassoura, são possíveis. Seu bordo desenvolverá um crescimento vigoroso das raízes e deve ser replantado anualmente, mas pelo menos a cada dois anos, com poda de raízes no início da primavera. **No inverno:** O bordo Trident é resistente até certo ponto e deve ser bem protegido, especialmente quando é jovem até o quarto ano e quando as temperaturas devem cair abaixo de -10° Celsius. Também regue no inverno em dias sem gelo, mas com menos frequência.



Bonsai - Arțar Trident Acer buergerianum Frunzele destul de mici / bonsai în aer liber

Arțarul cu trei colțuri de foioase este o adevărată raritate din estul Chinei, ale cărei frunze relativ mici au trei vârfuri. La înmugurire, acestea se transformă de la inițial în portocaliu deschis și apoi verde pe parcursul anului, transformându-se într-un spectru de culoare toamnă de la roșu portocaliu la roșu aprins. **Locație naturală:** Zona naturală de distribuție a arțarului cu trei colțuri se întinde din China, prin Taiwan până în Japonia, unde crește de la coastă la o altitudine de 1500 de metri. **Cultivare de succes:** Cultivarea este posibilă pe tot parcursul anului. Pentru a crește germinabilitatea semințelor, acestea ar trebui să petreacă mai întâi o săptămână la frigider pentru stratificare. Lăsați semințele să se înmoaie în apă caldă timp de încă 24 de ore și apoi așezați o jumătate de centimetru într-un mediu de creștere umed sau un sol bonsai bun. Acoperiți vasul de cultivare cu folie alimentară, pe care ați prevăzut-o cu găuri. Acest lucru protejează pământul de uscare. La fiecare două până la trei zile ar trebui să îndepărtați filmul timp de 2 ore. Acest lucru previne formarea mușgaiului pe solul de cultivare. Așezați vasul de cultivare într-un loc luminos și cald, cu 20-25 ° Celsius și mențineți solul de cultivare umed, dar nu umed. Deoarece semințele germinează încet și destul de neregulat, **Cea mai bună locație:** Spre deosebire de arțarul european, arțarul cu trei colțuri îi place să fie adăpostit de vânt la umbra parțială și ar trebui cel puțin protejat de soarele direct de la amiază. **Îngrijire optimă:** Acer buergerianum are nevoie de multă apă, dar ar trebui să evită apariția apei. Fertilizați cu îngrășământ bonsai lichid la fiecare două săptămâni de la începutul lăstarilor de frunze până la debutul colorării frunzelor în toamnă. Cu copacii tineri puteți obține un trunchi gros, ramuri puternice și ramificații fine, lăsând lăstarii noi să crească la 8-10 perechi de frunze și apoi să tăiați la una sau două perechi de frunze. Sunt posibile toate stilurile, cu excepția formei măturii. Arțarul dvs. va dezvolta o creștere puternică a rădăcinilor și ar trebui să fie repotat anual, dar cel puțin o dată la doi ani, cu tăierea rădăcinii la începutul primăverii. **În iarnă:** Arțarul cu trei colțuri este rezistent într-o măsură limitată și ar trebui să fie bine protejat, mai ales când este tânăr până în al patrulea an și când se așteaptă ca temperaturile să scadă sub -10 ° Celsius. Apă în zilele fără îngheț chiar și iarna, dar mai rar.



Bonsai - Trident Lönn

Acer buergerianum

Ganska liten bladform / utomhusbonsai

Den lövfällande trehorniga lönnen är en riktig sällsynthet från östra Kina, vars relativt små löv har tre spetsar. När de skjuter, blir de från ursprungligen ljusorange och sedan gröna under året och ändras till ett höstligt färgspektrum från orange-rött till flammrött. **Naturligt läge:** Den trehorniga lönnens naturliga utbredning sträcker sig från Kina till Taiwan till Japan, där den växer från kusten till en höjd av 1500 meter. **Framgångsrik odling:** Odling är möjlig året runt. För att öka fröns grobarhet bör de först tillbringa en vecka i kylan för stratifiering. Låt sedan fröna blötläggas i varmt vatten i 24 timmar och placera sedan en halv centimeter djupt i fuktigt växande substrat eller bra bonsaijord. Täck odlingskärlet med plastfolie, som du har försett med hål. Detta skyddar jorden från att torka ut. Varannan till var tredje dag ska du ta bort filmen i två timmar. Detta förhindrar att mögel bildas på odlingsjorden. Placera odlingskärlet på en ljus och varm plats med 20 till 25 ° Celsius och håll odlingsjorden fuktig men inte våt. Eftersom fröna groor långsamt och ganska oregelbundet, **Den bästa platsen:** Till skillnad från den europeiska lönnen gillar den trehorniga lönnen att vara skyddad från vinden i delvis skugga och bör åtminstone skyddas från direkt middagssol. **Optimal vård:** Din Acer buergerianum behöver mycket vatten, men du bör undvika vattendrag. Gödsla med flytande bonsai-gödsel varannan vecka från början av bladskottet tills bladfärgningen börjar på hösten. Med unga träd kan du uppnå en tjock stam, starka grenar och fina grenar genom att låta nya skott växa till 8-10 par blad och sedan skära ner till ett eller två par blad. Alla stilar utom kvastformen är möjliga. Din lönn kommer att utveckla en stark rottillväxt och bör omplaceras årligen, men minst vartannat år med rotbeskärning tidigt på våren. **På vintern:** Den trehorniga lönnen är hård i begränsad utsträckning och bör vara väl skyddad, särskilt i ungdomsskedet fram till fjärde året och när temperaturen förväntas ligga under -10 ° Celsius. Vattna på frostfria dagar även på vintern, men mindre ofta.



Javor trojzubý

Acer buergerianum

Pekný malý listový tvar / vonkajší bonsai

Ozajstnou vzácností z východnej Číny je javor trojzubý opadavý, ktorého pomerne malé listy majú tri hroty. Keď vyklíčia, najskôr sa v priebehu roka sfarbia do svetlooranžovej a potom zelenej farby, až nakoniec prechádzajú do jesenného farebného spektra z oranžovo-červenej po plamenne červenú. **Prirodzená poloha:** Prirodzený areál javora trojzubého siaha od Číny cez Taiwan až po Japonsko, kde rastie od pobrežia až do nadmorskej výšky 1500 metrov nad morom. **Úspešná kultivácia:** Pestovanie je možné počas celého roka. Aby sa zvýšila klíčivosť semien, mali by sa najskôr umiestniť do chladničky na týždeň na stratifikáciu. Potom nechajte semená namočené v izbovej teplej vode na 24 hodín a potom ich vložte pol centimetra hlboko do vlhkého pestovateľského substrátu alebo dobrej bonsajovej pôdy. Kultivačnú nádobu prikryte potravinovou fóliou, ktorú opatríte otvormi. To chráni pôdu pred vysychaním. Fóliu by ste mali odstraňovať na 2 hodiny každé dva až tri dni. To zabráňuje tvorbe plesní na rastúcej pôde. Črepník umiestnite na svetlé a teplé miesto s teplotou 20 až 25 °C a udržiavajte pôdu v črepníku vlhkú, ale nie mokrú. Keďže semená klíčia pomaly a dosť nepravidelne, **Najlepšie umiestnenie:** Na rozdiel od javora európskeho je javor trojzubý rád chránený pred vetrom v polotieni a mal by byť chránený aspoň pred priamym poludňajším slnkom. **Optimálna starostlivosť:** Váš Acer buergerianum vyžaduje veľa vody, aj keď by ste sa mali vyhýbať podmačaniu. Prihnojujte tekutým hnojivom na bonsaje v dvojtyždňových intervaloch od začiatku rašenia listov do začiatku vyfarbovania listov na jeseň. Pri mladých stromčekoch docielite hrubý kmeň, silné konáre a jemné rozkonárenie tak, že nové výhonky necháte vyrásť na 8 - 10 párov listov a potom ich zrežete na jeden až dva páry listov. Možné sú všetky štýlové formy okrem formy metly. Váš javor vyvinie silný rast koreňov a mal by sa presádzať každý rok, najmenej však každé dva roky, s prerezávaním koreňov skoro na jar. **V zime:** Javor trojzubý je v obmedzenej miere mrazuvzdorný a mal by byť dobre chránený, najmä keď je mladý do štvrtého roku a keď sa očakáva pokles teplôt pod -10° Celzia. Polievajte aj v zime v dňoch bez mrazov, ale menej často.



Trident javor

Acer buergerianum

Precej majhna oblika listov / zunanji bonsaj

Prava redkost iz vzhodne Kitajske je listopadni trizobi javor, katerega razmeroma majhni listi imajo tri konice. Ko vzklijejo, postanejo najprej svetlo oranžne, čez leto pa zelene, nazadnje pa preidejo v jesenski barvni spekter od oranžno rdeče do ognjeno rdeče. **Naravni habitat:** Naravno območje razširjenosti trizobca sega od Kitajske preko Tajvana do Japonske, kjer raste od obale do 1500 metrov nadmorske višine. **Navodila za gojenje:** Gojenje je možno vse leto. Da bi povečali kalivost semen, jih je treba najprej za en teden postaviti v hladilnik za stratifikacijo. Nato pustite semena namakati v sobno topli vodi 24 ur in jih nato pol centimetra globoko položite v vlažen rastni substrat ali dobro zemljo za bonsaj. Posodo z kulturo pokrijte s folijo za živila, ki jo opremite z luknjami. To ščiti tla pred izsušitvijo. Vsake dva do tri dni za 2 uri odstranite folijo. S tem preprečimo nastanek plesni na rastni zemlji. Lonček s semeni postavite na svetlo in toplo mesto s temperaturo od 20 do 25 °C, zemlja v lončku pa naj bo vlažna, vendar ne mokra. Ker semena kalijo počasi in precej neredno, **Najboljša lokacija:** V nasprotju z evropskim javorjem je trizobi javor rad zaščitene pred vetrom v polsenci in ga je treba zaščititi vsaj pred neposrednim opoldanskim soncem. **Optimalna nega:** Váš Acer buergerianum potrebuje veliko vode, vendar se morate izogibati zalivanju. Gnojite s tekočim gnojilom za bonsaj v dvotedenskih intervalih od začetka poganjanja listov do začetka obarvanja listov jeseni. Pri mladih drevesih lahko dosežete debelo deblo, močne veje in fino razvejanje tako, da pustite novim poganjkom, da zrastejo do 8-10 parov listov, nato pa jih porežete nazaj na enega ali dva para listov. Možne so vse slogovne oblike razen oblike metle. Váš javor bo razvil močno rast korenin in ga je treba presaditi vsako leto, vendar vsaj vsaki dve leti, z obrezovanjem korenin zgodaj spomladi. **V zimskem času:** Trizobi javor je omejeno trdoživ in ga je treba dobro zaščititi, še posebej ko je mlad do četrtega leta in ko se pričakujejo padci temperatur pod -10°C. Zalivajte tudi pozimi v dneh brez zmrzali, vendar redkeje.



Arce tridente

Acer buergerianum

Hojas pequeñas muy bonitas / bonsái para exterior

El arce tridente es caducifolio y una rareza del este de China, con hojas relativamente pequeñas con tres puntas. Con el brote las hojas son de color naranja claro y después a lo largo del año verde, y en otoño cambian de nuevo de color de naranja rojizo a rojo intenso. **Ubicación natural:** El área de distribución natural del arce de Trident se extiende de China sobre Taiwán a Japón, donde crece desde la costa hasta 1500 metros de altitud. **Cultivo exitoso:** La semilla se puede criar durante todo el año. Mantenga las semillas durante una semana en el frigorífico y posteriormente durante 24 horas en agua a temperatura ambiente para hidratarlas y aumentar su germinación. Introdúzcalas a medio centímetro de profundidad en sustrato húmedo o buena tierra para el cultivo de bonsái. Cubra el recipiente de cultivo con un film transparente y agüeréelo. Así protegerá la tierra de la desecación. Para evitar la putrefacción del sustrato retire el film cada dos o tres días durante 2 horas. Coloque el recipiente de cultivo en un lugar luminoso y cálido a alrededor de 20 grados y mantenga el sustrato húmedo, pero no mojado. La germinación se producirá entre ocho y doce semanas. **La mejor ubicación:** A diferencia del arce europeo el arce tridente prefiere un lugar protegido del viento en semi sombra y debe protegerlo del sol directo al mediodía. **Cuidado óptimo:** El arce buergerianum requiere abundante agua pero debe evitar el anegamiento. Sumínistrela en otoño, desde el brote de las hojas hasta su cambio de color, fertilizante líquido para bonsái con intervalos de dos semanas. Obtendrá un árbol joven con un tronco grueso y ramas fuertes con ramificación fina, si espera a que broten 8 a 10 pares de hojas y las poda a uno o dos pares de hojas. Todos los estilos de forma son posibles excepto la de escoba. Su arce desarrolla un crecimiento fuerte de raíces y deben ser podado en primavera al trasplantar cada año o máximo cada dos. **En el invierno:** El arce tridente tolera heladas de forma limitada, y sobre todo las plantas jóvenes hasta el cuarto año deben ser protegidas cuando se esperan temperaturas por debajo de los -10 grados. Riegue los días libres de heladas pero escasamente.



Trojzubec javor

Acer buergerianum

Docela malý tvar listu / venkovní bonsai

Opavodovou raritou z východní Číny je javor trojzubý opadavý, jehož poměrně malé listy mají tři cípy. Když vyraší, v průběhu roku se nejprve zbarví do světle oranžova a poté zezelenají, až nakonec přejdou do podzimního barevného spektra od oranžově červené až po plamenně červenou. **Přírodní poloha:** Přírodní areál javoru trojzubého sahá od Číny přes Tchaj-wan až po Japonsko, kde roste od pobřeží až do nadmořské výšky 1500 metrů. **Úspěšné pěstování:** Pěstování je možné celoročně. Aby se zvýšila klíčivost semen, měla by být nejprve umístěna do chladničky na týden pro stratifikaci. Poté nechte semena namočit na 24 hodin do pokojové vody a poté je vložte půl centimetru hluboko do vlhkého pěstebního substrátu nebo dobré bonsai zeminy. Kultivační nádobu zakryjte potravinářskou fólií, kterou opatříte otvory. To chrání půdu před vysycháním. Fólii byste měli odstraňovat na 2 hodiny každé dva až tři dny. Tím se zabrání tvorbě plísni na rostoucí půdě. Umístěte květináč na světlé a teplé místo s teplotou 20 až 25 °C a udržujte půdu v květináči vlhkou, ale ne mokrou. Protože semena klíčí pomalu a nepravidelně, **Nejlepší umístění:** Na rozdíl od javoru evropského je javor trojzubý rád chráněn před větrem v polostínu a měl by být chráněn alespoň před přímým poledním sluncem. **Optimální péče:** Váš Acer buergerianum vyžaduje hodně vody, i když byste se měli vyhnout zamokření. Přihnojte tekutým hnojivem na bonsaje ve dvoutýdenních intervalech od začátku rašení listů do začátku vybarvování listů na podzim. U mladých stromků docílíte silného kmene, silných větví a jemného větvení tak, že nové výhony necháte vyrůst na 8 - 10 párů listů a následně je seříznete na jeden až dva páry listů. Jsou možné všechny stylové formy kromě formy koštěte. Váš javor vyvine bujný růst kořenů a měl by být přesazován každoročně, nejméně však každé dva roky, s prořezáváním kořenů brzy na jaře. **V zimě:** Javor trojzubý je v omezené míře mrazuvzdorný a měl by být dobře chráněn, zvláště když je mladý do čtvrtého roku a kdy se očekává pokles teplot pod -10° Celsia. Zalévejte také v zimě ve dnech bez mrazu, ale méně často.



Üç dişli akçaağaç

Acer buergerianum

Oldukça küçük yaprak şekli / dış mekan bonsai

Yaprak dökten trident akçaağaç, nispeten küçük yaprakları üç uçlu olan doğu Çin'den gerçek bir nadirdir. Filizlendiklerinde, yıl boyunca önce açık turuncuya sonra yeşile dönerler ve sonunda turuncu-kırmızıdan alev kırmızısına sonbahar renk tayfına dönüşürler. **Doğal konum:** Üç Dişli Mızrak akçaağacının doğal menzili, Çin'den Tayvan'a, kıydan deniz seviyesinden 1500 metre yüksekliğe kadar büyüdüğü Japonya'ya kadar uzanır. **Başarılı yetiştirme:** Yetiştirme tüm yıl boyunca mümkündür. Tohumların çimlenme kapasitesini arttırmak için öncelikle tabakalaşma için bir hafta buzdolabına konulmalıdır. Daha sonra tohumları 24 saat oda sıcaklığında suda bekletin ve sonra onları yarım santimetre derinliğe, nemli büyüyen alt tabakaya veya iyi bonsai toprağına yerleştirin. Kültür kabının üzerini delikler açtığınız streç film ile kapatın. Bu, toprağın kurumasını önler. Folyoyu her iki ila üç günde bir 2 saat çıkarmalısınız. Bu, büyüyen toprakta küf oluşumunu önler. Tohum sakısını 20 ila 25°C sıcaklıkta hafif ve sıcak bir yere koyun ve saksı toprağını nemli tutun ama ıslak değil. Tohumlar yavaş ve düzensiz bir şekilde çimlendiğinden, **En iyi konum:** Avrupa akçaağacının aksine, trident akçaağacı kısmi gölgede rüzgardan korunmayı sever ve en azından doğrudan öğle güneşinden korunmalıdır. **Optimum bakım:** Acer buergerianum'unuz bol su gerektirir, ancak su basmasından kaçınmanız gerekir. Yaprakların filizlenmesinin başlangıcından sonbaharda yaprak renginin başlangıcına kadar iki haftalık aralıklarla sıvı bonsai gübresi ile gübrelayın. Genç ağaçlarda, yeni sürgünlerin 8 - 10 çift yaprağı kadar büyümesine izin vererek ve ardından bir veya iki yaprak çiftine kadar keserek kalın bir gövde, güçlü dallar ve ince dallanma elde edebilirsiniz. Süpürge formu hariç tüm stil formları mümkündür. Akçaağacınız güçlü bir kök büyümesi geliştirecek ve ilkbaharın başlarında kök budaması ile birlikte yılda bir kez, ancak en az iki yılda bir saksı değişimi yapılmalıdır. **Kışın:** Üç dişli akçaağaç sınırlı ölçüde dayanıklıdır ve özellikle dördüncü yaşına kadar gençken ve sıcaklıkların -10°C'nin altına düşmesi beklendiğinde iyi korunmalıdır. Ayrıca kışın don olmayan günlerde, ancak daha az sıklıkla sulayın.



Háromágú juhar

Acer buergerianum

Csinos kis levélforma / kültéri bonsai

A lombhullató háromágú juhar igazi ritkaság Kelet-Kínából, amelynek viszonylag kicsi levelei három hegyesek. Kihajtásukkor először világos narancssárgára, majd zöldre váltanak az év során, végül őszi színspektrumra váltanak narancsvörösre. **Természetes elhelyezkedés:** A Trident juhar természetes elterjedési területe Kínától Tajvanon át Japánig terjed, ahol a parttól 1500 méteres tengerszint feletti magasságig nő. **Sikeres termesztés:** Termesztése egész évben lehetséges. A magvak csírázóképeségének növelése érdekében először egy hétre hűtőbe kell tenni őket rétegződés céljából. Ezután hagyja a magokat szobameleg vízben 24 órán át ázni, majd helyezze fél centiméter mélyre nedves termesztőfelületbe vagy jó bonsai talajba. Fedje le a tenyészedényt ragasztó fóliával, amelyet lyukakkal lát el. Ez megvédi a talajt a kiszáradástól. A fóliát két-három naponta 2 órára le kell venni. Ez megakadályozza a penészképződést a növekvő talajon. Helyezze a magcserepet világos és meleg helyre, ahol a hőmérséklet 20-25°C, és a virágföldet tartsa nedvesen, de ne nedvesen. Mivel a magok lassan és meglehetősen szabálytalanul csíráznak, **A legjobb hely:** Az európai juharral ellentétben a háromágú juhar félárnyékban szereti a szélétől védve lenni, és legalább védeni kell a közvetlen déli napsütéstől. **Optimális gondozás:** Az Acer buergerianum sok vizet igényel, de kerülni kell a vízesedést. Trágyázzunk folyékony bonsai műtrágyával kéthetes időközönként a lombhajtás kezdetétől az őszi levélszínváltás kezdetéig. **Télen:** A Trident juhar korlátozott mértékben szívós, ezért jól védeni kell, különösen fiatalon a negyedik évig, és amikor a hőmérséklet várhatóan -10 °C alá süllyed. Télen, fagymentes napokon is öntözzük, de ritkábban.

: : : : :



トウカエデ

Acer buergerianum

小さくきれいな形の葉/屋外盆栽

落葉高木のトウカエデは東中国の興味深い植物で、3浅裂した葉を持ちます。芽が出ている間、葉は最初は明るいオレンジ色でその後は緑色に変化し、秋にはオレンジレッド色から燃えるような赤色に紅葉します。

自然な場所: 生息地は中国から台湾、さらに日本では海拔1500メートルの海岸沿いに分布しています。

栽培成功:

種子繁殖は室内で年間を通して可能です。発芽性を高めるには、最初に種を冷蔵庫で1週間保管する必要があります；その後、種を温水に24時間浸します。その後、湿った栽培用土または適切な盆栽用土の0.5cmの深さに種を植えます。サランラップなどの透明フィルムで鉢をカバーします。透明フィルムには空気穴をいくつかあけ、2~3日に1回は約2時間、完全にフィルムを鉢から外します。そうすることで、カビの発生を防ぎます。20℃~25℃の明るく暖かい場所に置き、用土は湿った状態に保ちます。ゆっくりと時間をかけて発芽するので、通常は約8~12週間後に発芽します。

最高のロケーション: 半日陰で防風された場所を好みます；少なくとも日中の強い陽射しから保護するようにしてください。

最適なケア:

たっぷりの水が必要ですが、水溜まりができないように注意が必要です。葉の形成から紅葉が始まるまで、盆栽用の液体肥料を2週間ごとに与えることができます。

若い樹木にしっかりとした幹、強い枝ときれいな分枝を発達させるためには、新しいシュートに8~10組の葉をつけて、その後1~2組の葉を残して剪定してください。箒立ちを除くすべての樹形の盆栽が栽培できます。強い根を発達させるので、毎年または少なくとも2年ごとの植え替えが必要です；春の早い時期に簡単に根を剪定してから新しい鉢に植え替えてください。

冬に:

限られた耐寒性しか備えていないので、マイナス10以下の地域の4年目までの若い木に関しては適切な保護が必要です。水は控えるために霜の降っていない日のみに与えてください。

SKU: 14998 / Dreispitzahorn