

Stosowanie środka:

Pszenica ozima, pszenżyto ozime, kukurydza, soja, śliwa, brzoskwinia, morela, pomidor, ogórek

Zalecane dawkowanie: 0,2-0,4 l/ha.

Liczba zabiegów: 3-4.

Pszenica jara, pszenżyto ozime, burak cukrowy, ziemniak, winorośl, papryka, warzywa cebulowe, marchew, pietruszka, pasternak

Zalecane dawkowanie: 0,2-0,4 l/ha.

Liczba zabiegów: 3.

Jęczmień ozimy, żyto ozime, rzepak jary, agrest, kwiaty jednoroczne

Zalecane dawkowanie: 0,2-0,4 l/ha

Liczba zabiegów: 2-4.

Jęczmień jary, żyto jare, owies, dynia

Zalecane dawkowanie: 0,2- 0,4 l/ha.

Liczba zabiegów: 2-3.

Len, brokuł, kalafior, kapusta głowiasta biała, czerwona, kapusta pekińska, kapusta włoska, kapusta brukselska, jarmuż, warzywa strączkowe

Zalecane dawkowanie: 0,2- 0,4 l/ha.

Liczba zabiegów: 2.

Kalarepa, rzodkiewka

Zalecane dawkowanie: 0,2- 0,4 l/ha.

Liczba zabiegów: 1.

Słonecznik

Zalecane dawkowanie: 0,2- 0,4 l/ha.

Liczba zabiegów: 1-2.

Czereśnia, wiśnia

Zalecane dawkowanie: 0,2- 0,4 l/ha.

Liczba zabiegów: 4.

Truskawka, jabłoń, grusza

Zalecane dawkowanie: 0,2- 0,4 l/ha.

Liczba zabiegów: 4-5.

Malina owocująca na pędach dwuletnich

Zalecane dawkowanie: 0,2- 0,4 l/ha.

Liczba zabiegów: 3-5.

Malina owocująca na pędach jednorocznych

Zalecane dawkowanie: 0,2- 0,4 l/ha.

Liczba zabiegów: 5.

Seler

Dawkowanie

Rozsada:

podlewanie/opryskiwanie: 0,02-0,03%.

Uprawa w gruncie:

Zalecane dawkowanie: 0,2-0,4 l/ha.

Rozsada pomidora

Zalecane dawkowanie: podlewanie/opryskiwanie: 0,02-0,03%.

Liczba zabiegów: 2.

Przygotowanie materiału siewnego

Zalecane dawkowanie: 0,5 l/1000kg materiału siewnego.

UPRAWY MAŁOOBSZAROWE I HOBBISTYCZNE

Drzewa i krzewy owocowe

Zalecane dawkowanie: roztwór 0,02-0,04%.

Liczba zabiegów: 4.

Warzywa, kwiaty jednoroczne

Zalecane dawkowanie: roztwór 0,02-0,04%.

Liczba zabiegów: 2-4.

Iglaki

Zalecane dawkowanie: roztwór 0,02-0,04%.

Liczba zabiegów: 1-3.

Byliny, krzewy ozdobne, trawniki

Zalecane dawkowanie: roztwór 0,02-0,04%.

Liczba zabiegów: 2-5.

UWAGA WAŻNE:

1.Preparat można stosować z innymi środkami po wcześniejszym przeprowadzeniu testów na mieszalność.

Okres karencji: nie dotyczy.