

Nawóz mineralny

Średnie orientacyjne dawki nawozu

Roślina	Dawka nawozu kg/ha
Rzepak ozimy	50-300
Rzepak jary	50-250
Kukurydza	50-350
Ziemniaki	50-350
Zboża ozime i jare	50-200
Buraki	50-200
Motylkowate	50-150

Opracował: Prof. dr hab. Janusz Igras - IUNG-PIB Puławy

PRZECHOWYWANIE

Przechowywać w oryginalnym, szczelnie zamkniętym opakowaniu, w suchym pomieszczeniu. Nie przechowywać razem z żywnością, napojami i paszami dla zwierząt.

Producent:
AGRECOL
AGRECOL Sp. z o.o.
98-400 Wieruszów, Mieszary 2
tel. +48 62 78 32 000
infolinia: 62 72 08 018
www.agrecol.pl

Data ważności (nr partii) - podano na zgrzewie opakowania



Masa netto: **5 kg**



5 kg



SIARCZAN AMONU

NAWÓZ WE
Typ A.1.4. Siarczan amonu N (SO₃; S) 20,8 (60,5; 24,2)

Skład nawozu w % (m/m):
20,8% - azot (N) amonowy
60,5% - trójtlenek siarki (SO₃) , 24,2% siarka (S)

ZASTOSOWANIE
Siarczan amonu zawiera azot w formie amonowej i łatwo dostępną siarkę, wobec czego nadaje się pod rośliny wymagające dobrego zaopatrzenia w te składniki pokarmowe. Siarczan amonu charakteryzuje się powolnym działaniem i jest typowym nawozem przedsiwnym. Siarczan amonu wykazuje działanie zakwaszające i nie zaleca się go stosować na glebach o odczynie bardzo kwaśnym i kwaśnym. Na glebach słabo kwaśnych, zgodnie z zaleceniami nawozowymi, siarczan amonu stosować pod uprawy wymagające takich warunków. Przed wysiewem siarczan amonu można mieszać z mączką fosforytową, fosforanem amonowym, a także z nawozami potasowymi.

ŚRODKI OSTROŻNOŚCI
Chronić przed dziećmi. Nie spożywać. W razie połknięcia niezwłocznie zasięgnij porady lekarza – pokaż opakowanie lub etykietę. W przypadku podrażnienia, skórę i oczy przemyć dużą ilością wody. Nie wdychać pyłu. Nosić odpowiednie rękawice ochronne. W razie przypadkowego rozsypania nawóz zebrać na sucho, a w razie konieczności zabrudzoną powierzchnię spłukać dużą ilością wody. Nie przekraczać zalecanych dawek nawozu.

PRZESTRZEGAĆ ZASAD PRZECHOWYWANIA I TRANSPORTOWANIA

