

## A11

## BROJLER I

Mieszanka paszowa pełnoporcjowa dla brojlerów w chowie zagrodowym

**Sposób stosowania:** od 1 dnia do 3 tyg. życia dla kurcząt brojlerów w chowie przyzagrodowym, jako wyłączna pasza.  
 Nie wymaga okresu karencji. Niebezpieczny dla koniowatych i indyków. Zawiera jonofor dlatego niewskazane jest jednoczesne stosowanie z niektórymi substancjami leczniczymi (np. tiamulina).

**Forma paszy:** Kruszonka

**Skład** pszenica, kukurydza, śruta poekstrakcyjna paszowa z nasion soi, śruta poekstrakcyjna słonecznikowa, tłuszcz drobiowy, węglan wapnia, fosforan jednowapniowy, chlorek sodu, siarczan sodu

Dodatkowe informacje: Produkt zawiera genetycznie zmodyfikowaną śrutę sojową.

|                                     |                |     |   |           |      |   |
|-------------------------------------|----------------|-----|---|-----------|------|---|
| <b>Składniki analityczne w 1 kg</b> | Białko surowe  | 198 | g | Fosfor    | 5.0  | g |
|                                     | Tłuszcz surowy | 35  | g | Sód       | 1.4  | g |
|                                     | Włókno surowe  | 29  | g | Lizyna    | 11.8 | g |
|                                     | Popiół surowy  | 47  | g | Metionina | 5.3  | g |
|                                     | Wapń           | 6.5 | g |           |      |   |

### Dodatki w 1 kg

#### Witaminy i prowitaminy

|                                              |       |     |
|----------------------------------------------|-------|-----|
| Witamina A (octan retinylu; 3a672a)          | 10000 | JM  |
| Witamina D3 (cholekalcyferol; 3a671)         | 3000  | JM  |
| Witamina E (octan dl-alfa-tokoferylu; 3a700) | 30    | mg  |
| Biotyna (3a880)                              | 160   | mcg |

#### Mikroelementy

|                                            |     |    |
|--------------------------------------------|-----|----|
| Żelazo (siarczan żelaza jednowodny; 3b103) | 50  | mg |
| Miedź (siarczan miedzi pięciowodny; 3b405) | 12  | mg |
| Cynk (tlenek cynku; 3b603)                 | 70  | mg |
| Mangan (tlenek manganu; 3b502)             | 80  | mg |
| Jod (granulowany jodan wapnia; 3b203)      | 1   | mg |
| Selen (powlekany gran.selenin sodu; 3b802) | 0.2 | mg |

|                                          |                                               |      |        |
|------------------------------------------|-----------------------------------------------|------|--------|
| <b>Substancje polepszające strawność</b> | 6- fitaza (EC 3.1.3.26; 4a24)                 | 1000 | FTU/kg |
|                                          | Endo-1,4 beta- ksylanaza (EC 3.2.1.8; 4a1617) | 2250 | EPU/kg |

|                          |                        |      |    |
|--------------------------|------------------------|------|----|
| <b>Przeciwutleniacze</b> | Galusan propylu (E310) | 0.01 | mg |
|                          | BHT (E321)             | 0.1  | mg |

|                         |                        |    |     |
|-------------------------|------------------------|----|-----|
| <b>Kokcydiostatyki:</b> | Salinomycyna (5 1 766) | 60 | ppm |
|-------------------------|------------------------|----|-----|

### Data produkcji i nr serii

**Okres przydatności** Wykorzystać przed upływem 3 miesięcy od daty produkcji.

**Warunki przechowywania i stosowania:** Wyrób stosować zgodnie z przeznaczeniem. Przechowywać w suchym i chłodnym miejscu. Producent nie odpowiada za skutki niewłaściwego przechowywania i stosowania wyrobu gotowego.