



SAFLAX®



Tips



© rücke-Osteuropa - CC0

Lycopersicon esculentum

	 Български	BG		2		 Malti	MT		5
	 Dansk	DK		2		 Nederlands	NL		5
	 Deutsch	DE		2		 Norsk	NO		6
	 English	UK		2		 Polski	PL		6
	 Eesti	EE		3		 Português	PT		6
	 Suomalainen	FI		3		 Românesc	RO		6
	 Français	FR		3		 Svenska	SE		7
	 Ελληνική	GR		3		 Slovensky	SK		7
	 Gaeilge	IE		4		 Slovenski	SI		7
	 íslenskur	IS		4		 Español	ES		7
	 Italiano	IT		4		 Český	CZ		8
	 Hrvatski	HR		4		 Türkçe	TR		8
	 Latviešu	LV		5		 Magyar	HU		8
	 Lietuvių kalba	LT		5		 日本語	JP		9



Домат - Costoluto Genovese

Lycopersicon esculentum

Ароматни и сочни - класическият домати в италианската кухня!

Костолуто Дженовезе е стар италиански, червенплоден, едър и сочен бифтек домати с плоски, обрени и сочни плодове, който все още се предлага на пазара в Италия. Неговите устойчиви на разкъсване плодове, които тежат до 250 грама, узряват сравнително рано и до октомври. Колкото по-дълго узряват плодовете им, толкова по-фин се развива ароматният им вкус. Интензивният вкус на доматите го прави идеален сорт за тестени ястия, салати и сосове. **Естествено местоположение:** Успешно отглеждане: Тъй като доматите трябва да се държат в градината едва от средата на май, когато вече не се очакват нощни слани, те се предпочитат в средата до края на март в светла и топла става. Доматите по-врат бързо и затова не е необходимо да се култивират тях по-рано. Когато в градината е достатъчно топло, растенията са достатъчно силни, за да ги засадят. Просто разпръснете плоските семена на два сантиметра едно от друго върху влажен субстрат за семена и само леко покрийте семената. Поддържайте растящия субстрат влажен, но не мокър, за предотвратяване като го навлажнявате със спрей бутилка. Покрийте съда с култура с домакинско фолио, което сте осигурили с дупки. Това предпазва почвата от изсушаване. Трябва да отстранявате фолиото за 2 часа на всеки два до три дни. Това предотвратява образуването на мухъл върху растящата почва. Поставете саксията на светло и топло място с температура между 20° и 24° по Целзий и поддържайте почвата влажна, но не мокра. След седмица или две трябва да се появят първите разсад. Сега махнете капака и дръжте растенията на колкото се може повече светлина (но не на палещото обедно слънце) и малко по-хладно, за да не изсъхнат младите растения. Веднага щом се развие втората двойка листа, младите разсади могат да се пикират (поединично) до първия лист в малки 10 см саксии с дупки на дъното и пръст от домати. Моля, внимавайте да не повредите все още фините корени и да поливате прясната почва леко. Поставете саксията на светло и топло място с температура между 20° и 24° по Целзий и поддържайте почвата влажна, но не мокра. След седмица или две трябва да се появят първите разсад. Сега махнете капака и дръжте растенията на колкото се може повече светлина (но не на палещото обедно слънце) и малко по-хладно, за да не изсъхнат младите растения. Веднага щом се развие втората двойка листа, младите разсади могат да се пикират (поединично) до първия лист в малки 10 см саксии с дупки на дъното и пръст от домати. Моля, внимавайте да не повредите все още фините корени и да поливате прясната почва леко. Поставете саксията на светло и топло място с температура между 20° и 24° по Целзий и поддържайте почвата влажна, но не мокра. След седмица или две трябва да се появят първите разсад. Сега махнете капака и дръжте растенията на колкото се може повече светлина (но не на палещото обедно слънце) и малко по-хладно, за да не изсъхнат младите растения. Веднага щом се развие втората двойка листа, младите разсади могат да се пикират (поединично) до първия лист в малки 10 см саксии с дупки на дъното и пръст от домати. Моля, внимавайте да не повредите все още фините корени и да поливате прясната почва леко. **Най-доброто местоположение:** **Оптимална грижа:** Веднага след като вашите доматени растения достигнат височина от десет сантиметра, те се нуждаят от пръчка за опора и могат да бъдат на открито през деня при поне 5° по Целзий, за да се втвърдят. Осигурете достатъчно поливане, тъй като бързото изпаряване става чрез сега бързо нарастващата зеленина. След ледените светли в средата на май растенията могат да бъдат трансплантирани в градинската лека или кофа на разстояние 75 сантиметра на пълно слънце. Кофата трябва да избира най-малко десет литра пръст и да е добре дренирана. Доматите се нуждаят от здрави опорни пръти, добре закрепени в земята, или спирални от домати от градинския магазин. Място, защитено от дъжд и вятър също е идеално. Осигурете равномерно режим на поливане, към който растението може да свикне. Оттук нататък най-важната мярка за грижа е непрекъснатото ужиране на второстепенните издънки, така че главният издънка да получи достатъчно светлина за развитието си. Отстранете всички аксиларни издънки, които се образуват между ствола и основата на клоната. Тъй като кореновата система първоначално се развива енергично, видимият растеж е бавен през първите няколко седмици. Натопете най-рано четири седмици след засаждането с наличен в търговската мрежа тор за домати и четири седмици по-късно втори път. **През зимата: Внимание: Доматите принадлежат към семейството на нощниците. Частите на растението са отровни. Но разбира се не зрялите плодове!**



Tomat - Costoluto Genovese

Lycopersicon esculentum

Aromatisk og saftig - den klassiske tomat i det italienske køkken!

Costoluto Genovese er en gammel italiensk, rødfrugtet, stor og saftig oksekødstomat med flade, ribbede og saftige frugter, som stadig er på markedet i Italien. Dens sprængfaste frugter, der vejer op til 250 gram, modner relativt tidligt og langt ind i oktober. Jo længere deres frugter modnes, jo finere udvikles deres aromatiske smag. Den intense tomat-smag gør den til den ideelle variant til pastaretter, salater og saucer. **Naturlig beliggenhed:** **Successful dyrkning:** Da tomater først skal stå i haven fra midten af maj, hvor der ikke længere er nattefrost, foretrækkes de midt til sidst i marts i et lyst og varmt lokale. Tomater spirer hurtigt og det er derfor ikke nødvendigt at dyrke dem tidligere. Når det er varmt nok i haven, er planterne stærke nok til at plante ud. Du skal blot sprede de flade frø med to centimeter fra hinanden på et fugtigt frøsubstrat og kun let dække frøene. Hold vækstsubstratet fugtigt, men ikke vådt, helst ved at fugte det med en sprayflaske. Dæk dyrkningskarret til med husholdningsfilm, som du forsyner med huller. Dette beskytter jorden mod udtørring. Du bør fjerne folien i 2 timer hver anden til tredje dag. Dette forhindrer mug i at dannes på den voksende jord. Stil potten et let og varmt sted med en temperatur mellem 20° og 24° Celsius og hold pottejorden fugtig, men ikke våd. Efter en uge eller to skal de første frøplanter dukke op. Fjern nu låget og hold planterne i så meget lys som muligt (dog ikke i den bragende middagssol) og lidt køligere, så de unge planter ikke visner. Så snart det andet bladepar udvikler sig, kan de unge småplanter prikkes ud (enkeltvis) op til det første blad i små 10 cm potter med huller i bunden og tomatjord. Sørg for ikke at beskadige de stadig fine rødder og at vandet den friske jord let. Stil potten et let og varmt sted med en temperatur mellem 20° og 24° Celsius og hold pottejorden fugtig, men ikke våd. Efter en uge eller to skal de første frøplanter dukke op. Fjern nu låget og hold planterne i så meget lys som muligt (dog ikke i den bragende middagssol) og lidt køligere, så de unge planter ikke visner. Så snart det andet bladepar udvikler sig, kan de unge småplanter prikkes ud (enkeltvis) op til det første blad i små 10 cm potter med huller i bunden og tomatjord. Sørg for ikke at beskadige de stadig fine rødder og at vandet den friske jord let. Stil potten et let og varmt sted med en temperatur mellem 20° og 24° Celsius og hold pottejorden fugtig, men ikke våd. Efter en uge eller to skal de første frøplanter dukke op. Fjern nu låget og hold planterne i så meget lys som muligt (dog ikke i den bragende middagssol) og lidt køligere, så de unge planter ikke visner. Så snart det andet bladepar udvikler sig, kan de unge småplanter prikkes ud (enkeltvis) op til det første blad i små 10 cm potter med huller i bunden og tomatjord. Sørg for ikke at beskadige de stadig fine rødder og at vandet den friske jord let. **Den bedste beliggenhed: Optimal pleje:** Så snart dine tomatplanter har nået en højde på ti centimeter, har de brug for en pind til støtte og kan stå udenfor i løbet af dagen ved mindst 5° Celsius for at stivne. Sørg for tilstrækkelig vanding, da hurtig fordamning sker via det nu hurtigt voksende løv. Efter ishelgenerne i midten af maj kan planterne transplanteres i havebedet eller spanden i en afstand af 75 centimeter i fuld sol. Spanden skal indeholde mindst ti liter jord og være godt drænet. Tomater har brug for stærke støttestænger forankekort jorden eller tomatspiraler fra havebutikken. Et sted beskyttet mod regn og vind er også ideelt. Giv en jævn vanding, som planten kan vænne sig til. Fra nu af er den vigtigste plejeforanstaltning den løbende stikning af sekundære skud, så hovedskuddet får nok lys til sin udvikling. Fjern eventuelle aksillære skud, der dannes mellem stammen og bunden af grenen. Da rodsystemet i starten udvikler sig kraftigt, er synlig vækst langs i de første par uger. Gød tidligst fire uger efter plantning med en kommercielt tilgængelig tomatgødning og fire uger senere en anden gang. **Om vinteren: OBS: Tomater tilhører natskyggefamilien. Plantens dele er giftige. Men selvfølgelig ikke den modne frugt!**



Tomate - Costoluto Genovese

Lycopersicon esculentum

Aromatisch und saftig - Die klassische Tomate der Italienischen Küche!

Costoluto Genovese ist eine alte italienische, rotfruchtige, große und saftige Fleischtomate mit platten, gerippten und saftigen Früchten, die in Italien noch im Handel ist. Ihre bis zu 250 Gramm schweren und platzen Früchte reifen relativ früh und lange bis in den Oktober. Je länger ihre Früchte reifen, umso feiner entwickelt sich ihr aromatischer Geschmack. Der intensive Tomatengeschmack macht sie zur idealen Sorte für Pastagerichte, Salate und Saucen. **Naturstandort:** **Anzucht:** Da man Tomaten erst ab Mitte Mai im Garten halten sollte, wenn keine Nachtfröste mehr zu erwarten sind, zieht man sie bereits Mitte bis Ende März in einem hellen und warmen Raum vor, Tomaten keimen schnell und eine frühere Anzucht ist daher nicht notwendig. Wenn es im Garten dann warm genug ist, sind die Pflanzen bereits kräftig genug zur Auspflanzung. Streuen sie die flachen Samen einfach im Abstand von zwei Zentimetern auf feuchtes Aussaatsubstrat und bedecken sie die Samen nur leicht. Halten Sie das Anzuchtsubstrat feucht, aber nicht nass, indem sie es am besten mit einer Sprühflasche nachfeuchten. Decken Sie das Anzuchtgefäß mit Klarsichtfolie ab, die Sie mit Löchern versehen. So ist die Erde vor Austrocknung geschützt. Alle zwei bis drei Tage sollten Sie die Folie für 2 Stunden entfernen. Das beugt einer Schimmelbildung auf der Anzuchterde vor. Stellen Sie das Anzuchtgefäß an einen hellen und warmen Ort mit einer Temperatur zwischen 20° und 24° Celsius und halten Sie die Anzuchterde feucht, aber nicht nass. Nach ein bis zwei Wochen sollten die ersten Sämlinge erscheinen. Entfernen Sie jetzt die Abdeckung und halten Sie die Pflanzen bei möglichst viel Licht (aber keine pralle Mittagssonne) und etwas kühler, damit die jungen Pflanzen nicht vergeilen. Sobald sich das zweite Blattpaar entwickelt, können die jungen Pflänzchen bis zum ersten Blatt in kleine 10-cm-Töpfe mit Bodenlöchern und Tomatenerde pikiert (vereinzelt) werden. Achten Sie bitte darauf, die noch feinen Wurzeln nicht zu verletzen und die frische Erde leicht zu wässern. **Standort: Pflege:** Sobald Ihre Tomatenpflanzen eine Höhe von zehn Zentimetern erreicht haben, brauchen sie einen Stützstab und können tagsüber bei mindestens 5° Celsius zur Abhärtung schon mal ins Freie. Achten Sie auf ausreichende Wasserversorgung, da über das jetzt schnell zunehmende Blattwerk eine schnelle Verdunstung erfolgt. Nach den Eisheiligen Mitte Mai können die Pflanzen im Abstand von 75 Zentimetern an einem vollsonnigen Standort ins Gartenbeet oder in den Kübel umgepflanzt werden. Der Kübel sollte mindestens zehn Liter Erde fassen und gut drainiert sein. Tomaten benötigen gut im Boden verankerte kräftige Stützstäbe oder Tomatenspiralen aus dem Gartenzentrum. Optimal ist zudem ein regen- und windgeschützter Platz. Sorgen Sie für eine Gleichmäßigkeit bei der Wasserversorgung, an die die Pflanze sich gewöhnen kann. Die wichtigste Pflegemaßnahme ist ab jetzt das laufende Entzweigen der Nebentriebe, damit der Haupttrieb genug Licht für seine Entwicklung erhält. Entfernen Sie alle Achseltriebe, die sich zwischen Stamm und Zweigansatz bilden. Da sich zunächst das Wurzelwerk kräftig weiter entwickelt, verläuft das sichtbare Wachstum in den ersten Wochen nur langsam. Düngen Sie frühestens vier Wochen nach der Auspflanzung erstmals mit einem handelsüblichen Tomatendünger und nach weiteren vier Wochen ein zweites Mal. **Im Winter: Achtung: Tomaten zählen zu den Nachtschattengewächsen. Die Pflanzenteile giftig. Aber natürlich nicht die reifen Früchte!**



Tomato - Costoluto Genovese

Lycopersicon esculentum

Aromatic and juicy – the classic tomato in the Italian kitchen

The Colstoluto Genovese is an old Italian, huge and juicy beef tomato with flat, ribbed and juicy fruits that are still traded in Italy. The strong fruits can weigh up to 250 grams and start showing up rather early and grow until mid October. The longer the fruits ripen, the better the aromatic taste will be. The intense tomato taste makes the Costoluto Genovese the perfect tomato for pastas, salads and sauces. **Natural location:** **Successful cultivation:** Since tomato plants should only be planted out from mid May after the last nightly frosts, it is advisable to start propagation in mid or end of March in a bright and warm room indoors. Tomato plants germinate rather quickly and you don't need to start propagation earlier than that. When the outdoor temperatures are high enough, the plants will be strong and ready for planting out. Spread the seeds about 2 cm apart from each other onto moist potting compost, put just a little compost earth on top and moisten the earth again by using a water sprayer. Cover the seed container with clear film to prevent the earth from drying out, but don't forget to make some holes in the clear film and take it every second or third day completely off for about 2 hours. That way you avoid mold formation on your potting compost. Place the seed container somewhere bright and warm with a temperature between 20°C and 24° Celsius and keep the earth moist, but not wet. The first seedlings should come up after one or two weeks. Now, you can remove the clear film and keep the sprouts somewhat cool and as bright as possible, but not in the full midday sun. As soon as the seedlings develop the second pair of leaves, you can prick out until the first leave pair, and plant the sprouts into small 10 cm pots with potting earth for tomato plants and a bottom hole. Be gentle with the fine roots and don't forget to modestly water the fresh soil. **The best location: Optimal care:** As soon as the tomato plant grows higher than 10 cm, you need to provide a wooden stick as a stabilizer, and during the day you can already keep the plants outdoors with at least 5° Celsius for acclimatization. After the "Ice Saints" in mid May, you can plant the tomatoes in a full sunny spot and about 75 cm apart from each other into the garden bed or in a bigger pot. The pot should have at least 10 litres of earth and a good drainage. The tomato plants need a strong and firmly fixed strut or tomato stakes from the garden centre. A rain-sheltered and wind-protected place would be ideal for cultivation. Water the plant regularly and evenly, so it can adapt to the amount of water given. The most important part of the care is now the ongoing cutting of the sideshoots, particularly between the stem and the base of the branches, so that the main sprout has enough light and strength for development. The aerial part of the plant grows rather slow during the first weeks since the tomato strongly develops its rooting first. You can give standard fertilizer for tomato plants, but the first time not earlier than four weeks from planting out, and the second time another four weeks later. **In the winter: Caution: Tomatoes are part of the nightshade family. Plant parts are poisonous. But of course, not the fruit.**

Tomat - Costoluto Genovese

Lycopersicon esculentum

Aromaatne ja mahlane – klassikaline tomat Itaalia köögis!

[illegible]

Tomaatti - Costoluto Genovese

Lycopersicon esculentum

Aromaattinen ja mehukas – italialaisen keittiön klassinen tomaatti!

[illegible]

Tomate Costoluto Genovese

Lycopersicon esculentum

Aromatique et juteuse - La tomate classique de la cuisine italienne !

La Costoluto Genovese est une ancienne tomate charnue italienne, à fruits rouges, grosse et juteuse avec des fruits plats, nervurés, et juteux, qui sont encore dans le commerce italien. Ses fruits résistants aux gerçures et qui pèsent jusqu'à 250 grammes mûrissent relativement tôt et durent jusqu'en octobre. Plus ses fruits mûrissent, plus son goût parfumé est fin. Elle fait le goût de tomate intense idéalement pour les plats de pâtes, les salades, et les sauces.

Emploi naturel: **Culture réussie:** Comme les tomates ne doivent être entretenues dans le jardin qu'à partir de mi-mai, s'il n'y a plus de gels de nuit, vous pouvez mettre la tomate dans une salle lumineuse et chaude en mi-mars à fin mars, les tomates germent rapidement et une culture plus précoce n'est pas nécessaire. S'il fait assez chaud dans le jardin, les plantes sont déjà assez puissantes pour le repiquage. Parsemez les graines sur du substrat humide à deux centimètres les unes des autres, puis recouvrez-les légèrement. Gardez le substrat humide, mais pas mouillé, en l'humidifiant de préférence tous les jours avec de l'eau pulvérisée. Couvrez le récipient avec une feuille transparente dans laquelle vous faites des trous. Comme ça, le terreau est protégé du dessèchement. Vous devez enlever la feuille pendant deux heures tous les deux ou trois jours. Ceci prévient la formation de moisissures dans le terreau. Mettez le récipient dans un endroit lumineux et chaud de 20° à 24° Celsius et gardez le terreau humide, mais pas mouillé. Les premières graines doivent apparaître après une à deux semaines. Enlevez la couverture et gardez les plantes dans le plus de lumière possible (mais pas de soleil de plomb de midi) et dans un endroit un peu plus froid pour que les plantes ne s'étioilent pas. Les jeunes plantes peuvent être repiquées (isolées) jusqu'à la première feuille dans des petits pots de 10 centimètres avec des trous dans la terre et de la terre pour tomates. Veillez à ce que vous ne blessiez pas les racines fines et à ce que vous arrosiez la terre légèrement. **Le meilleur emplacement:** **Soins optimaux:** Dès que vos tomates ont atteint une hauteur de dix centimètres, elles ont besoin d'une barre pour la protections et peuvent être en plein air dans des températures de 5° Celsius minimum pendant la journée pour le renforcement. Après les saints de glace en mi-mai, les plantes peuvent être rempotées dans un emplacement en plein soleil dans la plate-bande ou dans le pot à 75 centimètres les unes des autres. Le pot doit avoir au moins 10 litres de terre et être bien drainé. Les tomates ont besoin de barres de support puissantes ou des tuteurs à tomates de la jardinerie qui peuvent être ancrés dans la terre. Un endroit qui est aussi protégé de la pluie et du vent est idéal. Veillez à arroser la plante de façon à qu'elle puisse s'y habituer. La mesure de maintenance la plus importante à partir de là est de tailler les rameaux secondaires pour que le rameau principal reçoive assez de lumière pour son développement. Enlevez tous les rameaux axillaires qui se forment entre le tronc et l'entrée de la branche. Comme les racines se développent fortement d'abord, la croissance visible est lente pendant les premières semaines. Engraissez la tomate pour la première fois quatre semaines après le repiquage au plus tôt avec un engrais pour tomates commercial et pour une deuxième fois quatre semaines après.

En hiver: **Attention: Les tomates appartiennent à la famille des solanacées. Les parties végétales sont toxiques. Le fruit mûr ne l'est bien évidemment pas!**

Ντομάτα - Costoluto Genovese

Lycopersicon esculentum

Αρωματική και ζουμερή - η κλασική ντομάτα στην ιταλική κουζίνα!

[illegible]

Trátaí - Costoluto Genovese

 Lycopersicon esculentum

Aramatacha agus juicy - an trátaí clasaiceach i ealaín na hIodáile!

is Costoluto Genovaese sean-tráta mairteola mairteola, dhéanfartha, mór agus júicí na torthaí corthomh, iomaireach agus júicí, atá fós ar an margadh san Iodáil. Aibíonn a torthaí pléascacha-resistant, a mhéas suas le 250 gram, sách luath agus go maith íseal a m' Dheireadh Fómhair. Dá dhá ad aibíonn a gcuid torthaí, is ea is míne a fhorbairt na bsaí aramachat Mar gheall ar dhian-bhlais na dtárla is iontach an éagsúlacht le le haghaidh miasa pasta, saláid agus anlainn.

Suíomh nádúrtha: Saothrú agus: Os rud é nár chóir aithníocht a choinneáil sa ghairdín ach 6 lár mhí na Bealtaine, nuair nach bhfuiltear ag súil le frosts óiche a thuilleadh, is fearr iad lár mhí na Mhárta go déanach i seomra gearr agus te. Péacáin trátaí go tapa agus mar sin ní gá iad a chosú, idir níos luaithe. Nuair a bhíonn sé go te leor sa ghairdín, tá na plandaí láidir go leor chun plandaí amháin. Níl le déanamh ach na siolta corthomh a scaipeadh dhá cheintiméadar óna chéile ar fhorshraithe siolta tais agus gan ach na siolta a chúlúidh go héadrom. Coinnigh an tsuástráit atá ag fás tais ach ní fliuch, b'fhearr é a thais le buidéal spraeála. Clúdaigh an soitheach cultúir le scannán líng, a sholáraitheann na poill. Cosáinonn sé seo an tithir é thríoimí amháin. Ba chóir dúit an scragall a bhaint ar feadh 2 úr gach dhá mhí ní trí lár. Cuiréann sé seo cosc ar mhúla a fhoirmiú ar an tithir atá ag fás. Cuir an pota in áit éadrom te le teocht dhí 20 ° agus 24 ° Celsius agus coinnigh an tithir poitaithe tais ach ná bíodh sé fliuch. Tá éis seachtaine nó dhó, ba chóir go mbeadh na chéad síológa le feiceáil. Anois bain an clúdach agus coinnigh na plandaí i bhfianaise an oiread agus is féidir (ach ní sa ghriam méan lae blazing) agus beagán níos fuairé ionas nach mbeid na plandaí óga with. Chomh luath agus a fhorbairt an dara péire duilleoga, is féidir na plandaí óga a phiochadh amach (ina n-aonar) suas go dtí an chéad duilleog i bpotal beaga 10 cm le poill sa bhun agus san tithir trátaí. Déan cinnte, le do thoil, nach ndéanfaidh tú dochar do na fréamhacha atá fós mín agus uisce a chur ar an tithir úr go héadrom te. le teocht dhí 20 ° agus 24 ° Celsius agus coinnigh an tithir poitaithe tais ach ná bíodh sé fliuch. Tá éis seachtaine nó dhó, ba chóir go mbeadh na chéad síológa le feiceáil. Anois bain an clúdach agus coinnigh na plandaí i bhfianaise an oiread agus is féidir (ach ní sa ghriam méan lae blazing) agus beagán níos fuairé ionas nach mbeid na plandaí óga with. Chomh luath agus a fhorbairt an dara péire duilleoga, is féidir na plandaí óga a phiochadh amach (ina n-aonar) suas go dtí an chéad duilleog i bpotal beaga 10 cm le poill sa bhun agus san tithir trátaí. Déan cinnte, le do thoil, nach ndéanfaidh tú dochar do na fréamhacha atá fós mín agus uisce a chur ar an tithir úr go héadrom te. le teocht dhí 20 ° agus 24 ° Celsius agus coinnigh an tithir poitaithe tais ach ná bíodh sé fliuch. Tá éis seachtaine nó dhó, ba chóir go mbeadh na chéad síológa le feiceáil. Anois bain an clúdach agus coinnigh na plandaí i bhfianaise an oiread agus is féidir (ach ní sa ghriam méan lae blazing) agus beagán níos fuairé ionas nach mbeid na plandaí óga with. Chomh luath agus a fhorbairt an dara péire duilleoga, is féidir na plandaí óga a phiochadh amach (ina n-aonar) suas go dtí an chéad duilleog i bpotal beaga 10 cm le poill sa bhun agus san tithir trátaí. Déan cinnte, le do thoil, nach ndéanfaidh tú dochar do na fréamhacha atá fós mín agus uisce a chur ar an tithir úr go héadrom te. le teocht dhí 20 ° agus 24 ° Celsius agus coinnigh na plandaí i bhfianaise an oiread agus is féidir (ach ní sa ghriam méan lae blazing) agus beagán níos fuairé ionas nach mbeid na plandaí óga with. Chomh luath agus a fhorbairt an dara péire duilleoga, is féidir na plandaí óga a phiochadh amach (ina n-aonar) suas go dtí an chéad duilleog i bpotal beaga 10 cm le poill sa bhun agus san tithir trátaí. Déan cinnte, le do thoil, nach ndéanfaidh tú dochar do na fréamhacha atá fós mín agus uisce a chur ar an tithir úr go héadrom te. le teocht dhí 20 ° agus 24 ° Celsius agus coinnigh na plandaí i bhfianaise an oiread agus is féidir (ach ní sa ghriam méan lae blazing) agus beagán níos fuairé ionas nach mbeid na plandaí óga with. Chomh luath agus a fhorbairt an dara péire duilleoga, is féidir na plandaí óga a phiochadh amach (ina n-aonar) suas go dtí an chéad duilleog i bpotal beaga 10 cm le poill sa bhun agus san tithir trátaí. Déan cinnte, le do thoil, nach ndéanfaidh tú dochar do na fréamhacha atá fós mín agus uisce a chur ar an tithir úr go héadrom te. le teocht dhí 20 ° agus 24 ° Celsius agus coinnigh na plandaí i bhfianaise an oiread agus is féidir (ach ní sa ghriam méan lae blazing) agus beagán níos fuairé ionas nach mbeid na plandaí óga with. Chomh luath agus a fhorbairt an dara péire duilleoga, is féidir na plandaí óga a phiochadh amach (ina n-aonar) suas go dtí an chéad duilleog i bpotal beaga 10 cm le poill sa bhun agus san tithir trátaí. Déan cinnte, le do thoil, nach ndéanfaidh tú dochar do na fréamhacha atá fós mín agus uisce a chur ar an tithir úr go héadrom te. le teocht dhí 20 ° agus 24 ° Celsius agus coinnigh na plandaí i bhfianaise an oiread agus is féidir (ach ní sa ghriam méan lae blazing) agus beagán níos fuairé ionas nach mbeid na plandaí óga with. Chomh luath agus a fhorbairt an dara péire duilleoga, is féidir na plandaí óga a phiochadh amach (ina n-aonar) suas go dtí an chéad duilleog i bpotal beaga 10 cm le poill sa bhun agus san tithir trátaí. Déan cinnte, le do thoil, nach ndéanfaidh tú dochar do na fréamhacha atá fós mín agus uisce a chur ar an tithir úr go héadrom te. le teocht dhí 20 ° agus 24 ° Celsius agus coinnigh na plandaí i bhfianaise an oiread agus is féidir (ach ní sa ghriam méan lae blazing) agus beagán níos fuairé ionas nach mbeid na plandaí óga with. Chomh luath agus a fhorbairt an dara péire duilleoga, is féidir na plandaí óga a phiochadh amach (ina n-aonar) suas go dtí an chéad duilleog i bpotal beaga 10 cm le poill sa bhun agus san tithir trátaí. Déan cinnte, le do thoil, nach ndéanfaidh tú dochar do na fréamhacha atá fós mín agus uisce a chur ar an tithir úr go héadrom te. le teocht dhí 20 ° agus 24 ° Celsius agus coinnigh na plandaí i bhfianaise an oiread agus is féidir (ach ní sa ghriam méan lae blazing) agus beagán níos fuairé ionas nach mbeid na plandaí óga with. Chomh luath agus a fhorbairt an dara péire duilleoga, is féidir na plandaí óga a phiochadh amach (ina n-aonar) suas go dtí an chéad duilleog i bpotal beaga 10 cm le poill sa bhun agus san tithir trátaí. Déan cinnte, le do thoil, nach ndéanfaidh tú dochar do na fréamhacha atá fós mín agus uisce a chur ar an tithir úr go héadrom te. le teocht dhí 20 ° agus 24 ° Celsius agus coinnigh na plandaí i bhfianaise an oiread agus is féidir (ach ní sa ghriam méan lae blazing) agus beagán níos fuairé ionas nach mbeid na plandaí óga with. Chomh luath agus a fhorbairt an dara péire duilleoga, is féidir na plandaí óga a phiochadh amach (ina n-aonar) suas go dtí an chéad duilleog i bpotal beaga 10 cm le poill sa bhun agus san tithir trátaí. Déan cinnte, le do thoil, nach ndéanfaidh tú dochar do na fréamhacha atá fós mín agus uisce a chur ar an tithir úr go héadrom te. le teocht dhí 20 ° agus 24 ° Celsius agus coinnigh na plandaí i bhfianaise an oiread agus is féidir (ach ní sa ghriam méan lae blazing) agus beagán níos fuairé ionas nach mbeid na plandaí óga with. Chomh luath agus a fhorbairt an dara péire duilleoga, is féidir na plandaí óga a phiochadh amach (ina n-aonar) suas go dtí an chéad duilleog i bpotal beaga 10 cm le poill sa bhun agus san tithir trátaí. Déan cinnte, le do thoil, nach ndéanfaidh tú dochar do na fréamhacha atá fós mín agus uisce a chur ar an tithir úr go héadrom te. le teocht dhí 20 ° agus 24 ° Celsius agus coinnigh na plandaí i bhfianaise an oiread agus is féidir (ach ní sa ghriam méan lae blazing) agus beagán níos fuairé ionas nach mbeid na plandaí óga with. Chomh luath agus a fhorbairt an dara péire duilleoga, is féidir na plandaí óga a phiochadh amach (ina n-aonar) suas go dtí an chéad duilleog i bpotal beaga 10 cm le poill sa bhun agus san tithir trátaí. Déan cinnte, le do thoil, nach ndéanfaidh tú dochar do na fréamhacha atá fós mín agus uisce a chur ar an tithir úr go héadrom te. le teocht dhí 20 ° agus 24 ° Celsius agus coinnigh na plandaí i bhfianaise an oiread agus is féidir (ach ní sa ghriam méan lae blazing) agus beagán níos fuairé ionas nach mbeid na plandaí óga with. Chomh luath agus a fhorbairt an dara péire duilleoga, is féidir na plandaí óga a phiochadh amach (ina n-aonar) suas go dtí an chéad duilleog i bpotal beaga 10 cm le poill sa bhun agus san tithir trátaí. Déan cinnte, le do thoil, nach ndéanfaidh tú dochar do na fréamhacha atá fós mín agus uisce a chur ar an tithir úr go héadrom te. le teocht dhí 20 ° agus 24 ° Celsius agus coinnigh na plandaí i bhfianaise an oiread agus is féidir (ach ní sa ghriam méan lae blazing) agus beagán níos fuairé ionas nach mbeid na plandaí óga with. Chomh luath agus a fhorbairt an dara péire duilleoga, is féidir na plandaí óga a phiochadh amach (ina n-aonar) suas go dtí an chéad duilleog i bpotal beaga 10 cm le poill sa bhun agus san tithir trátaí. Déan cinnte, le do thoil, nach ndéanfaidh tú dochar do na fréamhacha atá fós mín agus uisce a chur ar an tithir úr go héadrom te. le teocht dhí 20 ° agus 24 ° Celsius agus coinnigh na plandaí i bhfianaise an oiread agus is féidir (ach ní sa ghriam méan lae blazing) agus beagán níos fuairé ionas nach mbeid na plandaí óga with. Chomh luath agus a fhorbairt an dara péire duilleoga, is féidir na plandaí óga a phiochadh amach (ina n-aonar) suas go dtí an chéad duilleog i bpotal beaga 10 cm le poill sa bhun agus san tithir trátaí. Déan cinnte, le do thoil, nach ndéanfaidh tú dochar do na fréamhacha atá fós mín agus uisce a chur ar an tithir úr go héadrom te. le teocht dhí 20 ° agus 24 ° Celsius agus coinnigh na plandaí i bhfianaise an oiread agus is féidir (ach ní sa ghriam méan lae blazing) agus beagán níos fuairé ionas nach mbeid na plandaí óga with. Chomh luath agus a fhorbairt an dara péire duilleoga, is féidir na plandaí óga a phiochadh amach (ina n-aonar) suas go dtí an chéad duilleog i bpotal beaga 10 cm le poill sa bhun agus san tithir trátaí. Déan cinnte, le do thoil, nach ndéanfaidh tú dochar do na fréamhacha atá fós mín agus uisce a chur ar an tithir úr go héadrom te. le teocht dhí 20 ° agus 24 ° Celsius agus coinnigh na plandaí i bhfianaise an oiread agus is féidir (ach ní sa ghriam méan lae blazing) agus beagán níos fuairé ionas nach mbeid na plandaí óga with. Chomh luath agus a fhorbairt an dara péire duilleoga, is féidir na plandaí óga a ph

Tómatar - Costoluto Genovese

Lycopersicon esculentum

Arómatískur og safaríkur - klassíski tómaturinn í ítalskri matargerð!

Costoluto Genovese er gamall Íslskur, rauðáæva, stór og safaríkur naustasteiktómatur með flötum, rífnum og safaríkum ávöxtum, sem enn er á markaði á Ítalíu. Sprungunni ávextir hans, sem vega allt að 250 grómm, þroskast tíltilögna snemma og langt fram í október. Því lengur sem ávextirnar þroskast, því finni þróast árómatísk bragð þeirra. Hið ákafa tómatabragð er grænblátt og hefur allt tilvalinni fjölbreytni fyrir pastarétti, salöt og sósur. **Náttúruleg staðsetning: Árangursrík ræktun:** Þar sem tómata ádeins að geyma í garðinum upp úr mjóum máli, þegar ekki er lengur von á næturfrosti, eru þeir áksojanlegir um mjóan tíl lok mars í björtu og hlýju herbergi. Tómatar spíra fljótt og því ekki nauðsynlegt að rækta, þeim áðan. Þegar það er nógu heitt í garðinum eru plönturnar nógu sterkar til að planta út. Dreifid flötu fræjum einfallega með tveggja sentímtrama millibili á þurr frændurlag og hlýju fræin áðans. Haltu undirlaginu rakt en ekki blautt, helst með því að væta það með óðafloSKI. Hlýjir ræktunarlátid með matarflumi, sem þú útvegar með góttum þetta verndar jarðveginn gegn þurrku. Þú ættir að fjarlægja álþappirinn í 2 klukkustundir á veggja til þriggja daga fresti. Þetta kemur í veg fyrir að mygla myndist á vaxandi jarðvegi. Settu pottinn á létlan og heitan stað með hita á bilinu 20° til 24° á Celsius og haltu pottajarðveginum rökum en ekki blautum. Eftir viku eða tvær ættu fyrstu plönturnar að birtast. Fjarlægðu nú hlífina og hafðu plönturnar í eins miklu ljósi og mögulegt er (en ekki í glampandi hádegissólinni) og áðeins svalara svo að ungu plönturnar visni ekki. Um leið og annað blaðapárið þróast má stínga ungna plöntum út (stærktak) upp að fyrsta blaðinu í lítulum 10 cm pottum með holum í botninn og tómataöld. Gættu þess að skemma ekki finnar ræturnar og vökva ferskan jarðveg lít. Settu pottinn á létlan og heitan stað með hita á bilinu 20° til 24° á Celsius og haltu pottajarðveginum rökum en ekki blautum. Eftir viku eða tvær ættu fyrstu plönturnar að birtast. Fjarlægðu nú hlífina og hafðu plönturnar í eins miklu ljósi og mögulegt er (en ekki í glampandi hádegissólinni) og áðeins svalara svo að ungu plönturnar visni ekki. Um leið og annað blaðapárið þróast má stínga ungna plöntum út (stærktak) upp að fyrsta blaðinu í lítulum 10 cm pottum með holum í botninn og tómataöld. Gættu þess að skemma ekki finnar ræturnar og vökva ferskan jarðveg lít. Fjarlægðu nú hlífina og hafðu plönturnar í eins miklu ljósi og mögulegt er (en ekki í glampandi hádegissólinni) og áðeins svalara svo að ungu plönturnar visni ekki. Um leið og annað blaðapárið þróast má stínga ungna plöntum út (stærktak) upp að fyrsta blaðinu í lítulum 10 cm pottum með holum í botninn og tómataöld. Gættu þess að skemma ekki finnar ræturnar og vökva ferskan jarðveg lít. Fjarlægðu nú hlífina og hafðu plönturnar í eins miklu ljósi og mögulegt er (en ekki í glampandi hádegissólinni) og áðeins svalara svo að ungu plönturnar visni ekki. Um leið og annað blaðapárið þróast má stínga ungna plöntum út (stærktak) upp að fyrsta blaðinu í lítulum 10 cm pottum með holum í botninn og tómataöld. Gættu þess að skemma ekki finnar ræturnar og vökva ferskan jarðveg lít. Fjarlægðu nú hlífina og hafðu plönturnar í eins miklu ljósi og mögulegt er (en ekki í glampandi hádegissólinni) og áðeins svalara svo að ungu plönturnar visni ekki. Um leið og annað blaðapárið þróast má stínga ungna plöntum út (stærktak) upp að fyrsta blaðinu í lítulum 10 cm pottum með holum í botninn og tómataöld. Gættu þess að skemma ekki finnar ræturnar og vökva ferskan jarðveg lít. **Besta staðsetningin: Besta umönnun:** Um leið og tómataplönturnar þinar eru orðnar tíu sentímtrar á hæð þurfa þær staf sem stuðning og geta verið út í daginn við að minnsta kost 5° Celsius til að harðna. Gakktu úr skugga um næga vökrun, þar sem hróð uppgufun á sér stað í gegnum laufin sem stækkar hratt. Eftir ísýrðingana um mjóan máli er hægt að gróðursetja plönturnar í garðbæð eða fótu í 75 sentímtra fjarlægð í fullu sól. Fótni ættu að taka að minnsta kost tíu lítra af jarðvegi og vera vel tæmd. Tómatar þurfa sterkar stuðningsstangir sem eru vel festar í jörðu eða tómatspirála úr garversluninni. Staður sem er varinn fyrir rigningu og vindi er líka tilvalinn. Veittu jafna vökvaferi sem plöntan getur vanist. Hæðan í frá er mikilvægasta varúðarráðstöfunin áframhaldandi stíng í aukapötrunum þannig að aðalsprotinn fái næga birtu fyrir þróun sína. Fjarlægðu alla handarkjarnasprotu sem myndast á milli stofnins og botni greinarinnar. Þar sem røktarferid þróast røktfulega í upphafi er sýnilegur vöxtur hægur fyrstu vikunnar. Þrívæðing í fyrsta lagi fòrum vikum eftir gróðurstínging með tómataburði sem fæst í sólú og fjórum vikum síðar í annað sinn. **A veturna: Aþyglí: Tómatar tilheyra næturskuggafjölskyldunni. Hlutar plöntunnar eru eitruðir. En auðvæðt ekki þroskarið ávextirnar!**

Pomodoro Costoluto Genovese

Lycopersicon esculentum

Profumato e succoso - il classico pomodoro della cucina italiana!

Costoluto Genovese è una varietà di pomodoro italiana antica, in Italia ancora oggi in commercio, il frutto grande, rosso e succoso si caratterizza per la forma costoluta e leggermente appiattita. Questo pomodoro pesa fino a 250 grammi ed ha una buccia resistente, matura relativamente presto e dura fino a ottobre. Più i frutti sono maturi, più sviluppano il caratteristico gusto aromatico.

Posizione naturale: Coltivazione riuscita: I pomodori andrebbero piantati in giardino da metà maggio, quando le gelate notturne sono finite, ma è possibile anticiparne la coltivazione a fine marzo, in un ambiente luminoso e caldo. I pomodori germogliano in fretta e non è necessario piantarli ancora prima. Quando in giardino farà abbastanza caldo, le piante saranno già abbastanza robuste per il trapianto. Distribuite i semi piatti sul substrato di coltivo umido, a distanza di due centimetri l'uno dall'altro, ricoprendoli solo leggermente. Mantenete il substrato umido ma non bagnato, utilizzando preferibilmente uno spruzzino per mantenere l'umidità. Coprite il recipiente di coltivazione con pellicola trasparente, sulla quale praticherete dei fori, in questo modo la terra eviterà di seccarsi. Ogni due o tre giorni rimuovete la pellicola per 2 ore, per prevenire la formazione di muffe sulla terra. Collocate il recipiente di coltivazione in un luogo luminoso e caldo, a una temperatura tra i 20° e i 24° C, mantenete la terra umida ma non bagnata. Le prime piantine compaiono di norma da una a due settimane dopo. Rimuovete la copertura e posizionate le piante il più possibile esposte alla luce (ma non al sole diretto) in un ambiente fresco, per evitare che le giovani piante crescano ingiallite, con steli lunghi e foglie piccole. Non appena si sviluppa il secondo paio di foglie, le piantine possono essere trapiantate fino alla prima foglia (diradandole) in vasi di circa 10 centimetri, con terreno traspirante e terriccio per pomodori. Fate attenzione a non danneggiare le radici delicate e ad innaffiare leggermente la terra fresca.

La posizione migliore: Cura ottimale: Quando le vostre piante di pomodori avranno raggiunto l'altezza di 10 centimetri servirà un bastone di sostegno e di giorno potranno stare all'aperto, ad almeno 5° C, per irrobustirsi. Dopo la metà di maggio potete trapiantare le piante in un punto esposto al sole, in giardino oppure in vaso, distanziandole 75 centimetri l'una dall'altra. Se coltivate in vaso, questo dovrebbe contenere almeno dieci litri di terra ed essere ben drenato/drenante. I pomodori hanno bisogno di stecche di sostegno ben piantate nel terreno o di tutori a spirale, reperibili fra gli articoli per giardinaggio. Irrigate in maniera regolare in modo da far abituare la pianta. Il compito più importante d'ora in poi è recidere i getti secondari, per far sì che il fusto centrale assorba tutta la luce necessaria a crescere bene. Tagliate tutte le ascelle che germogliano fra il fusto centrale e la ramificazione. Poiché il sistema radicale si sviluppa in maniera molto forte, nelle prime settimane la crescita visibile della pianta appare lenta. Concimate non prima di quattro settimane dopo il trapianto, con concime per pomodori reperibile sul mercato, dopo altre quattro settimane concimate di nuovo.

In inverno: Attenzione: i pomodori si annoverano tra le Solanacee. Le parti della pianta sono tossiche.

Non lo sono, naturalmente, i frutti maturi.

Rajčica - Costoluto Genovese


Lycopersicon esculentum

Aromatična i sočna - klasična rajčica u talijanskoj kuhinji!

Cestovla Genoveje se rata talijanska, crvenopodnaka i sa sočna biftek rajčica s plosnatim, rebrazitim i sočnim plodovima, koja se još uvijek nalazi na tržištu Italije. Njegovi plodovi otporni na pucanje, teški do 250 grama, sazrijevaju relativno rano i do listopada. Što im plodovi doliže sazrijevaju, to im se finiji aromatični okus razvija Intenzivn okus rajčice čini je idealnom sortom za jela od tjestenine, salate i umake. **Zemlja porijekla:** **Uspjeh uzgoj:** Budući da rajčice u vrtu treba držati otok sredine svibnja, kada se više ne očekuju noćni mrazevi, najbolje ih je sredinom do kraja ožujka u svijetloj i toploj prostoriji.Rajčice brzo klijaju pa ih nije potrebno uzgajati, niti ranije. Kada je u vrtu dovoljno toplo, biljke su dovoljno jake za sadnju. Jednostavno posipajte plosnate sjemenke na dva centimetra razmaka po vlažnom supstratu za sjemenke i samo lagano prekritje sjemenke. Održavajte supstrat za rast vlažan, ali ne i mokrim, po mogućnosti ga navlažite bocom s raspršivačem. Posudu s kulturom prekritje prozornom folijom koju ste opremili rupama. To štiti tlo od isušivanja. Svaka dva do tri dana skinite foliju na 2 sata. Time se sprječava stvaranje plijesni na tlu za uzgoj. Stavite lonac na svijetlo i toplo mjesto s temperaturom između 20° i 24° Celzij i održavajte tlo za lonce vlažno, ali ne mokrim. Nakon tjedan ili dva trebale bi se pojaviti prve sadnice. Sada skinite pokrov i držite biljke na što više svjetla (ali ne na žarkom podnevnom suncu) i malo na hladnijem da mlade biljčice ne uvenu. Čim se razvije drugi par listova, mlade sadnice se mogu pikirati (pojedinačno) do prvog lista u male posude od 10 cm s rupama na dnu i zemljom od rajčice. Pazite da ne oštete još fino korijenje i lagano zalijevajte svježju zemlju. Stavite lonac na svijetlo i toplo mjesto s temperaturom između 20° i 24° Celzij i održavajte tlo za lonce vlažno, ali ne mokrim. Nakon tjedan ili dva trebale bi se pojaviti prve sadnice. Sada skinite pokrov i držite biljke na što više svjetla (ali ne na žarkom podnevnom suncu) i malo na hladnijem da mlade biljčice ne uvenu. Čim se razvije drugi par listova, mlade sadnice se mogu pikirati (pojedinačno) do prvog lista u male posude od 10 cm s rupama na dnu i zemljom od rajčice. Pazite da ne oštete još fino korijenje i lagano zalijevajte svježju zemlju. Sada skinite pokrov i držite biljke na što više svjetla (ali ne na žarkom podnevnom suncu) i malo na hladnijem da mlade biljčice ne uvenu. Čim se razvije drugi par listova, mlade sadnice se mogu pikirati (pojedinačno) do prvog lista u male posude od 10 cm s rupama na dnu i zemljom od rajčice. Pazite da ne oštete još fino korijenje i lagano zalijevajte svježju zemlju. Sada skinite pokrov i držite biljke na što više svjetla (ali ne na žarkom podnevnom suncu) i malo na hladnijem da mlade biljčice ne uvenu. Čim se razvije drugi par listova, mlade sadnice se mogu pikirati (pojedinačno) do prvog lista u male posude od 10 cm s rupama na dnu i zemljom od rajčice. Pazite da ne oštete još fino korijenje i lagano zalijevajte svježju zemlju. Sada skinite pokrov i držite biljke na što više svjetla (ali ne na žarkom podnevnom suncu) i malo na hladnijem da mlade biljčice ne uvenu. Čim se razvije drugi par listova, mlade sadnice se mogu pikirati (pojedinačno) do prvog lista u male posude od 10 cm s rupama na dnu i zemljom od rajčice. Pazite da ne oštete još fino korijenje i lagano zalijevajte svježju zemlju. Sada skinite pokrov i držite biljke na što više svjetla (ali ne na žarkom podnevnom suncu) i malo na hladnijem da mlade biljčice ne uvenu. Čim se razvije drugi par listova, mlade sadnice se mogu pikirati (pojedinačno) do prvog lista u male posude od 10 cm s rupama na dnu i zemljom od rajčice. Pazite da ne oštete još fino korijenje i lagano zalijevajte svježju zemlju. Sada skinite pokrov i držite biljke na što više svjetla (ali ne na žarkom podnevnom suncu) i malo na hladnijem da mlade biljčice ne uvenu. Čim se razvije drugi par listova, mlade sadnice se mogu pikirati (pojedinačno) do prvog lista u male posude od 10 cm s rupama na dnu i zemljom od rajčice. Pazite da ne oštete još fino korijenje i lagano zalijevajte svježju zemlju.

Najbolja lokacija: Optimalna njega: Čim vaše biljke raste dosegnu visinu od deset centimetara, treba im štap kao oslonac i mogu biti na otvorenom tijekom dana na najmanje 5°C da očvrstnu. Pobrinute se za dovoljno zalijevanja, jer dolazi do brz isparavanja preko lišća koje sada brzo raste. Nakon ledenih svetaca sredinom svibnja, biljke se mogu presaditi u vrtu gredicu ili kantu na razmak od 75 centimetara na punom suncu. U kantu treba stati najmanje deset litara zemlje i biti dobro drenirana. Najvikami su potrebne snažne potpore šipke dobro usidrene u tlu ili spirale rajčice iz trgovine u vrtu. Idealno je i mjesto zaštićeno od kiše i vjetro. Osigurajte ravnomjern režim zalijevanja na koji se biljka može naviknuti. Od sada je najvažnija mjera njgege kontinuirano bokačenje sekundarnih izdanaka kako bi glavni izdanak dobro dobivao svjetla za svoj razvoj. Uklonite vse aksilarne izdanke koji se formiraju između debila i baze grane. Budući da se korijenski sustav u početku snažno razvija, vidljivi rast je spor u prvih nekoliko tjedana. Gnojite najranije četiri tjedna nakon sadnje komercijalno dostupnim gnojivom za rajčice, a četiri tjedna kasnije drugi put.

U zimi: Pažnja: rajčice pripadaju obitelji noćurka. Dijelovi biljke su otrovni. Ali naravno ne zrele voće!



Pomidoras – Costoluto Genovese
Lycopersicon esculentum
Aromatingas ir sultingas – klasikinis pomidoras italų virtuvėje!

Tadam - Costluto Genovese
Lycopersicon esculentum
Aromatiku u mmerrag - it-tadam klassiku fil-kċina Taljana!

Tomaat - Costoluto Genovese
Lycopersicon esculentum
Aromatisch en sappig - de klassieke tomaat uit de Italiaanse keuken!

© SAFLAX * MSL GmbH & Co. KG * Gropiusstrasse 7a * D - 48163 Münster * www.saflax.de * Alle Rechte vorbehalten * All rights reserved



Tomat - Costoluto Genovese

Lycopersicon esculentum

Aromatisk og saftig - den klassiske tomaten i det italienske kjøkkenet!

Costoluto Genovese er en gammel italiensk, rødfrukt, stor og saftig biffotmat, som fortsatt er på markedet i Italia. Dens sprengbestandige frukter, som veier opptil 250 gram, modnes relativt tidlig og langt ut i oktober. Jo lenger fruktene deres modnes, desto finere utvikler deres aromatiske smak Den intense tomatismaken gjør den til den ideelle varianten for pastaretter, salater og sauser. **Naturlig beliggenhet: Vellykket dyrking:** Siden tomatar kun skal oppbevares i hagen fra midten av mai, når natterfrost ikke lenger er å forvente, foretrekkes de i midten til slutten av mars i et lyst og varmt rom Tomater spirer raskt og det er derfor ikke nødvendig å dyrke dem tidligere. Når det er varmt nok i hagen, er plantene sterke nok til å plante ut. Spred ganske enkelt de flate frøene med to centimeter fra hverandre på et fuktig frøsubstrat og dekk frøene lett. Hold vekstsubstratet fuktig, men ikke vått, helst ved å fukte det med en sprayflaske. Dekk kulturkaret med matfilm, som du forsyner med hull. Dette beskytter jorda mot å tørke ut. Du bør fjerne folien i 2 timer annenhver til tredje dag. Dette forhindrer at det dannes mugg på den voksende jorda. Sett potten på et lett og varmt sted med en temperatur mellom 20° og 24° Celsius og hold pottejorda fuktig, men ikke våt. Etter en uke eller to skal de første frøplantene dukke opp. Fjern nå dekelekt og hold plantene i så mye lys som mulig (men ikke i brennende middagssol) og litt kjøligere slik at de unge plantene ikke visner. Så snart det andre bladparet utvikler seg, kan de unge småplantene prikkes ut (enkelvis) opp til det første bladet i små 10 cm pottar med hull i bunnen og tomatjord. Pass på å ikke skade de fortsatt fine røttene og å vanne den friske jorda lett. Sett potten på et lett og varmt sted med en temperatur mellom 20° og 24° Celsius og hold pottejorda fuktig, men ikke våt. Etter en uke eller to skal de første frøplantene dukke opp. Fjern nå dekelekt og hold plantene i så mye lys som mulig (men ikke i brennende middagssol) og litt kjøligere slik at de unge plantene ikke visner. Så snart det andre bladparet utvikler seg, kan de unge småplantene prikkes ut (enkelvis) opp til det første bladet i små 10 cm pottar med hull i bunnen og tomatjord. Pass på å ikke skade de fortsatt fine røttene og å vanne den friske jorda lett. Fjern nå dekelekt og hold plantene i så mye lys som mulig (men ikke i brennende middagssol) og litt kjøligere slik at de unge plantene ikke visner. Så snart det andre bladparet utvikler seg, kan de unge småplantene prikkes ut (enkelvis) opp til det første bladet i små 10 cm pottar med hull i bunnen og tomatjord. Pass på å ikke skade de fortsatt fine røttene og å vanne den friske jorda lett. Den beste beliggenheten: Optimal omsorg: Så snart tomatplantene dine har nådd en høyde på ti centimeter, trenger de en pinne som støtte og kan så utendørs på dagtid ved minst 5°C for å stivne. Sørg for tilstrekkelig vann, da rask fordampning skjer via det nå raske økende bladerket. Etter ishelgenene i midten av mai kan plantene transplanteres inn i hagebedet eller bøtta i en avstand på 75 centimeter i full sol. Bøtta skal romme minst ti liter jord og være godt drenert. Tomater trenger sterke støttestenger forankret godt i bakken eller tomatspiraler fra hagebutikken. Et sted beskyttet mot regn og vind er også ideelt. Gi et jevnt vanningsregime som planten kan venne seg til. Fra nå av er det viktigste pleietilaket den pågående stikkingen av sekundærskuddene slik at hovedskuddet får nok lys for sin utvikling. Fjern eventuelle aksillære skudd som dannes mellom stammen og bunnen av grenen. Siden rotsystemet i utgangspunktet utvikler seg kraftig, er synlig vekst sakte de første ukene. Gjødsele tidligst fire uker etter planting med en kommersiell tilgjengelig tomatgjødsele og fire uker senere en gang til. **Om vinteren: Oppmerksomhet: Tomater tilhører nattskyggefamilien. Delene av planten er giftige. Men selvfølgelig ikke den modne frukten!**



Pomidor - Costoluto Genovese

Lycopersicon esculentum

Aromatyczny i soczysty - klasyczny pomidor włoskiej kuchni!

Costoluto Genovese to stary włoski, ogromny i soczysty pomidor wołowy z płaskimi, żebrowanymi i soczystymi owocami, który nadal jest sprzedawany we Włoszech. Silne owoce mogą ważyć do 250 gramów, pojawiają się dość wcześnie i rosną do połowy października. Im dłużej dojrzewają owoce, tym lepszy będzie aromatyczny smak. Intensywny pomidorowy smak sprawia, że Costoluto Genovese jest idealnym pomidorem do makaronów, sałatek i sosów. **Naturalne położenie: Udana uprawa:** Ponieważ sadzonki pomidorów należy sadzić dopiero od połowy maja po ostatnich nocnych przymrozkach, zaleca się rozpoczęcie rozmnażania w połowie lub pod koniec marca w jasnym i ciepłym pomieszczeniu w pomieszczeniu. Pomidory kiełkują dość szybko i nie trzeba wcześniej rozpoczynać rozmnażania. Gdy temperatura na zewnątrz będzie wystarczająco wysoka, rośliny będą mocne i gotowe do sadzenia. Rozłóż nasioną w odległości około 2 cm od siebie na wilgotnym kompostie doniczkowym, nałóż niewielką ilość ziemi kompostowej i ponownie zwilż ziemię za pomocą rozpylacza wodnego. Przykryj pojemnik na nasioną przezroczystą folią, aby ziemia nie wyschła, ale nie zapomnij zrobić dziur w przezroczystej folii i zdejmuj ją co drugi lub trzeci dzień na około 2 godziny. W ten sposób unikniesz tworzenia się pleśni na kompostie doniczkowym. Umieść pojemnik na nasioną w miejscu jasnym i ciepłym o temperaturze od 20 ° C do 24 ° Celsjusza i utrzymuj ziemię wilgotną, ale nie mokrą. Pierwsze sadzonki powinny pojawić się po jednym lub dwóch tygodniach. Teraz możesz usunąć przezroczystą folię i utrzymywać kiełki w chłodzie i jak najjaśniejszej, ale nie w pełnym południowym słońcu. Gdy tylko sadzonki rozwiną drugą parę liści, można wykłuwać do pierwszej pary liści i sadzić kiełki w małych 10 cm doniczkach z ziemią doniczkową dla pomidorów i dołem. Dbaj o delikatne korzenie i nie zapomnij skromnie podlać świeżej gleby. Możesz usunąć przezroczystą folię i utrzymywać kiełki w chłodzie i jak najjaśniejszym świetle, ale nie w pełnym południowym słońcu. Gdy tylko sadzonki rozwiną drugą parę liści, można wykłuwać do pierwszej pary liści i sadzić kiełki w małych 10-centymetrowych doniczkach z ziemią do sadzenia pomidorów i dołem. Dbaj o delikatne korzenie i nie zapomnij skromnie podlać świeżej gleby. Możesz usunąć przezroczystą folię i utrzymywać kiełki w chłodzie i jak najjaśniejszym świetle, ale nie w pełnym południowym słońcu. Gdy tylko sadzonki rozwiną drugą parę liści, można wykłuwać do pierwszej pary liści i sadzić kiełki w małych 10-centymetrowych doniczkach z ziemią do sadzenia pomidorów i dołem. Dbaj o delikatne korzenie i nie zapomnij skromnie podlać świeżej gleby. **Najlepsza lokalizacja: Optymalna pielęgnacja:** Gdy tylko pomidor wzrośnie powyżej 10 cm, należy zapewnić drewniany patyk jako stabilizator, aw ciągu dnia można już trzymać rośliny na zewnątrz w temperaturze co najmniej 5 ° Celsjusza do aklimatyzacji. Po „Łodowych Świętych” w połowie maja można sadzić pomidory w całkowicie nasłonecznionym miejscu, w odległości około 75 cm od siebie, do grządek ogrodowej lub do większej doniczki. Garnek powinien mieć co najmniej 10 litrów ziemi i dobry drenaż. Rośliny pomidora wymagają mocnej i mocno zamocowanej rozpórki lub tyczki pomidora z centrum ogrodniczego. Miejsce osłonięte od deszczu i wiatru byłoby idealne do uprawy. Podlewaj roślinę regularnie i równomiernie, aby dostosowała się do ilości podawanej wody. Najwcześniejszą częścią pielęgnacji jest teraz ciągle przycinanie pędów bocznych, szczególnie między łodygą a podstawą gałęzi, tak, aby główny kiełek miał wystarczająco dużo światła i sily do rozwoju. Często nadziemna roślina rośnie raczej wolno w pierwszych tygodniach, ponieważ pomidor jako pierwszy silnie rozwija swoje ukorzenie. Możesz podać standardowy nawóz dla pomidorów, ale za pierwszym razem nie wcześniej niż cztery tygodnie od wysadzenia, a drugi raz kolejne cztery tygodnie później. **W zimie: Uwaga: pomidory należą do rodziny psiankowatych. Części roślin są trujące. Ale oczywiście nie owoce.**



Tomate - Costoluto Genovese

Lycopersicon esculentum

Aromático e suculento - o tomate clássico da culinária italiana!

Costoluto Genovese é um tomate bovino italiano antigo, de frutos vermelhos, grandes e suculentos, com frutos achatados, com nervuras e suculentos, que ainda está no mercado na Itália. Seus frutos resistentes à explosão, que pesam até 250 gramas, amadurecem relativamente cedo e até outubro. Quanto mais seus frutos amadurecem, mais fino se desenvolve seu sabor aromático O sabor intenso do tomate faz com que seja a variedade ideal para massas, saladas e molhos. **Localização natural: Cultivo bem sucedido:** Como os tomates só devem ser mantidos no jardim a partir de meados de maio, quando não são mais esperadas geadas noturnas, eles são preferidos em meados de março em uma sala iluminada e quente. Os tomates germinam rapidamente e, portanto, não é necessário cultivar eles antes. Quando está quente o suficiente no jardim, as plantas são fortes o suficiente para serem plantadas. Simplesmente espalhe as sementes planas com dois centímetros de distância em um substrato úmido e cubra apenas levemente as sementes. Mantenha o substrato em crescimento úmido, mas não molhado, de preferência umedecendo-o com um borrifador. Cubra o recipiente de cultura com filme plástico, que você fornece com furos. Isso protege o solo de secar. Você deve remover o papel alumínio por 2 horas a cada dois ou três dias. Isso evita a formação de mofo no solo em crescimento. Coloque o vaso em um local claro e quente com temperatura entre 20° e 24° Celsius e mantenha a terra do vaso úmida, mas não encharcada. Depois de uma ou duas semanas, as primeiras mudas devem aparecer. Agora retire a tampa e mantenha as plantas com o máximo de luz possível (mas não no sol forte do meio-dia) e um pouco mais fresco para que as plantas jovens não murchem. Assim que o segundo par de folhas se desenvolver, as mudas jovens podem ser repicadas (solteiramente) até a primeira folha em pequenos vasos de 10 cm com furos no fundo e terra de tomate. Por favor, certifique-se de não danificar as raízes ainda finas e regar levemente o solo fresco. Coloque o vaso em um local claro e quente com temperatura entre 20° e 24° Celsius e mantenha a terra do vaso úmida, mas não encharcada. Depois de uma ou duas semanas, as primeiras mudas devem aparecer. Agora retire a tampa e mantenha as plantas com o máximo de luz possível (mas não no sol forte do meio-dia) e um pouco mais fresco para que as plantas jovens não murchem. Assim que o segundo par de folhas se desenvolver, as mudas jovens podem ser repicadas (solteiramente) até a primeira folha em pequenos vasos de 10 cm com furos no fundo e terra de tomate. Por favor, certifique-se de não danificar as raízes ainda finas e regar levemente o solo fresco. Coloque o vaso em um local claro e quente com temperatura entre 20° e 24° Celsius e mantenha a terra do vaso úmida, mas não encharcada. Depois de uma ou duas semanas, as primeiras mudas devem aparecer. Agora retire a tampa e mantenha as plantas com o máximo de luz possível (mas não no sol forte do meio-dia) e um pouco mais fresco para que as plantas jovens não murchem. Assim que o segundo par de folhas se desenvolver, as mudas jovens podem ser repicadas (solteiramente) até a primeira folha em pequenos vasos de 10 cm com furos no fundo e terra de tomate. Por favor, certifique-se de não danificar as raízes ainda finas e regar levemente o solo fresco. Agora retire a tampa e mantenha as plantas com o máximo de luz possível (mas não no sol forte do meio-dia) e um pouco mais fresco para que as plantas jovens não murchem. Assim que o segundo par de folhas se desenvolver, as mudas jovens podem ser repicadas (solteiramente) até a primeira folha em pequenos vasos de 10 cm com furos no fundo e terra de tomate. Por favor, certifique-se de não danificar as raízes ainda finas e regar levemente o solo fresco. Agora retire a tampa e mantenha as plantas com o máximo de luz possível (mas não no sol forte do meio-dia) e um pouco mais fresco para que as plantas jovens não murchem. Assim que o segundo par de folhas se desenvolver, as mudas jovens podem ser repicadas (solteiramente) até a primeira folha em pequenos vasos de 10 cm com furos no fundo e terra de tomate. Por favor, certifique-se de não danificar as raízes ainda finas e regar levemente o solo fresco. **A melhor localização: Cuidado ideal:** Assim que seus pés de tomate atingirem dez centímetros de altura, eles precisam de um pedaço de pau para se apoiar e podem ficar ao ar livre durante o dia a pelo menos 5° Celsius para endurecer. Garanta rega suficiente, pois a rápida evaporação ocorre através da folhagem que agora cresce rapidamente. Após os santos do gelo em meados de maio, as plantas podem ser transplantadas para o canteiro ou balde a uma distância de 75 centímetros a pleno sol. O balde deve conter pelo menos dez litros de solo e ser bem drenado. Os tomates precisam de bastões de suporte fortes bem ancorados no solo ou espirais de tomates da loja de jardinagem. Um local protegido da chuva e do vento também é o ideal. Forneça um regime de rega uniforme ao qual a planta possa se acostumar. A partir de agora, o cuidado mais importante é a picada contínua dos brotos secundários para que o broto principal receba luz suficiente para seu desenvolvimento. Remova quaisquer brotos axilares que se formem entre o tronco e a base do galho. Como o sistema radicular inicialmente se desenvolve vigorosamente, o crescimento visível é lento nas primeiras semanas. Fertilize quatro semanas após o plantio, no mínimo, com um fertilizante de tomate disponível comercialmente e quatro semanas depois uma segunda vez. **No inverno: Atenção: Os tomates pertencem à família das beladonas. As partes da planta são venenosas. Mas claro que não a fruta madura!**



Tomate - Costoluto Genovese

Lycopersicon esculentum

Aromatic și suculent - roșia clasică a bucătăriei italiene!

Costoluto Genovese este o roșie veche italiană, cu fructe roșii, mare și suculentă, cu fructe plate, cu nervuri și suculente, care este încă pe piață în Italia. Fructele lor rezistente la explozie, care cântăresc până la 250 de grame, se coc relativ devreme și lung până în octombrie. Cu cât fructele lor se coc mai mult, cu atât se dezvoltă gustul lor aromatic Aromata intensă de roșii face varietatea ideală pentru mâncăruri de paste, salate și sosuri. **Locație naturală: Cultivare de succes:** Deoarece roșiile ar trebui păstrate în grădini numai de la jumătatea lunii mai, când nu mai sunt de așteptat înghețurile nocturne, acestea ar trebui cultivate într-o cameră ușoară și caldă încă de la mijlocul până la sfârșitul lunii martie, roșiile germinază rapid și, prin urmare, nu este necesară cultivarea mai devreme. Când este suficient de cald în grădini, plantele sunt deja suficiente de puternice pentru a fi plantate. Pur și simplu presărați semințele plate la o distanță de doi centimetri pe un substrat de înămănare umed și acoperiți semințele doar ușor. Păstrați mediul de creștere umed, dar nu umed, umezindu-l din nou cu o sticlă de pulverizare. Acoperiți vasul de cultivare cu folie alimentară, pe care ați prevăzută-o cu găuri. Acest lucru protejează pământul de uscăre. La fiecare două până la trei zile ar trebui să îndepărtați filmul timp de 2 ore. Acest lucru previne formarea mușgaiului pe solul de cultivare. Așezați vasul de cultivare într-un loc ușor și cald, cu o temperatură cuprinsă între 20 ° și 24 ° Celsius și mențineți solul de cultivare umed, dar nu umed. Primele răsaduri ar trebui să apară după o săptămână sau două. Acum scoateți capacul și păstrați plantele în lumină cât mai mare posibil (dar fără soare aprins la amiaza) și puțin mai răcoros, astfel încât plantele tinere să nu se ghimbrească. De îndată ce a doua pereche de frunze s-a dezvoltat, plantele tinere pot fi smulțuite (individual) până la prima frunză în ghiveci mici de 10 cm, cu găuri în fund și sol de roșii. Vă rugăm să aveți grijă să nu deteriorați rădăcinile încă fine și să așăți ușor solul proaspăt. Așezați vasul de cultivare într-un loc ușor și cald, cu o temperatură cuprinsă între 20 ° și 24 ° Celsius și mențineți solul de cultivare umed, dar nu umed. Primele răsaduri ar trebui să apară după o săptămână sau două. Acum scoateți capacul și păstrați plantele în lumină cât mai mare posibil (dar fără soare aprins la amiaza) și puțin mai răcoros, astfel încât plantele tinere să nu se ghimbrească. De îndată ce a doua pereche de frunze s-a dezvoltat, plantele tinere pot fi smulțuite (individual) până la prima frunză în ghiveci mici de 10 cm, cu găuri în fund și sol de roșii. Vă rugăm să aveți grijă să nu deteriorați rădăcinile încă fine și să așăți ușor solul proaspăt. Așezați vasul de cultivare într-un loc ușor și cald, cu o temperatură cuprinsă între 20 ° și 24 ° Celsius și mențineți solul de cultivare umed, dar nu umed. Primele răsaduri ar trebui să apară după o săptămână sau două. Acum scoateți capacul și păstrați plantele în lumină cât mai mare posibil (dar fără soare aprins la amiaza) și puțin mai răcoros, astfel încât plantele tinere să nu se ghimbrească. De îndată ce a doua pereche de frunze s-a dezvoltat, plantele tinere pot fi smulțuite (singure) în ghiveci mici de 10 cm cu găuri în fund și sol de roșii până la prima frunză. Vă rugăm să aveți grijă să nu deteriorați rădăcinile încă fine și să așăți ușor solul proaspăt. Acum scoateți capacul și păstrați plantele în lumină cât mai mare posibil (dar fără soare aprins la amiaza) și puțin mai răcoros, astfel încât plantele tinere să nu se ghimbrească. De îndată ce a doua pereche de frunze s-a dezvoltat, plantele tinere pot fi smulțuite (singure) în ghiveci mici de 10 cm cu găuri în fund și sol de roșii până la prima frunză. Vă rugăm să aveți grijă să nu deteriorați rădăcinile încă fine și să așăți ușor solul proaspăt. Cea mai bună locație: Îngrijire optimă: De îndată ce plantele de roșii au atins o înălțime de zece centimetri, au nevoie de o tijă ca suport și pot ieși în timpul zilei cu cel puțin 5 ° C pentru a se întări. Asigurați-vă că aveți suficientă udare, deoarece frunzele, care acum cresc rapid, provoacă evaporarea rapidă. După sfârșitul de gheață de la mijlocul lunii mai, plantele pot fi transplantate în patul de grădină sau în cadă la o distanță de 75 de centimetri în plin soare. Găleată trebuie să conțină cel puțin zece litri de sol și să fie bine drenată. Roșiile au nevoie de tije de sprijin puternice, care sunt bine ancorate în pământ sau spirale de roșii din centrul grădinii. Un loc protejat de ploaie și vânt este, de asemenea, ideal. Asigurați-vă că udarea este uniformă cu care se poate obține planta. Cea mai importantă măsură de întreținere de acum încolo este derularea continuă a lăstarilor secundari, astfel încât lăstarul principal să primească suficientă lumină pentru dezvoltarea sa. Îndepărtați orice lăstari axilari care se formează între trunchi și baza ramurii. Deoarece rădăcinile se dezvoltă viguros la început, creșterea vizibilă este lentă în primele câteva săptămâni. Fertilizați pentru prima dată cu un îngrășământ comercial cu care la patru săptămâni după plantare cel mai devreme și a doua oară după alte patru săptămâni. **În iarnă: Atenție: roșiile fac parte din familia Nightshade. Părțile plantei sunt otrăvitoare. Dar, desigur, nu fructele coapte!**

Tomat - Costoluto Genovese

Lycopersicon esculentum

Aromatisk och saftig - den klassiska tomaten från det italienska köket!

Costoluto Genova: är en gammal italiensk, rödfruktaad och saftig bifrukatom med platta, ribbade och saftiga frukter, som fortfarande finns på marknaden i Italien. Deras sprängriesta frukter, som väger upp till 250 gram, mognar relativt tidigt och långt in i oktober. Ju längre deras frukter mognar, desto finare utvecklas deras aromatiska smak. Den intensiva tomatsmaken gör den till den perfekta sorten för pastarätter, sallader och såser.

Naturligt läge: Framgångsrikt odling: Eftersom tomaten endast bör förvaras i trädgårdens från mitten av maj, när det inte längre kan förväntas nattfrost, föredras de i ett ljus och varmt rum så tidigt som i mitten till slutet av mars, tomaterna spira snabbt och tidigare odling är därför inte nödvändig. När det är tillräckligt varmt i trädgårdens är växterna redan tillräckligt starka för att planteras ut. Stänk helt enkelt de platta frön på två centimeter avstånd på ett fuktigt såsbrädd och tack för bara lått. Håll odlingsmediet fuktigt men inte vått genom att återfukta det med en sprayflaska. Tack odlingskärlet med plastfolie, som du har försett med hål. Detta skyddar jorden från att torka ut. Varannan till var tredje dag ska du ta bort filmen i två timmar. Detta förhindrar att mögel bildas på odlingsjorden. Placera odlingskärlet på en lätt och varm plats med en temperatur mellan 20 ° och 24 ° Celsius och håll odlingsjorden fuktig men inte våt. De första plantorna ska visas efter en vecka eller två. Ta bort locket och håll växterna i så mycket ljus som möjligt (men ingen flammande middagsgas) och lite svalare så att de unga plantorna inte blir ingefära. Så snart det andra bladparet har utvecklats kan de unga plantorna stickas ut (individuellt) upp till det första bladet i små 10 cm krukor med hål i botten och tomatjord. Var noga med att inte skada rötterna, som fortfarande är fina, och vattna lått den färska jorden. Placera odlingskärlet på en lätt och varm plats med en temperatur mellan 20 ° och 24 ° Celsius och håll odlingsjorden fuktig men inte våt. De första plantorna ska visas efter en vecka eller två. Ta bort locket och håll växterna i så mycket ljus som möjligt (men ingen flammande middagsgas) och lite svalare så att de unga plantorna inte blir ingefära. Så snart det andra bladparet har utvecklats kan de unga plantorna stickas ut (individuellt) upp till det första bladet i små 10 cm krukor med hål i botten och tomatjord. Var noga med att inte skada rötterna, som fortfarande är fina, och vattna lått den färska jorden. Placera odlingskärlet på en lätt och varm plats med en temperatur mellan 20 ° och 24 ° Celsius och håll odlingsjorden fuktig men inte våt. De första plantorna ska visas efter en vecka eller två. Ta bort locket och håll växterna i så mycket ljus som möjligt (men ingen flammande middagsgas) och lite svalare så att de unga plantorna inte blir ingefära. Så snart det andra bladparet har utvecklats kan de unga plantorna stickas ut (individuellt) upp till det första bladet i små 10 cm krukor med hål i botten och tomatjord. Var noga med att inte skada rötterna, som fortfarande är fina, och vattna lått den färska jorden. Ta bort locket och håll växterna i så mycket ljus som möjligt (men ingen flammande middagsgas) och lite svalare så att de unga plantorna inte blir ingefära. Så snart det andra bladparet har utvecklats kan de unga plantorna stickas ut (individuellt) upp till det första bladet i små 10 cm krukor med hål i botten och tomatjord. Var noga med att inte skada rötterna, som fortfarande är fina, och vattna lått den färska jorden.

Optimal vård: Så snart dina tomatplanter har nått en höjd av tio centimeter behöver de en stav som stöd och kan gå ut under dagen vid minst 5 ° C för att hårdna. Se till att du har tillräckligt vattnings, eftersom lövverket, som nu ökar snabbt, orsakar snabb avdunstning. Efter ishelgarna i mitten av maj kan man växterna transplanteras i trädgårdens bädden eller i badkaret på ett avstånd av 75 centimeter i full sol. Skopan ska rymma minst tio liter jord och vara väl dränerad. Tomater behöver starka stödängar som är väl förankrade i marken eller tomatspiraler från trädgårdscenert. En plats skyddad från regn och vind är också perfekt. Se till att vattningen är enhetlig som växten kan vänja sig på. Den viktigaste underhållsåtgärden från och med nu är den pågående skumningen av sekundära skott så att huvudsakligt frö tillräckligt med ljus för sin utveckling. Ta bort eventuella axillära skott som bildas mellan bagageutrymmet och grenbasen. Eftersom rötterna utvecklas kraftigt först är den synliga tillväxten långsam under de första veckorna. Gödsla tidigast fyra veckor efter plantering för första gången med ett kommersiellt tillgängligt tomatgödselmedel och efter ytterligare fyra veckor igen på andra gång.

På vintern: **Varning: Tomater är en del av nattskuggfamiljen. Växtens delar är giftiga. Men naturligtvis inte de mogna frukterna!**

Paradajka - Costoluto Genovese

Lycopersicon esculentum

Aromatické a šťavnaté - klasická paradajka v talianskej kuchyni!

dosť ovocia. Genovese je stará talianska, červenooplodá, a šatnávatá paradajka na biftek s plochými, rebrovými a šatnatými plodmi, ktorá je stále na trhu v Taliansku. Jeho praskavé plody, ktoré vážia až 250 gramov, zostávajú pomerne skoro a až v októbri. Čím dlhšie ich plody dozrievajú, tým jemnejšia sa rozvíja ich aromatická chuť. Intenzívna chuť paradajok z neho robí ideálne sprevčenie do cestovín, šalátov a omáčok. **Prírodné poloha:** **Úspešná kultivácia:** Vzhľadom k tomu, že paradajky by sa mali na záhrade uchovávať až do polovice mája, keď už netreba očakávať nočné mrazy, uprednostňujeme ich v polovici až koncom marca vo svetlej a teplej miestnosti. Paradajky kľúčia rýchlo a nie je potrebné ich pestovať ich skôr. Člen, že v záhrade dostatočné teplo, rastliny sú dostatočne silné na to, aby vysadili. Ploché semená jednoducho rozptýte dva centimetre od seba na vlnky semenný substrát a semená len zľahka prikryte. Pestovateľský substrát udržujte vlhky, ale nie mokry, najlepšie navlhčenie pomocou rozprašovača. Kultivačný nádobu prikryte potravinovou fóliou, ktorú patrite otvoriť. To chráni pôdu pred vysychaním. Fóliu by sa mali odstrániť na 2 hodiny každé dva až tri dni. To zabráňuje tvorbe plesní na rastúcej pôde. Črepník umiestnite na svetle a teplé miesto s teplotou medzi 20° a 24° Celzia a zeminu udržujte vlhkú, ale nie mokrú. Po týždni alebo dvoch by sa mali objaviť prvé sadenice. Teraz odstráňte kryt a rastliny udržujte na čo najvyššom svetle (nie však na prudkom poludňajšom slnku) a trochu chladnejšie, aby mladé rastliny neuschli. Len čo sa vyvinie druhý pár listov, mladé rastliny možno vypichovať (jednotlivo) až po prvý list v málch 10 cm kvetináčoch s otvorením na dne a zeminou z paradajok. Dbajte na to, aby ste nepoškodili ešte jemné koreňky a čerstvú pôdu mierne zalejte. Črepník umiestnite na svetle a teplé miesto s teplotou medzi 20° a 24° Celzia a zeminu udržujte vlhkú, ale nie mokrú. Po týždni alebo dvoch by sa mali objaviť prvé sadenice. Teraz odstráňte kryt a rastliny udržujte na čo najvyššom svetle (nie však na prudkom poludňajšom slnku) a trochu chladnejšie, aby mladé rastliny neuschli. Len čo sa vyvinie druhý pár listov, mladé rastliny možno vypichovať (jednotlivo) až po prvý list v málch 10 cm kvetináčoch s otvorením na dne a zeminou z paradajok. Dbajte na to, aby ste nepoškodili ešte jemné koreňky a čerstvú pôdu mierne zalejte. Teraz odstráňte kryt a rastliny udržujte na čo najvyššom svetle (nie však na prudkom poludňajšom slnku) a trochu chladnejšie, aby mladé rastliny neuschli. Len čo sa vyvinie druhý pár listov, mladé rastliny možno vypichovať (jednotlivo) až po prvý list v málch 10 cm kvetináčoch s otvorením na dne a zeminou z paradajok. Dbajte na to, aby ste nepoškodili ešte jemné koreňky a čerstvú pôdu mierne zalejte. Teraz odstráňte kryt a rastliny udržujte na čo najvyššom svetle (nie však na prudkom poludňajšom slnku) a trochu chladnejšie, aby mladé rastliny neuschli. Len čo sa vyvinie druhý pár listov, mladé rastliny možno vypichovať (jednotlivo) až po prvý list v málch 10 cm kvetináčoch s otvorením na dne a zeminou z paradajok. Dbajte na to, aby ste nepoškodili ešte jemné koreňky a čerstvú pôdu mierne zalejte. Teraz odstráňte kryt a rastliny udržujte na čo najvyššom svetle (nie však na prudkom poludňajšom slnku) a trochu chladnejšie, aby mladé rastliny neuschli. Len čo sa vyvinie druhý pár listov, mladé rastliny možno vypichovať (jednotlivo) až po prvý list v málch 10 cm kvetináčoch s otvorením na dne a zeminou z paradajok. Dbajte na to, aby ste nepoškodili ešte jemné koreňky a čerstvú pôdu mierne zalejte. Teraz odstráňte kryt a rastliny udržujte na čo najvyššom svetle (nie však na prudkom poludňajšom slnku) a trochu chladnejšie, aby mladé rastliny neuschli. Len čo sa vyvinie druhý pár listov, mladé rastliny možno vypichovať (jednotlivo) až po prvý list v málch 10 cm kvetináčoch s otvorením na dne a zeminou z paradajok. Dbajte na to, aby ste nepoškodili ešte jemné koreňky a čerstvú pôdu mierne zalejte. Teraz odstráňte kryt a rastliny udržujte na čo najvyššom svetle (nie však na prudkom poludňajšom slnku) a trochu chladnejšie, aby mladé rastliny neuschli. Len čo sa vyvinie druhý pár listov, mladé rastliny možno vypichovať (jednotlivo) až po prvý list v málch 10 cm kvetináčoch s otvorením na dne a zeminou z paradajok. Dbajte na to, aby ste nepoškodili ešte jemné koreňky a čerstvú pôdu mierne zalejte. Teraz odstráňte kryt a rastliny udržujte na čo najvyššom svetle (nie však na prudkom poludňajšom slnku) a trochu chladnejšie, aby mladé rastliny neuschli. Len čo sa vyvinie druhý pár listov, mladé rastliny možno vypichovať (jednotlivo) až po prvý list v málch 10 cm kvetináčoch s otvorením na dne a zeminou z paradajok. Dbajte na to, aby ste nepoškodili ešte jemné koreňky a čerstvú pôdu mierne zalejte. Teraz odstráňte kryt a rastliny udržujte na čo najvyššom svetle (nie však na prudkom poludňajšom slnku) a trochu chladnejšie, aby mladé rastliny neuschli. Len čo sa vyvinie druhý pár listov, mladé rastliny možno vypichovať (jednotlivo) až po prvý list v málch 10 cm kvetináčoch s otvorením na dne a zeminou z paradajok. Dbajte na to, aby ste nepoškodili ešte jemné koreňky a čerstvú pôdu mierne zalejte. Teraz odstráňte kryt a rastliny udržujte na čo najvyššom svetle (nie však na prudkom poludňajšom slnku) a trochu chladnejšie, aby mladé rastliny neuschli. Len čo sa vyvinie druhý pár listov, mladé rastliny možno vypichovať (jednotlivo) až po prvý list v málch 10 cm kvetináčoch s otvorením na dne a zeminou z paradajok. Dbajte na to, aby ste nepoškodili ešte jemné koreňky a čerstvú pôdu mierne zalejte. Teraz odstráňte kryt a rastliny udržujte na čo najvyššom svetle (nie však na prudkom poludňajšom slnku) a trochu chladnejšie, aby mladé rastliny neuschli. Len čo sa vyvinie druhý pár listov, mladé rastliny možno vypichovať (jednotlivo) až po prvý list v málch 10 cm kvetináčoch s otvorením na dne a zeminou z paradajok. Dbajte na to, aby ste nepoškodili ešte jemné koreňky a čerstvú pôdu mierne zalejte. Teraz odstráňte kryt a rastliny udržujte na čo najvyššom svetle (nie však na prudkom poludňajšom slnku) a trochu chladnejšie, aby mladé rastliny neuschli. Len čo sa vyvinie druhý pár listov, mladé rastliny možno vypichovať (jednotlivo) až po prvý list v málch 10 cm kvetináčoch s otvorením na dne a zeminou z paradajok. Dbajte na to, aby ste nepoškodili ešte jemné koreňky a čerstvú pôdu mierne zalejte. Teraz odstráňte kryt a rastliny udržujte na čo najvyššom svetle (nie však na prudkom poludňajšom slnku) a trochu chladnejšie, aby mladé rastliny neuschli. Len čo sa vyvinie druhý pár listov, mladé rastliny možno vypichovať (jednotlivo) až po prvý list v málch 10 cm kvetináčoch s otvorením na dne a zeminou z paradajok. Dbajte na to, aby ste nepoškodili ešte jemné koreňky a čerstvú pôdu mierne zalejte. Teraz odstráňte kryt a rastliny udržujte na čo najvyššom svetle (nie však na prudkom poludňajšom slnku) a trochu chladnejšie, aby mladé rastliny neuschli. Len čo sa vyvinie druhý pár listov, mladé rastliny možno vypichovať (jednotlivo) až po prvý list v málch 10 cm kvetináčoch s otvorením na dne a zeminou z paradajok. Dbajte na to, aby ste nepoškodili ešte jemné koreňky a čerstvú pôdu mierne zalejte. Teraz odstráňte kryt a rastliny udržujte na čo najvyššom svetle (nie však na prudkom poludňajšom slnku) a trochu chladnejšie, aby mladé rastliny neuschli. Len čo sa vyvinie druhý pár listov, mladé rastliny možno vypichovať (jednotlivo) až po prvý list v málch 10 cm kvetináčoch s otvorením na dne a zeminou z paradajok. Dbajte na to, aby ste nepoškodili ešte jemné koreňky a čerstvú pôdu mierne zalejte. Teraz odstráňte kryt a rastliny udržujte na čo najvyššom svetle (nie však na prudkom poludňajšom slnku) a trochu chladnejšie, aby mladé rastliny neuschli. Len čo sa vyvinie druhý pár listov, mladé rastliny možno vypichovať (jednotlivo) až po prvý list v málch 10 cm kvetináčoch s otvorením na dne a zeminou z paradajok. Dbajte na to, aby ste nepoškodili ešte jemné koreňky a čerstvú pôdu mierne zalejte. Teraz odstráňte kryt a rastliny udržujte na čo najvyššom svetle (nie však na prudkom poludňajšom slnku) a trochu chladnejšie, aby mladé rastliny neuschli. Len čo sa vyvinie druhý pár listov, mladé rastliny možno vypichovať (jednotlivo) až po prvý list v málch 10 cm kvetináčoch s otvorením na dne a zeminou z paradajok. Dbajte na to, aby ste nepoškodili ešte jemné koreňky a čerstvú pôdu mierne zalejte. Teraz odstráňte kryt a rastliny udržujte na čo najvyššom svetle (nie však na prudkom poludňajšom slnku) a trochu chladnejšie, aby mladé rastliny neuschli. Len čo sa vyvinie druhý pár listov, mladé rastliny možno vypichovať (jednotlivo) až po prvý list v málch 10 cm kvetináčoch s otvorením na dne a zeminou z paradajok. Dbajte na to, aby ste nepoškodili ešte jemné koreňky a čerstvú pôdu mierne zalejte. Teraz odstráňte kryt a rastliny udržujte na čo najvyššom svetle (nie však na prudkom poludňajšom slnku) a trochu chladnejšie, aby mladé rastliny neuschli. Len čo sa vyvinie druhý pár listov, mladé rastliny možno vypichovať (jednotlivo) až po prvý list v málch 10 cm kvetináčoch s otvorením na dne a zeminou z paradajok. Dbajte na to, aby ste nepoškodili ešte jemné koreňky a čerstvú pôdu mierne zalejte. Teraz odstráňte kryt a rastliny udržujte na čo najvyššom svetle (nie však na prudkom poludňajšom slnku) a trochu chladnejšie, aby mladé rastliny neuschli. Len čo sa vyvinie druhý pár listov, mladé rastliny možno vypichovať (jednotlivo) až po prvý list v málch 10 cm kvetináčoch s otvorením na dne a zeminou z paradajok. Dbajte na to, aby ste nepoškodili ešte jemné koreňky a čerstvú pôdu mierne zalejte. Teraz odstráňte kryt a rastliny udržujte na čo najvyššom svetle (nie však na prudkom poludňajšom slnku) a trochu chladnejšie, aby mladé rastliny neuschli. Len čo sa vyvinie druhý pár listov, mladé rastliny možno vypichovať (jednotlivo) až po prvý list v málch 10 cm kvetináčoch s otvorením na dne a zeminou z paradajok. Dbajte na to, aby ste nepoškodili ešte jemné koreňky a čerstvú pôdu mierne zalejte. Teraz odstráňte kryt a rastliny udržujte na čo najvyššom svetle (nie však na prudkom poludňajšom slnku) a trochu chladnejšie, aby mladé rastliny neuschli. Len čo sa vyvinie druhý pár listov, mladé rastliny možno vypichovať (jednotlivo) až po prvý list v málch 10 cm kvetináčoch s otvorením na dne a zeminou z paradajok. Dbajte na to, aby ste nepoškodili ešte jemné koreňky a čerstvú pôdu mierne zalejte. Teraz odstráňte kryt a rastliny udržujte na čo najvyššom svetle (nie však na prudkom poludňajšom slnku) a trochu chladnejšie, aby mladé rastliny neuschli. Len čo sa vyvinie druhý pár listov, mladé rastliny možno vypichovať (jednotlivo) až po prvý list v málch 10 cm kvetináčoch s otvorením na dne a zeminou z paradajok. Dbajte na to, aby ste nepoškodili ešte jemné koreňky a čerstvú pôdu mierne zalejte. Teraz odstráňte kryt a rastliny udržujte na čo najvyššom svetle (nie však na prudkom poludňajšom slnku) a trochu chladnejšie, aby mladé rastliny neuschli. Len čo sa vyvinie druhý pár listov, mladé rastliny možno vypichovať (jednotlivo) až po prvý list v málch 10 cm kvetináčoch s otvorením na dne a zeminou z paradajok. Dbajte na to, aby ste nepoškodili ešte jemné koreňky a čerstvú pôdu mierne zalejte. Teraz odstráňte kryt a rastliny udržujte na čo najvyššom svetle (nie však na prudkom poludňajšom slnku) a trochu chladnejšie, aby mladé rastliny neuschli. Len čo sa vyvinie druhý pár listov, mladé rastliny možno vypichovať (jednotlivo) až po prvý list v málch 10 cm kvetináčoch s otvorením na dne a zeminou z paradajok. Dbajte na to, aby ste nepoškodili ešte jemné koreňky a čerstvú pôdu mierne zalejte. Teraz

Paradižnik - Costoluto Genovese

Lycopersicon esculentum

Dišeč in sočen - klasičen paradižnik v italijanski kuhinji!

Costoluto Genova se star italijanski, rdečeplovi, veli in sočen bičevlji paradižnik s ploščatimi, rebastimi in sočnimi plodovi, ki je še vedno na tržišču v Italiji. Njeni plodovi, odporni proti pokanju, ki tehtajo do 250 gramov, dozorijo relativno zgodaj in do oktobra. Dlje kot njihovi plodovi zorijo, bolj fin se razvije njihov aromatični okus. Zaradi intenzivnega okusa je paradižnik idealna sorta za testenine, solate in omake. **Naravnih habitat: Navodila za gojenje:** Ker naj bo paradižnik na vrtu šele od sredine maja, ko nočnih zmrazil ni več pričakovati, ga raje sredi do konca marca v svetlem in toplem prostoru. Paradižnik hitro kali in ga zato ni treba gojiti, jeli pr. Kej je na vrtu dovolj toplo, so rastline dovolj močne za sajenje. Ploščata semena preprosto raztrsete dva centimetra narazen po vlažnem semenskem substratu in semena le rahlo pokrijte. Rastocih substrat vzdrži vlažen, a ne moker, najbolje tako, da ga navlažite z razpršilom. Posodo z kulturo pokrijte s folijo za živila, ki jo opremite z luknjami. To ščiti tla pred izsušitvijo. Vsake dva do tri dni za 2 uri odstranite folijo. S tem preprečimo nastanek plesni na rastni zemlji. Lonček postavite na svetlo in toplo mesto s temperaturo med 20° in 24° Celzija, zemlja v lončku pa naj bo vlažna, vendar ne mokra. Po tednu ali dveh naj bi se pojavile prve sadike. Zdad pokrov odstranimo in rastline pustimo na čimve svetlobe (vendar ne na žgočem opoldanskem soncu) in malo hladnejšem, da mlade rastline ne ovenile. Takoj, ko se razvije drugi par listov, lahko mlade rastline pikiramo (posamično) do prvega lista v majhne 10 cm lončke z luknjami na dnu in paradižnikovo zemljo. Pazite, da ne poškodujete še vedno finih korenin in svežo zemljo rahlo zalivate. Lonček postavite na svetlo in toplo mesto s temperaturo med 20° in 24° Celzija, zemlja v lončku pa naj bo vlažna, vendar ne mokra. Po tednu ali dveh naj bi se pojavile prve sadike. Zdad pokrov odstranimo in rastline pustimo na čimve svetlobe (vendar ne na žgočem opoldanskem soncu) in malo hladnejšem, da mlade rastline ne ovenile. Takoj, ko se razvije drugi par listov, lahko mlade rastline pikiramo (posamično) do prvega lista v majhne 10 cm lončke z luknjami na dnu in paradižnikovo zemljo. Pazite, da ne poškodujete še vedno finih korenin in svežo zemljo rahlo zalivate. Zdad pokrov odstranimo in rastline pustimo na čimve svetlobe (vendar ne na žgočem opoldanskem soncu) in malo hladnejšem, da mlade rastline ne ovenile. Takoj, ko se razvije drugi par listov, lahko mlade rastline pikiramo (posamično) do prvega lista v majhne 10 cm lončke z luknjami na dnu in paradižnikovo zemljo. Pazite, da ne poškodujete še vedno finih korenin in svežo zemljo rahlo zalivate. Zdad pokrov odstranimo in rastline pustimo na čimve svetlobe (vendar ne na žgočem opoldanskem soncu) in malo hladnejšem, da mlade rastline ne ovenile. Takoj, ko se razvije drugi par listov, lahko mlade rastline pikiramo (posamično) do prvega lista v majhne 10 cm lončke z luknjami na dnu in paradižnikovo zemljo. Pazite, da ne poškodujete še vedno finih korenin in svežo zemljo rahlo zalivate. **Najboljša lokacija: Optimalna nega:** Takoj, ko vaše rastline paradižnika dosežejo višino deset centimetrov, potrebujejo palico za oporo in so lahko že dan na prostem pri vsaj 5°C, da se utrdijo. Poskrbite za zadostno zalivanje, saj hitro izhlapevanje poteka preko sedaj hitro rastočega lista. Po ledenih vstvihnihh sredih maja lahko rastline presadimo v gredico ali vedro na razdaljo 75 centimetrov na polnem soncu. Vedro naj vsebuje vsaj deset litrov zemlje in mora biti dobro ocedno. Paradižnik potrebuje močne oporne palice, dobro zasidrane v tla, ali paradižnikove spirale iz vrtnih trgovine. Idealen je tudi prostor, zaščiten pred dežjem in vetrom. Zagotovite enakomeren režim zalivanja, na katerega se lahko rastlina navadi. Odslej je najpomembnejši negovalni ukrep sprotno žganje sekundarnih pogankov, da dobi glavni poganke dovolj svetlobe za svoj razvoj. Odstranite vse aksilarne pogonjke, ki nastanejo med debelom in dnom veje. Ker se koreninski sistem na začetku močno razvija, je vidna rast v prvih nekaj tednih počasna. Gnojite najpri štiri tedne po sajenju s komercialno dostopnim gnojilom za paradižnike in štiri tedne pozneje drugi. **V zimskem času: Pozor: paradižnik spada v družino nočnih senčnikov. Deli rastline so strupeni. A seveda ne zrelega sadja!**

Tomate - Costoluto Genovese

Lycopersicon esculentum

Aromática y jugosa - ¡El tomate clásico de la cocina italiana!

Costoluto Genovese es un tomate clásico italiano, con pulpa roja, grande y jugosa, característico por su forma acostillada, que aún se comercializa en Italia. Sus frutos alcanzan hasta 250 gramos, maduran relativamente temprano y durante mucho tiempo hasta octubre. Cuanto más tiempo maduran sus frutos, más fino se desarrolla su sabor y aroma. El intenso sabor a tomate lo hace ideal para recetas de pasta, ensaladas y salsas. **Ubicación natural:** Cultivo exitoso: El tomate se debe plantar a partir de mayo cuando ya no se esperen heladas nocturnas, por lo que se empieza a cultivar de mediados a finales de marzo, en un lugar luminoso y cálido. Los tomates brotan rápido por lo que no es necesario empezar a cultivarlos antes. Cuando las temperaturas en el jardín son cálidas las plántulas estarán lo suficientemente fuertes para ser trasplantadas en el exterior. Esparra las semillas sobre sustrato húmedo, con una distancia de dos centímetros y cúbralas ligeramente con el mismo sustrato. Mantenga el sustrato húmedo pero no mojado, por lo que se recomienda rociarlo. Cubra el recipiente de cultivo con un film transparente y agujereélo. Así protegerá la tierra de la desecación. Para evitar la putrefacción del sustrato retire el film cada dos o tres días durante 2 horas. Coloque el recipiente de cultivo en un lugar luminoso y cálido entre 20 y 24 grados y mantenga el sustrato húmedo, pero no mojado. A las dos a tres semanas aparecerán las primeras plántulas. Retire la cobertura del recipiente y mantenga las plántulas en un espacio muy luminoso (pero sin sol directo al medio día) y algo más fresco, para que no amarillean las plántulas. En cuanto se desarrolle el segundo par de hojas se pueden trasplantar los plantones individualmente, en un macetero de 10 centímetros con el fondo agujereado y tierra para el cultivo de tomates. Preste atención de no dañar las raíces finas y riegue la tierra ligeramente. **La mejor ubicación:** Cuidado óptimo: Una vez que la planta de tomate haya alcanzado una altura de diez centímetros, necesitará una vara como soporte y puede permanecer en exterior durante el día con al menos 5 grados, para hacerlas más resistentes. A mediados de mayo puede trasplantar las plantas con una distancia de 75 centímetros entre sí, en un lugar soleado en el jardín, en un arriate o en maceta. El macetero debe tener una capacidad de al menos diez litros de tierra y tener drenaje. Los tomates necesitan unos soportes bien anclados en el suelo. El lugar óptimo es protegido del viento y de la lluvia. Asegúrese de que haya uniformidad en el riego, al que se puede acostumbrar la planta. La medida más importante de cuidado a partir de ahora, es el eliminar los brotes nuevos laterales para que el brote principal reciba suficiente luz para su desarrollo. Durante las primeras semanas se desarrollan las raíces, por lo que no se aprecia a penas desarrollo superficial. Elimine cualquier brote axilar que se forma entre el vástago y el enfoque rama. Dado que inicialmente el desarrollo de la planta es más fuerte en el sistema de raíces, en la parte visible el crecimiento es más lento. Sumínistrelle fertilizante para tomates como muy temprano a las cuatro semanas de trasplantar en exterior por primera vez y la segunda a otras cuatro semanas. **En el invierno:** **Advertencia: Los tomates pertenecen a las solanáceas. ¡Todas las partes de la planta son venenosas, por supuesto excepto el fruto maduro!**



Rajče - Costoluto Genovese

Lycopersicon esculentum

Aromatické a šťavnaté - klasická rajčata v italské kuchyni!

Costoluto Genovese je staré italské, červenoplodé, velké a šťavnaté rajče na biftek s plochými, žebrovanými a šťavnatými plody, které je stále na trhu v Itálii. Jeho praskavé plody, které váží až 250 gramů, dozrávají poměrně brzy a dlouho do října. Čím déle jejich plody dozrávají, tím jemnější se rozvíjí jejich aromatická chuť Intenzivní rajčatová chuť z něj dělá ideální odrůdu pro těstoviny, saláty a omáčky. **Přirozená poloha:** **Úspěšné pěstování:** Vzhledem k tomu, že rajčata by měla být na zahrádě chována až od poloviny května, kdy již nelze očekávat noční mrazíky, preferujeme je od poloviny do konce března ve světlé a teplé místnosti. Rajčata rychle klíčí a není tedy nutné je pěstovat je dříve. Když je na zahrádě dostatečné teplo, rostliny jsou dostatečně silné, aby se vysadily. Plochá semena jednoduše rozsypte dva centimetry od sebe na vlhký semenný substrát a semena jen lehce zakryjte. Pěstební substrát udržujte vlhký, ale ne mokrý, nejlépe navlhčením rozprašovačem. Kulturační nádobu zakryjte potravinářskou fólií, kterou opatříte otvory. To chrání půdu před vysycháním. Fólii byste měli odstranit na 2 hodiny každé dva až tři dny. Tím se zabrání tvorbě plísní na rostoucí půdě. Květináč postavte na světlé a teplé místo s teplotou mezi 20° a 24° Celsia a udržujte zeminu v květináči vlhkou, ale ne mokrou. Po týdnu až dvou by se měly objevit první sazenice. Nyní sejměte kryt a udržujte rostliny na co největším světle (ale ne na prudkém poledním slunci) a trochu chladněji, aby mladé rostlinky neuvadly. Jakmile se vyvine druhý pár listů, lze mladé rostlinky vypichovat (jednotlivě) až po první list v malých 10 cm květináčích s otvory na dně a zeminou z rajčat. Dbejte prosím na to, abyste nepoškodili ještě jemné kořeny a čerstvou zeminu mírně zalijte. Květináč postavte na světlé a teplé místo s teplotou mezi 20° a 24° Celsia a udržujte zeminu v květináči vlhkou, ale ne mokrou. Po týdnu až dvou by se měly objevit první sazenice. Nyní sejměte kryt a udržujte rostliny na co největším světle (ale ne na prudkém poledním slunci) a trochu chladněji, aby mladé rostlinky neuvadly. Jakmile se vyvine druhý pár listů, lze mladé rostlinky vypichovat (jednotlivě) až po první list v malých 10 cm květináčích s otvory na dně a zeminou z rajčat. Dbejte prosím na to, abyste nepoškodili ještě jemné kořeny a čerstvou zeminu mírně zalijte. Květináč postavte na světlé a teplé místo s teplotou mezi 20° a 24° Celsia a udržujte zeminu v květináči vlhkou, ale ne mokrou. Po týdnu až dvou by se měly objevit první sazenice. Nyní sejměte kryt a udržujte rostliny na co největším světle (ale ne na prudkém poledním slunci) a trochu chladněji, aby mladé rostlinky neuvadly. Jakmile se vyvine druhý pár listů, lze mladé rostlinky vypichovat (jednotlivě) až po první list v malých 10 cm květináčích s otvory na dně a zeminou z rajčat. Dbejte prosím na to, abyste nepoškodili ještě jemné kořeny a čerstvou zeminu mírně zalijte. Nyní sejměte kryt a udržujte rostliny na co největším světle (ale ne na prudkém poledním slunci) a trochu chladněji, aby mladé rostlinky neuvadly. Jakmile se vyvine druhý pár listů, lze mladé rostlinky vypichovat (jednotlivě) až po první list v malých 10 cm květináčích s otvory na dně a zeminou z rajčat. Dbejte prosím na to, abyste nepoškodili ještě jemné kořeny a čerstvou zeminu mírně zalijte. **Nejlepší umístění: Optimální péče:** Jakmile vaše rostliny rajčat dosáhnou výšky deseti centimetrů, potřebují klacek na oporu a mohou být venku přes den alespoň při 5° Celsia, aby ztvrdly. Zajistěte dostatečné zavlažování, protože díky nyní rychle rostoucím listům dochází k rychlému odpařování. Po ledových svatých v polovině května lze rostliny přesadit do zahradního záhonu nebo kbeliku ve vzdálenosti 75 centimetrů na plné slunce. Kbelík by měl pojmut alespoň deset litrů vody. Rajčata potřebují silné podpůrné tyče dobře ukořtené v zemi nebo rajčatové spirálky ze zahradnictví. Ideální je také místo chráněné před deštěm a větrem. Zajistěte rovnoměrný režim zavlažování, na který si rostlina může zvyknout. Od nynějška je nejdůležitějším opatřením péče průběžné bádání vedlejších výhonů, aby hlavní výhon dostal dostatek světla pro svůj vývoj. Odstraňte všechny nežádoucí výhonky, které se tvoří mezi kmenem a základnou větve. Protože se kořenový systém zpočátku vyvíjí bujně, viditelný růst je v prvních týdnech pomalý. Hnojte nejdříve čtyři týdny po výsadbě komerčně dostupným hnojivem na rajčata a po čtyřech týdnech podruhé. **V zímě: Pozor: Rajčata patří do čeledi hluchavkovitých. Části rostliny jsou jedovaté. Ale samozřejmě ne zralé ovoce!**



Domates - Costoluto Genovese

Lycopersicon esculentum

Aromatik ve sulu - italyan mutfağının klasik domatesi!

Costoluto Genovese, İtalya'da halen piyasada bulunan yassı, nervürlü ve sulu meyvelere sahip, eski bir İtalyan, kırmızı meyveli, iri ve sulu biftek domatesidir. 250 gram ağırlığa kadar patlamaya dayanıklı meyveleri nispeten erken ve Ekim ayına kadar olgunlaşır. Meyveleri ne kadar uzun süre olgunlaşırsa, aromatik tatları o kadar ince gelişir. Yoğun domates aroması onu makarna yemekleri, salatalar ve soslar için ideal bir çeşit haline getirir. **Doğal konum: Başarılı yetiştirme:** Domatesler bahçede ancak gece donlarının beklenmediği Mayıs ortasından itibaren muhafaza edilmesi gerektiğinden, aydınlık ve sıcak bir odada Mart ortasından sonuna kadar tercih edilir.Domatesler çabuk çimlenir ve bu nedenle ekime gerek kalmaz, onları daha erken Bahçede yeterince sıcak olduğunda, bitkiler dışarı çıkacak kadar güçlüdür. Yassı tohumları nemli bir tohum substratı üzerine iki santimetre aralya dağıtın ve tohumları hafifçe örtün. Büyüyen substratı terchen bir sprej şişesiyle nemlendirerek nemli tutun, ancak ıslak değil. Kültür kabının üzerini delikler açtığınız streç film ile kapatın. Bu, toprağın kurumasını önler. Folyoyu her iki ila üç günde bir 2 saat çikmalısınız. Bu, büyüyen toprakta küf oluşumunu önler. Saksıyı 20° ile 24° Santigrat arasında bir sıcaklığa sahip hafif ve sıcak bir yere koyun ve saksı toprağını nemli tutun ama ıslak değil. Bir veya iki hafta sonra ilk fideler görünebilir. Şimdi örtüyü kaldırın ve genç bitkilerin solmaması için bitkileri mümkün olduğu kadar çok ıskta (ancak kavrurcu ögle güneşinde değil) ve biraz daha serin tutun. İkinci yaprak çifti gelişir gelişmez, genç fidancıklar (tek tek) diplerinde delikler ve domates toprağı olan 10 cm'lik küçük saksılarda ilk yaprağı kadar dikilebilir. Lütfen hala ince köklere zarar vermediğinizden ve taze toprağı hafifçe suladığınızdan emin olun. Saksıyı 20° ile 24° Santigrat arasında bir sıcaklığa sahip hafif ve sıcak bir yere koyun ve saksı toprağını nemli tutun ama ıslak değil. Bir veya iki hafta sonra ilk fideler görünebilir. Şimdi örtüyü kaldırın ve genç bitkilerin solmaması için bitkileri mümkün olduğu kadar çok ıskta (ancak kavrurcu ögle güneşinde değil) ve biraz daha serin tutun. İkinci yaprak çifti gelişir gelişmez, genç fidancıklar (tek tek) diplerinde delikler ve domates toprağı olan 10 cm'lik küçük saksılarda ilk yaprağı kadar dikilebilir. Lütfen hala ince köklere zarar vermediğinizden ve taze toprağı hafifçe suladığınızdan emin olun. Saksıyı 20° ile 24° Santigrat arasında bir sıcaklığa sahip hafif ve sıcak bir yere koyun ve saksı toprağını nemli tutun ama ıslak değil. Bir veya iki hafta sonra ilk fideler görünebilir. Şimdi örtüyü kaldırın ve genç bitkilerin solmaması için bitkileri mümkün olduğu kadar çok ıskta (ancak kavrurcu ögle güneşinde değil) ve biraz daha serin tutun. İkinci yaprak çifti gelişir gelişmez, genç fidancıklar (tek tek) diplerinde delikler ve domates toprağı olan 10 cm'lik küçük saksılarda ilk yaprağı kadar dikilebilir. Lütfen hala ince köklere zarar vermediğinizden ve taze toprağı hafifçe suladığınızdan emin olun. Saksıyı 20° ile 24° Santigrat arasında bir sıcaklığa sahip hafif ve sıcak bir yere koyun ve saksı toprağını nemli tutun ama ıslak değil. Bir veya iki hafta sonra ilk fideler görünebilir. Şimdi örtüyü kaldırın ve genç bitkilerin solmaması için bitkileri mümkün olduğu kadar çok ıskta (ancak kavrurcu ögle güneşinde değil) ve biraz daha serin tutun. İkinci yaprak çifti gelişir gelişmez, genç fidancıklar (tek tek) diplerinde delikler ve domates toprağı olan 10 cm'lik küçük saksılarda ilk yaprağı kadar dikilebilir. Lütfen hala ince köklere zarar vermediğinizden ve taze toprağı hafifçe suladığınızdan emin olun. **En iyi konum: Optimum bakım:** Domates bitkileriniz on santimetre yüksekliğe ulaşır ulaşmaz, destek için bir çubuğa ihtiyaç duyular ve sertleşmeye 75 gün boyunca en az 5°C'de açık havada kalabilirler. Hızlı buharlaşma artık hızla artan yapılarak aracılığıyla gerçekleştiğinden, yeterli sulama sağlayın. Mayıs ortasından buz azizlerinden sonra, bitkiler tam güneşte 15 santimetre mesafedeki bahçe yatağına veya kovaya ekilebilir. Kova en az on litre toprak tutmalı ve iyi drene edilmelidir. Domatesler, zemine iyice sabitlenmiş güçlü destek çubuklarına veya bahçe deposundan domates spirallerine ihtiyaç duyar. Yağmur ve rüzgardan korunan bir yer de idealdir. Bitkinin alılabileceği eşit bir sulama rejimi sağlayın. Şu anda itibaren en önemli bakım önlemleri, alana sürgünün gelişmesi için yeterli ışıq alması için ikincil sürgünlerin sürekli batmasıdır. Gövde ile dalın tabanı arasında oluşan koltuk altı sürgünlerini çıkartın. Kök sistemi başlangıçta güçlü bir şekilde geliştikten, ilk birkaç haftada görünür büyüme yavaşlar. Dikimden dört hafta sonra en erken piyasada bulunan bir domates gübresi ile ve dört hafta sonra ikinci kez gübreleyin. **Kişin: Dikkat: Domatesler, itüzümügiller familyasına aittir. Bitkinin kısımları zehirlidir. Ama tabii ki olgun meyve değil!**



Paradicsom - Costoluto Genovese

Lycopersicon esculentum

Aromás és lédús – a klasszikus paradicsom az olasz konyhában!

A Costoluto Genovese egy régi olasz, piros gyümölcsű, nagy és lédús beefsteak paradicsom lapos, bordás és lédús gyümölcökkkel, amely még mindig forgalomban van Olaszországbn. 250 grammig terjedő repedéstálló termései viszonylag korán, októberig érnek. Minél tovább érik terméseitek, annál finomabb lesz az aromás ízük. **Természetes elhelyezkedés: Sikeres termesztés:** Mivel a paradicsomot csak május közepétől érdemes a kertben tartani, amikor már nem várható éjszakai fagy, ezért március közepén-vegén, világos és meleg helyiségben részesítjük előnyben.A paradicsom gyorsan kikel, ezért nem szükséges termeszteti óket korábban. Ha elég meleg van a kertben, a növények elég erősek ahhoz, hogy kiülessék. Egyszerűen szórja szét a lapos magokat egymástól két centiméter távolságra egy nedves vetőmag szubsztrátumra, és csak enyhén takarja be a magokat. A természetes aljzatot tartsa nedvesen, de ne nedvesen, lehetőleg szórófejes palackkal nedvesítse meg. Fedje le a tenyészedényt ragasztófóliával, amelyet lyukakkal lát el. Ez megvédi a talajt a kiszáradástól. A fóliát két-három naponta 2 órára le kell venni. Ez megakadályozza a penészképződést a növekvő talajon. Helyezze az edényt világos és meleg helyre, ahol a hőmérséklet 20 °C és 24 °C között van, és a virágföldet tartsa nedvesen, de ne nedvesen. Egy-két hét múlva meg kell jellenniük az első palántáknak. Most távolítsa el a fedelet, és tartsa a növényeket a lehető legtöbb fényben (de ne a tűző déli napon) és egy kicsit hűvösebb helyen, hogy a fiatal növények ne hervadjanak el. Amint a második levélpár kifejlődik, a fiatal palántákat (egyenként) az első levélig kis, 10 cm-es, alján lyukas cserépben és paradicsomföldben szúrhatjuk ki. Ügyeljen arra, hogy ne sértse meg a még finom gyökereket, és enyhén öntözze meg a friss talajt. Helyezze az edényt világos és meleg helyre, ahol a hőmérséklet 20 °C és 24 °C között van, és a virágföldet tartsa nedvesen, de ne nedvesen. Egy-két hét múlva meg kell jellenniük az első palántáknak. Most távolítsa el a fedelet, és tartsa a növényeket a lehető legtöbb fényben (de ne a tűző déli napon) és egy kicsit hűvösebb helyen, hogy a fiatal növények ne hervadjanak el. Amint a második levélpár kifejlődik, a fiatal palántákat (egyenként) az első levélig kis, 10 cm-es, alján lyukas cserépben és paradicsomföldben szúrhatjuk ki. Ügyeljen arra, hogy ne sértse meg a még finom gyökereket, és enyhén öntözze meg a friss talajt. Helyezze az edényt világos és meleg helyre, ahol a hőmérséklet 20 °C és 24 °C között van, és a virágföldet tartsa nedvesen, de ne nedvesen. Egy-két hét múlva meg kell jellenniük az első palántáknak. Most távolítsa el a fedelet, és tartsa a növényeket a lehető legtöbb fényben (de ne a tűző déli napon) és egy kicsit hűvösebb helyen, hogy a fiatal növények ne hervadjanak el. Amint a második levélpár kifejlődik, a fiatal palántákat (egyenként) az első levélig kis, 10 cm-es, alján lyukas cserépben és paradicsomföldben szúrhatjuk ki. Ügyeljen arra, hogy ne sértse meg a még finom gyökereket, és enyhén öntözze meg a friss talajt. Most távolítsa el a fedelet, és tartsa a növényeket a lehető legtöbb fényben (de ne a tűző déli napon) és egy kicsit hűvösebb helyen, hogy a fiatal növények ne hervadjanak el. Amint a második levélpár kifejlődik, a fiatal palántákat (egyenként) az első levélig kis, 10 cm-es, alján lyukas cserépben és paradicsomföldben szúrhatjuk ki. Ügyeljen arra, hogy ne sértse meg a még finom gyökereket, és enyhén öntözze meg a friss talajt. Most távolítsa el a fedelet, és tartsa a növényeket a lehető legtöbb fényben (de ne a tűző déli napon) és egy kicsit hűvösebb helyen, hogy a fiatal növények ne hervadjanak el. Amint a második levélpár kifejlődik, a fiatal palántákat (egyenként) az első levélig kis, 10 cm-es, alján lyukas cserépben és paradicsomföldben szúrhatjuk ki. Ügyeljen arra, hogy ne sértse meg a még finom gyökereket, és enyhén öntözze meg a friss talajt. Most távolítsa el a fedelet, és tartsa a növényeket a lehető legtöbb fényben (de ne a tűző déli napon) és egy kicsit hűvösebb helyen, hogy a fiatal növények ne hervadjanak el. Amint a második levélpár kifejlődik, a fiatal palántákat (egyenként) az első levélig kis, 10 cm-es, alján lyukas cserépben és paradicsomföldben szúrhatjuk ki. Ügyeljen arra, hogy ne sértse meg a még finom gyökereket, és enyhén öntözze meg a friss talajt. Most távolítsa el a fedelet, és tartsa a növényeket a lehető legtöbb fényben (de ne a tűző déli napon) és egy kicsit hűvösebb helyen, hogy a fiatal növények ne hervadjanak el. Amint a második levélpár kifejlődik, a fiatal palántákat (egyenként) az első levélig kis, 10 cm-es, alján lyukas cserépben és paradicsomföldben szúrhatjuk ki. Ügyeljen arra, hogy ne sértse meg a még finom gyökereket, és enyhén öntözze meg a friss talajt. Most távolítsa el a fedelet, és tartsa a növényeket a lehető legtöbb fényben (de ne a tűző déli napon) és egy kicsit hűvösebb helyen, hogy a fiatal növények ne hervadjanak el. Amint a második levélpár kifejlődik, a fiatal palántákat (egyenként) az első levélig kis, 10 cm-es, alján lyukas cserépben és paradicsomföldben szúrhatjuk ki. Ügyeljen arra, hogy ne sértse meg a még finom gyökereket, és enyhén öntözze meg a friss talajt. Most távolítsa el a fedelet, és tartsa a növényeket a lehető legtöbb fényben (de ne a tűző déli napon) és egy kicsit hűvösebb helyen, hogy a fiatal növények ne hervadjanak el. Amint a második levélpár kifejlődik, a fiatal palántákat (egyenként) az első levélig kis, 10 cm-es, alján lyukas cserépben és paradicsomföldben szúrhatjuk ki. Ügyeljen arra, hogy ne sértse meg a még finom gyökereket, és enyhén öntözze meg a friss talajt. Most távolítsa el a fedelet, és tartsa a növényeket a lehető legtöbb fényben (de ne a tűző déli napon) és egy kicsit hűvösebb helyen, hogy a fiatal növények ne hervadjanak el. Amint a második levélpár kifejlődik, a fiatal palántákat (egyenként) az első levélig kis, 10 cm-es, alján lyukas cserépben és paradicsomföldben szúrhatjuk ki. Ügyeljen arra, hogy ne sértse meg a még finom gyökereket, és enyhén öntözze meg a friss talajt. Most távolítsa el a fedelet, és tartsa a növényeket a lehető legtöbb fényben (de ne a tűző déli napon) és egy kicsit hűvösebb helyen, hogy a fiatal növények ne hervadjanak el. Amint a második levélpár kifejlődik, a fiatal palántákat (egyenként) az első levélig kis, 10 cm-es, alján lyukas cserépben és paradicsomföldben szúrhatjuk ki. Ügyeljen arra, hogy ne sértse meg a még finom gyökereket, és enyhén öntözze meg a friss talajt. Most távolítsa el a fedelet, és tartsa a növényeket a lehető legtöbb fényben (de ne a tűző déli napon) és egy kicsit hűvösebb helyen, hogy a fiatal növények ne hervadjanak el. Amint a második levélpár kifejlődik, a fiatal palántákat (egyenként) az első levélig kis, 10 cm-es, alján lyukas cserépben és paradicsomföldben szúrhatjuk ki. Ügyeljen arra, hogy ne sértse meg a még finom gyökereket, és enyhén öntözze meg a friss talajt. Most távolítsa el a fedelet, és tartsa a növényeket a lehető legtöbb fényben (de ne a tűző déli napon) és egy kicsit hűvösebb helyen, hogy a fiatal növények ne hervadjanak el. Amint a második levélpár kifejlődik, a fiatal palántákat (egyenként) az első levélig kis, 10 cm-es, alján lyukas cserépben és paradicsomföldben szúrhatjuk ki. Ügyeljen arra, hogy ne sértse meg a még finom gyökereket, és enyhén öntözze meg a friss talajt. Most távolítsa el a fedelet, és tartsa a növényeket a lehető legtöbb fényben (de ne a tűző déli napon) és egy kicsit hűvösebb helyen, hogy a fiatal növények ne hervadjanak el. Amint a második levélpár kifejlődik, a fiatal palántákat (egyenként) az első levélig kis, 10 cm-es, alján lyukas cserépben és paradicsomföldben szúrhatjuk ki. Ügyeljen arra, hogy ne sértse meg a még finom gyökereket, és enyhén öntözze meg a friss talajt. Most távolítsa el a fedelet, és tartsa a növényeket a lehető legtöbb fényben (de ne a tűző déli napon) és egy kicsit hűvösebb helyen, hogy a fiatal növények ne hervadjanak el. Amint a második levélpár kifejlődik, a fiatal palántákat (egyenként) az első levélig kis, 10 cm-es, alján lyukas cserépben és paradicsomföldben szúrhatjuk ki. Ügyeljen arra, hogy ne sértse meg a még finom gyökereket, és enyhén öntözze meg a friss talajt. Most távolítsa el a fedelet, és tartsa a növényeket a lehető legtöbb fényben (de ne a tűző déli napon) és egy kicsit hűvösebb helyen, hogy a fiatal növények ne hervadjanak el. Amint a második levélpár kifejlődik, a fiatal palántákat (egyenként) az első levélig kis, 10 cm-es, alján lyukas cserépben és paradicsomföldben szúrhatjuk ki. Ügyeljen arra, hogy ne sértse meg a még finom gyökereket, és enyhén öntözze meg a friss talajt. Most távolítsa el a fedelet, és tartsa a növényeket a lehető legtöbb fényben (de ne a tűző déli napon) és egy kicsit hűvösebb helyen, hogy a fiatal növények ne hervadjanak el. Amint a második levélpár kifejlődik, a fiatal palántákat (egyenként) az első levélig kis, 10 cm-es, alján lyukas cserépben és paradicsomföldben szúrhatjuk ki. Ügyeljen arra, hogy ne sértse meg a még finom gyökereket, és enyhén öntözze meg a friss talajt. Most távolítsa el a fedelet, és tartsa a növényeket a lehető legtöbb fényben (de ne a tűző déli napon) és egy kicsit hűvösebb helyen, hogy a fiatal növények ne hervadjanak el. Amint a második levélpár kifejlődik, a fiatal palántákat (egyenként) az első levélig kis, 10 cm-es, alján lyukas cserépben és paradicsomföldben szúrhatjuk ki. Ügyeljen arra, hogy ne sértse meg a még finom gyökereket, és enyhén öntözze meg a friss talajt. Most távolítsa el a fedelet, és tartsa a növényeket a lehető legtöbb fényben (de ne a tűző déli napon) és egy kicsit hűvösebb helyen, hogy a fiatal növények ne hervadjanak el. Amint a második levélpár kifejlődik, a fiatal palántákat (egyenként) az első levélig kis, 10 cm-es, alján lyukas cserépben és paradicsomföldben szúrhatjuk ki. Ügyeljen arra, hogy ne sértse meg a még finom gyökereket, és enyhén öntözze meg a friss talajt. Most távolítsa el a fedelet, és tartsa a növényeket a lehető legtöbb fényben (de ne a tűző déli napon) és egy kicsit hűvösebb helyen, hogy a fiatal növények ne hervadjanak el. Amint a második levélpár kifejlődik, a fiatal palántákat (egyenként) az első levélig kis, 10 cm-es, alján lyukas cserépben és paradicsomföldben szúrhatjuk ki. Ügyeljen arra, hogy ne sértse meg a még finom gyökereket, és enyhén öntözze meg a friss talajt. Most távolítsa el a fedelet, és tartsa a növényeket a lehető legtöbb fényben (de ne a tűző déli napon) és egy kicsit hűvösebb helyen, hogy a fiatal növények ne hervadjanak el. Amint a második levélpár kifejlődik, a fiatal palántákat (egyenként) az első levélig kis, 10 cm-es, alján lyukas cserépben és paradicsomföldben szúrhatjuk ki. Ügyeljen arra, hogy ne sértse meg a még finom gyökereket, és enyhén öntözze meg a friss talajt. Most távolítsa el a fedelet, és tartsa a növényeket a lehető legtöbb fényben (de ne a tűző déli napon) és egy kicsit hűvösebb helyen, hogy a fiatal növények ne hervadjanak el. Amint a második levélpár kifejlődik, a fiatal palántákat (egyenként) az első levélig kis, 10 cm-es, alján lyukas cserépben és paradicsomföldben szúrhatjuk ki. Ügyeljen arra, hogy ne sértse meg a még finom gyökereket, és enyhén öntözze meg a friss talajt. Most távolítsa el a fedelet, és tartsa a növényeket a lehető legtöbb fényben (de ne a tűző déli napon) és egy kicsit hűvösebb helyen, hogy a fiatal növények ne hervadjanak el. Amint a második levélpár kifejlődik, a fiatal palántákat (egyenként) az első levélig kis, 10 cm-es, alján lyukas cserépben és paradicsomföldben szúrhatjuk ki. Ügyeljen arra, hogy ne sértse meg a még finom gyökereket, és enyhén öntözze meg a friss talajt. Most távolítsa el a fedelet, és tartsa a növényeket a lehető legtöbb fényben (de ne a tűző déli napon) és egy kicsit hűvösebb helyen, hogy a fiatal növények ne hervadjanak el. Amint a második levélpár kifejlődik, a fiatal palántákat (egyenként) az első levélig kis, 10 cm-es, alján lyukas cserépben és paradicsomföldben szúrhatjuk ki. Ügyeljen arra, hogy ne sértse meg a még finom gyökereket, és enyhén öntözze meg a friss talajt. Most távolítsa el a fedelet, és tartsa a növényeket a lehető legtöbb fényben (de ne a tűző déli napon) és egy kicsit hűvösebb helyen, hogy a fiatal növények ne hervadjanak el. Amint a második levélpár kifejlődik, a fiatal palántákat (egyenként) az első levélig kis, 10 cm-es, alján lyukas cserépben és paradicsomföldben szúrhatjuk ki. Ügyeljen arra, hogy ne sértse meg a még finom gyökereket, és enyhén öntözze meg a friss talajt. Most távolítsa el a fedelet, és tartsa a növényeket a lehető legtöbb fényben (de ne a tűző déli napon) és egy kicsit hűvösebb helyen, hogy a fiatal növények ne hervadjanak el. Amint a második levélpár kifejlődik, a fiatal palántákat (egyenként) az első levélig kis, 10 cm-es, alján lyukas cserépben és paradicsomföldben szúrhatjuk ki. Ügyeljen arra, hogy ne sértse meg a még finom gyökereket, és enyhén öntözze meg a friss talajt. Most távolítsa el a fedelet, és tartsa a növényeket a lehető legtöbb fényben (de ne a tűző déli napon) és egy kicsit hűvösebb helyen, hogy a fiatal növények ne hervadjanak el. Amint a második levélpár kifejlődik, a fiatal palántákat (egyenként) az első levélig kis, 10 cm-es, alján lyukas cserépben és paradicsomföldben szúrhatjuk ki. Ügyeljen arra, hogy ne sértse meg a még finom gyökereket, és enyhén öntözze meg a friss talajt. Most távolítsa el a fedelet, és tartsa a növényeket a lehető legtöbb fényben (de ne a tűző déli napon) és egy kicsit hűvösebb helyen, hogy a fiatal növények ne hervadjanak el. Amint a második levélpár kifejlődik, a fiatal palántákat (egyenként) az első levélig kis, 10 cm-es, alján lyukas cserépben és paradicsomföldben szúrhatjuk ki. Ügyeljen arra, hogy ne sértse meg a még finom gyökereket, és enyhén öntözze meg a friss talajt. Most távolítsa el a fedelet, és tartsa a növényeket a lehető legtöbb fényben (de ne a tűző déli napon) és egy kicsit hűvösebb helyen, hogy a fiatal növények ne hervadjanak el. Amint a második levélpár kifejlődik, a fiatal palántákat (egyenként) az első levélig kis, 10 cm-es, alján lyukas cserépben és paradicsomföldben szúrhatjuk ki. Ügyeljen arra, hogy ne sértse meg a még finom gyökereket, és enyhén öntözze meg a friss talajt. Most távolítsa el a fedelet, és tartsa a növényeket a lehető legtöbb fényben (de ne a tűző déli napon) és egy kicsit hűvösebb helyen, hogy a fiatal növények ne hervadjanak el. Amint a második levélpár kifejlődik, a fiatal palántákat (egyenként) az első levélig kis, 10 cm-es, alján lyukas cserépben és paradicsomföldben szúrhatjuk ki. Ügyeljen arra, hogy ne sértse meg a még finom gyökereket, és enyhén öntözze meg a friss talajt. Most távolítsa el a fedelet, és tartsa a növényeket a lehető legtöbb fényben (de ne a tűző déli napon) és egy kicsit hűvösebb helyen, hogy a fiatal növények ne hervadjanak el. Amint a második levélpár kifejlődik, a fiatal palántákat (egyenként) az első levélig kis, 10 cm-es, alján lyukas cserépben és paradicsomföldben szúrhatjuk ki. Ügyeljen arra, hogy ne sértse meg a még finom gyökereket, és enyhén öntözze meg a friss talajt. Most távolítsa el a fedelet, és tartsa a növényeket a lehető legtöbb fényben (de ne a tűző déli napon) és egy kicsit hűvösebb helyen, hogy a fiatal növények ne hervadjanak el. Amint a második levélpár kifejlődik, a fiatal palántákat (egyenként) az első levélig kis, 10 cm-es, alján lyukas cserépben és paradicsomföldben szúrhatjuk ki. Ügyeljen arra, hogy ne sértse meg a még finom gyökereket, és enyhén öntözze meg a friss talajt. Most távolítsa el a fedelet, és tartsa a növényeket a lehető legtöbb fényben (de ne a tűző déli napon) és egy kicsit hűvösebb helyen, hogy a fiatal növények ne hervadjanak el. Amint a második levélpár kifejlődik, a fiatal palántákat (egyenként) az első levélig kis, 10 cm-es, alján lyukas cserépben és paradicsomföldben szúrhatjuk ki. Ügyeljen arra, hogy ne sértse meg a még finom gyökereket, és enyhén öntözze meg a friss talajt. Most távolítsa el a fedelet, és tartsa a növényeket a lehető legtöbb fényben (de ne a tűző déli napon) és egy kicsit hűvösebb helyen, hogy a fiatal növények ne hervadjanak el. Amint a második levélpár kifejlődik, a fiatal palántákat (egyenként) az első levélig kis, 10 cm-es, alján lyukas cserépben és paradicsomföldben szúrhatjuk ki. Ügyeljen arra, hogy ne sértse meg a még finom gyökereket, és enyhén öntözze meg a friss talajt. Most távolítsa el a fedelet, és tartsa a növényeket a lehető legtöbb fényben (de ne a tűző déli napon) és egy kicsit hűvösebb helyen, hogy a fiatal növények ne hervadjanak el. Amint a második levélpár kifejlődik, a fiatal palántákat (egyenként) az első levélig kis, 10 cm-es, alján lyukas cserépben és paradicsomföldben szúrhatjuk ki. Ügyeljen arra, hogy ne sértse meg a még finom gyökereket, és enyhén öntözze meg a friss talajt. Most távolítsa el a fedelet, és tartsa a növényeket a lehető legtöbb fényben (de ne a tűző déli napon) és egy kicsit hűvösebb helyen, hogy a fiatal növények ne hervadjanak el. Amint a második levélpár kifejlődik, a fiatal palántákat (egyenként) az első levélig kis, 10 cm-es, alján lyukas cserépben és paradicsomföldben szúrhatjuk ki. Ügyeljen arra, hogy ne sértse meg a még finom gyökereket, és enyhén öntözze meg a friss talajt. Most távolítsa el a fedelet, és tartsa a növényeket a lehető legtöbb fényben (de ne a tűző déli napon) és egy kicsit hűvösebb helyen, hogy a fiatal növények ne hervadjanak el. Amint a második levélpár kifejlődik, a fiatal palántákat (egyenként) az első levélig kis, 10 cm-es, alján lyukas cserépben és paradicsomföldben szúrhatjuk ki. Ügyeljen arra, hogy ne sértse meg a még finom gyökereket, és enyhén öntözze meg a friss talajt. Most távolítsa el a fedelet, és tartsa a növényeket a lehető legtöbb fényben (de ne a tűző déli napon) és egy kicsit hűvösebb helyen, hogy a fiatal növények ne hervadjanak el. Amint a második levélpár kifejlődik, a fiatal palántákat (egyenként) az első levélig kis, 10 cm-es, alján lyukas cserépben és paradicsomföldben szúrhatjuk ki. Ügyeljen arra, hogy ne sértse meg a még finom gyökereket, és enyhén öntözze meg a friss talajt. Most távolítsa el a fedelet, és tartsa a növényeket a lehető legtöbb fényben (de ne a tűző déli napon) és egy kicsit hűvösebb helyen, hogy a fiatal növények ne hervadjanak el. Amint a második levélpár kifejlődik, a fiatal palántákat (egyenként) az első levélig kis, 10 cm-es, alján lyukas cserépben és paradicsomföldben szúrhatjuk ki. Ügyeljen arra, hogy ne sértse meg a még finom gyökereket, és enyhén öntözze meg a friss talajt. Most távolítsa el a fedelet, és tartsa a növényeket a lehető legtöbb fényben (de ne a tűző déli napon) és egy kicsit hűvösebb helyen, hogy a fiatal növények ne hervadjanak el. Amint a második levélpár kifejlődik, a fiatal palántákat (egyenként) az első levélig kis, 10 cm-es, alján lyukas cserépben és paradicsomföldben szúrhatjuk ki. Ügyeljen arra, hogy ne sértse meg a még finom gyökereket, és enyhén öntözze meg a friss talajt. Most távolítsa el a fedelet, és tartsa a növényeket a lehető legtöbb fényben (de ne a tűző déli napon) és egy kicsit hűvösebb helyen, hogy a fiatal növények ne hervadjanak el. Amint a második levélpár kifejlődik, a fiatal palántákat (egyenként) az első levélig kis, 10 cm-es, alján lyukas cserépben és paradicsomföldben szúrhatjuk ki. Ügyeljen arra, hogy ne sértse meg a még finom gyökereket, és enyhén öntözze meg a friss talajt. Most távolítsa el a fedelet, és tartsa a növényeket a lehető legtöbb fényben (de ne a tűző déli napon) és egy kicsit hűvösebb helyen, hogy a fiatal növények ne hervadjanak el. Amint a második levélpár kifejlődik, a fiatal palántákat (egyenként) az első levélig kis, 10 cm-es, alján lyukas cserépben és paradicsomföldben szúrhatjuk ki. Ügyeljen arra, hogy ne sértse meg a még finom gyökereket, és enyhén öntözze meg a friss talajt. Most távolítsa el a fedelet, és tartsa a növényeket a lehető legtöbb fényben (de ne a tűző déli napon) és egy kicsit hűvösebb helyen, hogy a fiatal növények ne hervadjanak el. Amint a második levélpár kifejlődik, a fiatal palántákat (egyenként) az első levélig kis, 10 cm-es, alján lyukas cserépben és paradicsomföldben szúrhatjuk ki. Ügyeljen arra, hogy ne sértse meg a még finom gyökereket, és enyhén öntözze meg a friss talajt. Most távolítsa el a fedelet, és tartsa a növényeket a lehető legtöbb fényben (de ne a tűző déli napon) és egy kicsit hűvösebb helyen, hogy a fiatal növények ne hervadjanak el. Amint a második levélpár kifejlődik, a fiatal palántákat (egyenként) az első levélig kis, 10 cm-es, alján lyukas cserépben és paradicsomföldben szúrhatjuk ki. Ügyeljen arra, hogy ne sértse meg a még finom gyökereket, és enyhén öntözze meg a friss talajt. Most távolítsa el a fedelet, és tartsa a növényeket a lehető legtöbb fényben (de ne a tűző déli napon) és egy kicsit hűvösebb helyen, hogy a fiatal növények ne hervadjanak el. Amint a második levélpár kifejlődik, a fiatal palántákat (egyenként) az első levélig kis, 10 cm-es, alján lyukas cserépben és paradicsomföldben szúrhatjuk ki. Ügyeljen arra, hogy ne sértse meg a még finom gyökereket, és enyhén öntözze meg a friss talajt. Most távolítsa el a fedelet, és tartsa a növényeket a lehető legtöbb fényben (de ne a tűző déli napon) és egy kicsit hűvösebb helyen, hogy a fiatal növények ne hervadjanak el. Amint a második levélpár kifejlődik, a fiatal palántákat (egyenként) az első levélig kis, 10 cm-es, alján lyukas cserépben és paradicsomföldben szúrhatjuk ki. Ügyeljen arra, hogy ne sértse meg a még finom gyökereket, és enyhén öntözze meg a friss talajt. Most távolítsa el a fedelet, és tartsa a növényeket a lehető legtöbb fényben (de ne a tűző déli napon) és egy kicsit hűvösebb helyen, hogy a fiatal növények ne hervadjanak el. Amint a második levélpár kifejlődik, a fiatal palántákat (egyenként) az első levélig kis, 10 cm-es, alján lyukas cserépben és paradicsomföldben szúrhatjuk ki. Ügyeljen arra, hogy ne sértse meg a még finom gyökereket, és enyhén öntözze meg a friss talajt. Most távolítsa el a fedelet, és tartsa a növényeket a lehető legtöbb fényben (de ne a tűző déli napon) és egy kicsit hűvösebb helyen, hogy a fiatal növények ne hervadjanak el. Amint a második levélpár kifejlődik, a fiatal palántákat (egyenként) az első levélig kis, 10 cm-es, alján lyukas cserépben és paradicsomföldben szúrhatjuk ki. Ügyeljen arra, hogy ne sértse meg a még finom gyökereket, és enyhén öntözze meg a friss talajt. Most távolítsa el a fedelet, és tartsa a növényeket a lehető legtöbb fényben (de ne a tűző déli napon) és egy kicsit hűvösebb helyen, hogy a fiatal növények ne hervadjanak el. Amint a második levélpár kifejlődik, a fiatal palántákat (egyenként) az első levélig kis, 10 cm-es, alján lyukas cserépben és paradicsomföldben szúrhatjuk ki. Ügyeljen arra, hogy ne sértse meg a még finom gyökereket, és enyhén öntözze meg a friss talajt. Most távolítsa el a fedelet, és tartsa a növényeket a lehető legtöbb fényben (de ne a tűző déli napon) és egy kicsit hűvösebb helyen, hogy a fiatal növények ne hervadjanak el. Amint a második levélpár kifejlődik, a fiatal palántákat (egyenként) az első levélig kis, 10 cm-es, alján lyukas cserépben és paradicsomföldben szúrhatjuk ki. Ügyeljen arra, hogy ne sértse meg a még finom gyökereket, és enyhén öntözze meg a friss talajt. Most távolítsa el a fedelet, és tartsa a növényeket a lehető legtöbb fényben (de ne a tűző déli napon) és egy kicsit hűvösebb helyen, hogy a fiatal növények ne hervadjanak el. Amint a második levélpár kifejlődik, a fiatal palántákat (egyenként) az első levélig kis, 10 cm-es, alján lyukas cserépben és paradicsomföldben szúrhatjuk ki. Ügyeljen arra, hogy ne sértse meg a még finom gyökereket, és enyhén öntözze meg a friss talajt. Most távolítsa el a fedelet, és tartsa a növényeket a lehető legtöbb fényben (de ne a tűző déli napon) és egy kicsit hűvösebb helyen, hogy a fiatal növények ne hervadjanak el. Amint a második levélpár kifejlődik, a fiatal palántákat (egyenként) az első levélig kis, 10 cm-es, alján lyukas cserépben és paradicsomföldben szúrhatjuk ki. Ügyeljen arra, hogy ne sértse meg a még finom gyökereket, és enyhén öntözze meg a friss talajt. Most távolítsa el a fedelet, és tartsa a növényeket a lehető legtöbb fényben (de ne a tűző déli napon) és egy kicsit hűvösebb helyen, hogy a fiatal növények ne hervadjanak el. Amint a második levélpár kifejl



コストルート・ジェノベーゼ

Lycopersicon esculentum

香りがよくジューシー - イタリアンキッチンクラシックなトマト

コストルート・ジェノベーゼは果肉が多くジューシーで大きく平でうねのあるトマトで、イタリアでは現在でも人気があります。丈夫な実は最大で250gの重さがあり、成長が速く10月中旬まで実をつけます。実の熟成期間が長いほど香りと味がよくなります。

濃厚な味のコストルート・ジェノベーゼは、パスタ、サラダ、ソースに最適です。

自然な場所:

栽培成功:

霜が降りなくなった5月中旬に定植するべきで、3月中旬または下旬には明るく暖かい屋内で栽培を開始するのがよいでしょう。かなり早く発芽するので、これ以前に栽培を開始する必要はありません。屋外の気温が十分に高くなったら植え付けの準備が整います。種を約2cm間隔で湿った栽培用土に広げ、少量の用土を被せ水をスプレーして土壌を湿らせます。サランラップなどの透明フィルムで鉢をカバーします。透明フィルムには空気穴をいくつかあけ、2~3日に1回は約2時間、完全にフィルムを鉢から外します。そうすることで、カビの発生を防ぎます。20°C~24°Cの明るく暖かい場所に置き、用土は湿った状態に保ちます。通常は約1~2週間後に発芽します。ここで透明フィルムを取外して、涼しくできるだけ明るい場所に保管します。しかし日中の強い陽射し避けてください。第二の対の葉が形成されたら、10cmの大きさの底に水はけ用の穴のある鉢に植え替えます。根は繊細なので丁寧に扱い、新しい土壌に適度な水分を与える事を忘れないで下さい。

最高のロケーション:

最適なケア:

苗が10cmの大きさになったら、安定のために木製の支柱を用意します。そして最低でも5°Cの屋外に苗を保管して順応させます。寒の戻りの後の5月中旬には苗を75cm間隔で庭や大きな鉢に植え、日当たりの良い場所で保管することができます。鉢には10リットルの水はけのよい土壌が必要です。トマトの苗にはガーデンセンターなどで販売している、しっかりとした支柱が必要です。栽培には雨に当たらない防風された場所が理想的です。水を定期的に均等に与えることにより、その水の量に適應するようになります。この時点での大切な手入れはサイドシュート、特に茎と枝の基部の定期的な剪定です。それにより、苗が十分な光を得ることができ強く成長します。トマトは最初に根を強く発達させるので、苗の地上部分の成長は最初の数週間は遅くなります。トマトの苗には定植して4週間目以降から標準的な肥料を与えることができます、二回目の施肥はそのまた4週間後に行ってください。

冬に:

注意: トマトはナイトシェードに属し 植物の一部は有毒です。果実は安全です。

SKU: 13404 / Tomate - Costoluto Genovese