

BOPON

BOPON

BOPON

BOPON

BOPON

Sposób użycia:

1.  odmierzyć zalecaną dawkę
2.  równomiernie rozprowadzić nawóz wokół rośliny (jedną garść to ok. 50 g nawozu)
3.  wymieszać granulat z górną warstwą ziemi
4.  podleć roślinę, aby od razu uaktywnić substancje zawarte w nawozie

 = 50 g

1kg

wystarczy
do 50 m² lub
60 roślin

BOPON nawóz do borówek

Specjalistyczny nawóz granulowany przeznaczony do nawożenia borówek. Zawiera odpowiednio zbilansowane składniki niezbędne do utrzymania optymalnej kwasowości podłoża. Jego systematyczne stosowanie zapewnia idealne warunki rozwoju roślin. Zawartość potasu gwarantuje obfite owocowanie.

Roślina	Termin	Dawka [g/m ²]
borówki	3 razy w sezonie; w II połowie marca, na przełomie kwietnia i maja i w czerwcu	20 - 30

Wielkość dawki dostosować do wieku krzewów: mniejsza dawka dla młodszych roślin, większa dla roślin wieloletnich. Stosować wyłącznie w uzasadnionej potrzebie. Nie przekraczać dawki.

Zalecane terminy stosowania:

I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII

nawóz do BORÓWEK

Producent:
BROS sp. z o.o.
ul. Karpiła 24, 61-619 Poznań
tel. 61 826 25 12
e-mail: biuro@bros.pl
www.bopon.pl

Zawartość netto:

1 kg



nawóz do BORÓWEK

- ZDROWE I SMACZNE OWOCE
- UTRZYMUJE KWAŚNY ODCZYN GŁĘBY

1kg

wystarczy
do 50 m² lub
60 roślin



WIELOSKŁADNIKOWY STAŁY NIEORGANICZNY NAWÓZ MAKROSKŁADNIKOWY

Zawartość składników pokarmowych (m/m): 9,3 % azot (N) całkowity w formie amonowej, 5,5 % pięciotlenek fosforu (P₂O₅) całkowity (≈2,4 % P), 4,5 % pięciotlenek fosforu (P₂O₅) rozpuszczalny w wodzie (≈2,0 % P), 5,0 % pięciotlenek fosforu (P₂O₅) rozpuszczalny w obojętnym roztworze cytrynianu amonu (≈2,2 % P), 5,3 % tlenek potasu (K₂O) rozpuszczalny w wodzie (≈7,7 % K), 3,0 % tlenek magnezu (MgO) całkowity (≈1,8 % Mg).

Mikroskładniki (m/m): 0,03 % bor (B) całkowity, w postaci soli sodowej¹, 0,12 % miedź (Cu) całkowita, w postaci siarczanu², 0,18 % żelazo (Fe) całkowite, w postaci siarczanu², 0,18 % mangan (Mn) całkowity, w postaci siarczanu², 0,03 % cynk (Zn) całkowity, w postaci siarczanu².

¹zawarte w nawozie w/w mikroelementy są częściowo, w zmiennej ilości, rozpuszczalne w wodzie.

Granulometria: Granule. Przesiew przez sito o rozmiarze oczek 5 mm: co najmniej 95 % (m/m). Granule. Przesiew przez sito o rozmiarze oczek 2 mm: nie więcej niż 10 % (m/m).

Wykaz składników powyżej 5 % (w przeliczeniu na suchą masę): siarczan amonu (CAS 7783-20-2), superfosfat prosty pylisty (CAS 8011-76-5), siarczan potasu (CAS 7778-80-5), magnez² Gdzie.

²-CMC 1 produkty uboczne w rozmieleniu dyrektywy 2008/98/WE

³-CMC 1 pierwotne surowce i mieszaniny.

Środki ostrożności i przechowywanie:

Niebezpieczeństwo H318 Powoduje poważne uszkodzenie oczu. H412 Działa szkodliwie na organizmy wodne, powodując długotrwałe skutki. P102 Chronić przed dziećmi. P280 Stosować rękawice ochronne / ochronę oczu. P305 + P351 + P338 W PRZYPADKU DOSTANIA SIĘ DO OCZU: Ostrożnie płukać wodą przez kilka minut. Wyjąć soczewki kontaktowe, jeżeli są i można je łatwo usunąć.

Nadzielić płukać. P310 Natychmiast skontaktować się z OŚRODKIEM ZATOK lub lekarzem. Zawiesić superfosfat. W razie przypadkowego spożycia skontaktować się z lekarzem. Przechowywać z dala od żywności, w szczelnie zamkniętym opakowaniu, w temperaturze 5°C - 30°C. Postępowanie z odpadami: przestrzegać aktualnie obowiązujących przepisów.

UFI: 3PTE-3046-000J-NNRS



Data ważności i nr serii na opakowaniu.