

Jak stosować Multirose 2w1?

- 1 Środka nie stosować przy dużym nasłonecznieniu.
- 2 Przed zastosowaniem środka na uprawianych po raz pierwszy odmianach lub przed zabiegiem na większej lub szczególnie cennej kolekcji roślin ozdobnych należy wykonać na każdej uprawianej odmianie /każdym gatunku próbny zabieg w celu sprawdzenia czy nie wystąpiły uszkodzenia roślin.
- 3 Nie stosować środka na młodych sadzonkach i roślinach świeżo przesadzonych.
- 4 Po użyciu środka mogą pozostawać przebarwienia na roślinie.
- 5 **Nie stosować środka do ochrony paproci, w tym Adiantum.**
- 6 W celu ochrony pszczół i innych owadów zapylających nie stosować na rośliny uprawne w czasie kwitnienia. **Nie używać w miejscach, gdzie pszczoły mają pożytek.** Nie stosować, kiedy występują kwitnące chwasty.

✳ Róża (uprawa w gruncie)

✗ mszyce, mączniak prawdziwy róży, rdza róży, czarna plamistość róży

Maksymalna dawka dla jednorazowego zastosowania: **15 ml/10 m²**

Zalecana dawka dla jednorazowego zastosowania: **7,5-15 ml/10 m²**

Termin stosowania: po zauważeniu szkodnika lub pierwszych objawów chorób

Maksymalna ilość zabiegów w sezonie wegetacyjnym: 2

Odstęp między zabiegami: 10-14 dni

Zalecana ilość wody: 0,75-1,5 l/10 m²

✳ Róża (uprawa pod osłonami)

✗ mszyce, mączniak prawdziwy róży

Maksymalna dawka dla jednorazowego zastosowania: **15 ml/10 m²**

Zalecana dawka dla jednorazowego zastosowania: **7,5-15 ml/10 m²**

Termin stosowania: po zauważeniu szkodnika lub pierwszych objawów występowania chorób

Maksymalna ilość zabiegów w sezonie wegetacyjnym: 2

Odstęp między zabiegami: 10-14 dni

Zalecana ilość wody: 0,75-1,5 l/10 m²

 Rośliny ozdobne (uprawa w gruncie)

✗ mszyce, mączniaki prawdziwe, plamistości liści

Maksymalna dawka dla jednorazowego zastosowania: **15 ml/10 m²**

Zalecana dawka dla jednorazowego zastosowania: **7,5-15 ml/10 m²**

Termin stosowania: po zauważeniu szkodnika lub pierwszych objawów występowania chorób

Maksymalna ilość zabiegów w sezonie wegetacyjnym: 2

Odstęp między zabiegami: 10-14 dni

Zalecana ilość wody: 0,75-1,5 l/10 m²

 Rośliny ozdobne (uprawa pod osłonami)

✗ mszyce, mączniaki prawdziwe

Maksymalna dawka dla jednorazowego zastosowania: **15 ml/10 m²**

Zalecana dawka dla jednorazowego zastosowania: **7,5-15 ml/10 m²**

Termin stosowania: po zauważeniu szkodnika lub pierwszych objawów występowania chorób

Maksymalna ilość zabiegów w sezonie wegetacyjnym: 2

Odstęp między zabiegami: 10-14 dni

Zalecana ilość wody: 0,75-1,5 l/10 m²

 **Ilość środka i wydatek cieczy dostosować do wysokości roślin:**

rośliny do 50 cm – dawka środka 7,5 ml/10 m² w 0,75 l wody

rośliny od 50 cm do 125 cm – dawka środka 11,3 ml/10 m² w 1,13 l wody

rośliny powyżej 125 cm – dawka środka 15,0 ml/10 m² w 1,5 l wody