

BOPON

BOPON

BOPON

BOPON

BOPON

BOPON nawóz do iglaków przeciw brązowieniu igieł

Najczęstszą przyczyną brązowienia drzew i krzewów iglastych jest niedobór składników pokarmowych w podłożu. Niedoborom tym można w łatwy sposób zapobiegać stosując nawóz BOPON do iglaków przeciw brązowieniu igieł. Specjalnie dobrane proporcje magnezu i siarki w pełni pokrywają zapotrzebowanie roślin na te pierwiastki, eliminując przyczynę brązowienia igieł. Dodatkowo nawóz zakwasza fizjologicznie glebę, co korzystnie wpływa na iglaki. Rośliny stają się znowu zielone i zdrowe. Najlepszym momentem na rozpoczęcie nawożenia jest pojawienie się pierwszych objawów brązowienia igieł lub potrzeba zakwaszenia gleby. UWAGA: Brunatnienie igieł może być również spowodowane chorobami grzybowymi oraz przez szkodniki, którym nie przeciwdziała żaden nawóz. W takich przypadkach konieczne jest zastosowanie środków ochrony roślin.

Zalecana dawka nawozu zależy od wielkości rośliny i sposobu nawożenia.

POSYPYWANIE

Wielkość rośliny	Termin	Dawka [g/m ²]
do 1 m		25
1 - 2 m	Od wczesnej wiosny do późnej jesieni, stosować 3 - 4 razy w sezonie, nie częściej niż co 2 tygodnie.	50
2 - 5 m		100
> 5 m		150

OPRYSK

Przygotowanie roztworu	Termin	Dawka [ml/m wysokości rośliny]
500 g nawozu rozpuścić w 10 l wody	Od wczesnej wiosny do późnej jesieni, stosować 3 - 4 razy w sezonie, nie częściej niż co 2 tygodnie. Oprysk najlepiej wykonać rano lub wieczorem.	50 - 100

Nie należy przekraczać zalecanych dawek nawozu.

Zalecane terminy stosowania:

I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII

Sposób użycia: Posypywanie:

-  odmierzyć zalecaną dawkę
-  równomiernie rozprószyć nawóz wokół rośliny
-  wymieszać nawóz z górną warstwą ziemi
-  podlać roślinę, aby od razu uaktywnić substancje zawarte w nawozie

Oprysk – patrz tabela.

 = 50 g

nawóz do IGLAKÓW PRZECIW BRĄZOWIENIU IGIEŁ

Producent:
BROS sp. z o.o.
ul. Karpią 24, 61-619 Poznań
tel. 61 826 25 12
e-mail: biuro@bros.pl
www.bopon.pl

Zawartość netto:

1 kg

KJ6056



5 904517 048706 >

1kg wystarczy do 40 m²

nawóz do IGLAKÓW PRZECIW BRĄZOWIENIU IGIEŁ

- ELIMINUJE WSZYSTKIE OBJAWY NIEDOBÓRU MAGNEZU
- ZAPEWNIĄ ZDROWY WYGLĄD

1kg wystarczy do 40 m²



WIEŁOSKŁADNIKOWY STAŁY NIEORGANICZNY NAWÓZ MAKROSKŁADNIKOWY

Zawartość składników pokarmowych (m/m): tlenek magnezu (MgO) 16 % rozpuszczalny w wodzie (=9,6 % Mg), trójtlenek siarki (SO₃) 31 % rozpuszczalny w wodzie (=12,4 % S).

Granulometria: Mieszanka proszku i bryłek. 70 % produktu przechodzi przez sito o rozmiarze oczek 1 mm a pozostałe 30 % przechodzi przez sito o rozmiarze oczek 2 mm. Nawóz może przejściowo aglomerować się w przechowywaniu. Jest to jednak proces odwracalny i wystarczy rozkruszenie go ręką.

Wykaz składników powyżej 5 % (w przeliczeniu na suchą masę): siarczan magnezu¹ (CAS: 10034-99-8), Gdzie¹ – CMC 1 pierwotne surowce i mieszaniny.

Środki ostrożności i przechowywanie: W razie przypadkowego spożycia skonsultować się z lekarzem; w przypadku dostania się nawozu do oczu przemyć je dużą ilością czystej wody; w razie przypadkowego rozsypania nawóz zbierać na sucho, a następnie zabrudzoną powierzchnię splukać wodą. Przechowywać z dala od żywności, w miejscach niedostępnych dla dzieci, w temperaturze 0°C - 30°C. Postępowanie z odpadami: przestrzegać aktualnie obowiązujących przepisów.



Data ważności i nr serii na opakowaniu.