



BROS NATURALNIE Preparat na pędraki, nicienie, opuchlaki Mikrobiologiczny preparat higienizujący środowisko glebowe, stwarzający niekorzystne warunki dla bytowania i żerowania szkodników glebowych, takich jak pędraki, opuchlaki, drutowce i nicienie. Zawarte w preparacie pożyteczne mikroorganizmy szybko zasiedlają strefę korzeniową roślin i wytwarzają tam m.in. kwasy organiczne i enzymy, które sprawiają, że okoliczne środowisko staje się nieatrakcyjne dla szkodników. W rezultacie stosowanie preparatu ogranicza ilość uszkodzonych roślin i ubytków w trawniku. Dodatkowo produkt przyczynia się do zwiększenia odporności roślin na stres biotyczny, spowodowany żerowaniem larw szkodników na korzeniach roślin. Działanie preparatu pozytywnie wpływa na kondycję roślin i znacząco poprawia wygląd trawników. Preparat nie zawiera substancji chemicznych, nie wywołuje negatywnych skutków dla opryskiwanych roślin i nie wymaga okresu karencji.

Sposób użycia: Preparat przeznaczony do upraw ogrodniczych, obejmujących trawniki, rośliny ozdobne, zioła, warzywa i owoce, w tym te pod osłonami. Aplikowany metodą oprysku.

- Rekomendowana dawka - 50g/100 m².
- Maksymalna dawka w sezonie wegetacyjnym - 100g/100 m².
- Preparat można stosować jednorazowo w dawce 100g/100 m² lub stosować metodą dawek dzielonych - 50g/100m² wiosną oraz 50g/100 m² jesienią.
- Do przygotowania cieczy roboczej należy użyć wody o temperaturze 10 - 30 °C.
- Oprysk zaleca się wykonać na wilgotną glebę w godzinach wieczornych lub w pochmurny dzień.
- Preparat zaleca się wymieszać z glebą bezpośrednio po zastosowaniu, wykonując jesienne i / lub wiosenne zabiegi agrotechniczne.
- W przypadku braku możliwości wykonania powyższych zabiegów, należy użyć większej ilości wody, tak by wprowadzić preparat w głąb warstwy ornej gleby lub aplikować preparat przed spodziewanymi opadami deszczu.
- Preparat można stosować za pomocą systemów nawadniających.
- W uprawach warzyw, owoców oraz roślin ozdobnych można stosować preparat przed ich wysadzeniem do gruntu, mocząc sadzonki w roztworze roboczym.
- Roztwór cieczy roboczej powinien zostać zużyty w ciągu 3h od przygotowania.
- Unikać bezpośredniego działania promieni słonecznych.
- Warunkiem skuteczności działania jest prawidłowe wprowadzenie preparatu do gleby.

Zastosowanie	Termin stosowania	Dawkowanie
wprowadzanie do gleby podczas zabiegów uprawnych	jesienią i / lub wiosną	50 - 100 g/8 - 10 l wody/100 m ² (1 ar)
warzywa i owoce	zaprawianie korzeni sadzonek przed sadzeniem	20 - 30 g/5 l wody/50 szt.
	oprysk w okresie wegetacji	50 - 100 g/50 - 100 l wody/100 m ² (1 ar)
rośliny ozdobne trawniki, krzewy, zioła	zaprawianie korzeni przed zasadzeniem	20 - 25 g/5 l wody /100 m ² (10 kg)
	oprysk gleby przed sadzeniem	50 - 100 g/ 30 - 50 l wody/ 100 m ² (1 ar)
	oprysk w okresie wegetacji	50 - 100 g/ 50 - 100 l wody/ 100 m ² (1 ar)

Pierwsza pomoc: w razie kontaktu z preparatem skórę i oczy przemyć obficie wodą. W razie połknięcia zasięgnąć porady lekarza. Przechowywać z dala od żywności, w oryginalnym szczelnie zamkniętym opakowaniu w temperaturze -5 do 30°C. Pozostałości preparatu i puste opakowanie traktować jak odpady komunalne.

Dystrybutor: BROS sp. z o.o., ul. Karpia 24, 61-619 Poznań, tel. (61) 826 25 12, e-mail: biuro@bros.pl.