



SAFLAX®



Tips



© Jeff dean - Attribution

Acer rubrum

	 Български	BG		2		 Malti	MT		5
	 Dansk	DK		2		 Nederlands	NL		5
	 Deutsch	DE		2		 Norsk	NO		6
	 English	UK		2		 Polski	PL		6
	 Eesti	EE		3		 Português	PT		6
	 Suomalainen	FI		3		 Românesc	RO		6
	 Français	FR		3		 Svenska	SE		7
	 Ελληνική	GR		3		 Slovensky	SK		7
	 Gaeilge	IE		4		 Slovenski	SI		7
	 íslenskur	IS		4		 Español	ES		7
	 Italiano	IT		4		 Český	CZ		8
	 Hrvatski	HR		4		 Türkçe	TR		8
	 Latviešu	LV		5		 Magyar	HU		8
	 Lietuvių kalba	LT		5		 日本語	JP		9



Червен клен

Acer rubrum

Бързорастящ и издръжлив - с огнено червени есенни багри!

Червеният клен е особено самотен, бляскав цвят и развива красива овална корона. Растящ бързо с до 60 сантиметра на година, той достига височина до 12 метра и носи нотка на индийско лято в собствената ви градина с ранния си, огненочервен есенен цвят. Неговите малки листа с бронзов цвят особено са петделни и дълги около 10 сантиметра. Дори много млади дървета цъфтят, преди да поникнат листата. След това червените цветя стоят на тънките стъбла в гъсти съветия и излъчват леко подобен на мед аромат. Между другото, червеният клен е част от канадското знаме. - **ИЗОБРАЖЕНИЕ НА ЗНАМЕ** **Естествено местоположение:** Домът на червения клен е главно в източната част на Северна Америка, от атлантическото крайбрежие до Апалачите до края на прерията. **Успешно отглеждане:** Отглеждането от семена на закрито е възможно през цялата година. За да увеличите кълняемостта на семената, първо трябва да ги поставите във фризер за три седмици. След това ги оставете да киснат във вода със стайна температура за още 24 часа. Натиснете леко семената във влажна почва за саксии и само леко ги покрийте с почвата за саксии. Покрийте съда с култура с домакинско фолио, което сте осигурили с дупки. Това предпазва почвата от изсушаване. Трябва да отстранявате фолиото за 2 часа на всеки два до три дни. Това предотвратява образуването на мухъл върху растящата почва. Поставете саксията със семена на светло и топло място с около 20° по Целзий и поддържайте почвата влажна, но не мокра. Първите разсад се появяват след четири до осем седмици. Между другото: Кореновата система на червения клен е много плитка. Вече в разсада, след пет сантиметра вертикален растеж, коренът се извива настрана. **Най-доброто местоположение:** Вашият червен клен ще оцени светло, слънчево място. Възможно е и място с лека сянка - но несоразмерните есенни цветове се изразяват най-добре на място, осветено от пълно слънце. Дори младите растения растат доста бързо. **Оптимална грижа:** Кореновата система на червения клен се справя добре с различни почвени условия и понася както сухи, така и пряно влажни или мокри места. Дори корените на по-големите дървета едва ли достигат дълбочина повече от 35 сантиметра, преди да се разпространят много надалеч. **През зимата:** Ярките есенни листа се окапват много късно. Дървото понася безпроблемно и най-тежките студове до -30° по Целзий. Въпреки това, когато е млад, той е застрашен от късна слана и следователно трябва да бъде защитен донякъде чрез натрупване на листа.



Rød ahorn

Acer rubrum

Hurtigtvoksende og hårdfør - med flammerøde efterårsfarver!

Den røde ahorn er særligt solitær, en farvestrålende og udvikler en smuk oval krone. Hurtigtvoksende med op til 60 centimeter om året, når en højde på op til 12 meter og bringer et strejf af indisk sommer til din egen have med sin tidligt indsættende, flammerøde efterårsfarve. Dens små, bronzefarvede blade er generelt fem-fligede og omkring 10 centimeter lange. Selv meget unge træer blomstrer, før bladene spirer. De røde blomster står så på de slanke stængler i tætte blomsterstande og udstråler en let honningagtig duft. Den røde ahorn er i øvrigt en del af det canadiske flag. - **FLAGBILLEDE** **Naturlig beliggenhed:** Hjemmet for den røde ahorn er hovedsageligt i det østlige Nordamerika, fra Atlanterhavskysten til Appalacherne til kanten af prærien. **Succesfuld dyrkning:** Dyrkning fra frø indendørs er muligt hele året rundt. For at øge frøens spiring skal du først placere dem i en fryser i tre uger. Lad dem derefter trække i vand ved stuetemperatur i yderligere 24 timer. Tryk frøene let ned i fugtig pottejord og dæk dem kun let med pottejorden. Dæk dyrkningskarret til med husholdningsfilm, som du forsyner med huller. Dette beskytter jorden mod udtørring. Du bør fjerne folien i 2 timer hver anden til tredje dag. Dette forhindrer mug i at dannes på den voksende jord. Stil frøpotten et let og varmt sted med omkring 20° Celsius og hold pottejorden fugtig, men ikke våd. De første frøplanter vises efter fire til otte uger. I øvrigt: Den røde ahorns rodsystem er meget lavvandet. Allerede i frøplanterne, efter fem centimeters lodret vækst, buer roden sidelæns. **Den bedste beliggenhed:** Din røde ahorn vil sætte pris på et lyst, solrigt sted. En placering med let skygge er også mulig - dog kommer de uforlignelige efterårsfarver bedst til udtryk på en placering i fuld sol. Selv de unge planter vokser ret hurtigt. **Optimal pleje:** Den røde ahorns rodsystem klarer forskellige jordbundsforhold godt og tåler både tørre og frisk fugtig eller våde steder. Selv rødderne på større træer når næppe en dybde på mere end 35 centimeter, før de breder sig meget langt. **Om vinteren:** De lyse efterårsblade fældes meget sent. Træet tåler selv de hårdeste frostforhold ned til -30° Celsius uden problemer. Den er dog truet af sen frost som ung og bør derfor beskyttes noget ved at hobe blade op.



Rotahorn

Acer rubrum

Schnellwüchsig und winterhart - mit flammenroter Herbstfärbung!

Der Rotahorn ist besonders solitär stehend eine Farbenpracht und entwickelt eine schöne ovale Krone. Schnellwüchsig mit bis zu 60 Zentimetern pro Jahr erreicht er eine Höhe von bis zu 12 Metern und bringt durch seine früheinsetzende flammenrote Herbstfärbung ein Stück Indian Summer in den eigenen Garten. Seine kleinen, beim Austrieb bronzefarbenen Blätter sind im Allgemeinen fünfflüchtig und etwa 10 Zentimeter groß. Schon sehr junge Bäume blühen noch vor dem Blattaustrieb. Die roten Blüten stehen dann an den schlanken Stielen in dichten Blütenständen und verströmen einen leicht honigartigen Duft. Der Rotahorn ist übrigens Bestandteil der kanadischen Flagge. - **FLAGGENBILD** **Naturstandort:** Die Heimat des Rotahorn liegt vor allem im östlichen Nordamerika, von der Atlantikküste über die Appalachen bis an den Rand der Prärie. **Anzucht:** Im Haus ist die Anzucht aus Samen das ganze Jahr über möglich. Um die Keimfähigkeit der Samen zu erhöhen, sollten Sie sie zunächst für drei Wochen in ein Gefrierfach legen. Dann lassen Sie sie bitte noch 24 Stunden in Wasser bei Raumtemperatur vorquellen. Drücken Sie die Samen etwas in feuchte Anzuchterde und bedecken Sie sie nur leicht mit dem Anzuchtsubstrat. Decken Sie das Anzuchtgefäß mit Klarsichtfolie ab, die Sie mit Löchern versehen. So ist die Erde vor Austrocknung geschützt. Alle zwei bis drei Tage sollten Sie die Folie für 2 Stunden entfernen. Das beugt einer Schimmelbildung auf der Anzuchterde vor. Stellen Sie das Anzuchtgefäß an einen hellen und warmen Ort mit etwa 20° Celsius und halten Sie die Anzuchterde feucht, aber nicht nass. Nach vier bis acht Wochen erscheinen dann die ersten Sämlinge. Übrigens: Das Wurzelsystem des Rotahorn ist sehr flach. Bereits bei den Sämlingen krümmt sich die Wurzel nach fünf Zentimetern senkrechten Wachstums seitwärts. **Standort:** Ihr Rotahorn ist für einen hellen, sonnigen Platz dankbar. Ein Standort mit lichtem Schatten ist ebenfalls möglich - allerdings prägt sich die unvergleichbare Herbstfärbung am besten an einem vollsonnigen Standort aus. Bereits die jungen Pflanzen wachsen recht schnell. **Pflege:** Das Wurzelsystem des Rotahorn kommt gut mit unterschiedlichen Bodenbedingungen zurecht und toleriert sowohl Trockenheit wie auch frisch-feuchte oder nasse Standorte. Auch die Wurzeln größerer Bäume erreichen kaum mehr als 35 Zentimeter Tiefe, bevor sie sich allerdings sehr weit ausbreiten. **Im Winter:** Das leuchtende Herbstlaub wird erst sehr spät abgeworfen. Der Baum toleriert selbst härteste Frostbedingungen bis -30° Celsius ohne Probleme. Allerdings ist er im Jugendstadium spätfrostgefährdet und solltedaher etwas durch Anhäufeln von Laub geschützt werden.



Red Maple

Acer rubrum

Fast-growing and frost-resistant - fiery red autumn colouring

The Red Maple really shows to advantage with its gorgeous oval-shaped crown and the magnificent colouring, when it is cultivated as a solitary plant. It is fast-growing with up to 60 cm a year and reaches a height of up to 12 meters. With its fiery red colouring during autumn, the Red Maple brings a piece of Indian Summer into your garden. Its small and initially bronze-coloured leaves are basically five-lobed and up to 10 cm big. Even young trees bloom early before the leaf formation, with red blossoms that come with thick inflorescences on long stalks and exhale a light honey-like scent. By the way, the Red Maple leaf is shown on the Canadian banner. **Natural location:** The Red Maple has its natural habitat mainly in eastern North America, from the Atlantic Coast to the Appalachian Mountains until close to the Plains. **Successful cultivation:** Seed propagation indoors is possible throughout the year. To increase the germinability, you should keep the seeds initially for about three weeks in the freezer and place them afterwards for another 24 hours in warm water for priming. Press the seeds gently into moist potting compost, put just a little compost earth on top and cover the seed container with clear film to prevent the earth from drying out. Don't forget to make some holes in the clear film and take it every second or third day completely off for about 2 hours. That way you avoid mold formation on your potting compost. Place the seed container somewhere bright and warm with a temperature about 20°Celsius and keep the earth moist, but not wet. The first seedlings will come up after four to eight weeks. By the way: the rooting of the Red Maple is rather flat - even in the seedlings the roots will spread to the side after growing not more than 5 cm deep. **The best location:** The Red Maple prefers a bright and sunny spot. A light shaded place is also possible - however, the magnificent colouring in autumn comes out best in full sunny places. Even young plants are rather fast-growing. **Optimal care:** The rooting of the Red Maple can cope easily with most soils and tolerates dry places as well as moist or even wet habitats. Even the roots of matured trees don't reach deeper than 35 cm, but grow wide instead. **In the winter:** The shiny autumn leaves are being cast off rather late. The tree is completely frost-resistant even up to -30° Celsius. However, in its first years it can be sensitive to late frosts, and should therefore be protected by earthing up some foliage.



Punane vaher

Acer rubrum

Kiirekasvuline ja vastupidav - leekpunaste sügisvärvidega!

Punane vaher on eriti üksildane, värviline ja sellel on ilus ovaalne kroon. Kiirekasvuline, kuni 60 sentimeetrit aastas, ulatub kuni 12 meetri kõrguseni ja toob oma varakult algava leekpunase sügisvärviga India suve hõngu teie enda aeda. Selle väikesed pronksikarva lehed on tavaliselt viieharulised ja umbes 10 sentimeetri pikkused. Isegi väga noored puud õitsevad enne lehtede tärkamist. Seejärel seisavad punased õied peenikestel vartel tihedates õisikutes ja eritavad kergelt meelaadset lõhna. Muide, punane vaher on osa Kanada lipust. - LIPU PILT **Looduslik asukoht:** Punase vahtra kodu on peamiselt Põhja-Ameerika idaosas, Atlandi ookeani rannikust Appalachi mägedeni kuni preeria servani. **Edukas kasvatamine:** Seemnetest siseruumides kasvatamine on võimalik aastaringiselt. Seemnete idanemise suurendamiseks tuleks need kõigepealt kolmeks nädalaks sügavkülma panna. Seejärel laske neil veel 24 tundi toatemperatuuril vees liguneda. Suruge seemned kergelt niiskesse potimulda ja katke need ainult kergelt poimullaga. Kata kultuurianum toidukilega, mille varustad aukudega. See kaitseb mulda kuivamise eest. Peaksite fooliumi eemaldama 2 tunniks iga kahe kuni kolme päeva järel. See takistab hallituse teket kasvupinnal. Asetage seemnepott valgusküllasesse ja sooja kohta, mille temperatuur on umbes 20 °C, ning hoidke istutusmuld niiske, kuid mitte märjana. Esimesed seemikud ilmuvad nelja kuni kaheksa nädala pärast. Muideks: Punase vahtra juurestik on väga madal. Juba seemikutes, pärast viiesentimeetrist vertikaalset kasvu, kõverdub juur küllili. **Parim asukoht:** Teie punane vaher hindab heledat ja päikeselist kohta. Võimalik on ka heleda varjundiga asukoht – võrreldamatud sügisvärvid väljenduvad aga kõige paremini lauspäikese käes. Isegi noored taimed kasvavad üsna kiiresti. **Optimaalne hooldus:** Punase vahtra juurestik tuleb hästi toime erinevate mullatingimustega ja talub nii kuiva kui värskest niisket või märga kasvukohta. Isegi suuremate puude juured ei ulatu vaevalt üle 35 sentimeetri sügavusele, enne kui nad väga kaugele levivad. **Talvel:** Säravad sügislehed langevad väga hilja. Puu talub probleemideta ka kõige karmimaid külmatingimusi kuni -30°C. Küll aga ohustab teda noorena hiline külm ja seetõttu tuleks teda lehtede kuhjamisega mõnevõrra kaitsta.



Punainen vaahtera

Acer rubrum

Nopeasti kasvava ja kestävä - liekinpunaisilla syysväreillä!

Punainen vaahtera on erityisen yksinäinen, värikäs ja kehittää kauniin soikean kruunun. Nopeakasvuinen, jopa 60 senttimetriä vuodessa, se saavuttaa jopa 12 metrin korkeuden ja tuo intialaisen kesän ripauksen omaan puutarhaasi varhain alkavalla liekinpunaisella syysväriällään. Sen pienet, pronssinväriset lehdet ovat yleensä viisilehtisiä ja noin 10 senttimetriä pitkiä. Jopa hyvin nuoret puut kukkivat ennen lehtien itämistä. Punaiset kukat seisovat sitten ohuilla varrella tiiviissä kukinnoissa ja tihkuvat hieman hunajaista tuoksua. Muuten, punainen vaahtera on osa Kanadan lippua. - LIPUKUVA **Luonnollinen sijainti:** Punavaahteran kotipaikka on pääasiassa Pohjois-Amerikan itäosassa Atlantin rannikolta Appalakien vuoristoon ja preeriaan. **Onnistunut viljely:** Kasvatat siemenistä sisätiloissa on mahdollista ympäri vuoden. Siementen itävyyden lisäämiseksi sinun tulee ensin laittaa ne pakastimeen kolmeksi viikoksi. Anna niiden sitten liota vedessä huoneenlämmössä vielä 24 tuntia. Paina siemenet kevyesti kosteaan istutusmaahan ja peitä ne vain kevyesti istutusmultalla. Peitä viljelyastia kelmulla, johon on tehty reikiä. Tämä suojaaa maaperää kuivumiselta. Poista folio 2 tuntiin ajaksi kahden tai kolmen päivän välein. Tämä estää homeen muodostumisen kasvumaahan. Aseta siemenruukku valoisaan ja lämpimään paikkaan, jonka lämpötila on noin 20 °C, ja pidä istutusmaa kosteana, mutta ei märkänä. Ensimmäiset taimet ilmestyvät neljässä kahdeksaan viikon kuluuta. Muuten: Punavaahteran juuristo on erittäin matala. Jo taimissa, viiden senttimetrin pystysuoran kasvun jälkeen, juuri taipuu sivusuunnassa. **Paras sijainti:** Punainen vaahterasi arvostaa valoisa, aurinkoista paikkaa. Myös vaalean sävyinen sijainti on mahdollinen - vertaansa vailla olevat syysvärit ilmenevät kuitenkin parhaiten täydessä auringonpaisteessa. Jopa nuoret kasvit kasvavat melko nopeasti. **Optimaalinen hoito:** Punavaahteran juuristo kestää hyvin erilaisia maaperäolosuhteita ja sietää sekä kuivia että vastakosteita tai märkiä paikkoja. Jopa suurempien puiden juuret tuskin yltyvät yli 35 senttimetrin syvyyteen ennen kuin ne leviävät hyvin pitkälle. **Talvella:** Syksyn kirrkaat lehdet irtaavat hyvin myöhään. Puu sietää vaikeimmatkin pakkasolosuhteet -30°C asti ilman ongelmia. Myöhäinen pakkanen uhkaa sitä kuitenkin nuorena, ja siksi sitä on suojeltava jonkin verran kasaamalla lehtiä.



Erable rouge

Acer rubrum

Croissance rapide et rustique - avec une couleur rouge feu en automne !

L'érable rouge est particulièrement solitaire avec des couleurs magnifiques et développe une belle couronne ovale. L'érable rouge est un arbre à croissance rapide et grandit jusqu'à 60 centimètres par an, atteint une hauteur jusqu'à 12 mètres, et donne un morceau d'été indien dans le jardin avec sa couleur rouge feu en automne. Ses petites feuilles bronzées lors de la poussée des feuilles ont cinq lobes et sont d'environ 10 centimètres de longueur en général. Même les très jeunes arbres fleurissent avant l'apparition des feuilles. Les fleurs rouges se trouvent ensuite sur les tiges minces dans des inflorescences denses et exhalent un parfum légèrement mielleux. L'érable rouge est un composant du drapeau canadien. - IMAGE DU DRAPEAU **Emplacement naturel:** L'habitation de l'érable rouge se trouve surtout à l'est de l'Amérique du Nord, de la côte atlantique et les Appalaches jusqu'au bord de la Prairie. **Culture réussie:** La culture des graines à la maison est possible tout au long de l'année. Pour améliorer la faculté germinative des graines, vous devez d'abord les mettre dans un congélateur pendant trois semaines. Ensuite, laissez-les dans de l'eau à température ambiante pendant 24 heures. Mettez les graines dans du terreau humide et recouvrez-les légèrement avec le substrat. Couvrez le récipient avec une feuille transparente dans laquelle vous faites des trous. Comme ça, le terreau est protégé du dessèchement. Vous devez enlever la feuille pendant deux heures tous les deux ou trois jours. Ceci prévient la formation de moisissures dans le terreau. Mettez le récipient dans un endroit lumineux et chaud à environ 20° Celsius et gardez le terreau humide, mais pas mouillé. Les premiers semis apparaissent après quatre à huit semaines. D'ailleurs, le système racinaire de l'érable rouge est très plat. La racine se courbe latéralement chez les semis après avoir grandi verticalement de 5 centimètres. **Le meilleur emplacement:** Votre érable rouge apprécie un emplacement lumineux et ensoleillé. Il est aussi possible de le mettre dans un endroit avec de l'ombre lumineuse. Cependant, la coloration d'automne incomparable se forme le mieux dans un endroit en plein soleil. Les jeunes plantes grandissent rapidement. **Soins optimaux:** Le système racinaire de l'érable rouge s'en sort avec des conditions de terre différentes et supporte la sécheresse, ainsi que des emplacements frais et humides, ou mouillés. Les racines de plus grands arbres arrivent à peine à une profondeur de plus de 35 centimètres avant de s'étendre largement. **En hiver:** Les feuilles d'automne vives sont rejetées tard. L'arbre supporte les conditions de gel jusqu'à -30° Celsius tout seul sans problème. Cependant, les jeunes arbres n'aiment pas les gels printaniers et doivent donc être un peu protégés par des buttages de feuilles.



Κόκκινο σφενδάμι

Acer rubrum

Ταχέως αναπτυσσόμενο και ανθεκτικό - με φλόγα κόκκινα φθινοπωρινά χρώματα!

Ο κόκκινος σφενδάμις είναι ιδιαίτερα μοναχικός, έχει χρώμα και αναπτύσσει ένα όμορφο οβάλ στέμμα. Αναπτύσσεται γρήγορα έως και 60 εκατοστά ετησίως, φτάνει σε ύψος έως και 12 μέτρα και φέρνει μια νότα Ινδικού Καλοκαιριού στον κήπο σας με το πρώτο ξεκίνημα, το κόκκινο της φλόγας χρώμα του φθινοπώρου. Τα μικρά, χάλκινα φύλλα του είναι γενικά πεντάλοβα και μήκους περίπου 10 εκατοστά. Ακόμη και πολύ νεαρά δέντρα ανθίζουν πριν φυτρώσουν τα φύλλα. Τα κόκκινα λουλούδια στη συνέχεια στέκονται στους λεπτούς μίσχους σε πυκνές ταξιανθίες και αποπνέουν ένα ελαφρώς άρωμα σαν μέλι. Παρεμπιπτόντως, ο κόκκινος σφενδάμιος είναι μέρος της καναδικής σημαίας. - ΕΙΚΟΝΑ ΣΗΜΑΙΑΣ **Φυσική τοποθεσία:** Η πατρίδα του κόκκινου σφενδάμου βρίσκεται κυρίως στην ανατολική Βόρεια Αμερική, από την ακτή του Ατλαντικού μέχρι τα Απαλάτσια Όρη μέχρι την άκρη του Λιβάνι. **Επιτυχημένη καλλιέργεια:** Η καλλιέργεια από σπόρους σε εσωτερικούς χώρους είναι δυνατή όλο το χρόνο. Για να αυξήσετε τη βλάστηση των σπόρων, θα πρέπει πρώτα να τους τοποθετήσετε στην κατάψυξη για τρεις εβδομάδες. Στη συνέχεια, αφήστε τα να μουλιάσουν σε νερό σε θερμοκρασία δωματίου για άλλες 24 ώρες. Πιέστε ελαφρά τους σπόρους σε υγρό χώμα γλάστρας και σκεπάστε τους μόνο ελαφρά με το χώμα της γλάστρας. Καλύψτε το δοχείο καλλιέργειας με μεμβράνη, την οποία ανοίγετε με τρύπες. Αυτό προστατεύει το έδαφος από το στέγνωμα. Θα πρέπει να αφαιρείτε το αλουμινοχαρτό για 2 ώρες κάθε δύο έως τρεις ημέρες. Αυτό αποτρέπει τη δημιουργία μούχλας στο αναπτυσσόμενο έδαφος. Τοποθετήστε τη γλάστρα σε ένα ελαφρύ και ζεστό μέρος με θερμοκρασία περίπου 20° Κελσίου και διατηρήστε το χώμα της γλάστρας υγρό αλλά όχι υγρό. Τα πρώτα σπορόφυτα εμφανίζονται μετά από τέσσερις έως οκτώ εβδομάδες. Παρεμπιπτόντως: Το ριζικό σύστημα του κόκκινου σφενδάμου είναι πολύ ριχτό. Ήδη στα σπορόφυτα, μετά από πέντε εκατοστά κάθετης ανάπτυξης, η ρίζα λυγίζει πλάγια. **Η καλύτερη τοποθεσία:** Το κόκκινο σφενδάμι σας θα εκτιμήσει ένα φωτεινό, ηλιόλουστο σημείο. Μια τοποθεσία με ανοιχτόχρωμη απόχρωση είναι επίσης δυνατή - ωστόσο, τα ασήγχετα χρώματα του φθινοπώρου εκφράζονται καλύτερα σε μια τοποθεσία με πλήρη ηλιοφάνεια. Ακόμη και τα νεαρά φυτά αναπτύσσονται αρκετά γρήγορα. **Βέλτιστη φροντίδα:** Το ριζικό σύστημα του κόκκινου σφενδάμου αντιμετωπίζει καλά τις διαφορετικές συνθήκες του εδάφους και ανέχεται τόσο ξηρές όσο και πρόσφατα υγρές ή υγρές τοποθεσίες. Ακόμη και οι ρίζες μεγαλύτερων δέντρων φτάνουν μετά βίας σε βάθος μεγαλύτερο από 35 εκατοστά πριν εξαπλωθούν πολύ μακριά. **Το χειμώνα:** Τα λαμπερά φύλλα του φθινοπώρου ρίχνονται πολύ αργά. Το δέντρο ανέχεται ακόμη και τις πιο σκληρές συνθήκες παγετού έως και -30° Κελσίου χωρίς κανένα πρόβλημα. Ωστόσο, κινδυνεύει από τον όψιμο παγετό όταν είναι νέος και επομένως θα πρέπει να προστατεύεται κάπως με τη συσσώρευση φύλλων.



Maple dearg

Acer rubrum

Ag fás go tapa agus hardy - le dathanna an fhómhair dearg lasair!

Tá an maple dearg go háirithe solitary, blaze dath agus forbraíonn coróin ubhchruthach álainn. Ag fás go tapa ag suas le 60 ceintiméadar in aghaidh na bliana, sroicheann sé airde de suas le 12 méadar agus tugann sé teagmháil le Samhradh Indiach chuig do ghairdín féin le dath an fhómhair lasair-dearg go luath. De ghnáth bíonn a dhuilleoga beaga ar dhath cré-umha cúig-lóbach agus timpeall 10 ceintiméadar ar fad. Bíonn fiú crainn an-óg faoi bhláth sula bhfágann na duilleoga. Seasann na bláthanna dearga ansin ar na gais caola in inflorescences dlúth agus feiceann siad boladh beagán cosúil le mil. Teagmhasach, tá an maple dearg mar chuid de bhratach Cheanada. - ÍOMHÁ BRATACH **Suíomh nádúrtha:** Is in oirthear Mheiriceá Thuaidh den chuid is mó atá baile an mhapail dhearg, ó chósta an Atlantaigh go dtí na Sléibhte Appalachian go dtí imeall na pairce. **Saothrú rathúil:** Is féidir fás ó shíolta taobh istigh ar feadh na bliana. Chun péacadh na síolta a mhéadú, ba chóir duit iad a chur ar dtús i reoiteoir ar feadh trí seachtaine. Ansin lig dóibh soak in uisce ag teocht an tseomra ar feadh 24 uair an chloig eile. Brúigh na síolta beagán isteach in ithir potaithe tais agus gan ach iad a chlúdach go héadrom leis an ithir potaithe. Clúdaigh an soitheach cultúir le scannán cling, a sholáthraíonn tú le poill. Cosnaíonn sé seo an ithir ó thriomú amach. Ba chóir duit an scragall a bhaint ar feadh 2 uair gach dhá nó trí lá. Cuireann sé seo cosc ar mhúnla a fhoirmiú ar an ithir atá ag fás. Cuir an pota síolta in áit éadrom te thart ar 20° Celsius agus coinnigh an ithir potaithe tais ach ná bíodh sé fliuch. Tá na chéad síológa le feiceáil tar éis ceithre nó ocht seachtaine. Dála an scéil: Tá córas fréimhe an maple dearg an-éadomhain. Cheana féin sna síológa, tar éis cúig ceintiméadar d'fhás ingearach, cuair an fhréamh ar an taobh. **An suíomh is fearr:** Beidh meas ag do mhailpe dearg ar láthair geal, grianmhar. Is féidir suíomh le scáth solais freisin - áfach, is fearr dathanna neamh-inchomparáide an fhómhair a chur in iúl i suíomh faoi ghrian iomlán. Fásann fiú na plandaí óga go tapa go leor. **Cúram is fearr is féidir:** Déileáilann córas fréimhe an mhapaill rua go maith le coinníollacha éagsúla ithreach agus fhuilgíngíonn sé láithreacha tírimhe agus úra tais nó fliuch. Is ar éigean a shroicheann fréamhacha na gcrann níos mó doimhneacht níos mó ná 35 ceintiméadar sula leathnaíonn siad i bhfad. **Sa gheimhreadh:** Cailltear duilleoga geal an fhómhair an-déanach. Fulaingíonn an crann fiú na coinníollacha is gairbhe sioc síos go -30 ° Celsius gan aon fhadhbanna. Mar sin féin, tá sé i mbaol sioc déanach nuair a bhíonn sé óg agus ba chóir é a chosaint beagán mar sin trí dhuilleoga a chnadh.



Rauður hlynur

Acer rubrum

Ört vaxandi og harðgert - með lograðum haustlitum!

Rauði hlynurinn er sérlega einfarinn, ljómar af lit og fær fallega sporóskjula kórónu. Hann vex hratt, allt að 60 sentimetrar á ári, nær allt að 12 metra hæð og færir snertingu af indíánasumar í garðinn þinn með eldrauðum haustlit sínum snemma. Lítill, bronslituð blöð hennar eru yfirleitt fimmflippótt og um 10 sentimetrar á lengd. Jafnvel mjög ung tré blómstra áður en lafin spretta. Rauðu blómin standa svo á mjóum stönglunum í þéttum blómablómum og gefa frá sér örlítið hunangskennan ilm. Tilviljun, rauði hlynurinn er hluti af kanadíska fánanum. - FÁNAMYND **Náttúrleg staðsetning:** Heimili rauða hlynsins er aðallega í austurhluta Norður-Ameríku, frá Atlantshafsströndinni til Appalachian-fjallanna að jaðri sléttunnar. **Árangursrík ræktun:** Ræktun úr fræjum innandyrar er mögulegt allt árið um kring. Til að auka spírun fræanna ættir þú fyrst að setja þau í frýsti í þrjár vikur. Látið þær síðan liggja í bleyti í vatni við stofuhita í 24 klukkustundir í viðbót. Þrýstu fræjunum örlítið ofan í rakan pottamold og hyldu þau aðeins með pottamoldinni. Hyljið ræktunarlátið með matarfilmu, sem þú útvegar með götum. Þetta verndar jarðvegin gegn þurrkun. Þú ættir að fjarlægja álpappírinn í 2 klukkustundir á tveggja til þriggja daga fresti. Þetta kemur í veg fyrir að mygla myndist á vaxandi jarðvegi. Settu fræpottinn á léttan og heitan stað með um 20°C og haltu pottjarðveginum rökum en ekki blautum. Fyrstu plönturnar birtast eftir fjórar til átta vikur. Við the vegur: Rótarkerfi rauða hlynsins er mjög grunnt. Þegar í plöntunum, eftir fimm sentímetra löðréttan vöxt, sveigir rótin til hliðar. **Besta staðsetningin:** Rauði hlynurinn þinn kann að meta bjartan, sólrikan stað. Staðsetning með ljósum skugga er líka möguleg - hins vegar koma hinir óviðjafnanlegu haustlitir best fram á stað í fullri sól. Jafnvel ungu plönturnar vaxa nokkuð hratt. **Besta umönnun:** Rótarkerfi rauða hlynsins þolir mismunandi jarðvegsaðstæður vel og þolir bæði þurra og nývota eða blauta staði. Jafnvel rætur stærri trjáa ná varla meira en 35 sentímetra dýpi áður en þær dreifast mjög langt. **Á veturna:** Björt haustlafin falla mjög seint. Tréð þolir jafnvel erfiðustu frostsكيلýrði niður í -30° Celsius án vandræða. Henni stafar þó hætta af síðfrosti þegar hann er ungur og ætti því að verjast nokkuð með því að hlaða upp laufblöðum.



Acero rosso

Acer rubrum

Pianta a crescita veloce e resistente al freddo, con una colorazione autunnale rosso fuoco

L'Acero rosso è uno spettacolo di colori piuttosto unico nel suo genere. L'albero sviluppa una chioma ovale, cresce rapidamente di circa 60 centimetri all'anno e raggiunge un'altezza massima di 12 metri. Con la tipica colorazione autunnale precoce porterà un tocco di estate indiana nel vostro giardino. Le piccole foglie sono bronzee appena sboccate, generalmente pentalobate e misurano un'ampiezza di circa 10 centimetri. Già gli alberi molto giovani fioriscono prima dello spuntare del fogliame. I fiori rossi compaiono sugli steli sottili, raggruppati in infiorescenze fitte, emanando un profumo che ricorda leggermente il miele. L'Acero rosso è protagonista della bandiera canadese. **Posizione naturale:** L'areale dell'Acero rosso si trova soprattutto nel Nord America orientale, dalla costa atlantica sui Monti Appalachi fino ai confini della prateria. **Coltivazione riuscita:** La coltivazione da semi in casa è possibile durante tutto l'anno. Per aumentare la germinabilità dei semi, conservateli per tre settimane nel congelatore. Poi lasciateli immersi per 24 ore in un recipiente con acqua a temperatura ambiente affinché si gonfino. Collocate i semi nella terra di coltivo umida e copriteli leggermente con il substrato. Coprite il recipiente di coltivazione con pellicola trasparente, sulla quale praterete dei fori, in questo modo la terra eviterà di seccarsi. Ogni due o tre giorni rimuovete la pellicola per 2 ore, per prevenire la formazione di muffe sulla terra. Collocate il recipiente di coltivazione in un luogo luminoso e caldo, a una temperatura di circa 20° C e mantenete la terra umida, ma non bagnata. Le prime piantine spuntano di norma da quattro a otto settimane dopo. Attenzione: il sistema radicale dell'Acero rosso è molto superficiale. Già nelle piantine le radici si piegano lateralmente dopo circa cinque centimetri di crescita verticale. **La posizione migliore:** Il vostro Acero rosso predilige un ambiente luminoso e soleggiato. E' anche possibile collocarlo in un punto leggermente all'ombra, ma in generale l'inconfondibile colorazione autunnale si sviluppa meglio se esposto al sole. Le piante giovani crescono già rapidamente. **Cura ottimale:** Il sistema radicale dell'Acero rosso si adatta bene a svariate condizioni del terreno e tollera persino la siccità, così come luoghi freschi-umidi o bagnati. Neppure le radici delle piante più grandi superano i 35 centimetri di profondità, ma si espandono piuttosto in maniera molto ampia. **In inverno:** Il vivace fogliame autunnale cade solo molto tardi. L'albero tollera senza problemi anche temperature molto gelide, fino a -30° C. In età giovane teme le gelate tardive, per questo dovrebbe essere protetto rinzalendolo con fogliame.



Crveni javor

Acer rubrum

Brzorastuće i izdržljive - plamenocrvene jesenske boje!

Crveni javor je posebno usamljen, blistave boje i razvija prekrasnu ovalnu krošnju. Brzo raste do 60 centimetara godišnje, doseže visinu i do 12 metara i donosi dašak indijskog ljeta u vaš vlastiti vrt svojom ranom pojavom, plamenocrvenom jesenskom bojom. Njegovi mali listovi brončane boje uglavnom su peterokraki i dugi oko 10 centimetara. Čak i vrlo mlada stabla cvjetaju prije nego lišće nikne. Crveni cvjetovi tada stoje na tankim stapkama u gustim cvatovima i odišu blago mednim mirisom. Uzgred, crveni javor dio je kanadske zastave. - SLIKA ZASTAVE **Zemlja porijekla:** Postojbina crvenog javora je uglavnom u istočnoj Sjevernoj Americi, od atlantske obale do Appalachian planina do ruba prerije. **Uspješan uzgoj:** Uzgoj iz sjemena u zatvorenom prostoru moguć je tijekom cijele godine. Da biste povećali klijavost sjemena, najprije ih stavite u zamrzivač na tri tjedna. Zatim ih ostavite da se namaču u vodi sobne temperature još 24 sata. Lagano utisnite sjeme u vlažnu zemlju za posude i samo ih lagano prekrijte zemljom za posude. Posudu s kulturom prekrijte prozirnom folijom koju ste opremili rupama. To štiti tlo od isušivanja. Svaka dva do tri dana skinite foliju na 2 sata. Time se sprječava stvaranje plijesni na tlu za uzgoj. Stavite posudu za sjeme na svijetlo i toplo mjesto s oko 20° Celzija i održavajte tlo u posudi vlažnim, ali ne mokrim. Prve sadnice pojavljuju se nakon četiri do osam tjedana. Usput: Korijenski sustav crvenog javora je vrlo plitak. Već u sadnicama, nakon pet centimetara okomitog rasta, korijen se savija u stranu. **Najbolja lokacija:** Vaš crveni javor će cijeniti svijetlo, sunčano mjesto. Moguća je i lokacija s laganom sjenom - međutim, neusporedive jesenske boje najbolje dolaze do izražaja na lokaciji na punom suncu. Čak i mlade biljke rastu prilično brzo. **Optimalna njega:** Korijenov sustav crvenog javora dobro se nosi s različitim uvjetima tla i podnosi i suha i svježje vlažna ili mokra mjesta. Čak i korijenje većih stabala teško doseže dubinu veću od 35 centimetara prije nego što se rašire jako daleko. **U zimi:** Svijetlo jesensko lišće opada vrlo kasno. Stablo bez problema podnosi i najteže mrazove do -30°C. No, u mladosti joj prijete kasni mraz pa je treba donekle zaštititi nagomilavanjem lišća.



Sarkanā kļava

Acer rubrum

Ātri augošs un izturīgs - ar liesmu sarkanām rudens krāsām!

Sarkanā kļava ir īpaši vienkārša, tā ir krāsaina un attīsta skaistu ovālu vainagu. Strauji aug līdz 60 centimetriem gadā, tas sasniedz pat 12 metru augstumu un ienes jūsu dārzā Indijas vasaras pieskārienu ar savu agri sākušos liesmu sarkano rudens krāsu. Tās mazās, bronzas krāsas lapas parasti ir piecas daivas un apmēram 10 centimetrus garas. Pat ļoti jauni koki uzzied pirms lapu dīgšanas. Pēc tam sarkanie ziedi stāv uz slaidajiem kātiem blīvās ziedkopās un izdala nedaudz medum līdzīgu smaržu. Starp citu, sarkanā kļava ir daļa no Kanādas karoga. - **KAROGA ATTĒLS** **Dabiska vieta:** Sarkanās kļavas mājvieta galvenokārt atrodas Ziemeļamerikas austrumos, no Atlantijas okeāna piekrastes līdz Apalaču kalniem līdz prērijas malai. **Veiksmīga audzēšana:** Audzēšana no sēklām telpās ir iespējama visu gadu. Lai palielinātu sēklu dīgspēju, vispirms tās jāievieto saldētavā uz trim nedēļām. Pēc tam ļaujiet tiem vēl 24 stundas mērcēt ūdenī istabas temperatūrā. Nedaudz iespaidiet sēklas mitrā augsnē un tikai viegli pārklājiet tās ar augsni. Nosedziet kultivēšanas trauku ar pārtikas plēvi, kuru nodrošina ar caurumiem. Tas pasargā augsni no izžūšanas. Jums vajadzētu noņemt foliju 2 stundas ik pēc divām līdz trim dienām. Tas novērš pelējuma veidošanos augošajā augsnē. Novietojiet sēklu podu gaišā un siltā vietā ar aptuveni 20°C un turiet augsni mitru, bet ne mitru. Pirmie stādi parādās pēc četrām līdz astoņām nedēļām. Starp citu: Sarkanās kļavas sakņu sistēma ir ļoti sekla. Jau stādos pēc piecu centimetru vertikālas augšanas sakne izliecas uz sāniem. **Labākā atrašanās vieta:** Jūsu sarkanā kļava novērtēs gaišu, saulainu vietu. Iespējama arī vieta ar gaišu nokrāsu – tomēr nepārspējamās rudens krāsas vislabāk izpauž vietā pilnā saulē. Pat jaunie augi aug diezgan ātri. **Optimāla aprūpe:** Sarkanās kļavas sakņu sistēma ļoti labi tiek galā ar dažādiem augsnes apstākļiem un pacieš gan sausu, gan tikko mitru vai slapju vietu. Pat lielāku koku saknes diez vai sasniedz dziļumu vairāk par 35 centimetriem, pirms tās izplešas ļoti tālu. **Ziemā:** Spilgtās rudens lapas nobirst ļoti vēlu. Koks bez problēmām pacieš pat vismagākos sala apstākļus līdz -30°C. Tomēr jaunībā to apdraud vēlās sals, tāpēc to vajadzētu nedaudz aizsargāt, sakrājot lapas.



Raudonasis klevas

Acer rubrum

Greitai augantis ir ištvermingas - su liepsnai raudonomis rudens spalvomis!

Raudonasis klevas yra ypač vienišas, žydi spalvos ir sukuria gražią ovalią karūną. Greitai užauga iki 60 centimetrų per metus, pasiekia iki 12 metrų aukštį ir anksti prasidėsiančia liepsnai raudona rudens spalva įneša į jūsų sodą Indijos vasaros. Jo maži, bronzinės spalvos lapai paprastai yra penkių skilčių ir apie 10 centimetrų ilgio. Netgi labai jauni medžiai pražysta prieš išdygstant lapams. Tada raudoni žiedai stovi ant plonų stiebų tankiuose žiedynuose ir skleidžia šiek tiek medaus kvapą. Beje, raudonasis klevas yra Kanados vėliavos dalis. - **VĖLIAVOS VAIZDAS** **Natūrali vieta:** Raudonojo klevo buveinė daugiausia yra rytinėje Šiaurės Amerikos dalyje, nuo Atlanto vandenyno pakrantės iki Apalačų kalnų iki perijos pakraščio. **Sėkmingas auginimas:** Auginti iš sėklų patalpose galima ištisus metus. Norėdami padidinti sėklų daigumą, pirmiausia turėtumėte jas įdėti į šaldiklį trims savaitėms. Tada leiskite jiems mirkyti kambario temperatūros vandenyje dar 24 valandas. Sėklas šiek tiek įspauskite į drėgną vazoninę žemę ir tik lengvai užberkite jas vazoninė žeme. Kultūros indą uždenkite maistine plėvele, kurioje yra skylės. Tai apsaugo dirvą nuo išdžiūvimo. Kas dvi ar tris dienas 2 valandas nuimkite foliją. Tai neleids augančioje dirvoje susidaryti pelėsiui. Sėklų vazoną padėkite į šviesią ir šiltą vietą, kurios temperatūra yra apie 20 °C, o vazono žemė turi būti drėgna, bet ne šlapia. Pirmieji daigai pasirodo po keturių – aštuonių savaičių. Beje: Raudonojo klevo šaknų sistema labai sekli. Jau daiguose, po penkių centimetrų vertikalaus augimo, šaknis vingiuoja į šoną. **Geriausia vieta:** Jūsų raudonasis klevas įvertins šviesią, saulėtą vietą. Galima ir šviesaus atspalvio vieta – tačiau neprilygstamos rudens spalvos geriausiai išryškėja saulėtoje vietoje. Net jauni augalai auga gana greitai. **Optimali priežiūra:** Raudonojo klevo šaknų sistema puikiai susidoroja su įvairiomis dirvožemio sąlygomis ir toleruoja tiek sausas, tiek šviežiai drėgnas ar šlapias vietas. Net didesnių medžių šaknys vargu ar pasiekia didesnę nei 35 centimetrų gylį, kol neišsiskleidė labai toli. **Ziemą:** Ryškūs rudens lapai metas labai vėlai. Medis be problemų toleruoja net atšiauriausias šalčio sąlygas iki -30°C. Tačiau jaunai jai gresia vėlyvas šalnas, todėl reikėtų šiek tiek apsaugoti, kaupiant lapus.



Aggru ahmar

Acer rubrum

Li jikbru malajr u jifilhu - bil-kuluri tal-ħarifa ahmar tal-fjamma!

L-aggru ahmar huwa partikolarment solitarju, nar ta 'kulur u jizviluppa kuruna ovali sabiħa. Li tikber b'rata mghagħġa sa 60 centimetru fis-sena, tilhaq għoli sa 12-il metru u għib mess tas-Sajf Indjan fil-ġnien tiegħek bil-kulur tal-ħarifa ahmar fjamma tal-bidu tiegħu. Il-weraq żgħar tiegħu ta' kulur il-bronż huma ġeneralment b'ħames lobi u twal madwar 10 centimetri. Anke sigar żgħar hafna jiffjorixxu qabel ma jinbet il-weraq. Il-fjuri ħomor imbagħad joqogħdu fuq iz-zuk irraq fi fjoritur densi u joħorġu riħa kemmxajn qisha għasel. Incidentalment, l-aggru ahmar huwa parti mill-bandiera Kanadiża. - **IMMAĠNI TAL-BANDIERA** **Post naturali:** Id-dar tal-aggru ahmar tinsab prinċipalment fil-Lvant tal-Amerika ta 'Fuq, mill-kosta tal-Atlantiku sal-Muntanji Appalachian sat-tarf tal-prairie. **Kultivazzjoni b'suċċess:** It-tkabbir miż-żrieragħ ġewwa huwa possibbli s-sena kollha. Biex iżżid il-ġerminazzjoni taż-żrieragħ, l-ewwel għandek tpoġġihom fil-frizja għal tliet ġimgħat. Imbagħad hallihom jixxarrbu fl-ilma f'temperatura tal-kamra għal 24 siegħa oħra. Aghfas iż-żrieragħ fit fil-ħamrija tal-qsari niedja u għattihom biss ħafif bil-ħamrija tal-qsari. Għatti l-bastiment tal-kultura b'cling film, li inti tipprovi d'toqob. Dan jipproteġi l-ħamrija milli tinxf. Għandek tneħħi l-fojl għal sagħtejn kull jumejn jew tlett ijiem. Dan jipprevjeni l-iffurmar tal-moffa fuq il-ħamrija li qed tikber. Poġġi l-borma taż-żerriegħa f'post ħafif u shun b'madwar 20° Celsius u żomm il-ħamrija tal-qsari niedja izda mhux imxarra. L-ewwel nebbieta jidhru wara erba 'sa tmien ġimgħat. Mill-mod: Is-sistema ta 'l-għeruq ta' l-aggru ahmar hija baxxa hafna. Diġà fin-nebbieta, wara ħames centimetri ta 'tkabbir vertikali, l-għerq jitgħawweg lejn il-ġenb. **L-aħjar post:** L-aggru ahmar tiegħek se japprezza post qawwi u xemxi. Post bi dell ħafif huwa wkoll possibbli - madankollu, il-kuluri inkomparabbli tal-ħarifa huma l-aħjar espressi f'post fix-xemx shiħ. Anke l-pjanti żgħar jikbru pjuttost malajr. **Kura ottimali:** Is-sistema ta 'l-għeruq ta' l-aggru ahmar tlaħħaq tajjeb ma 'kundizzjonijiet differenti tal-ħamrija u titollera postijiet kemm niexxa kif ukoll friska niedja jew imxarra. Anke l-għeruq ta 'l-sigar akbar bilkemm jilħqu fond ta' aktar minn 35 centimetru qabel ma jinfirxu 'l bogħod hafna. **Fix-xitwa:** Il-weraq qawwi tal-ħarifa jintrema tard hafna. Is-sigra titollera anki l-aktar kundizzjonijiet horox tal-ġlata sa -30 ° Celsius mingħajr problemi. Madankollu, hija pperikolata mill-ġlata tard meta tkun żgħira u għalhekk għandha tkun protetta kemmxajn billi jingabru weraq.



Rode Esdoorn

Acer rubrum

Snelgroeïend en winterhard - met een vuurrode herfstkleur!

De rode esdoorn is bijzonder kleurrijk als hij alleen staat en ontwikkelt een mooie ovale kroon. Snelgroeïend met wel 60 centimeter per jaar, bereikt een hoogte van wel 12 meter en brengt een stukje nazomer in eigen tuin dankzij de vuurrode herfstkleur die vroeg intrekt. De kleine, bronskleurige bladeren zijn bij het ontkiemen over het algemeen vijflobbig en ongeveer 10 centimeter lang. Zelfs heel jonge bomen bloeien voordat de bladeren schieten. De rode bloemen staan dan op de slanke stelen in dichte bloeiwijzen en geven een licht honingachtige geur af. Overigens maakt de rode esdoorn deel uit van de Canadese vlag. - **VLAG AFBELDING** **Natuurlijke locatie:** Het huis van de rode esdoorn bevindt zich voornamelijk in het oosten van Noord-Amerika, van de Atlantische kust over de Appalachen tot aan de rand van de prairie. **Succesvolle teelt:** Binnen weken uit zaden is het hele jaar mogelijk. Om de kiemkracht van de zaden te vergroten, moet je ze eerst drie weken in de vriezer leggen. Laat ze vervolgens nog eens 24 uur in water van kamertemperatuur weken. Druk de zaden een beetje in vochtige potgrond en bedek ze slechts licht met het groeistruaat. Dek de kweekbak af met vershoudfolie, die u van gaten heeft voorzien. Dit beschermt de aarde tegen uitdroging. Om de twee tot drie dagen moet u de film gedurende 2 uur verwijderen. Dit voorkomt schimmelvorming op de teeltgrond. Zet de kweekbak op een lichte en warme plaats met circa 20 ° Celsius en houd de kweekgrond vochtig, maar niet nat. De eerste zaailingen verschijnen na vier tot acht weken. Trouwens: Het wortelstelsel van de rode esdoorn is erg ondiep. Zelfs bij de zaailingen buigt de wortel zijwaarts na vijf centimeter verticale groei. **De beste locatie:** Je rode esdoorn zal je dankbaar zijn voor een heldere, zonnige plek. Een standplaats met lichte schaduw is ook mogelijk, maar de onvergelijkbare herfstkleur komt het best tot uiting op een volledig zonnige standplaats. Zelfs de jonge planten groeien vrij snel. **Optimale verzorging:** Het wortelsysteem van de rode esdoorn kan goed omgaan met verschillende bodemomstandigheden en verdraagt zowel droogte als verse, vochtige of natte locaties. Zelfs de wortels van grotere bomen bereiken amper een diepte van meer dan 35 centimeter voordat ze zich heel ver verspreiden. **In de winter:** De gloeiende herfstbladeren worden pas laat afgeworpen. De boom verdraagt zelfs de meest extreme vorst tot -30 ° Celsius zonder problemen. Het wordt echter bedreigd door late vorst in de jeugdfase en moet daarom een beetje worden beschermd door ophoping van bladeren.



Rød lønn

Acer rubrum

Hurtigvoksende og hardfør - med flammerøde høstfarger!

Den røde lønnen er spesielt enslig, en fargestråle og utvikler en vakker oval krone. Den vokser raskt med opptil 60 centimeter per år, når en høyde på opptil 12 meter og bringer et snev av indisk sommer til din egen hage med sin tidlige, flammerøde høstfarge. De små, bronsefargede bladene er vanligvis femfagede og omtrent 10 centimeter lange. Selv svært unge trær blomstrer før bladene spirer. De røde blomstene står da på de slanke stilkene i tette blomsterstander og utstråler en litt honningaktig duft. Den røde lønnen er forøvrig en del av det kanadiske flagget. - **FLAGGBILDE** **Naturlig beliggenhet:** Hjemmet til den røde lønnen er hovedsakelig i det østlige Nord-Amerika, fra Atlanterhavsysten til Appalachian-fjellene til kanten av prærien. **Vellykket dyrking:** Å dyrke fra frø innendørs er mulig hele året. For å øke spireevnen til frøene bør du først legge dem i fryseren i tre uker. La dem så trekke i vann i romtemperatur i ytterligere 24 timer. Press frøene litt ned i fuktig pottejord og dekk dem bare lett med pottejorda. Dekk kulturkaret med matfilm, som du forsyner med hull. Dette beskytter jorda mot å tørke ut. Du bør fjerne folien i 2 timer annenhver til tredje dag. Dette forhindrer at det dannes mugg på den voksende jorda. Sett frøpotten på et lett og varmt sted med rundt 20° Celsius og hold pottejorda fuktig, men ikke våt. De første frøplantene vises etter fire til åtte uker. Forresten: Rotsystemet til den røde lønnen er veldig grunt. Allerede i frøplantene, etter fem centimeter vertikal vekst, krummer roten seg sidelengs. **Den beste beliggenheten:** Den røde lønnen din vil sette pris på et lyst, solrikt sted. En plassering med lett skygge er også mulig - men de uforlignelige høstfargene kommer best til uttrykk på en plassering i full sol. Selv de unge plantene vokser ganske raskt. **Optimal omsorg:** Rotsystemet til den røde lønnen takler forskjellige jordforhold og tåler både tørre og nyfukte eller våte steder. Selv røttene til større trær når knapt en dybde på mer enn 35 centimeter før de sprer seg veldig langt. **Om vinteren:** De lyse høstløvet feller veldig sent. Treer tåler selv de hardeste frostforholdene ned til -30° Celsius uten problemer. Den er imidlertid truet av sen frost som ung og bør derfor beskyttes noe ved å hope seg opp løv.



Klon Czerwony

Acer rubrum

Szybko rosnąca i wytrzymała - o ognistoczerwonym kolorze jesieni!

Klon czerwony naprawdę okazuje się korzystny dzięki wspaniałej owalnej koronie i wspaniałej kolorystyce, gdy jest uprawiany jako roślina samotna. Rośnie szybko, osiąga do 60 cm rocznie i osiąga do 12 metrów wysokości. Dzięki ognistej czerwieni jesienią czerwony klon wnosi do ogrodu kawałek indyjskiego lata. Jej małe i początkowo brązowe liście są zasadniczo pięciopłatkowe i osiągają do 10 cm wielkości. Nawet młode drzewa kwitną wcześniej, zanim uformują się liście, z czerwonymi kwiatami, które pojawiają się z grubymi kwiatostanami na długich łodygach i wydychają lekki miodowy zapach. Nawiasem mówiąc, ulrop z czerwonego klonu jest pokazany na kanadyjskim banerze. **Naturalne położenie:** Klon czerwony występuje głównie we wschodniej Ameryce Północnej, od wybrzeża Atlantyku po Appalache, aż po równiny. **Udana uprawa:** Rozmnażanie nasion w pomieszczeniach jest możliwe przez cały rok. Aby zwiększyć zdolność kiełkowania, należy początkowo przechowywać nasiona przez około trzy tygodnie w zamrażarce, a następnie umieścić je na kolejne 24 godziny w ciepłej wodzie w celu zaprawy. Delikatnie wciśnij nasiona do wilgotnego kompostu doniczkowego, nałóż niewielką ilość ziemi kompostowej i przykryj pojemnik na nasiona przezroczystą folią, aby zapobiec wysychaniu ziemi. Nie zapomnij zrobić dziur w przezroczystej folii i zdejmuj ją co drugi lub trzeci dzień na około 2 godziny. W ten sposób unikniesz tworzenia się pleśni na komposcie doniczkowym. Umieść pojemnik na nasiona w miejscu jasnym i ciepłym o temperaturze około 20 ° Celsjusza i utrzymuj ziemię wilgotną, ale nie mokrą. Pierwsze sadzonki pojawiają się po czterech do ośmiu tygodniach. Tak poza tym: **Najlepsza lokalizacja:** Klon czerwony preferuje jasne i słoneczne miejsce. Możliwe jest również miejsce lekko zacienione - jednak wspaniała kolorystyka jesienią prezentuje się w miejscach w pełni nasłonecznionych. Nawet młode rośliny rosną dość szybko. **Optymalna pielęgnacja:** Ukorzenienie klonu czerwonego z łatwością radzi sobie z większością gleb i toleruje zarówno suche, jak i wilgotne, a nawet mokre siedliska. Nawet korzenie dojrzałych drzew nie sięgają głębiej niż 35 cm, ale zamiast tego rosną szeroko. **W zimę:** Liście jesienne liście wypadają dość późno. Drzewo jest całkowicie mrozoodporne nawet do -30 ° Celsjusza. Jednak w pierwszych latach życia może być wrażliwy na późne przymrozki, dlatego należy go chronić, uzimając część liści.



Bordo vermelho

Acer rubrum

De crescimento rápido e resistente - com cores de outono vermelho chama!

O bordo vermelho é particularmente solitário, uma explosão de cores e desenvolve uma bela coroa oval. De crescimento rápido de até 60 centímetros por ano, atinge uma altura de até 12 metros e traz um toque de verão indiano ao seu próprio jardim com sua cor vermelha de outono precoce. Suas pequenas folhas cor de bronze são geralmente de cinco lóbulos e cerca de 10 centímetros de comprimento. Mesmo as árvores muito jovens florescem antes que as folhas brotem. As flores vermelhas ficam então nas hastas delgadas em inflorescências densas e exalam um aroma ligeiramente semelhante ao mel. Aliás, o red maple faz parte da bandeira canadense. - **IMAGEM DA BANDEIRA** **Localização natural:** A casa do bordo vermelho é principalmente no leste da América do Norte, desde a costa atlântica até as montanhas Apalaches até a borda da pradaria. **Cultivo bem sucedido:** Cultivar a partir de sementes dentro de casa é possível durante todo o ano. Para aumentar a germinação das sementes, você deve primeiro colocá-las no freezer por três semanas. Em seguida, deixe-os de molho em água em temperatura ambiente por mais 24 horas. Pressione as sementes levemente no solo úmido e cubra-as apenas levemente com o solo. Cubra o recipiente de cultura com filme plástico, que você fornece com furos. Isso protege o solo de secar. Você deve remover o papel alumínio por 2 horas a cada dois ou três dias. Isso evita a formação de mofo no solo em crescimento. Coloque o vaso de sementes em um local claro e quente com cerca de 20° Celsius e mantenha o solo do vaso úmido, mas não molhado. As primeiras mudas aparecem após quatro a oito semanas. Por falar nisso: O sistema radicular do bordo vermelho é muito raso. Já nas mudas, após cinco centímetros de crescimento vertical, a raiz se curva para o lado. **A melhor localização:** Seu bordo vermelho apreciará um local claro e ensolarado. Um local com sombra clara também é possível - no entanto, as incomparáveis cores do outono são melhor expressas em um local com sol pleno. Mesmo as plantas jovens crescem muito rapidamente. **Cuidado ideal:** O sistema radicular do bordo vermelho lida bem com diferentes condições de solo e tolera locais secos e úmidos ou úmidos. Mesmo as raízes das árvores maiores dificilmente atingem uma profundidade de mais de 35 centímetros antes de se espalharem muito longe. **No inverno:** As folhas brilhantes do outono caem muito tarde. A árvore tolera até mesmo as condições de geada mais severas até -30° Celsius sem problemas. No entanto, está em perigo de geada tardia quando jovem e, portanto, deve ser protegido um pouco pelo acúmulo de folhas.



Arțar Roșu

Acer rubrum

Creștere rapidă și rezistentă - cu o culoare de toamnă roșie-flacără!

Arțarul roșu este deosebit de colorat atunci când stă singur și dezvoltă o frumoasă coroană ovală. În creștere rapidă, cu până la 60 de centimetri pe an, atinge o înălțime de până la 12 metri și aduce o bucată de vară indiană în propria grădină datorită culorii sale roșii de toamnă, care se instalează devreme. Frunzele sale mici, de culoare bronz, la înmugurire, sunt în general cu cinci lobi și înălțime de aproximativ 10 centimetri. Chiar și copacii foarte tineri înfloresc înainte ca frunzele să tragă. Florile roșii sunt apoi pe tulpini subțiri în inflorescențe dense și emană un miros ușor asemănător mierii. De altfel, arțarul roșu face parte din steagul canadian. - **IMAGINE FLAG** **Locație naturală:** Locuința arțarului roșu se află în principal în estul Americii de Nord, de la coasta Atlanticului peste Apalachi până la marginea preriei. **Cultivare de succes:** Cultivarea din semințe în interior este posibilă pe tot parcursul anului. Pentru a crește germinabilitatea semințelor, ar trebui să le puneți mai întâi într-un congelator timp de trei săptămâni. Apoi lăsați-i să se înmoaie în apă la temperatura camerei încă 24 de ore. Apăsăți puțin semințele în sol umed de ghiveci și acoperiți-le doar ușor cu mediul de creștere. Acoperiți vasul de cultivare cu folie alimentară, pe care ați prevăzut-o cu găuri. Acest lucru protejează pământul de uscare. La fiecare două până la trei zile ar trebui să îndepărtați filmul timp de 2 ore. Acest lucru previne formarea mușgaiului pe solul de cultivare. Așezați vasul de cultivare într-un loc luminos și cald, cu aproximativ 20 ° Celsius și mențineți solul de cultivare umed, dar nu umed. Primele răsaduri apar după patru până la opt săptămâni. Apropo: Sistemul rădăcină al arțarului roșu este foarte superficial. Chiar și cu răsaduri, rădăcina se curbează lateral după cinci centimetri de creștere verticală. **Cea mai bună locație:** Arțarul roșu vă va fi recunoscător pentru un loc luminos și însorit. Este posibilă și o locație cu umbră deschisă - totuși, culoarea toamnei incomparabilă este exprimată cel mai bine într-o locație complet însorită. Chiar și plantele tinere cresc destul de repede. **Îngrijire optimă:** Sistemul de rădăcină al arțarului roșu se descurcă bine cu diferite condiții ale solului și tolerează atât seceta, cât și locurile proaspete, umede sau umede. Chiar și rădăcinile copacilor mari mari abia ajung la o adâncime de peste 35 de centimetri înainte să se răspândească foarte departe. **În iarnă:** Frunzele strălucitoare de toamnă sunt aruncate doar foarte târziu. Arborele tolerează chiar și cele mai dure condiții de îngheț până la -30 ° Celsius fără probleme. Cu toate acestea, este pus în pericol de înghețul târziu în etapa de tineret și, prin urmare, ar trebui protejat puțin prin îngrămădirea frunzelor.



Röd Lönn

Acer rubrum

Snabbväxande och hårdig - med en flamröd höstfärg!

Den röda lönnen är särskilt färgstark när man står ensam och utvecklar en vacker oval krona. Den växer snabbt med upp till 60 centimeter per år och når en höjd på upp till 12 meter och ger en bit indisk sommar in i din egen trädgård tack vare den flamröda höstfärgen som börjar tidigt. De små, bronsfärgade bladen när de spirar är i allmänhet femflikiga och cirka 10 centimeter långa. Även mycket unga träd blommar innan bladen skjuter. De röda blommorna är sedan på de smala stjälkarna i täta blomställningar och ger en lite honungsliknande doft. Förresten är den röda lönnen en del av den kanadensiska flaggan. - **FLAGGA DESIGN** **Naturligt läge:** Hemmet för den röda lönnen är främst i östra Nordamerika, från Atlantkusten över Appalachians till kanten av prärien. **Framgångsrik odling:** Att odla från frön inomhus är möjligt året runt. För att öka fröns grobarhet bör du först lägga dem i en frys i tre veckor. Låt dem sedan suga i vatten vid rumstemperatur i ytterligare 24 timmar. Pressa fröna lite i fuktig krukväxt och täck dem bara lätt med odlingsmediet. Täck odlingskärlet med plastfolie, som du har försett med hål. Detta skyddar jorden från att torka ut. Varannan till var tredje dag ska du ta bort filmen i två timmar. Detta förhindrar att mögel bildas på odlingsjorden. Placera odlingskärlet på en ljus och varm plats med cirka 20 ° Celsius och håll odlingsjorden fuktig men inte våt. De första plantorna dyker upp efter fyra till åtta veckor. Förresten: Rotsystemet på den röda lönnen är mycket grunt. Även med plantorna, rotar roten i sidled efter fem centimeter vertikal tillväxt. **Den bästa platsen:** Din röda lönn kommer att vara tacksam för en ljus, solig plats. En plats med ljus nyans är också möjlig - den ojämförliga höstfärgen uttrycks dock bäst i ett helt soligt läge. Även de unga växterna växer ganska snabbt. **Optimal vård:** Rotsystemet på den röda lönnen klarar olika markförhållanden och tål både torka och fräscha, fuktiga eller våta platser. Till och med rötterna till större träd når knappast ett djup på mer än 35 centimeter innan de sprids mycket långt. **På vintern:** De glödande höstbladen kastas först mycket sent. Trädet tål även de hårdaste frostförhållandena ner till -30 ° C utan problem. Det är dock hotat av sen frost i ungdomsskedet och bör därför skyddas lite genom att stapla upp löv.



Červený javor

Acer rubrum

Rýchlo rastúce a odolné - s ohnivočervenými jesennými farbami!

Červený javor je obzvlášť osamělý, má žiarivú farbu a vytvára krásnu oválnu korunu. Rýchlo rastie až do 60 centimetrov za rok, dorastá do výšky až 12 metrov a prináša do vašej záhrady nádych babieho leta svojom skorým nástupom, ohnivočervenou jesennou farbou. Jeho malé, bronzovo sfarbené listy sú zvyčajne päťlaločné a dlhé asi 10 centimetrov. Dokonca aj veľmi mladé stromy kvitnú skôr, ako vyrašia listy. Červené kvety potom stoja na štíhlych stonkách v hustých súkvetiach a vyžarujú jemne medovú vôňu. Mimochodom, červený javor je súčasťou kanadskej vlajky. - **OBRÁZOK VLAJKY** **Prirodzená poloha:** Domov javora červeného je najmä vo východnej časti Severnej Ameriky, od pobrežia Atlantiku cez Apalačské pohorie až po okraj prerie. **Úspešná kultivácia:** Pestovanie zo semien v interiéri je možné po celý rok. Aby ste zvýšili klíčivosť semien, mali by ste ich najskôr umiestniť na tri týždne do mrazničky. Potom ich nechajte namočiť vo vode pri izbovej teplote ďalších 24 hodín. Semená mierne zatlačte do vlhkej zeminy a len zľahka ich zasypete zeminou. Kultivačnú nádobu prikryte potravinovou fóliou, ktorú opatríte otvormi. To chráni pôdu pred vysychaním. Fóliu by ste mali odstraňovať na 2 hodiny každé dva až tri dni. To zabráňuje tvorbe plesní na rastúcej pôde. Črepník umiestnite na svetlé a teplé miesto s teplotou okolo 20 ° Celzia a zeminu udržiavajte vlhkú, ale nie mokrú. Prvé sadenice sa objavia po štyroch až ôsmich týždňoch. Mimochodom: Koreňový systém javora červeného je veľmi plytký. Už v semenákoch sa po piatich centimetroch vertikálneho rastu koreň zakriví nabok. **Najlepšie umiestnenie:** Váš červený javor ocení svetlé slnečné miesto. Možno je aj stanovište so svetlým tieňom - neporovnateľné jesenné farby však najlepšie vystihnú lokalita na plnom slnku. Dokonca aj mladé rastliny rastú pomerne rýchlo. **Optimálna starostlivosť:** Koreňový systém javora červeného sa dobre vyrovnáva s rôznymi pôdnymi podmienkami a znáša suché aj čerstvo vlhké či vlhké polohy. Dokonca aj korene väčších stromov sotva siahajú do hĺbky viac ako 35 centimetrov, kým sa nerozšíria veľmi ďaleko. **V zime:** Svetlé jesenné listie opadáva veľmi neskoro. Strom bez problémov znáša aj najtvrdšie mrazy do -30 ° Celzia. V mladosti ju však ohrozujú neskoré mrazy, a preto ju treba trochu chrániť hromadením listov.



Rdeči javor

Acer rubrum

Hitro rastoč in odporen - z ognjeno rdečimi jesenskimi barvami!

Rdeči javor je še posebej samoten, bleščeče barve in razvije lepo ovalno krošnjo. Hitro raste z do 60 centimetri na leto, doseže višino do 12 metrov in s svojo zgodnjo jesensko ognjeno rdečo barvo v vaš vrt vnese pridih indijskega poletja. Njegovi majhni, bronasto obarvani listi so običajno petkrpati in dolgi približno 10 centimetrov. Tudi zelo mlada drevesa zacvetijo, preden poženejo listi. Rdeči cvetovi takrat stojijo na vitkih steblih v gostih socvetjih in oddajajo rahlo meden vonj. Mimogrede, rdeči javor je del kanadske zastave. - **SLIKA ZASTAVE** **Naravni habitat:** Dom rdečega javorja je predvsem v vzhodni Severni Ameriki, od atlantske obale do apalaškega gorovja do roba prerie. **Navodila za gojenje:** Gojenje iz semen v zaprtih prostorih je možno vse leto. Da bi povečali kalivost semen, jih najprej za tri tedne postavite v zamrzovalnik. Nato jih pustimo še 24 ur namakati v vodi pri sobni temperaturi. Semena rahlo potisnite v vlažno zemljo za lončke in jih le rahlo prekrijte z zemljo za lončke. Posodo z kulturo pokrijte s folijo za živila, ki jo opremite z luknjami. To ščiti tla pred izsušitvijo. Vsake dva do tri dni za 2 uri odstranite folijo. S tem preprečimo nastanek plesni na rastni zemlji. Lonček s semeni postavite na svetlo in toplo mesto s približno 20 ° C, zemlja v lončku pa naj bo vlažna, a ne mokra. Prve sadike se pojavijo po štirih do osmih tednih. Mimogrede: Koreninski sistem rdečega javorja je zelo plitek. Že pri sadiki se po petih centimetrih navpične rasti korenina zakrivi vstran. **Najboljša lokacija:** Váš rdeči javor bo cenil svetlo, sončno mesto. Možna je tudi lega s svetlo senco - vendar pa neprimerljive jesenske barve najbolje pridejo do izraza na legi na polnem soncu. Tudi mlade rastline rastejo zelo hitro. **Optimalna nega:** Koreninski sistem rdečega javorja se dobro spopada z različnimi pogoji tal in prenaša tako suhe kot sveže vlažne ali mokre lege. Tudi korenine večjih dreves komaj dosežejo globino več kot 35 centimetrov, preden se razširijo zelo daleč. **V zimskem času:** Svetlo jesensko listje odpade zelo pozno. Drevo brez težav prenaša tudi najhujšo zmrzal do -30°C. Vendar jo v mladosti ogroža pozna pozeba, zato jo je treba nekoliko zaščititi z nabiranjem listov.



Arce rojo

Acer rubrum

De crecimiento rápido y tolerante a heladas - con hojas de color rojo vivo en otoño

El arce rojo cuando se cultiva en solitario es particularmente impresionante por su hermoso colorido y el desarrollo de su preciosa corona oval. El arce rojo es de rápido crecimiento, de hasta 60 centímetros por año y alcanza una altura de hasta 12 metros. El cambio de colorido de las hojas a rojo vivo a comienzos de otoño, trae un poco de veranillo al jardín. Cuando Las hojas brotan son de color bronce y generalmente son de cinco lóbulos y unos 10 centímetros de tamaño. Incluso los árboles jóvenes florecen antes que las hojas broten. Las flores rojas brotan en los tallos delgados en densas inflorescencias y emiten una fragancia ligeramente similar a miel. El arce rojo forma parte de la bandera canadiense. **Ubicación natural:** El origen del arce rojo es principalmente el este de América del Norte, desde la costa atlántica a través de los Apalaches, hasta el borde de la pradera. **Cultivo exitoso:** La semilla se puede criar en interior durante todo el año. Mantenga las semillas durante 3 semanas en el congelador y después durante 24 horas en agua a temperatura ambiente, para hidratarlas y aumentar la germinación de las mismas. Presione las semillas un poco sobre sustrato húmedo y cúbralas ligeramente con el mismo sustrato. Cubra el recipiente de cultivo con un film transparente y agujeréelo. Así protegerá la tierra de la desecación. Para evitar la putrefacción del sustrato retire el film cada dos o tres días durante 2 horas. Coloque el recipiente de cultivo en un lugar luminoso y cálido a 20 grados y mantenga el sustrato húmedo, pero no mojado. La germinación tardará entre cuatro y ocho semanas. Por cierto, el sistema de raíces es muy débil. Incluso la raíz de los plantones ya se tuerce vertical cuando alcanza los 5 centímetros de profundidad. **La mejor ubicación:** El arce rojo agradece un lugar luminoso y soleado. Un sitio con un poco de sombra también es posible. Sin embargo, los colores incomparables en otoño se forman especialmente en lugares a pleno sol. Incluso las plantas jóvenes crecen rápidamente. **Cuidado óptimo:** El sistema radicular del arce rojo se forma bien con diferentes condiciones de suelo, tolera la sequía, así como lugares húmedos o mojados. Las raíces de los árboles más grandes alcanzan poco más de 35 centímetros de profundidad, pero se propagan a lo ancho muy lejos. **En el invierno:** La caída del follaje brillante se produce muy tarde. El árbol tolera incluso las más duras condiciones de frío hasta -30 grados sin problemas. Sin embargo, como planta joven es sensible a heladas tardías y debe ser protegido ante las mismas con follaje apilado.



Červený javor

Acer rubrum

Rychle rostoucí a odolné - s plamenně červenými podzimními barvami!

Červený javor je zvláště osamělý, má zářivou barvu a má krásnou oválnou korunu. Rychle roste až do 60 centimetrů za rok, dosahuje výšky až 12 metrů a přináší do vaší zahrady nádech babího léta svým raným nástupem, ohnivě červenou podzimní barvou. Jeho malé, bronzově zbarvené listy jsou obvykle pětilaločné a dlouhé asi 10 centimetrů. I velmi mladé stromy kvetou dřívě, než vyraší listy. Červené květy pak stojí na štíhlých stoncích v hustých květenstvích a vydávají lehké medovou vůni. Červený javor je mimochodem součástí kanadské vlajky. - **OBRÁZEK VLAJKY** **Přirozená poloha:** Domov javoru červeného je především na východě Severní Ameriky, od pobřeží Atlantiku přes Apalačské pohorí až po okraj prerie. **Úspěšné pěstování:** Pěstování ze semenek v interiéru je možné po celý rok. Chcete-li zvýšit klíčivost semen, měli byste je nejprve umístit do mrazáku na tři týdny. Poté je nechte dalších 24 hodin máčet ve vodě pokojové teploty. Semínka mírně zatlačte do vlhké zeminy a jen lehce je zasypete zeminou. Kultivační nádobu zakryjte potravinářskou fólií, kterou opatříte otvory. To chrání půdu před vysycháním. Fólii byste měli odstraňovat na 2 hodiny každé dva až tři dny. Tím se zabrání tvorbě plísni na rostoucí půdě. Umístěte květináč na světlé a teplé místo s teplotou kolem 20 °C a udržujte půdu v květináči vlhkou, ale ne mokrou. První sazenice se objevují po čtyřech až osmi týdnech. Mimochodem: Kořenový systém javoru červeného je velmi mělký. Již u sazenic se po pěti centimetrech vertikálního růstu kořen zakřívuje do stran. **Nejlepší umístění:** Váš červený javor ocení světlé, slunné místo. Možné je i stanoviště se světlým stínem - nesrovnatelné podzimní barvy však nejlépe vystihují stanoviště na plném slunci. Dokonce i mladé rostliny rostou poměrně rychle. **Optimální péče:** Kořenový systém javoru červeného se dobře vyrovnává s různými půdními podmínkami a snáší suché i čerstvě vlhké nebo vlhké polohy. I kořeny větších stromů stěží dosahují hloubky větší než 35 centimetrů, než se rozšíří velmi daleko. **V zimě:** Jasně podzimní listí opadáva velmi pozdě. Strom bez problémů snáší i ty nejtvrdší mrazy do -30° Celsia. V mládí ji však ohrožuje pozdní mraz, a proto je třeba ji trochu chránit kupením listů.



Kırmızı akçaağaç

Acer rubrum

Hızlı büyüyen ve dayanıklı - alev kırmızısı sonbahar renkleri ile!

Kırmızı akçaağaç özellikle yalnızdır, bir renk parlıtıdır ve güzel bir oval taç geliştirir. Yılda 60 santimetreye kadar hızla büyüyen, 12 metre yüksekliğe ulaşan ve erken başlayan, alev kırmızısı sonbahar rengiyle kendi bahçenize Kızılderili Yazının dokunuşunu getiriyor. Küçük, bronz renkli yaprakları genellikle beş lobludur ve yaklaşık 10 cm uzunluğundadır. Çok genç ağaçlar bile yapraklar filizlenmeden çiçek açar. Kırmızı çiçekler daha sonra yoğun çiçek salkımlarında ince sapların üzerinde durur ve hafif bal benzeri bir koku yayar. Bu arada, kırmızı akçaağaç Kanada bayrağının bir parçasıdır. - **BAYRAK GÖRÜNTÜSÜ** **Doğal konum:** Kırmızı akçaağacın anavatanı, Atlantik kıyılarından Appalachian Dağları'na ve bozkırların kenarına kadar, esas olarak Kuzey Amerika'nın doğusundadır. **Başarılı yetiştirme:** İç mekanlarda tohumlardan büyüme tüm yıl boyunca mümkündür. Tohumların çimlenmesini artırmak için önce üç hafta boyunca dondurucuya koymalısınız. Daha sonra 24 saat daha oda sıcaklığında suda bekletin. Tohumları nemli sakı toprağına hafifçe bastırın ve sakı toprağı ile üzerlerini sadece hafifçe örtün. Kültür kabının üzerini delikler açtığınız streç film ile kapatın. Bu, toprağın kurumasını önler. Folyoyu her iki ila üç günde bir 2 saat çıkarmalısınız. Bu, büyüyen toprakta küf oluşumunu önler. Tohum sakısını yaklaşık 20° Santigrat ile hafif ve sıcak bir yere koyun ve sakı toprağını nemli tutun ama ıslak tutmayın. İlk fideler dört ila sekiz hafta sonra ortaya çıkar. Bu arada: Kırmızı akçaağacın kök sistemi çok sığdır. Zaten fidelerde, beş santimetre dikey büyümeden sonra kök yana doğru kıvrılır. **En iyi konum:** Kırmızı akçaağacınız parlak, güneşli bir yeri takdir edecektir. Açık gölgeli bir konum da mümkündür - ancak, eşsiz sonbahar renkleri en iyi şekilde tam güneş alan bir konumda ifade edilir. Genç bitkiler bile oldukça hızlı büyür. **Optimum bakım:** Kırmızı akçaağacın kök sistemi, farklı toprak koşullarıyla iyi başa çıkar ve hem kuru hem de taze nemli veya ıslak yerleri tolere eder. Daha büyük ağaçların kökleri bile çok uzağa yayılmadan önce 35 santimetreden fazla derinliğe ulaşır. **Kışın:** Parlak sonbahar yaprakları çok geç dökülür. Ağaç, -30°C'ye kadar olan en sert don koşullarını bile sorunsuz bir şekilde tolere eder. Bununla birlikte, gençken geç don nedeniyle tehlike altındadır ve bu nedenle yaprakların üst üste yığılmasıyla bir şekilde korunmalıdır.



Vörös juhar

Acer rubrum

Gyorsan növé és szívs - lángvörös őszi színekkell!

A vörös juhar különösen magányos, színes, és gyönyörű ovális koronát fejleszt. Gyorsan növekszik, akár évi 60 centiméteres, akár 12 méteres magasságot is elér, és korán kezdődő, lángvörös őszi színevel az indián nyár illatát hozza el saját kertjébe. Apró, bronzszínű levelei általában ötkaréjosak és körülbelül 10 centiméter hosszúak. Még a nagyon fiatal fák is virágoznak, mielőtt a levelek kihajtanak. A vörös virágok ezután a karcsú száron sűrű virágzatban állnak, és enyhén mézszzerű illatot árasztanak. A vörös juhar egyébként a kanadai zászló része. - **ZÁSZLÓ KÉP** **Természetes elhelyezkedés:** A vörös juhar főként Észak-Amerika keleti részén található, az Atlanti-óceán partjától az Appalache-hegységen át a préri széléig. **Sikeres termesztés:** A beltéri magvak termesztése egész évben lehetséges. A magvak csírázásának fokozása érdekében először három hétre fagyasztóba kell helyezni. Ezután hagyja őket szobahőmérsékleten vízben ázni további 24 órán át. Enyhén nyomja a magokat a nedves virágföldbe, és csak enyhén takarja be őket a virágfölddel. Fedje le a tenyészedényt ragasztó fóliával, amelyet lyukakkal lát el. Ez megvédi a talajt a kiszáradástól. A fóliát két-három naponta 2 órára le kell venni. Ez megakadályozza a penészképződést a növekvő talajon. Helyezze a magcserepet világos és meleg, körülbelül 20 °C-os helyre, és tartsa a virágföldet nedvesen, de ne nedvesen. Az első palánták négy-nyolc hét után jelennek meg. Mellesleg: A vörös juhar gyökérrendszere nagyon sekély. Már a palántákban öt centiméter függőleges növekedés után a gyökér oldalra görbül. **A legjobb hely:** A vörös juhar értékelni fogja a világos, napos helyet. Világos árnyalatú helyszín is lehetséges - azonban a páratlan őszi színek legjobban a teljes napsütéses helyen jelennek meg. Még a fiatal növények is elég gyorsan nőnek. **Optimális gondozás:** A vörös juhar gyökérrendszere jól megbirkózik a különböző talajviszonyokkal, és elviseli mind a száraz, mind a frissen nedves vagy nedves helyeket. Még a nagyobb fák gyökerei sem érnek el 35 centiméternél nagyobb mélységet, mielőtt nagyon messzire elterjednének. **Télen:** A fényes őszi levelek nagyon későn hullanak le. A fa a legkeményebb fagyot is gond nélkül tolerálja -30°C-ig. Fiatalon azonban veszélyeztetni a késői fagy, ezért némileg védeni kell levelek felhalmozásával.

: : : : :



ベニカエデ

Acer rubrum

速い成長と耐寒性 - 燃えるような秋の紅葉

孤立した状態で栽培することが、楕円形の樹冠と素晴らしい色彩を得る利点となります。成長が速く年間で60cm伸び、最大で12mの高さまで成長します。秋には素晴らしい赤の色彩で、あなたの庭に小春日和のような雰囲気を与えてくれます。初期の青銅色の小さな葉は、基本的に5つの裂片があり最大10cmの大きさです。若い苗木でも、長い茎についた太い花序に蜂蜜のような香りを持つ赤い花を咲かせます。ベニカエデはカナダの旗印でもあります。

自然な場所: 生息地は大西洋沿岸からアパラチア山脈平の野に至るまで、北アメリカ東部を中心に分布しています。

栽培成功:

種子繁殖は室内で年間を通して可能です。発芽率を高めるために、最初に種を冷凍庫で3週間保管し、その後、温水に24時間浸します。湿った用土に種を軽く押し込み、その上から少量の用土をかぶせます。乾燥を防ぐためサランラップなどの透明フィルムでカバーします。透明フィルムには空気穴をいくつかあけ、2~3日に1回は約2時間、完全にフィルムを鉢から外します。そうすることで、カビの発生を防ぎます。20°Cくらいの明るく暖かい場所に置き、用土は湿った状態に保ちます。通常は約4~8週間後に発芽します。根は平坦に広がります；根は5cmの深さに達した後は横に広がります。

最高のロケーション:

明るく日当たりの良い場所を好みます。少々の日陰でも保管できます；日当たりの良い場所に置くことで、素晴らしい紅葉が可能になります。若い苗木でも急速に成長します。

最適なケア:

ほとんどのタイプの土壌に簡単に対応し、湿った場所だけでなく乾燥した場所にも対処します。成熟した樹木の根は35cm以上の深さには伸びず、代わりに横に広く成長します。

冬に:

かなり遅くに、光沢のある紅葉した葉を落とします。マイナス30°Cまでの完全な耐寒性を備えていますが、最初の年は遅霜に備えて、土壌を枝葉などで保護する必要があります。

SKU: 13138 / Rotahorn