

**ČEŠTINA**

PŘÍBALOVÁ INFORMACE – INFORMACE PRO UŽIVATELE

Ponechte si příbalovou informaci pro případ, že si ji budete potřebovat přečíst znovu.

Máte-li jakékoli další otázky, zeptejte se svého lékaře nebo lékárníka.

Používejte v kombinaci s přípravkem R2 v rámci systému R1R2. Není určeno k samostatnému použití.

RADIADERM Chladicí gel s LACTOKINE™ 120 ml (4oz)©

Složení:

Aqua, Milk Protein, Triethanolamine, Glycerin, Phenoxyethanol, Carbomer, Acrylates / C10-30 Alkyl Acrylate Crosspolymer, Disodium EDTA, Ethylhexylglycerin, Sodium Dehydroacetate

R1 je bez parfemace, antioxidanty ani kovy.

CO JE PŘÍPRAVEK R1 Chladicí gel s LACTOKINE™ A K ČEMU SE POUŽÍVÁ?

R1 Chladicí gel s LACTOKINE™ je první krok v dvoufázovém systému určeném pro použití v průběhu a po ukončení radioterapie.

R1 použijte co nejdříve po každé dávce radioterapie

R1 chladí, zmírňuje bolest, hydratuje pokožku a pomáhá zmírnit nežádoucí účinky léčby na pokožku.

**Kontaktujte nás na stránkách:
www.radiaderm.com**

R1: Pokyny k použití

Naneste v silné vrstvě na postižené místo. Nevrtějte do pokožky. Krátce po aplikaci můžete cítit lehké štipání. Gel je neúčinnější, pokud je nanesen v silné vrstvě a ponechán v kontaktu pokožkou po dobu minimálně 20 minut. Případné zbytky gelu lehce setřete.

Upozornění

Přípravek je určen pouze pro zevní použití. Nepoužívejte na otevřené rány. Zabraňte kontaktu s očima. Obsahuje mléčný protein.

R1: Skladování

Skladujte na bezpečném místě mimo dosah dětí. Spotřebujte do data uvedeného na tubě. Uchovávejte při teplotě 15° - 30°C

Pro společnost Radiaderm Ltd vyrábí:

MedicProgress a.s., Hněvotín 588, 783 47
Hněvotín, Česká republika





ČEŠTINA

CZ

PŘÍBALOVÁ INFORMACE – INFORMACE PRO UŽIVATELE

Ponechte si příbalovou informaci pro případ, že si ji budete potřebovat přečíst znovu.

Máte-li jakékoli další otázky, zeptejte se svého lékaře nebo lékárníka.

Používejte v kombinaci s přípravkem R1 v rámci systému R1R2.

Přípravek R2 lze používat i samostatně.

RADIADERM R2 Zklidňující emulze s LACTOKINE™ 120 ml (4oz)^E

Složení:

Aqua, Octocrylene, C12-15 Alkyl Benzoate, Milk Protein, Caprylyl Methicone, Ethylhexyl Methoxycinnamate, Butyl Methoxydibenzoylmethane, Glyceryl Stearate, Zea Mays Starch, Glyceryl Stearate Citrate, Phenoxyethanol, Ammonium Acryloyldimethyltaurate/VP Copolymer, Cetareth-20, Cetearyl Alcohol, Disodium EDTA, Ethylhexylglycerin, Sodium Hydroxide, BHT, Sodium Dehydroacetate

R2 je bez parfemace, antioxidantů ani kovy.

CO JE PŘÍPRAVEK R2 Zklidňující emulze s LACTOKINE™ A K ČEMU SE POUŽÍVÁ?

R2 Zklidňující emulze s LACTOKINE™ představuje druhý krok v dvoufázovém systému určeném pro posílení přirozené obranyschopnosti pokožky, aby dokázala odolat možným nežádoucím účinkům léčby.

R2 emulze zklidňuje, hydratuje a pomáhá udržet elasticitu pokožky, která je poškozena radioterapií a slunečním zářením. R2 rovněž poskytuje ochranu proti UVA a UVB záření, aby se zmírnilo riziko reakce na sluneční záření po léčbě.

R2: Pokyny k použití

Naneste šetrně na poškozenou oblast nejméně 3x denně a před spaním. R2 emulze by se měla jemně vetřít do pokožky. Pokračujte v používání přípravku R2 nejméně 2 týdny po ukončení radioterapie.

Upozornění

Přípravek je určen pouze pro zevní použití. Nepoužívejte na otevřené rány. Zabraňte kontaktu s očima. Obsahuje mléčný protein.

R2: Skladování

Skladujte na bezpečném místě mimo dosah dětí. Spotřebujte do data uvedeného na tubě. Uchovávejte při teplotě 15°- 30°C.

Pro společnost Radiaderm Ltd vyrábí:

MedicProgress a.s., Hněvotín 588, 783 47
Hněvotín, Česká republika

European Patent Number 2964248
US Pat. US61/773,225

