



SAFLAX®



Tips



© Frank Vincentz - CC-BY-SA-3.0

Erythrina crista-galli

	 Български	BG		2		 Malti	MT		5
	 Dansk	DK		2		 Nederlands	NL		5
	 Deutsch	DE		2		 Norsk	NO		6
	 English	UK		2		 Polski	PL		6
	 Eesti	EE		3		 Português	PT		6
	 Suomalainen	FI		3		 Românesc	RO		6
	 Français	FR		3		 Svenska	SE		7
	 Ελληνική	GR		3		 Slovensky	SK		7
	 Gaeilge	IE		4		 Slovenski	SI		7
	 íslenskur	IS		4		 Español	ES		7
	 Italiano	IT		4		 Český	CZ		8
	 Hrvatski	HR		4		 Türkçe	TR		8
	 Latviešu	LV		5		 Magyar	HU		8
	 Lietuvių kalba	LT		5		 日本語	JP		9



Карибски коралов храст

Erythrina crista-galli

Море от пламъци от юни до септември

Националното растение на Аржентина може лесно да се съхранява в кофа, достига идеална височина на саксията от средно 1,50 метра и разгръща море от пламъци с огненочервени перепрудени цветове през лятото от юни до септември. С течение на годините тя развива къс, дебел ствол с дълги, елегантни и често долни клони. В края седят до 25 сантиметра дълги съцветия с многобройни цветя с ширина до 5 сантиметра. През есента издънките изхвърлят листата си и изсъхват далеч назад, което им позволява да бъдат подрязани далеч назад като многогодишно растение. Ботаническото наименование произлиза от цветето, подобно на петълов гребен: erythros (на гръцки за червено) и crista-galli (на латински за петлишки гребен). Внимание: всички части на растението са отровни. **Естествено местоположение:** Кораловият храст е роден в Бразилия, Парагвай, Боливия и Аржентина. Там често расте в галерийни гори по бреговете на реките. Сега се култивира в цял свят като декоративно растение.

Успешно отглеждане: Отглеждането от семена на закрито е възможно през цялата година. До първия цъфтеж обаче са необходими около четири години. Първо поставете семената в съд със стайна топла вода за дванадесет часа, за да набъбнат и по този начин да подобрят покълването. Едва след това го поставете на около един сантиметър дълбочина във влажна почва за отглеждане. Опънете хранително фолио върху съда с култура и пробийте няколко дупки във фолиото. Това предпазва почвата от изсушаване. Трябва да отстранявате фолиото за 2 часа на всеки два до три дни. Това предотвратява образуването на мухъл върху растящата почва. Поставете саксията със семена на светло и топло място с 20 до 25° по Целзий и поддържайте почвата влажна, но не мокра. Обикновено са необходими две до четири седмици, за да покълнат.

Най-добротоместоположение: Тъй като кораловият храст пониква сравнително късно, препоръчително е да го поставите в стаята от март за цъфтеж в началото на лятото. Като контейнерно растение е най-добре да поставите вашия храст на открито на топло, пълно слънце през лятото от средата на май до края на септември. По време на тази фаза на растеж и цъфтеж мястото трябва да е възможно най-слънчево. **Оптимална грижа:** Като контейнерно растение кораловият храст е един от лесните за поддръжка сортове. По време на фазата на растеж и цъфтеж обаче се нуждае от редовна и обилна вода. В горещите дни често трябва да се полива сутрин и вечер. Трябва да го подхранвате с течен тор на всеки две седмици по време на фазата на растеж и всяка седмица по време на фазата на цъфтеж. След цъфтежа намаляете поливането и намаляете поливането до минимум от октомври. Растението се пресажда през пролетта на всеки две до четири години в почва за саксии или смес от половин градинска пръст и компост. Редовно премахвайте изсъхналите съцветия, за да постигнете дълъг цъфтеж на няколко етапа. **През зимата:** През късната есен издънките се отрязват на около 10 см над ствола и кораловият храст презимува най-добре при минимална почвена влага в тъмно помещение без замръзване и температури под 10°C. От март трябва да му дадете по-топло и светло място в стаята за разгонване и бавно да увеличите отново поливането. **Моля, обърнете внимание: семената са отровни!**



Caribisk koralbusk

Erythrina crista-galli

Et hav af flammer fra juni til september

Argentinas nationale plante kan nemt opbevares i en spand, når en ideel pottehøjde på 1,50 meter i gennemsnit og folder et hav af flammer ud med ildrøde sommerfugleblomster om sommeren fra juni til september. Med årene udvikler hun en kort, tyk stamme med lange, elegante og ofte tornede grene. For enden sidder de op til 25 centimeter lange racemes med talrige blomster op til 5 centimeter brede. Om efteråret fælder skuddene deres blade og tørrer langt tilbage, så de kan beskæres langt tilbage som en stau. Det botaniske navn er afledt af den hanekamlignende blomst: erythros (græsk for rød) og crista-galli (latin for hanekam). Advarsel: alle dele af planten er giftige. **Naturlig beliggenhed:** Koralbusken er hjemmehørende i Brasilien, Paraguay, Bolivia og Argentina. Der vokser den ofte i galleriskove på kanten af flodbredder. Den dyrkes nu over hele verden som prydblante. **Succesfuld dyrkning:** Dyrkning fra frø indendørs er muligt hele året rundt. Der går dog omkring fire år til den første blomstring. Læg først frøene i en beholder med stuevarmt vand i tolv timer for at opnå hævelse og dermed forbedret spiring. Først derefter placerer du den cirka en centimeter dybt i fugtig vækstjord. Stræk husholdningsfilm over dyrkningskarret og prik et par huller i filmen. Dette beskytter jorden mod udtørring. Du bør fjerne folien i 2 timer hver anden til tredje dag. Dette forhindrer mug i at dannes på den voksende jord. Stil frøpotten et let og varmt sted med 20 til 25° Celsius og hold pottejorden fugtig, men ikke våd. Det tager normalt to til fire uger at spire. **Den bedste beliggenhed:** Da koralbusken først spirer relativt sent, er det tilrådeligt at køre den frem i rummet fra marts til en tidlig sommerblomstring. Som containerplante er det bedst at placere din busk uendørs i en varm, fuld sol om sommeren fra midten af maj til slutningen af september. I denne vækst- og blomstringsfase skal stedet være så solrigt som muligt. **Optimal pleje:** Som containerplante er koralbusken en af de letplejede sorter. I vækst- og blomstringsfasen har den dog brug for regelmæssigt og rigeligt vand. På varme dage skal den ofte vandes morgen og aften. Du bør fodre den med flydende gødning hver anden uge i vækstfasen og ugentligt i blomstringsfasen. Efter blomstringen skal du reducere vanding og reducere vanding til en minimumsbasislinje fra oktober. Planten ompottes om foråret hvert andet til fjerde år i pottejord eller en blanding af halv havejord og kompost. Fjern jævnligt de visne blomsterstande for at opnå lang blomstring i flere faser. **Om vinteren:** Sidst på efteråret klippes skuddene ca. 10 cm over stammen og koralbusken overvintrer bedst med minimal jordfugtighed i et mørkt frostfrit rum med temperaturer under 10° Celsius. Fra marts bør du give den et varmere, lyst sted i rummet til fremdrift og langsomt øge vandingen igen. **Bemærk venligst: frøene er giftige!**



Karibischer Korallenstrauch

Erythrina crista-galli

Ein Flammenmeer von Juni bis September

Die Nationalpflanze Argentiniens kann leicht im Kübel gehalten werden, erreicht im Durchschnitt eine ideale Topfhöhe von 1,50 Metern und entfaltet im Sommer von Juni bis September ein Flammenmeer mit feuerroten Schmetterlingsblüten. Im Laufe der Jahre entwickelt sie einen kurzen, dicken Stamm mit langen, eleganten und oft bedornten Zweigen. An ihrem Ende sitzen die bis zu 25 Zentimeter langen Trauben mit zahlreichen bis zu 5 Zentimetern breiten Blüten. Im Herbst werfen die Triebe ihre Blätter ab und trocknen weit zurück, so dass sie wie eine Stau weit zurückgeschnitten werden können. Der botanische Name ist aus der Hahnenkammartigen Blüte abgeleitet: erythros (griechisch für rot) und crista-galli (lateinisch für Hahnenkamm). Achtung: Die Pflanze ist in allen Teilen giftig. **Naturstandort:** Der Korallenstrauch ist in Brasilien, Paraguay, Bolivien und Argentinien heimisch. Dort wächst er häufig in Galeriewäldern am Rande von Flussufern. Weltweit wird er mittlerweile als Zierpflanze kultiviert. **Anzucht:** Im Haus ist die Anzucht aus Samen das ganze Jahr über möglich. Allerdings dauert es etwa vier Jahre bis zur ersten Blüte. Legen Sie die Samen zunächst für zwölf Stunden in ein Gefäß mit raumwarmem Wasser, um ein Aufquellen und damit eine verbesserter Keimfähigkeit zu erreichen. Erst dann setzen Sie ihn circa einen Zentimeter tief in feuchter Anzuchterde. Spannen Sie Klarsichtfolie über das Anzuchtgefäß und stechen Sie einige Löcher in die Folie. So ist die Erde vor Austrocknung geschützt. Alle zwei bis drei Tage sollten Sie die Folie für 2 Stunden entfernen. Das beugt einer Schimmelbildung auf der Anzuchterde vor. Stellen Sie das Anzuchtgefäß an einen hellen und warmen Ort mit 20 bis 25° Celsius und halten Sie die Anzuchterde feucht, aber nicht nass. Bis zur Keimung dauert es dann gewöhnlich zwei bis vier Wochen. **Standort:** Da der Korallenstrauch erst relativ spät austreibt, empfiehlt es sich, ihn für eine zeitige Sommerblüte ab März im Zimmer vorzutreiben. Als Kübelpflanze stellen Sie Ihren Strauch danach während des Sommers von Mitte Mai bis Ende September am besten ins Freie an einen warmen vollsonnigen Platz. Während dieser Wachstums- und Blühphase sollte der Platz so sonnig wie irgend möglich sein. **Pflege:** Als Kübelpflanze gehört der Korallenstrauch zu den pflegeleichten Sorten. Während der Wachstums- und Blühphase benötigt er allerdings regelmäßige und reichlich Wasser. An heißen Tagen muss häufig sogar morgens und abends gegossen werden. Während der Wachstumsphase sollten Sie ihn alle zwei Wochen und während der Blühphase wöchentlich mit Flüssigdünger versorgen. Nach der Blüte reduzieren Sie die Wassergaben und reduzieren das Wässern ab Oktober auf eine minimale Grundversorgung. Alle zwei bis vier Jahre wird die Pflanze im Frühjahr in Kübelpflanzenerde oder eine Mischung aus jeweils einer Hälfte Gartenerde und Kompost umgetopft. Entfernen Sie regelmäßig die welken Blütenstände, um eine lange Blüte in mehreren Schüben zu erreichen. **Im Winter:** Im Spätherbst werden die Triebe etwa 10 cm über dem Stamm abgeschnitten und der Korallenstrauch überwintert am besten bei minimaler Grundfeuchte in einem dunklen, frostfreien Raum mit Temperaturen unter 10° Celsius. Ab März sollten Sie ihn für den Vortrieb einen wärmeren hellen Zimmerplatz einräumen und die Wassergaben langsam wieder steigern. **Bitte beachten: Die Samen sind giftig!**



Cockspur Coral Tree

Erythrina crista-galli

A sea of flames from June to September

The national plant of Argentina can easily be cultivated as a tub plant, ideally grows 1.50 meters in average in a pot and unfolds in the summer time between June and September a sea of flames with fiery red butterfly blossoms. Over the years it develops a short, thick stem with long, graceful and thorny branches with up to 25 cm long grapes and 5 cm big blossoms sitting at end. During autumn the sprouts are casting their leaves and dry almost out, so it can be pruned heavily like a bush. Its botanical name derived from the cockscomb-like shaped blossoms: "erythros" means red in Greek language, and "crista-galli" is Latin for crest of a rooster. Warning! The plant is in every part poisonous. **Natural location:** The Cockspur Coral Tree has its natural habitat in Brazil, Paraguay, Bolivia and Argentina. There, it is often found in the gallery forests near riverbanks. Today it is being cultivated as ornamental plant in all parts of the world. **Successful cultivation:** Seed propagation indoors is possible throughout the year. But it will take about four years until the first blossoming. Place the seeds for about 12 hours for priming in warm water to increase the germinability. Then plant the seeds about 1 cm deep in moist potting compost and cover the seed container with clear film to prevent the earth from drying out. Don't forget to make some holes in the clear film and take it every second or third day completely off for about 2 hours. That way you avoid mold formation on your potting compost. Place the seed container somewhere bright and warm with a temperature between 20°C and 25° Celsius and keep the earth moist, but not wet. The germination usually starts after two to four weeks. **The best location:** The Cockspur Coral Tree normally sprouts very late. It is advisable, for a blooming in early summer, to pre-shoot indoors beginning of March. Afterwards, from the middle of May until the end of September, it is best to place your tub plant outdoors at a warm and full sunny spot. During growth and blossoming it should be kept somewhere as sunny as possible. **Optimal care:** The Cockspur Coral Tree is rather carefree, but it has to be watered during growth and blossoming regularly and sufficiently. On hot days, watering is required even twice, in the morning and in the evening. During growth it also needs fluid fertilizer every two weeks, while during blossoming fertilizing is needed on a weekly basis. After blossoming you can give less water, and starting with October only a minimum of water is required. Every two to four years, the tree should be shifted during spring to a new pot, using either quality earth for tub plants or a mix of one half garden soil and one half compost earth. Regularly cut out the dried inflorescences to achieve a longer blossoming in several waves. **In the winter:** In late autumn you have to cut the sprouts about 10 cm above the stem. During hibernation, the Cockspur Coral Tree is best to be kept only slightly moist, in a dark, frost-free room with a temperature below 10° Celsius. Starting in March you should move your plant to a warmer and brighter spot in the house, so it can slowly start to shoot again and the watering can be increased accordingly. **Please note: seeds are poisonous!**



Kariibi mere korallipõõsas Erythrina crista-galli Leekide meri juunist septembrini

Argentina rahvustaim saab hõlpsasti ämbris hoida, see saavutab ideaalse potikõrguse keskmiselt 1,50 meetrit ja avab suvel juunist septembrini tulipunaste liblikaõitega leegimere. Aastate jooksul areneb tal välja lühike, jäme tüvi, millel on pikad, elegantsed ja sageli okkalised oksad. Otsas istuvad kuni 25 sentimeetri pikkused roosid, millel on palju kuni 5 sentimeetri laiuseid lilli. Sügisel heidavad võrsed lehed maha ja kuivavad kaugele taha, võimaldades neid kärpida kaugele taha nagu püskuid. Botaaniline nimetus on tuletatud kukeharjalaadsest lillest: erythros (kreeka keeles punane) ja crista-galli (ladina keeles kukehari). Hoiatus: kõik taimesood on mürgised. **Looduslik asukoht:** Korallipõõsa kodumaa on Brasiilia, Paraguay, Bolivia ja Argentina. Seal kasvab ta sageli galeriimeetsades jõekallaste serval. Nüüd kasvatatakse seda kogu maailmas dekoratiivtaimena. **Edukas kasvatamine:** Seemnetest siseruumides kasvatamine on võimalik aastaringselt. Esimese õitsemiseni kulub aga umbes neli aastat. Esmalt asetage seemned kaheteistkümneks tunniks toasooja veega anumasse, et need saavutamiseks ja seeläbi paranenud idanemiseks. Alles seejärel asetage see umbes ühe sentimeetri sügavusele niiskesse kasvumuld. Venitage kultuurianuma kohale toidukile ja torkake kilesse mõned augud. See kaitseb mulda kuivamise eest. Peaksite fooliumi eemaldama 2 tunniks iga kahe kuni kolme päeva järel. See takistab hallituse teket kasvupinnal. Asetage külvipott valgusküllasesse ja sooja kohta, mille temperatuur on 20–25 °C, ning hoidke istutusmuld niiskena, kuid mitte märjana. Tavaliselt kulub idanemiseks kaks kuni neli nädalat **Parim asukoht:** Kuna korallipõõsas tärkab alles suhteliselt hilja, on soovitatav alates märtsist varasuviseks õitsenguks tuppa ette ajada. Konteinertaimena on kõige parem paigutada oma põõsas suvel mai keskpaigast septembri lõpuni õue sooja, täis päikese kätte. Sellel kasvu- ja õitsemisfaasil peaks koht olema võimalikult päikeseline. **Optimaalne hooldus:** Konteinertaimena on korallipõõsas üks kergesti hooldatavaid sorte. Kasvu- ja õitsemisfaasis vajab ta aga regulaarset ja rohket vett. Kuumadel päevadel tuleb seda sageli kasta hommikul ja õhtul. Kasvufaasis tuleks seda toita vedelväetisega iga kahe nädala tagant ja õitsemise ajal kord nädalas. Pärast õitsemist vähendage kastmist ja vähendage alates oktoobrist kastmist minimaalse algtasemeni. Taim istutatakse ümber kevadel iga kahe-nelja aasta tagant potimulda või pooliku aiamaalla ja komposti segusse. Pika mitmeaastase õitsemise saavutamiseks eemaldage regulaarselt närtsinud õisikud. **Talvel:** Hilissügisel lõigatakse võrsed umbes 10 cm tüve kohalt maha ja korallipõõsas talvitub kõige paremini minimaalse maapinnaniiskuse juures pimedas, külmavabas ruumis, mille temperatuur on alla 10 °C. Alates märtsist tuleks anda talle tõukejõuks ruumis soojem valgusküllane koht ja kastmist uuesti aeglaselt suurendada. **Pange tähele: seemned on mürgised!**



Karibian korallipensas Erythrina crista-galli Liekkimeri kesäkuusta syyskuuhun

Argentiinan kansalliskasvi voidaan helposti säilyttää ämpäriässä, saavuttaa ihteellisen ruukkukorkeuden keskimäärin 1,50 metriä ja avaa liekkien meren tulipunaissilla perhoskuillaan kesällä kesäkuusta syyskuuhun. Vuosien mittaan hän kehittää lyhyen, paksun rungon, jossa on pitkät, tylikkää ja usein piikkas oksat. Lopussa istuu jopa 25 senttimetriä pitkiä kukkia, joissa on lukuisia jopa 5 senttimetriä leveitä kukkia. Syksyllä versot pudottavat lehtiään ja kuivuvat kausa taakse, jolloin ne voidaan leikata kausa taaksepäin kuin monivuotiset. Kasvitiiteellinen nimi on johdettu kukonkennomaisesta kukaasta: erythros (kreikaksi punaista) ja crista-galli (latinaksi kukonkenno). Varoitust: kaikki kasvin osat ovat myrkyllisiä. **Luonnollinen sijainti:** Korallipensas on kotoisin Brasiiliasta, Paraguayasta, Boliviasta ja Argentiinasta. Siellä se kasvaa usein galleriametsissä joen rantojen reunalla. Nyt sitä viljellään maailmanlaajuisesti koristekasvina. **Onnistunut viljely:** Kasvatustaimen sementin sisätiloissa on mahdollista vuoden. Ensimmäisen kukintaan kestää kuitenkin noin neljä vuotta. Aseta siemenet ensin huoneenlämpöiseen veteen astiaan 12 tunniksisaavuttaa turvotusta ja siten parantaa itävyyttä. Vasta sitten asetetaan sen noin sentin syvyyteen kosteaan kasvumaahan. Venytetä elintarvikekalvo viljelyastian päälle ja pistele kalvoon muutamia reikiä. Tämä suojaaa maaperää kuivumiselta. Poista folio 2 tunnin ajaksi kahden tai kolmen päivän välein. Tämä estää homeen muodostumisen kasvumaahan. Aseta siemenruukku valoisaan ja lämpimään paikkaan, jonka lämpötila on 20–25 °C, ja pidä istutusmaa kosteana, mutta ei märkänä. Itäminen kestää yleensä kahdesta neljään viikkoa **Paras sijainti:** Koska korallipensas itää vasta suhteellisen myöhään, on suositeltavaa ajaa se huoneeseen maaliskuusta alkaen alkukesän kukintaa varten. Konttikasvina pensas on parasta sijoittaa ulkona lämpimään, täyteen aurinkoon kesällä toukokuun puolivälistä syyskuun loppuun. Kasvu- ja kukintavaiheen aikana paikan tulee olla mahdollisimman aurinkoinen. **Optimaalinen hoito:** Konttikasvina korallipensas on yksi helpohoitaisista lajikkeista. Kasvu- ja kukintavaiheessa se tarvitsee kuitenkin säännöllistä ja runsaasti vettä. Kuumina päivinä sitä on usein kasteltava aamulla ja illalla. Sinun tulee ruokkia sitä nestemäisellä lannoitteella kahden viikon välein kasvuvaiheessa ja viikoittain kukinnan aikana. Vähennä kastelua kukinnan jälkeen ja vähennä kastelua minimiin lokakuusta alkaen. Kasvi istutetaan keuhalla kahden-neljän vuoden välein ruukkumultaan tai puolipuutarhamaan ja kompostin seokseen Poistamalla kuivuneet kukinnot säännöllisesti, jotta saavutetaan pitkä kukinta useissa vaiheissa. **Talvella:** Myöhään syksyllä versot leikataan pois noin 10 cm rungon yläpuolelta ja korallipensas talvehtii parhaiten mahdollisimman vähäisellä maankosteudella pimeässä, pakkasetuomassa huoneessa, jonka lämpötila on alle 10 °C. Maaliskuusta alkaen sinun tulee antaa sille lämpimämpi, valoisia paikkaa työskentelyä varten ja lisätä kastelua uudelleen hitaasti. **Huomaa: siemenet ovat myrkyllisiä!**



Ceibo Erythrina crista-galli Une mer de flammes de juin à septembre

La plante nationale de l'Argentine peut être facilement entretenue dans un bac, atteint une hauteur idéale de 1,5 mètres en moyenne, et développe une mer de flammes avec des fleurs papilionacées rouge vif en été, de juin à septembre. Au cours de l'année, elle développe un tronc court et gros avec des branches longues, élégantes, et souvent épineuses. Les grappes de jusqu'à 25 centimètres se situent sur les tiges avec beaucoup de fleurs de jusqu'à 5 centimètres de largeur. En automne, les rameaux perd ses feuilles et se resèchent pour qu'ils puissent être taillés comme une plante vivace. Le nom botanique est dérivé de la crête de coq : erythros (mot grec signifiant rouge) et crista-galli (mot latin signifiant crête de coq). Attention : Toutes les parties de la plante sont toxiques. **Emplacement naturel:** Le ceibo se trouve au Brésil, au Paraguay, en Bolivie, et en Argentine. Là-bas, il pousse souvent dans des forêts-galeries aux bords de rivières. Il est désormais cultivé comme plante ornementale dans le monde entier. **Culture réussie:** La culture des graines à la maison est possible tout au long de l'année. Cependant, il faut attendre environ quatre ans pour les premières fleurs. Laissez les graines dans un récipient avec de l'eau à température ambiante pendant douze heures pour avoir un gonflement et, par conséquent, une meilleure faculté germinative. Ensuite, mettez-les dans du terreau humide à environ un centimètre de profondeur. Couvrez le récipient avec une feuille transparente dans laquelle vous faites des trous. Comme ça, le terreau est protégé du dessèchement. Vous devez enlever la feuille pendant deux heures tous les deux ou trois jours. Ceci prévient la formation de moisissures dans le terreau. Mettez le récipient dans un endroit lumineux et chaud de 20° à 25° Celsius et gardez le terreau humide, mais pas mouillé. Normalement, la germination dure entre deux et quatre semaines. **Le meilleur emplacement:** Comme le ceibo pousse relativement tard, il est conseillé de le mettre dans la chambre à partir de mars pour une floraison tôt en été. Ensuite, mettez la plante en pot en plein air dans un emplacement chaud et en plein soleil pendant l'été de mai à fin septembre. Pendant cette phase de croissance et de floraison, l'emplacement doit être le plus ensoleillé possible. **Soins optimaux:** Le ceibo est une plante en pot facile à entretenir. Pendant la phase de croissance et de floraison, il a régulièrement besoin de beaucoup d'eau. Pendant les périodes chaudes, il doit être arrosé fréquemment le matin et le soir. Vous devez l'engraisser toutes les deux semaines pendant la période de croissance et avec de l'engrais liquide pendant la période de floraison. Après la floraison, arrosez-le moins à partir d'octobre pour une alimentation minimale. La plante doit être rempotée dans du terreau pour plantes en pot ou dans un mélange d'une moitié de terre de jardin et une moitié de compost tous les deux à quatre ans en printemps. Enlevez les inflorescences flétries régulièrement, afin d'avoir une floraison en plusieurs poussées. **En hiver:** En fin automne, les rameaux sont coupés à environ 10 centimètres en-dessus du tronc et le ceibo hiverne mieux dans une salle sombre hors gel avec des températures inférieures à 10° Celsius. A partir de mars, vous devrez le mettre dans un emplacement chaud et lumineux et l'arroser progressivement plus. **Veuillez noter: les semences sont toxiques!**



Θάμνος κοραλλιών Καραϊβικής Erythrina crista-galli Μια θάλασσα από φλόγες από τον Ιούνιο έως τον Σεπτέμβριο

Το εθνικό φυτό της Αργεντινής μπορεί εύκολα να διατηρηθεί σε έναν κουβά, φτάνει σε ένα ιδανικό ύψος γλάστρας τα 1,50 μέτρα κατά μέσο όρο και ξεδιπλώνει μια θάλασσα από φλόγες με φλογερά άνθη πεταλούδας το καλοκαίρι από τον Ιούνιο έως τον Σεπτέμβριο. Με τα χρόνια, αναπτύσσει έναν κοντό, χοντρό κορμό με μακριά, κομψά και συχνά ακανθώδη κλαδιά. Στο τέλος καθνεται οι ράτσες μήκους έως 25 εκατοστών με πολλά λουλούδια πλατύς έως 5 εκατοστών. Το φθινόπωρο, οι βλαστοί ρίχνουν τα φύλλα τους και στεγνώνουν πολύ πίσω, επιτρέποντάς τους να κλαδεύονται πολύ πίσω σαν πολυετές. Η βολανική ονομασία προέρχεται από το λουλούδι που μοιάζει με κηροπήγιο: erythros (ελληνικά σημαίνει κόκκινο) και crista-galli (Λατινικά σημαίνει κηροπήγιο). Προειδοποίηση: όλα τα μέρη του φυτού είναι δηλητηριώδη. **Φυσική τοποθεσία:** Ο κοραλλιογενής θάμνος είναι εγγενής στη Βραζιλία, την Παραγουάη, τη Βολιβία και την Αργεντινή. Εκεί αναπτύσσεται συχνά σε δάση γκαλερί στις όχθες των ποταμών. Καλλιεργείται πλέον παγκοσμίως ως καλλωπιστικό φυτό. **Επιτυχημένη καλλιέργεια:** Η καλλιέργεια από σπόρους σε εσωτερικούς χώρους είναι δυνατή όλο το χρόνο. Ωστόσο, χρειάζονται περίπου τέσσερα χρόνια μέχρι την πρώτη ανθοφορία. Τοποθετήστε πρώτα τους σπόρους σε ένα δοχείο με ζεστό νερό για δώδεκα ώρες για να επιτευχθεί οίδημα και έτσι βελτιωμένη βλάστηση. Μόνο τότε το τοποθετείτε περίπου ένα εκατοστό βάθος σε υγρό έδαφος ανάπτυξης. Τεντώστε μεμβράνη πάνω από το δοχείο καλλιέργειας και ανοίξτε μερικές τρύπες στη μεμβράνη. Αυτό προστατεύει το έδαφος από το στέγνωμα. Θα πρέπει να αφαιρέσετε το αλουμινόχαρτο για 2 ώρες κάθε δύο έως τρεις ημέρες. Αυτό αποτρέπει τη δημιουργία μούχλας στο αναπτυσσόμενο έδαφος. Τοποθετήστε τη γλάστρα σε ένα ελαφρύ και ζεστό μέρος με θερμοκρασία 20 έως 25° Κελσίου και διατηρήστε το χώμα της γλάστρας υγρό αλλά όχι υγρό. Συνήθως χρειάζονται δύο έως τέσσερις εβδομάδες για να βλαστήσει. **Η καλύτερη τοποθεσία:** Δεδομένου ότι ο θάμνος των κοραλλιών φυτρώνει μόνο σχετικά αργά, συνιστάται να τον οδηγήσετε προς τα εμπρός στο δωμάτιο από τον Μάρτιο για μια πρώιμη καλοκαιρινή άνθιση. Ως φυτό δοχείων, είναι καλύτερο να τοποθετήσετε τον θάμνο σας σε εξωτερικό χώρο σε ζεστό, γεμάτο ήλιο κατά τη διάρκεια του καλοκαιριού από τα μέσα Μαΐου έως τα τέλη Σεπτεμβρίου. Κατά τη διάρκεια αυτής της φάσης ανάπτυξης και ανθοφορίας, το σημείο πρέπει να είναι όσο το δυνατόν πιο ηλιόλουστο. **Βέλτιστη φροντίδα:** Ως φυτό κοντέινερ, ο κοραλλιογενής θάμνος είναι μια από τις ποικιλίες εύκολης φροντίδας. Κατά τη φάση της ανάπτυξης και της ανθοφορίας όμως χρειάζεται τακτικό και άφθονο νερό. Τις ζεστές μέρες, συχνά πρέπει να ποτίζεται πρωί και βράδυ. Θα πρέπει να το ταΐζετε με υγρό λίπασμα κάθε δύο εβδομάδες κατά τη φάση ανάπτυξης και κάθε εβδομάδα κατά τη φάση της ανθοφορίας. Μετά την ανθοφορία, μειώστε το πότισμα και μειώστε το πότισμα στο ελάχιστο επίπεδο βάσης από τον Οκτώβριο. Το φυτό μετατοπίζεται την άνοιξη κάθε δύο έως τέσσερα χρόνια σε χώρα γλάστρας ή σε μέγιστο μισού χώματος κήπου και κομψό. Αφαιρέστε τακτικά τις παραμένοντες ταξιανθίες για να επιτύχετε μεγάλη ανθοφορία σε διάφορα στάδια. **Το χειμώνα:** Στα τέλη του φθινοπώρου, οι βλαστοί κόβονται περίπου 10 cm πάνω από τον κορμό και ο κοραλλιογενής θάμνος διαχειμάζει καλύτερα με ελάχιστη υγρασία στο έδαφος σε ένα σκοτεινό, χωρίς παγετό δωμάτιο με θερμοκρασίες κάτω των 10° Κελσίου. Από τον Μάρτιο θα πρέπει να του δώσετε ένα πιο ζεστό, φωτεινό μέρος στο δωμάτιο για προώθηση και σιγά σιγά να αυξήσετε ξανά το πότισμα. **Παρακαλώ σημειώστε: οι σπόροι είναι δηλητηριώδεις!**



Tor coiréil sa Mhuir Chairib

Erythrina crista-galli

Farraige lasracha ó Mheitheamh go Meán Fómhair

Is féidir planda náisiúnta na hAirtintíne a choinneáil go héasca i mbeicéad, sroicheann sé airde pota idéalach de 1.50 méadar ar an meán agus leathnaíonn farraige lasracha le bláthanna féileacán dearg fiery sa samhradh ó Mheitheamh go Meán Fómhair. Thar na blianta, forbraíonn sí trunk gearr tiubh le craobhacha fada, galánta agus go minic deilgneach. Ag an deireadh suí na rásaí suas le 25 ceintiméadar ar fad le bláthanna iomadúla suas le 5 ceintiméadar ar leithead. Sa titim, cailleanann na shoots a gcuid duilleoga agus tirim i bhfad siar, rud a ligeann dóibh a bheith bearrtha i bhfad siar mar ilbhliantúil. Diorthaítear an t-ainm luibheolaíoch ón mbláth atá cosúil le cockscorn: erythros (Gréigis le haghaidh dearg) agus crista-galli (Laidin le haghaidh cockscorn). Rabhadh: tá gach cuid den phlanda nimhiúil. **Suíomh nádúrtha:** Tá an tor coiréil dúchasach don Bhrasaíl, Paragua, an Bholaiv agus an Airtintín. Is minic a fhásann sé i bhforaoisí gailearaí ar imeall bruaíoch abhann. Saothraítear anois é ar fud an domhain mar phlanda ornáideach. **Saothrú rathúil:** Is féidir fás ó shiolta taobh istigh ar feadh na bliana. Mar sin féin, tógann sé thart ar cheithre bliana go dtí an chéad bláthanna. Cuir na síolta ar dtús i gcoimeádán le huisce te seomra ar feadh dhá uair an chloighchun swelling a bhaint amach agus péacadh feabhsaithe dá réir. Ní féidir ach ansin é a chur timpeall ceintiméadar ar doimhneacht in ithir tais atá ag fás. Sin an scannán cumhdaithe thar an soitheach cultúir agus cuir cúpla poll sa scannán. Cosnaíonn sé seo an ithir ó thriomú amach. Ba chóir duit an scragall a bhaint ar feadh 2 uair gach dhá nó trí lá. Cuireann sé seo cosc ar mhúlna a fhoirmiú ar an ithir atá ag fás. Cuir an pota síolta in áit éadrom te ag 20 go 25 ° Celsius agus coinneigh an ithir potaithe tais ach ní fliuch. De ghnáth tógann sé dhá nó cheithre seachtaine chun péacadh **An suíomh is fearr:** Ós rud é nach bhfágann an tor coiréil ach sách déanach, tá sé inmholtá é a thiomáint ar aghaidh sa seomra ó mhí an Mhárta le haghaidh bláth go luath sa samhradh. Mar phlanda coimeádán, is fearr do tor a chur lasmuigh i ghrian le, iomlán i rith an tsamhraidh ó lár mhí na Bealtaine go deireadh mhí Mheán Fómhair. Le linn na céime fáis agus bláthanna seo, ba chóir go mbeadh an láthair chomh griannhar agus is féidir. **Cúram is fearr is féidir:** Mar ghléasra coimeádán, tá an tor coiréil ar cheann de na cineálacha cúram éasca. Le linn na céime fáis agus bláthanna, áfach, caithfidh sé go rialta agus go leor uisce. Ar laethanta te, ní mór é a uisce go minic ar maidin agus tráthnóna. Ba chóir duit é a bheathú le leasachán leachtach gach coicís le linn na céime fáis agus go seachtainiúil le linn na céime bláthanna. Tar éis bláthanna, laghdaigh an t-uisciú agus laghdaigh uisce go bunlíne iosta ó Dheireadh Fómhair. Tá an gléasra repotted san earrach gach dhá nó cheithre bliana in ithir potaithe nó meascán de leath ithir gairdín agus múirín. Bain go rialta inflorescences withered a bhaint amach bláthanna fada i roinnt céimeanna. **Sa gheimhreadh:** Go déanach san fhómhar, gearrtair na shoots thart ar 10 cm os cionn an stoc agus is fearr go n-éireoidh an tor coiréil geimhreadh le híosmhéid tais talún i seomra dorchá, saor ó sheo le teocht faoi bhun 10 ° Celsius. Ó mhí an Mhárta ba chóir duit áit níos teo, geal a thabhairt dó sa seomra le haghaidh tiomána agus an t-uisciú a mhéadú go mall arís. **Tabhair faoi deara le do thoil: tá na síolta nimhiúil!**



Karabískur kóralrunni

Erythrina crista-galli

Eldahaf frá júní til september

Audvælt er að geyma þjóðarplöntu Argentínu í fötu, nær fullkominni potthæð að meðaltali 1,50 metra og afhjúpar logahaf með eldrauðum fiðrildablómum á sumrin frá júní til september. Með árunum þrjár hún með sér stuttan, þykkjan stofn með löngum, glæsilegum og oft þyrnóttum greinum. Á endanum sitja allt að 25 sentimetrar langir kynþættir með fjölmörgum blómum allt að 5 sentimetrar breiðum. Á haustin losa sprotarnir lauf sín og þorna langt aftur, þannig að hægt er að klippa þá langt aftur eins og fjölær. Grafsafræðilega nafnið er dregið af blóminu sem líkist hanakambi: erythros (gríska fyrir rautt) og crista-galli (latneskt fyrir hanakambur). Viðvörðun: allir hlutar plöntunnar eru eittraðir. **Náttúruleg staðsetning:** Kóralrunni er ættaður frá Brasilíu, Paragvæ, Bólívíu og Argentínu. Þar vær það oft í gallerskógum á jaðri árþakka. Það er nú ræktað um allan heim sem skrautjurt. **Árangursrík ræktun:** Ræktun úr fræjum innandyrá er mögulegt allt árið um kring. Hins vegar líða um fjögur ár þar til fyrstu blómgun fer fram. Settu fyrst fræin í ílát með herbergisheitu vatni í tólf klukkustundir til að ná fram bólgu og þar með bættri spirun. Aðeins þá setuðu það um eins sentímétrar djúpt í rökum vaxandi jarðvegi. Teygðu matarfilum yfir ræktunarlítið og stingdu nokkrum gót á filmunna. Þetta verndar jarðvegin gegn þurrkun. Þú ættir að fjarlægja álpappirinn í 2 klukkustundir á tveggja til þriggja daga fresti. Þetta kemur í veg fyrir að mygla myndist á vaxandi jarðvegi. Settu fræpottinn á léttan og heitan stað með 20 til 25° Celsius og haltu pottjarðveginum rökum en ekki blautum. Það tekur venjulega tvær til fjórar vikur að spíra **Besta staðsetningin:** Þar sem kóralrunni sprettur aðeins tiltölulega seint er ráðlegt að reka hann áfram í herberginu frá mars til að blómstra snemma sumars. Sem gámaplanta er best að setja runni þinn utandyra í heitri, fullri sól á sumrin frá miðjum maí til loka september. Á þessum vaxtar- og blómstrandi áfanga ætti staðurinn að vera eins sólríkur og mögulegt er. **Besta umönnun:** Sem gámaplanta er kóralrunni ein af afbrigðum sem auðvelt er að sjá um. Á vaxtar- og flórústinu þarf hún hins vegar reglulega og nóg af vatni. Á heitum dögum þarf oft að vökva það kvölds og morgna. Þú ættir að fæða það með fljótandi áburði á tveggja vikna fresti á vaxtarskeiði og vikulega á blómstrandi áfanga. Eftir blómgun skaltu draga úr vökvun og draga úr vökvun í lágmarks grunnlínu frá október. Plöntan er pottalögð á vorin á tveggja til fjögurra ára fresti í pottjarðvegi eða blöndu af hálfri garðmold og meltu. Fjarlægðu visnuð blómstrandi reglulega til að ná langri blómgun í nokkrum áföngum. **Á veturna:** Síðla hausts eru sprotarnir skornir af um 10 cm fyrir ofan stofninn og kóralrunni yfirvetrar best með lágmarks raka í jörðu í dimmu frostlausu herbergi með hita undir 10° á Celsius. Frá mars ættirðu að gefa því hlýrri, bjartan stað í herberginu til að knýja áfram og auka vökvunina hægt aftur. **Vinsamlegast athugaðu: fræin eru eitruð!**



Albero del corallo

Erythrina crista-galli

Un mare di fiamme da giugno a settembre

La pianta nazionale dell'Argentina può essere facilmente coltivata in vaso, dove raggiunge un'altezza massima di 1,5 metri. In estate, da giugno a settembre, produce l'effetto di un mare di fiamme con i suoi fiori a forma di farfalla. Nel corso degli anni sviluppa un tronco corto e tozzo, con lunghi rami eleganti spesso spinosi. All'estremità dei rami si trovano i grappoli, lunghi fino a 25 centimetri, con numerosi fiori che raggiungono fino a 5 centimetri di larghezza. In autunno le foglie germogliano dai getti e questi si seccano, per questo è possibile tornare a potare la pianta come un arbusto. Il nome botanico viene dal fiore che ricorda la cresta di gallo: erythros (rosso in greco) e crista-galli (cresta di gallo in latino). Attenzione: la pianta è tossica in ogni sua parte. **Posizione naturale:** L'albero del corallo è tipico del Brasile, del Paraguay, della Bolivia e dell'Argentina. In queste zone spesso cresce in filari lungo gli argini dei fiumi. In questo modo si è diffusa in tutto il mondo come pianta da ornamento. **Coltivazione riuscita:** La coltivazione da semi in casa è possibile durante tutto l'anno. I primi fiori compariranno tuttavia intorno ai quattro anni di età della pianta. Lasciate i semi per dodici ore in un recipiente con acqua a temperatura ambiente, affinché si gonfino aumentando la capacità di germinazione. In seguito piantateli nella terra di coltivo umida, a circa un centimetro di profondità. Coprite il recipiente di coltivazione con pellicola trasparente sulla quale praticherete dei fori, in questo modo la terra eviterà di seccarsi. Ogni due o tre giorni rimuovete la pellicola per 2 ore, per prevenire la formazione di muffe sulla terra. Collocate il recipiente di coltivazione in un luogo luminoso e caldo, a una temperatura tra i 20° e i 25° C, mantenete la terra umida, ma non bagnata. La germinazione avverrà da due a quattro settimane dopo. **La posizione migliore:** Poiché l'albero del corallo fiorisce relativamente tardi, per stimolare per tempo la fioritura estiva si consiglia di collocarlo in casa a partire da marzo. Come pianta da vaso collocare poi il vostro arbusto nel periodo estivo - da metà maggio a fine settembre - preferibilmente all'aperto, in un luogo caldo e pienamente soleggiato. Durante queste fasi di crescita e di fioritura dovrebbe stare il più possibile esposto al sole. **Cura ottimale:** Come pianta da vaso, l'albero del corallo fa parte di quelle piante che non necessitano di molte cure. Durante le fasi di crescita e di fioritura ha bisogno soprattutto di annaffiature regolari e abbondanti. Nei giorni molto caldi dovrà essere innaffiato mattina e sera. Durante la fase di crescita somministrategli del concime liquido ogni due settimane, durante la fioritura una volta a settimana. Dopo la fioritura riducete le annaffiature e da ottobre riducete la somministrazione di acqua al minimo necessario. Ogni due-quattro anni in primavera trapiantatela in terriccio per piante da vaso oppure in un miscuglio di terriccio da giardino e compost. Provvedete regolarmente a rimuovere i fiori appassiti, per ottenere fiori lunghi sparpagliati in più gruppi. **In inverno:** In tardo autunno tagliate i germogli circa 10 centimetri sopra il tronco. In inverno l'albero di corallo preferisce un'umidità minima e un ambiente con poca luce, a temperature sotto i 10° C ma senza gelo. A partire da marzo, per stimolare la ripresa collocatelo in un punto della stanza più caldo e luminoso e gradualmente aumentate le annaffiature. **Attenzione: i semi sono tossici.**



Karipski koraljni grm

Erythrina crista-galli

More plamena od lipnja do rujna

Nacionalna biljka Argentine može se lako držati u kanti, doseže idealnu visinu lonca u prosjeku od 1,50 metara i otvara more plamena s vatreno crvenim leptirastim cvjetovima ljeti od lipnja do rujna. Tijekom godina razvije kratko, debelo deblo s dugim, elegantnim i često trnovitim granama. Na kraju se nalaze do 25 centimetara duge grozdove s brojnim cvjetovima širokim do 5 centimetara. U jesen mladice odbacuju svoje lišće i suše se duboko unazad, što im omogućuje da se orežuju daleko unazad kao trajnice. Botanički naziv potječe od cvijeta nalik pijetlovom češlju: erythros (grčki za crveno) i crista-galli (latinski za pijetlov češalj). Upozorenje: svi dijelovi biljke su otrovni. **Zemlja porijekla:** Koraljni grm je porijeklom iz Brazila, Paragvaja, Bolivije i Argentine. Tamo često raste u gajerskim šumama na rubovima riječnih obala. Sada se diljem svijeta uzgaja kao ukrasna biljka. **Uspješan uzgoj:** Uzgoj iz sjemena u zatvorenom prostoru moguć je tijekom cijele godine. No, do prvog cvjetanja potrebno je oko četiri godine. Prvo stavite sjeme u posudu sa sobno toplom vodom na dvanaest satipostići bubrenje i time poboljšati klijavost. Tek tada ga stavite otprilike jedan centimetar duboko u vlažnu zemlju za uzgoj. Razvucite prozirnu foliju preko posude s kulturom i probušite nekoliko rupa u foliji. To štiti tlo od isušivanja. Svaka dva do tri dana skinite foliju na 2 sata. Time se sprječava stvaranje plijesni na tlu za uzgoj. Stavite posudu za sjeme na svijetlo i toplo mjesto s 20 do 25° Celzija i održavajte tlo za saksije vlažnim, ali ne mokrim. Obično je potrebno dva do četiri tjedna da proklija **Najbolja lokacija:** Budući da grm koralja tek relativno kasno niče, preporučljivo ga je od ožujka tjerati naprijed u prostoriju radi ranog ljetnog cvata. Kao kontejnersku biljku, najbolje je staviti svoj grm na otvoreno, na toplo, puno sunca tijekom ljeta od sredine svibnja do kraja rujna. U ovoj fazi rasta i cvatnje, mjesto bi trebalo biti što sunčanije. **Optimalna njega:** Kao kontejnerska biljka, koraljni grm je jedna od sorti koje se lako održavaju. Međutim, tijekom faze rasta i cvatnje potrebno ju je redovito i obilno zalijevati. U vrućim danima često se mora zalijevati ujutro i navečer. Hraniti ga tekućim gnojivom svaka dva tjedna tijekom faze rasta i tjedno tijekom faze cvatnje. Nakon cvatnje smanjite zalijevanje i smanjite zalijevanje na minimalnu početnu vrijednost od listopada. Biljka se presaduje u proljeće svake dvije do četiri godine u zemlju za posude ili mješavinu polovice vrtna zemlje i komposta. Osušene cvatove redovito uklanjajte kako biste postigli dugu cvatnju u nekoliko faza. **U zimi:** U kasnu jesen izdanci se odrežu oko 10 cm iznad debila i koraljni grm najbolje prezimi uz minimalnu vlažnost tla u tamnoj prostoriji bez smrzavanja i temperaturama nižim od 10°C. Od ožujka joj treba dati toplije, svijetlo mjesto u prostoriji za tjeranje i opet polako pojačati zalijevanje. **Napomena: sjemenke su otrovne!**



Karību jūras koraļļu krūms Erythrina crista-galli Liesmu jūra no jūnija līdz septembrim

Argentīnas nacionālo augu var viegli turēt spainī, tas sasniedz ideālu poda augstumu vidēji 1,50 metrus un vasarā no jūnija līdz septembrim izvērsīs liesmu jūru ar ugunīgi sarkaniem tauriņu ziediem. Gadu gaitā viņai izveidojas īss, resns stumbrs ar gariem, elegantiem un bieži vien ērkšķainiem zariem. Beigās sēž līdz 25 centimetrus garas raketes ar daudzliedzīmiem līdz 5 centimetriem platiem ziediem. Rudenī dzinumi nomet lapas un nokalst tālu atpakaļ, ļaujot tos apgriezt tālu atpakaļ kā daudzgadīgu augu. Botāniskais nosaukums ir atvasināts no gaiļbiksēm līdzīga zieda: erythros (grieķu valodā — sarkans) un crista-galli (latīņu valodā — gaiļbiezis). Brīdīnājumus: visas auga daļas ir indīgas. **Dabiska vieta:** Koraļļu krūmu dzimtene ir Brazīlija, Paragvaja, Bolīvija un Argentīna. Tur tas bieži aug galeriju mežos upju krastu malās. Mūsdienās to visā pasaulē audzē kā dekoratīvu augu. **Veismīga audzēšana:** Audzēšana no sēklīm telpās ir iespējama visu gadu. Tomēr līdz pirmajai ziedēšanai paiet apmēram četri gadi. Vispirms ievietojiet sēklas traukā ar istabas siltu ūdeni uz divpadsmit stundām lai panāktu pietūkumu un tādējādi uzlabotu dīgtspeju. Tikai tad novietojiet to apmēram viena centimetra dziļumā mitrā augšanas augsnē. Izstiepiet pārtikas plēvi virs kultivēšanas trauka un ieduriet plēvē dažus caurumus. Tas pasargā augsni no izžušanas. Jums vajadzētu noņemt foliju 2 stundas ik pēc divām līdz trim dienām. Tas novērš pelējuma veidošanos augošajā augsnē. Novietojiet sēklu podu gaišā un siltā vietā ar temperatūru 20 līdz 25 ° C un turiet augsni mitru, bet ne mitru. Parasti dīgšanai nepieciešamas divas līdz četras nedēļas **Labākā atrašanās vieta:** Tā kā koraļļu krūms uzdīgst tikai salīdzinoši vēlu, no marta vēlams to dzenēt istabā uz priekšu vasaras sākumam. Kā konteineru augu vislabāk ir novietot savu krūmu ārā siltā, pilnā saulē vasarā no maija vidus līdz septembra beigām. Šajā augšanas un ziedēšanas fāzē vietai jābūt pēc iespējas saulainākai. **Optimālā aprūpe:** Kā konteineru augu koraļļu krūms ir viena no viegli kopjamajām šķirnēm. Tomēr augšanas un ziedēšanas fāzē tai nepieciešams regulārs un daudz ūdens. Karstās dienas to bieži nākas laistīt no rīta un vakarā. Jums tas jābāro ar šķidro mēslojumu ik pēc divām nedēļām augšanas fāzē un reizi nedēļā ziedēšanas fāzē. Pēc ziedēšanas samaziniet laistīšanu un no oktobra samaziniet laistīšanu līdz minimālajam bāzes līmenim. Augu pārstāda pavasarī reizi divos līdz četros gados podinos vai pusdārza zemes un komposta maisījumā. Regulāri novāc nokaltušās ziedkopas, lai panāktu ilgstošu ziedēšanu vairākos posmos. **Ziemā:** Vēlā rudens dzinumus nogriež apmēram 10 cm virs stubra, un koraļļu krūms vislabāk pārziemo ar minimālu zemes mitrumu tumšā, bez sāls telpā ar temperatūru zem 10°C. No marta vajadzētu dot tai siltāku, gaišāku vietu telpā piedziņai un atkal lēnām palielināt laistīšanu. **Lūdzu, ņemiet vērā: sēklas ir indīgas!**



Karību koraļļu krūms Erythrina crista-galli Liespnū jūra nuo birželio iki rugsėjo

Nacionālais Argentīnas augals gali būtī lengvai laikomas kibire, pasiekia ideālā vazono aukštj vidutiniškai 1,50 metro ir vasarā nuo birželio iki rugsėjo išskleidžia liespnū jūrą su ugningų raudonų drugelių žiedais. Bėgant metams ji išsiugdo trumpą, storą kamieną su ilgomis, elegantiškomis ir dažnai dygliuotomis šakomis. Pabaigoje sėdi iki 25 centimetrų ilgio žiedai su daugybe iki 5 centimetrų pločio gėlių. Rudenį ūgliai nomet lapus ir nudžiūsta toli atgal, todėl juos galima genėti toli atgal kaip daugiameitį augalą. Botaniniai pavadinimas kilęs iš į gaidžiūs panašios gėlės: erythros (graikiškai raudona) ir crista-galli (lot. gaidžio šuo). Įspėjimas: visos augalo dalys yra nuodingos. **Natūrali vieta:** Koraļļu krūmas yra kilęs iš Brazilijos, Paragvajaus, Bolīvijos ir Argentīnos. Ten jis dažnai auga galerijū miškuose upiū pakraščiuose. Dabar visame pasaulyje auginamas kaip dekoratyvinis augalas. **Sėkmingas auginimas:** Auginti iš sėklų patalpose galima ištisus metus. Tačiau iki pirmojo žydėjimo prireikia maždaug ketverių metų. Pirmiausia įdėkite sėklas į indą su kambario šilto vandens dvylikai valandų pasiekti patinimą ir taip pagerinti daigumą. Tik tada įdėkite jį maždaug vieno centimetro gyliu į drėgną augančią žemę. Ant kultivavimo indo užtieskite maistinę plėvelę ir įdarykite kelias skylutes. Tai apsaugo dirvą nuo išdžiūvimo. Kas dvi ar tris dienas 2 valandas nuimkite foliją. Tai neleidsia augančioje dirvoje susidaryti pelėsiui. Sėklų vazoną pastatykite šviesioje ir šiltoje vietoje, kurios temperatūra yra 20–25 ° C, o vazono žemė turi būti drėgna, bet ne šlapia. Paprastai sudygsta nuo dviejų iki keturių savaitių **Geriausia vieta:** Kadangi koraļļu krūmas atželia tik palyginti vėlai, nuo kovo patartina jį vartyti į priekį patalpoje, kad žydėtų vasaros pradžioje. Kaip konteinerinį augalą geriausia sodinti savo krūmą lauke šiltoje, saulėtoje vasarą nuo gegužės vidurio iki rugsėjo pabaigos. Šiuo augimo ir žydėjimo laikotarpiu vieta turi būti kuo saulesnė. **Optimali priežiūra:** Kaip konteinerinis augalas, koraļļu krūmas yra viena iš lengvai prižiūrimų veislių. Tačiau augimo ir žydėjimo fazėje jai reikia reguliariai ir daug vandens. Karštomis dienomis jį dažnai reikia laistyti ryte ir vakare. Kas dvi savaites auginimo fazėje ir kas savaitę žydėjimo fazėje turėtumėte šerti skystomis trąšomis. Po žydėjimo sumažinkite laistymą ir nuo spalio sumažinkite laistymą iki minimalaus pradinio lygio. Augalas persodinamas pavasarį kas dvejus ar ketverius metus į vazoninę žemę arba pusės sodo žemės ir komposto mišinį. Reguliariai pašalinkite nuvytusius žiedynus, kad žydėtų keliais etapais. **Ziemą:** Vėlyvą rudens ūgliai nupjaunami apie 10 cm virš kamieno ir koraļļu krūmas geriausiai žiemoja esant minimaliai dirvožemio drėgmei tamsioje, neužšalancioje patalpoje, žemesnėje nei 10°C temperatūroje. Nuo kovo mėnesio patalpoje reikėtų suteikti jai šiltesnę, šviesesnę vietą ir vėl lėtai didinti laistymą. **Atkreipkite dėmesį: sėklos yra nuodingos!**



Arbuxxell tal-qroll tal-Karibew Erythrina crista-galli Baħar ta 'fjammi minn Ġunju sa Settembru

L-impjant nazzjonali tal-Argentina jista 'faċilment jinżamm f'barmil, jilħaq għoli tal-borma ideali ta' metru 1.50 bħala medja u jiżvolgi baħar ta 'fjammi bi fjur ta' farfett aħmar tan-nar fis-sajf minn Ġunju sa Settembru. Matul is-snin, hija tiżviluppa zokk qasir u oħxon b'fergħat twal, eleganti u spiss tax-xewk. Fl-aħħar ipogġu l-razzemi twal sa 25 centimetru bi fjuri numerużi sa 5 centimetri wiesgħa. Fil-harifa, ir-rimjiet jifgħu l-weraq tagħhom u jinxfu 'l bogħod, u jippermettulhom li jinqata' lura 'l bogħod bħal pjanti perenni. L-isem botaniku huwa derivat mill-fjura bħal xehda tas-sriedu: erythros (Grieg għall-aħmar) u crista-galli (Latin għal xehda). Twissija: il-partijiet kollha tal-pjanta huma velenużi. **Post naturali:** L-arbuxxell tal-qroll huwa indiġenu għall-Brazil, il-Paragwai, il-Boliviya u l-Argentina. Hemm hafna drabi tikber fil-foresti tal-galleriji fit-tarf tax-xtut tax-xmajjar. Issa hija kkultivata mad-dinja kollha bħala pjanta ornamental. **Kultivazzjoni b'suċċess:** It-tkabbir miż-żrieragħ gewwa huwa possibbli s-sena kollha. Madankollu, tieħu madwar erba 'snin sal-ewwel fjoritura. L-ewwel poġġi ż-żrieragħ f'kontenitur b'ilma shun tal-kamra għal tnaħ il siegħabiex tinkiseb nefħa u b'hekk il-germinazzjoni mtejbja. Imbagħad biss poġġiha madwar centimetru fond f'hamrija niedja li qed tikber. Stretch cling film fuq il-bastiment tal-kultura u poka f'it toqob fil-film. Dan jipproteġi l-hamrija milli tinxef. Għandek tneħhi l-folj għal sagħtejn kull jumejn jew tlett ijiem. Dan jipprevjeni l-iffurmar tal-moffa fuq il-hamrija li qed tikber. Poġġi l-borma taż-żerriegħa f'post hafif u shun b'20 sa 25 ° Celsius u żomm il-hamrija tal-qrsari niedja iżda mhux imxarrba. Normalment jieħu ġimagħtejn sa erba 'ġimghat biex jiġġerminaw **L-aħjar post:** Peress li l-bush tal-qroll jinbet biss relativament tard, huwa rakkomandabbli li jmxexxi 'il quddiem fil-kamra minn Marzu għal fjur kmieni tas-sajf. Bħala pjanta tal-kontenitur, huwa aħjar li tpoġġi l-arbuxxell tiegħek barra f'xmxx shuna u shiħa matul is-sajf minn nofs Mejju sal-aħħar ta 'Settembru. Matul din il-faži ta 'tkabbir u fjoritura, il-post għandu jkun xemxi kemm jista' jkun. **Kura ottimali:** Bħala pjanta tal-kontenitur, l-arbuxxell tal-qroll huwa wieħed mill-varjetajiet ta 'kura faċli. Matul il-faži ta-tkabbir u l-fjoritura, madankollu, teħtieġ ilma regolari u hafna. Fi għranet shan, hafna drabi trid tisqija filgħodu u filgħaxija. Għandek titmaha b'fertilizzant likwidu kull ġimghatejn matul il-faži ta-tkabbir u kull ġimgha matul il-faži tal-fjoritura. Wara l-fjur, naqqas it-tisqija u naqqas it-tisqija għal linja baži minima minn Ottubru. L-impjant huwa repotted fir-rebbieġha kull sentenja sa erba 'snin f'hamrija qrsari jew tahlita ta' nofs hamrija tal-ġnien u kompost. Neħhi regolarment il-fjoritur i nixfin biex tikseb fjoritura twila f'diversi stadij. **Fix-xitwa:** Fl-aħħar tal-harifa, ir-rimjiet jinqatgħu madwar 10 cm 'il fuq mit-tronk u l-arbuxxell tal-qroll jinżel l-aħjar b'umdiġa minima tal-art f'kamra mudlama u hieġla mill-ġlata b'temperatura taħt 10 ° Celsius. Minn Marzu għandek tagħtiha post aktar shun u qawwi fil-kamra għall-propulsjoni u bil-mod iżid it-tisqija mill-ġdid. **Jekk jogħġbok innota: iż-żrieragħ huma velenużi!**



Caribische Koraalstruik Erythrina crista-galli Een vlammenzee van juni tot september

De nationale plant van Argentiniē kan gemakkelijk in een emmer worden gehouden, bereikt een ideale pothoogte van gemiddeld 1,50 meter en ontwikkelt in de zomer van juni tot september een vlammenzee met vurig rode vlinderbloesems. Door de jaren heen ontwikkelt hij een korte, dikke stam met lange, sierlijke en vaak doornige takken. Aan het eind staan de tot 25 centimeter lange druiven met talrijke bloemen tot 5 centimeter breed. In de herfst laten de scheuten hun blad vallen en drogen ver naar achteren, zodat ze als een vaste plant ver naar achteren kunnen worden geknipt. De botanische naam is afgeleid van de hanekamachtige bloem: erythros (Grieks voor rood) en crista-galli (Latijn voor hanekam). Waarschuwing: de plant is in alle delen giftig. **Natuurlijke locatie:** De koraalstruik komt oorspronkelijk uit Braziliē, Paraguay, Bolivia en Argentiniē. Daar groeit het vaak in galeriebossen aan de rand van rivieroevers. Het wordt nu wereldwijd geteeld als sierplant. **Succesvolle teelt:** Binnen kweken uit zaden is het hele jaar mogelijk. Het duurt echter ongeveer vier jaar om voor de eerste keer te bloeien. Plaats de zaden eerst twaalf uur in een vat met kamerwarm water om op te zwellen en zo hun kiemkracht te verbeteren. Pas dan plaats je hem ongeveer 2,5 cm diep in vochtige potgrond. Rek huishoudfolie over de kweekbak en prik een paar gaatjes in de folie. Dit beschermt de aarde tegen uitdroging. Om de twee tot drie dagen moet u de film gedurende 2 uur verwijderen. Dit voorkomt schimmelvorming op de teeltgrond. Zet de kweekbak op een lichte en warme plaats met 20 à 25 ° Celsius en houd de kweekgrond vochtig, maar niet nat. Het duurt meestal twee tot vier weken voordat het ontkiemt **De beste locatie:** Omdat de koraalstruik relatief laat uitloopt, is het aan te raden om hem vanaf maart de kamer in te rijden voor een vroege zomerbloei. Als kuipplant zet u uw struik tijdens de zomer van half mei tot eind september het beste buiten in een warme, volle zon. Tijdens deze groei- en bloeifase moet de plaats zo zonnig mogelijk zijn. **Optimale verzorging:** Als kuipplant is de koraalstruik een van de gemakkelijk te onderhouden soorten. Tijdens de groei- en bloeifase heeft ze echter regelmatig en overvloedig water nodig. Op warme dagen moet je 's ochtenden en 's avonds vaak water geven. Tijdens de groeifase en wekelijks tijdens de bloeifase moet je hem elke twee weken vloeibare mest geven. Na de bloei de watergift verminderen en de watergift vanaf oktober verminderen tot een minimale basisvoorraad. In het voorjaar wordt de plant elke twee tot vier jaar verpot in potgrond of een mengsel van halve tuingrond en compost. Verwijder regelmatig de verdorde bloeiwijzen om in meerdere partijen een lange bloeitijd te bekomen. **In de winter:** In de late herfst worden de scheuten ongeveer 10 cm boven de stam afgesneden en overwintert de koraalstruik het beste met minimaal vocht in een donkere, vorstvrije ruimte met temperaturen onder de 10 ° Celsius. Geef hem vanaf maart een warmere, lichte plek in de kamer voor de opmars en verhoog langzaam de bewatering. **Let op: de zaden zijn giftig!**



Karibisk korallbusk

Erythrina crista-galli

Et hav av flammer fra juni til september

Den nasjonale planten i Argentina kan enkelt holdes i en bølge, når en ideell pottehøyde på 1,50 meter i gjennomsnitt og utfolder et hav av flammer med flammende røde sommerfugl blomstrer om sommeren fra juni til september. Med årene utvikler hun en kort, tykk stamme med lange, elegante og ofte tornete greiner. På enden sitter de opptil 25 centimeter lange rasene med mange blomster opp til 5 centimeter brede. Om høsten kaster skuddene bladene og tørker langt bak, slik at de kan beskjæres langt tilbake som en stau. Det botaniske navnet er avledet fra den hanekamliggende blomsten: erythros (gresk for rød) og crista-galli (latin for hanekam). Advarsel: alle deler av planten er giftige. **Naturlig beliggenhet:** Korallbusken er hjemmehørende i Brasil, Paraguay, Bolivia og Argentina. Der vokser den ofte i galleriskoger på kanten av elvebredden. Den dyrkes nå over hele verden som en prydblant. **Vellykket dyrking:** Å dyrke fra frø innendørs er mulig hele året. Det tar imidlertid omtrent fire år til den første blomstringen. Legg først frøene i en beholder med romvarmt vann i tolv timer for å oppnå hevelse og dermed forbedret spiring. Først da plasserer du den omtrent 10 centimeter dyp i fuktig vekstjord. Strekk matfilm over kulturkaret og stikk noen hull i filmen. Dette beskytter jorda mot å tørke ut. Du bør fjerne folien i 2 timer annenhver til tredje dag. Dette forhindrer at det dannes mugg på den voksende jorda. Plasser frøpotten på et lett og varmt sted med 20 til 25° Celsius og hold pottejorda fuktig, men ikke våt. Det tar vanligvis to til fire uker å spire. **Den beste beliggenheten:** Siden korallbusken først spirer relativt sent, er det lurt å drive den frem i rommet fra mars for en forsommerblomstring. Som containerplante er det best å plassere busken utendørs i en varm, full sol om sommeren fra midten av mai til slutten av september. Under denne vekst- og blomstringsfasen skal stedet være så solrikt som mulig. **Optimal omsorg:** Som en containerplante er korallbusken en av de lettstelte variantene. I vekst- og blomstringsfasen trenger den imidlertid regelmessig og rikelig med vann. På varme dager må den ofte vannes morgen og kveld. Du bør mate den med flytende gjødsel annenhver uke i vekstfasen og ukentlig i blomstringsfasen. Etter blomstring, reduser vanningen og reduser vanningen til minimum grunnlinje fra oktober. Planten plantes om våren hvert annet til fjerde år i pottejord eller en blanding av halv hagejord og kompost. Fjern de visne blomsterstandene regelmessig for å oppnå lang blomstring i flere stadier. **Om vinteren:** På senhøsten klippes skuddene ca 10 cm over stammen og korallbusken overvintrer best med minimal markfuktighet i et mørkt frostfritt rom med temperaturer under 10° Celsius. Fra mars bør du gi den et varmere, lyst sted i rommet for fremdrift og sakte øke vanningen igjen. **Vennligst merk: frøene er giftige!**



Karaibski Krzew Koralow

Erythrina crista-galli

Morze płomieni od czerwca do września

Narodowa roślina Argentyny może być łatwo uprawiana jako roślina doniczkowa, najlepiej rośnie średnio 1,50 metra w doniczce i rozwija się latem od czerwca do września w morzu płomieni z ognistymi czerwonymi kwiatami motyli. Z biegiem lat rozwija krótką, grubą łodygę z długimi, wdzicznymi i ciernistymi gałęziami z winogronami o długości do 25 cm i dużymi kwiatami do 5 cm. Jesienią pędy wyrzucają liście i prawie wysychają, więc można je przycinać mocno jak krzew. Jej botaniczna nazwa pochodzi od kwiatów w kształcie grzebieniowatych: „erythros” oznacza po grecku czerwony, a „crista-galli” to po łacinie herb koguta. Ostrzeżenie! Roślina jest trująca w każdej części. **Naturalne położenie:** Drzewo koralowe Cockspur ma swoje naturalne środowisko w Brazylii, Paragwaju, Boliwii i Argentynie. Tam często spotykany jest w lasach galerii w pobliżu brzegów rzek. Dziś jest uprawiana jako roślina ozdobna we wszystkich częściach świata. **Udana uprawa:** Rozmnażanie nasion w pomieszczeniach jest możliwe przez cały rok. Ale pierwsze kwitnienie zajmie około czterech lat. Umieść nasiona na około 12 godzin w ciepłej wodzie, aby zagruntować, aby zwiększyć zdolność kiełkowania. Następnie posadź nasiona na głębokość około 1 cm w wilgotnym kompoście doniczkowym i przykryj pojemnik na nasiona przezroczystą folią, aby zapobiec wysychaniu ziemi. Nie zapomnij zrobić dziur w przezroczystej folii i zdejmować ją co drugi lub trzeci dzień na około 2 godziny. W ten sposób unikniesz tworzenia się pleśni na kompoście doniczkowym. Umieść pojemnik na nasiona w miejscu jasnym i ciepłym o temperaturze od 20 ° C do 25 ° Celsjusza i utrzymuj ziemię w stanie wilgotnym, ale nie mokrym. Kiełkowanie zwykle rozpoczyna się po dwóch do czterech tygodni. **Najlepsza lokalizacja:** Drzewo koralowe Cockspur zwykle kiełkuje bardzo późno. W przypadku kwitnienia wczesnym latem wskazane jest wykonanie zdjęć wstępnych w pomieszczeniach na początku marca. Następnie, od połowy maja do końca września, najlepiej jest sadzić wannę na zewnątrz w ciepłym i pełnym słońcu miejscu. W okresie wzrostu i kwitnienia należy trzymać w miejscu możliwie słonecznym. **Optymalna pielęgnacja:** Drzewo koralowe Cockspur jest raczej beztrzoskie, ale należy je podlewać podczas wzrostu i regularnie i wystarczająco kwitnąć. W upalne dni podlewanie jest wymagane nawet dwa razy, rano i wieczorem. W okresie wzrostu potrzebuje również płynnego nawozu co dwa tygodnie, podczas kwitnienia co tydzień. Po kwitnieniu możesz dać mniej wody, a od października wystarczy tylko minimalna ilość wody. Co dwa do czterech lat drzewo należy przzenieść do nowej doniczki, używając albo dobrej jakości ziemi do roślin doniczkowych, albo mieszanki połowy ziemi ogrodowej i połowy ziemi kompostowej. Suszone kwiatostany regularnie wycinaj, aby uzyskać dłuższe kwitnienie w kilku falach. **W zime:** Późną jesienią należy ścinać kielki około 10 cm powyżej łodygi. Podczas hibernacji Cockspur Coral Tree najlepiej przechowywać tylko lekko wilgotne, w ciemnym, wolnym od mrozu pomieszczeniu o temperaturze poniżej 10 ° Celsjusza. Od marca należy przenieść roślinę w cieplejsze i jaśniejsze miejsce w domu, aby mogła powoli ponownie zacząć strzelać i odpowiednio zwiększyć podlewanie. **Uwaga: nasiona są trujące!**



Arbusto coral caribenho

Erythrina crista-galli

Um mar de chamas de junho a setembro

A planta nacional da Argentina pode ser facilmente guardada em um balde, atinge uma altura ideal de vaso de 1,50 metros em média e revela um mar de chamas com flores de borboleta vermelha ardente no verão de junho a setembro. Com o passar dos anos, ela desenvolve um tronco curto e grosso com galhos longos, elegantes e muitas vezes espinhosos. No final estão os racemos de até 25 centímetros de comprimento com numerosas flores de até 5 centímetros de largura. No outono, os brotos perdem as folhas e secam bem para trás, permitindo que sejam podados bem para trás como uma planta perene. O nome botânico é derivado da flor em forma de crista de galo: erythros (grego para vermelho) e crista-galli (latim para crista de galo). Aviso: todas as partes da planta são venenosas. **Localização natural:** O arbusto de coral é nativo do Brasil, Paraguai, Bolívia e Argentina. Lá cresce frequentemente em matas ciliares à beira dos rios. Atualmente é cultivada em todo o mundo como planta ornamental. **Cultivo bem sucedido:** Cultivar a partir de sementes dentro de casa é possível durante todo o ano. No entanto, leva cerca de quatro anos até a primeira floração. Primeiro coloque as sementes em um recipiente com água morna por doze horas para atingir o inchaço e assim melhorar a germinação. Só então você o coloca a cerca de um centímetro de profundidade no solo úmido em crescimento. Estique o filme plástico sobre o recipiente de cultura e faça alguns furos no filme. Isso protege o solo de secar. Você deve remover o papel alumínio por 2 horas a cada dois ou três dias. Isso evita a formação de mofo no solo em crescimento. Coloque o vaso de sementes em um local claro e quente com 20 a 25 ° Celsius e mantenha o solo do vaso úmido, mas não molhado. Geralmente leva de duas a quatro semanas para germinar. **A melhor localização:** Como o arbusto de coral só brota relativamente tarde, é aconselhável conduzi-lo para a frente na sala a partir de março para uma floração no início do verão. Como uma planta de contêiner, é melhor colocar seu arbusto ao ar livre em um sol quente e pleno durante o verão, de meados de maio até o final de setembro. Durante esta fase de crescimento e floração, o local deve estar o mais ensolarado possível. **Cuidado ideal:** Como planta de contêiner, o arbusto de coral é uma das variedades de fácil manutenção. Durante a fase de crescimento e floração, porém, precisa de água regular e abundante. Em dias quentes, muitas vezes tem que ser regada de manhã e à noite. Você deve alimentá-lo com fertilizante líquido a cada duas semanas durante a fase de crescimento e semanalmente durante a fase de floração. Após a floração, reduza a rega e reduza a rega ao mínimo a partir de outubro. A planta é replantada na primavera a cada dois a quatro anos em solo para vasos ou uma mistura de meio solo de jardim e composto. Remova regularmente as inflorescências murchas para obter uma floração longa em vários estágios. **No inverno:** No final do outono, os brotos são cortados cerca de 10 cm acima do tronco e o arbusto de coral hiberna melhor com o mínimo de umidade do solo em uma sala escura e sem gelo, com temperaturas abaixo de 10° Celsius. A partir de março, você deve dar a ele um local mais quente e iluminado na sala para propulsão e aumentar lentamente a rega novamente. **Atenção: as sementes são venenosas!**



Tufă De Corali

Erythrina crista-galli

O mare de flăcări din iunie până în septembrie

Planta națională din Argentina poate fi păstrată cu ușurință într-o găleată, atinge o înălțime ideală a ghiveciului de 1,50 metri în medie și dezvoltă o mare de flăcări cu flori de flutur roșu aprins vara din iunie până în septembrie. De-a lungul anilor dezvoltă un trunchi scurt, gros, cu ramuri lungi, elegante și adesea spinosae. La sfârșit sunt struguri cu lungimea de până la 25 de centimetri, cu numeroase flori de până la 5 centimetri lățime. Toamna lăstarii își aruncă frunzele și se usucă mult în spate, astfel încât să poată fi tăiați mult înăpoi ca o plantă perenă. Denumirea botanică este derivată din floarea asemănătoare cicoșului: erythros (în greacă pentru roșu) și crista-galli (în latină pentru coaja de cocoș). Atenție: planta este otrăvitoare în toate părțile. **Locație naturală:** Tufa de corali este originară în Brazilia, Paraguay, Bolivia și Argentina. Acolo crește adesea în pădurile galeriei de la marginea malurilor râurilor. Acum este cultivată la nivel mondial ca plantă ornamentală. **Cultivare de succes:** Cultivarea din semințe în interior este posibilă pe tot parcursul anului. Cu toate acestea, durează aproximativ patru ani pentru a înflori pentru prima dată. Așezați mai întâi semințele într-un vas cu apă caldă în cameră timp de douăsprezece ore, pentru a se umfla și a-și îmbunătăți astfel capacitatea de germinare. Doar atunci îl așezați cu o adâncime de aproximativ un centimetru în sol umed de ghiveci. Întindeți folia alimentară peste recipientul de cultivare și introduceți câteva găuri în film. Acest lucru protejează pământul de uscare. La fiecare două până la trei zile ar trebui să îndepărtați filmul timp de 2 ore. Acest lucru previne formarea mușcăiului pe solul de cultivare. Așezați vasul de cultivare într-un loc luminos și cald, cu 20-25 ° Celsius și mențineți solul de cultivare umed, dar nu umed. De obicei durează două până la patru săptămâni pentru germinare. **Cea mai bună locație:** Deoarece tufișul de corali răsare relativ târziu, este recomandabil să îl conduceți în cameră din martie pentru o floare la începutul verii. Ca plantă container, cel mai bine este să vă așezați arbustul în aer liber, într-un soare cald și plin, în timpul verii, de la mijlocul lunii mai până la sfârșitul lunii mai septembrie. În această fază de creștere și înflorire, locul ar trebui să fie cât mai însorit posibil. **Îngrijire optimă:** Ca plantă container, tufa de corali este una dintre soiurile ușor de întreținut. Cu toate acestea, în timpul fazei de creștere și înflorire are nevoie de apă regulată și abundentă. În zilele caniculare, este adesea necesar să udăm dimineață și seara. Ar trebui să-i asigurați îngrășământ lichid la fiecare două săptămâni în timpul fazei de creștere și săptămânal în timpul fazei de înflorire. După înflorire, reduceți udarea și reduceți udarea din octombrie la o aprovizionare minimă de bază. La fiecare doi până la patru ani în primăvară, planta este repopulată în sol în ghivece sau într-un amestec de jumătate de sol de grădină și compost. **În iarnă:** La sfârșitul toamnei, lăstarii sunt tăiați la aproximativ 10 cm deasupra trunchiului, iar tufa de corali hibernează cel mai bine cu umiditate minimă într-o cameră întunecată, fără îngheț, cu temperaturi sub 10 ° Celsius. Din martie ar trebui să-i oferi un loc mai cald și ușor în cameră pentru avans și să crești încet udarea din nou. **Vă rugăm să rețineți: semințele sunt otrăvitoare!**



Karibisk Korallbuske

Erythrina crista-galli

Ett flammhäv från juni till september

Argentinas nationella växt kan lätt förvaras i en hink, när en idealisk krukhöjd på i genomsnitt 1,50 meter och utvecklar ett flammhäv med eldröda fjärilsblommor på sommaren från juni till september. Under åren utvecklas en kort, tjock bagage med långa, eleganta och ofta taggiga grenar. I slutet finns de upp till 25 centimeter långa druvorna med många blommor upp till 5 centimeter breda. På hösten skjuter skotten sina löv och torkar långt tillbaka så att de kan klippas långt tillbaka som en flerårig. Det botaniska namnet härstammar från den hanekamlänkande blomman: erythros (grekiska för rött) och crista-galli (latin för hanekam). Varning: växten är giftig i alla delar. **Naturligt läge:** Korallbusken är infödd i Brasilien, Paraguay, Bolivia och Argentina. Där växer det ofta i galleriskogar i utkanten av flodstränderna. Det odlas nu över hela världen som en prydnadsväxt. **Framgångsrik odling:** Att växa från frön inomhus är möjligt året runt. Det tar dock ungefär fyra år att blomma för första gången. Placera först fröna i ett kärl med rumsvarmt vatten i tolv timmar för att svälla dem och därmed förbättra deras spiringskapacitet. Först då placeras du den ungefär en tum djupt i fuktig krukväxtjord. Sträck fast folie över odlingskärl och sticka några hål i filmen. Detta skyddar jorden från att torka ut. Varannan till var tredje dag ska du ta bort filmen i två timmar. Detta förhindrar bildning av mögel på odlingsjorden. Placera odlingskärl på en ljus och varm plats med 20 till 25 ° Celsius och håll odlingsjorden fuktig men inte våt. Det tar vanligtvis två till fyra veckor för spiring. **Den bästa platsen:** Eftersom korallbusken groddar relativt sent är det tillräckligt att köra den i rummet från mars för en tidig sommarblomning. Som en containerväxt är det bäst att placera din buske utomhus i en varm, full sol under sommaren från mitten av maj till slutet av september. Under denna tillväxt- och blomningsfas bör platsen vara så solig som möjligt. **Optimal vård:** Som en containerväxt är korallbusken en av de lättködda sorterna. Men under tillväxt- och blomningsfasen behöver den regelbundet och rikligt med vatten. På varma dagar måste du ofta vattna på morgonen och kvällen. Du bör förse den med flytande gödselmedel varannan vecka under tillväxtfasen och varje vecka under blomningsfasen. Efter blomningen, minska vattnet och minska vattnet från oktober till ett minimum basutbud. Vart vart fjärde år på våren omplanteras växten i krukväxtjord eller en blandning av halv trädgårdsmark och kompost. Ta bort de visna blomställningarna för att uppnå en lång blomningsperiod i flera omgångar. **På vintern:** På senhösten skärs skotten cirka 10 cm ovanför stammen och korallbusken övervintrar bäst med minimal fukt i ett mörkt, frostfritt rum med temperaturer under 10 ° Celsius. Från mars bör du ge honom en varmare, lätt plats i rummet för framsteg och sakta öka vattnet igen. **Observera: fröna är giftiga!**



Karibisk koralový ker

Erythrina crista-galli

More plameňov od júna do septembra

Argentínska národná rastlina sa dá ľahko uchovávať vo vedre, dosahuje ideálnu výšku kvetníc na priemere 1,50 metra a v lete od júna do septembra rozvinie more plameňov s ohnivocervenými motýľovými kvetmi. V priebehu rokov sa z nej vyvinie krátky, hrubý kmeň s dlhými, elegantnými a často ostrými vetvami. Na konci nasadia až 25 cm dlhé strapce s početnými kvetmi širokými až 5 cm. Na jeseň výhonky zhadzujú listy a zasychajú ďaleko dozadu, čo im umožňuje orezať ich ďaleko dozadu ako trvalku. Botanický názov je odvodený od kvetu podobného kohútium hrebienku: erythros (grécky červený) a crista-galli (lat. hrebeň). Upozornenie: všetky časti rastliny sú jedovaté. **Prirodzená poloha:** Koralový ker pochádza z Brazílie, Paraguaja, Bolívie a Argentíny. Tam často rastie v galerijných lesoch na okraji brehov riek. V súčasnosti sa celosvetovo pestuje ako okrasná rastlina. **Úspešná kultivácia:** Pestovanie zo semien v interiéri je možné po celý rok. Do prvého kvitnutia však trvá asi štyri roky. Najprv umiestnite semená do nádoby s izbovou teplotou na dvanásť hodín dosiahnutie opuchu a tým zlepšíte klíčivosť. Až potom ho umiestnite asi jeden centimeter hlboko do vlhkej pestovateľskej pôdy. Natiahnite prilnavú fóliu na nádobu s kultúrou a urobte do nej niekoľko otvorov. To chráni pôdu pred vysychaním. Fóliu by ste mali odstraňovať na 2 hodiny každé dva až tri dni. To zabráňuje tvorbe plesní na rastúcej pôde. Črepník umiestnite na svetlé a teplé miesto s teplotou 20 až 25 °C a udržiavajte pôdu v črepníku vlhkú, ale nie mokrú. Klíčenie zvyčajne trvá dva až štyri týždne. **Najlepšie umiestnenie:** Každé koralový ker raší až pomerne neskoro, je vhodné ho od marca nahnať dopredu v miestnosti, aby rozkvitol začiatkom leta. Ako kontajnerovú rastlinu je najlepšie umiestniť ker vonku na teplé a plné slnko počas leta od polovice mája do konca septembra. Počas tejto fázy rastu a kvitnutia by malo byť miesto čo najslnečnejšie. **Optimálna starostlivosť:** Ako kontajnerová rastlina je koralový ker jednou z odrôd nenáročných na starostlivosť. Vo fáze rastu a kvitnutia však potrebuje pravidelnú a dostatok vody. V horúcich dňoch sa často musí polievať ráno a večer. Mali by ste ho kŕmiť tekutým hnojivom každé dva týždne počas fázy rastu a raz týždenne počas fázy kvitnutia. Po odkvitnutí znížte zálievku a od októbra znížte zálievku na minimálnu základnú líniu. Rastlinu presádzame na jar každé dva až štyri roky do črepníkov zeminou alebo zmiešanou polovicou záhradnej zeminou a kompostu. Odschnuté súkvetia pravidelne odstraňujte, aby ste dosiahli dlhé kvitnutie v niekoľkých fázach. **V zime:** Koncom jesene sa výhonky odrežú asi 10 cm nad kmeňom a koralový ker najlepšie prezimuje pri minimálnej prízemnej vlhkosti v tmavej bezmrzačnej miestnosti s teplotami pod 10 ° Celzia. Od marca by ste jej mali dopriať teplejšie svetlé miesto v miestnosti na pohon a zálievku opäť pomaly zvyšovať. **Pozor, semená sú jedovaté!**



Karibski koralni grm

Erythrina crista-galli

Morje plamenov od junija do septembra

Nacionalno rastlino Argentine je mogoče enostavno hraniti v vedru, v povprečju doseže idealno višino lonca 1,50 metra in poleti od junija do septembra razgrne morje plamenov z ognjeno rdečimi cvetovi metulja. Z leti razvije kratko, debelo debló z dolgimi, elegantnimi in pogosto trnastimi vejami. Na koncu sedijo do 25 centimetrov dolge socvetje s številnimi do 5 centimetrov širokimi cvetovi. Jeseni poganjki odvržejo liste in se posušijo daleč nazaj, kar omogoča, da jih porežemo daleč nazaj kot trajnice. Botanično ime izhaja iz cveta, podobnega petelinjemu glavniku: erythros (grško za rdeče) in crista-galli (latinsko za petelinji glavnik). Opozorilo: vsi deli rastline so strupeni. **Naravni habitat:** Koralni grm je doma v Braziliji, Paragvaju, Boliviji in Argentini. Tam pogosto raste v galerijskih gozdovih na obrobju rečnih bregov. Zdj se po vsem svetu goji kot okrasna rastlina. **Navodila za gojenje:** Gojenje iz semen v zaprtih prostorih je možno vse leto. Do prvega cvetenja pa traja približno štiri leta. Semena najprej ur postavite v posodo s sobno toplo vodo da dosežemo nabrekanje in s tem izboljšamo kalitev. Šele nato ga položite približno en centimeter globoko v vlažno rastno zemljo. Preko posode s kulturo napnite živilsko folijo in v folijo prebodite nekaj lukenj. To ščiti tla pred izsušitvijo. Vsake dva do tri dni za 2 uri odstranite folijo. S tem preprečimo nastanek plesni na rastni zemlji. Lonček s semeni postavite na svetlo in toplo mesto s temperaturo od 20 do 25 °C, zemlja v lončku pa naj bo vlažna, vendar ne mokra. Običajno traja dva do štiri tedne, da vzklije. **Najboljša lokacija:** Ker koralni grm vzklije relativno pozno, ga je priporočljivo od marca naprej pogoniti v prostor za zgodnje poletno cvetenje. Kot rastlino v posodah je najbolje, da svoj grm postavite na prosto, na toplo, polno sonce poleti od sredine maja do konca septembra. V tej fazi rasti in cvetenja naj bo mesto čim bolj sončno. **Optimalna nega:** Kot kontejnerska rastlina je koralni grm ena izmed sort, ki jih je enostavno vzdrževati. V fazi rasti in cvetenja pa potrebuje redno in obilno zalivanje. V vročih dneh ga je treba pogosto zalivati zjutraj in zvečer. Hraniti ga morate s tekočim gnojilom vsaka dva tedna v fazi rasti in tedensko v fazi cvetenja. Po cvetenju zmanjšajte zalivanje in zmanjšajte zalivanje na minimalno izhodisko vrednost od októbra. Rastlino presadimo spomladi vsaki dve do štiri leta v zemljo za lončnice ali mešanico polovice vrtné zemlje in komposta, redno odstranjujemo odcvetela socvetja, da dosežemo dolgo cvetenje v več fazah. **V zimskem času:** Pozno jeseni poganjke odrežemo približno 10 cm nad deblom in koralni grm najbolje prezimi ob minimalni vlagi tal v temnem prostoru brez zmrzali in temperaturah pod 10°C. Od marca ji namenite toplejši, svetel prostor v prostoru za poganjanje in počasi ponovno povečajte zalivanje. **Pozor: semena so strupena!**



Árbol del coral

Erythrina crista-galli

Un mar en llamas desde junio a septiembre

La planta nacional de Argentina puede ser cultivada en maceta y puede alcanzar una altura de 1,5 metros. En verano desarrolla, desde junio a septiembre, un mar en llamas con sus flores de mariposa en rojo fuego. Con el paso de los años desarrolla un tronco corto pero ancho, con ramas largas, elegantes y a veces con espigas. Al final reposan las bayas de 25 centímetros de largo con hojas de hasta 5 centímetros de ancho. En otoño pierde sus hojas y las ramas se encogen. Ahora se puede podar bastante, como un arbusto. El nombre botánico lo recibe por sus hojas con forma de cresta de gallo: erythros (griego: rojo) y crista-galli (latín: cresta de gallo). Atención: esta planta es venenosa en todas sus partes. **Ubicación natural:** El árbol del coral es natural de Brasil, Paraguay, Bolivia y Argentina. Allí crece mucho en bosques, en los bordes de las orillas de ríos. En todo el mundo se deja cultivar como planta ornamental. **Cultivo exitoso:** La semilla se puede criar en interior durante todo el año. Hasta la primera floración pueden pasar cuatro años. Mantenga las semillas durante 12 horas en agua a temperatura ambiente para aumentar la germinación de las mismas. Después introduzca las semillas en sustrato húmedo a un centímetro de profundidad. Cubra el recipiente de cultivo con un film transparente y agüerélo. Así protegerá la tierra de la desecación. Para evitar la putrefacción del sustrato retire el film cada dos o tres días durante 2 horas. Coloque el recipiente de cultivo en un lugar luminoso y cálido entre 20 y 25 grados y mantenga el sustrato húmedo, pero no mojado. Hasta la germinación pasarán habitualmente de unas dos a doce semanas. **La mejor ubicación:** El árbol del coral brota relativamente tarde, por lo que se recomienda mantenerlo en interior para que en marzo empiece a brotar. Como planta en maceta lo puede mantener en interior durante los meses de verano, desde mediados de mayo y hasta finales de septiembre, en un lugar cálido y soleado. Durante este periodo de crecimiento y floración debe permanecer en un sitio lo más soleado posible. **Cuidado óptimo:** Como planta en maceta este arbusto es una especie muy fácil de cultivar. Durante el periodo de crecimiento y floración necesita riego regular y con bastante agua. Debe suministrarle fertilizante líquido para plantas en maceta, cada dos semanas en la fase de crecimiento y semanalmente durante la floración. Después de la floración reduzca el riego y a partir de octubre suminístrele solo el agua necesaria. Cada cuatro años se recomienda trasplantarlo, en una mezcla de mitad tierra para jardinería y compost. Para obtener una floración en varios momentos se recomienda eliminar la inflorescencia marchita. **En el invierno:** A finales de otoño debe podar el rebrote alrededor de 10 centímetros por encima del tronco y situar el arbusto para invernar preferentemente con una humedad mínima, en un lugar oscuro y sin heladas, con temperaturas por debajo de los 10 grados. A partir de marzo se aconseja pasarlo a un lugar más luminoso y cálido en interior y aumentar el suministro de agua poco a poco, para así lograr una propulsión temprana. **Tenga en cuenta: ¡Las semillas son venenosas!**



Karibský korálový keř Erythrina crista-galli Moře plamenů od června do září

Argentinskou národní rostlinu lze snadno chovat v kbelíku, dosahuje ideální výšky květináče v průměru 1,50 metru a v létě od června do září rozvíjí moře plamenů s ohnivě červenými motýlími květy. V průběhu let si vyvine krátký, silný kmen s dlouhými, elegantními a často trnitými větvemi. Na konci nasedají až 25 cm dlouhé hrozní s četnými květy až 5 cm širokými. Na podzim výhonky shazují listy a usychají daleko dozadu, což jim umožňuje seřezávat daleko dozadu jako trvalku. Botanický název je odvozen od květu podobného kohoutímu hřebínku: erythros (řecky červený) a crista-galli (latinsky kohoutí hřebínek). Upozornění: všechny části rostliny jsou jedovaté. **Přirozená poloha:** Korálový keř pochází z Brazílie, Paraguaye, Bolívie a Argentiny. Tam často roste ve štolových lesích na okraji břehů řek. Nyní se celosvětově pěstuje jako okrasná rostlina. **Úspěšné pěstování:** Pěstování ze semínek v interiéru je možné po celý rok. Do prvního kvetení však trvá asi čtyři roky. Nejprve umístíte semena na dvanáct hodin do nádoby s pokojově teplou vodou dosázení bobtnání a tím zlepšení klíčení. Teprve poté je umístíte asi jeden centimetr hluboko do vlhké pěstební půdy. Natáhněte přínavou fólii přes kultivační nádobu a propíchněte do fólie několik otvorů. To chrání půdu před vysycháním. Fólii byste měli odstraňovat na 2 hodiny každé dva až tři dny. Tím se zabrání tvorbě plísni na rostoucí půdě. Umístěte květináč na světlé a teplé místo s teplotou 20 až 25 °C a udržujte půdu v květináči vlhkou, ale ne mokrou. Klíčení obvykle trvá dva až čtyři týdny. **Nejlepší umístění:** Vzhledem k tomu, že korálový keř raší až poměrně pozdě, je vhodné jej od března zahnat dopředu v místnosti, aby brzy v létě kvetl. Jako kontejnerovou rostlinu je nejlepší umístit váš keř venku na teplém a plném slunci během léta od poloviny května do konce září. Během této fáze růstu a kvetení by mělo být místo co nejslunnější. **Optimální péče:** Jako kontejnerová rostlina je korálový keř jednou z odrůd nenáročných na péči. Ve fázi růstu a květu však potřebuje pravidelnou a dostatek vody. V horkých dnech se často musí zalévat ráno a večer. Měli byste ji krmit tekutým hnojivem každé dva týdny ve fázi růstu a jednou týdně ve fázi květu. Po odkvětu omezte zalívku a od října omezte zalívku na minimální základní linii. Rostlina se přesazuje na jaře každé dva až čtyři roky do květináče nebo směsi poloviční zahradní zeminy a kompostu. Pro dosažení dlouhého kvetení v několika fázích pravidelně odstraňujte odkvetlá květenství. **V zimě:** V pozdním podzimu se výhonky odříznou asi 10 cm nad kmenem a korálový keř přezimuje nejlépe při minimální zemní vlhkosti v tmavé, bezmrazé místnosti s teplotami pod 10° Celsia. Od března byste mu měli dopřát teplejší světlé místo v místnosti na pohon a zalívku opět pomalu zvyšovat. **Pozor: semena jsou jedovatá!**



Karayip mercan çalı Erythrina crista-galli Haziran'dan Eylül'e kadar bir alev denizi

Arjantin'in milli bitkisi kolayca bir kovada tutulabilir, ortalama 1,50 metrelik ideal bir saksı yüksekliğine ulaşır ve yaz aylarında Haziran'dan Eylül'e kadar ateşli kırmızı keleşek çiçekleriyle bir alev denizi açar. Yıllar geçtikçe, uzun, zarif ve genellikle dikenli dalları olan kısa, kalın bir gövde geliştirir. Sonunda, 5 cm genişliğe kadar sayısız çiçeklerle 25 cm uzunluğa kadar salkımlar oturmaktadır. Sonbaharda, sürgünler yapraklarını döker ve geride kurur, bu da çok yıllık bir bitki gibi çok geride budanmalarına olanak tanır. Botanik adı, horoziböğü benzeri çiçekten türetilmiştir: erythros (Yunanca kırmızı) ve crista-galli (Latince horoziböğü). Uyarı: Bitkinin tüm kısımları zehirlidir. **Doğal konum:** Mercan çalı Brezilya, Paraguay, Bolivya ve Arjantin'e özgüdür. Orada genellikle nehir kıyılarının kenarındaki galeri ormanlarında yetişir. Artık dünya çapında bir süs bitkisi olarak yetiştirilmektedir. **Başarılı yetiştirme:** İç mekanlarda tohumlardan büyümek tüm yıl boyunca mümkündür. Ancak, ilk çiçeklenmeye kadar yaklaşık dört yıl sürer. Önce tohumları oda sıcaklığında suyla dolu bir kaba on iki saat boyunca koyun, ışıme ve böylece geliştirilmişi çimlenme elde etmek için. Ancak o zaman nemli büyüyen toprağın yaklaşık bir santimetre derinliğine yerleştirirsiniz. Kültür kabının üzerine streç film çekin ve filmde birkaç delik açın. Bu, toprağın kurumasını önler. Folyoyu her iki ila üç günde bir 2 saat çıkarmalısınız. Bu, büyüyen toprakta küf oluşumunu önler. Tohum saksısını 20 ila 25°C sıcaklıkta hafif ve sıcak bir yere koyun ve saksı toprağını nemli tutun ama ıslak değil. Çimlenme genellikle iki ila dört hafta sürer. **En iyi konum:** Mercan çalısı yalnızca nispeten geç filizlendiğinden, yazın erken çiçek açması için Mart ayından itibaren odada ileriye doğru sürülmesi tavsiye edilir. Bir konteyner bitkisi olarak, çalılarınızı yazın Mayıs ortasından Eylül sonuna kadar sıcak, tam güneş alan bir yere yerleştirmek en iyisidir. Bu büyüme ve çiçeklenme aşamasında, nokta mümkün olduğunca güneşli olmalıdır. **Optimum bakım:** Bir saksı bitkisi olarak mercan çalısı, bakımı kolay çesitlerden biridir. Büyüme ve çiçeklenme döneminde ise düzenli ve bol suya ihtiyaç duyar. Sıcak günlerde genellikle sabah ve akşam sulanması gerekir. Büyüme döneminde iki haftada bir, çiçeklenme döneminde ise haftada bir sıvı gübre ile beslemelisiniz. Çiçeklenmeden sonra, sulamayı azaltın ve Ekim ayından itibaren sulamayı minimum taban çizgisine indirin. Bitki, ilkbaharda her iki ila dört yılda bir saksı toprağı veya yarım bahçe toprağı ve kompost karışımı içinde yeniden saksılanır. Birkaç aşamada uzun çiçeklenme elde etmek için solmuş çiçek salkımlarını düzenli olarak çıkarın. **Kışın:** Sonbaharın sonlarında, sürgünler gövdenin yaklaşık 10 cm yukarısında kesilir ve mercan çalısı en iyi kışı minimum zemin nemi ile karanlık, don olmayan ve sıcaklığı 10°C'nin altında olan bir odada geçirir. Mart ayından itibaren, itme için odada daha sıcak, aydınlık bir yer vermeli ve sulamayı tekrar yavaşça artırmalısınız. **Lütfen dikkat: tohumlar zehirlidir!**



Karib-tengeri korallcserje Erythrina crista-galli Lángtenger júniustól szeptemberig

Argentína nemzeti növénye könnyen vödörben tartható, ideális cserépmagasságá átlagosan 1,50 méter, és nyáron júniustól szeptemberig lángtengert bont ki tűzpiros pillangóvirággal. Az évek során rövid, vastag törzsét fejleszt ki hosszú, elegáns és gyakran tuskés ágakkal. A végén ülnek a legfeljebb 25 centiméter hosszú rózsák, számos, legfeljebb 5 centiméter széles virággal. Ősszel a hajtások lehullatják leveleiket, és messzire visszazáradnak, így évelőhöz hasonlóan messzire lehet metszeni őket. A botanikai elnevezés a kakasfiúhoz hasonló virágból származik: erythros (görögül vörös) és crista-galli (latinul kakascomb). Figyelmeztetés: a növény minden része mérgező. **Természetes elhelyezkedés:** A korallcserje Brazíliában, Paraguayban, Bolíviában és Argentínában őshonos. Ott gyakran nő a galériaerdőkben a folyópartok szélén. Ma már világszerte dísznövényként termesztik. **Sikeres termesztés:** A beltéri magvak termesztése egész évben lehetséges. Az első virágzásig azonban körülbelül négy év kell. Először helyezze a magokat egy edénybe szobameleg vízzel tizenkét óráraduzzanat és ezáltal jobb csírázás elérése érdekében. Csak ezután helyezze körülbelül egy centiméter mélyre nedves termőtalajba. Nyújtson ragasztó fóliát a tenyészedényre, és szűrjön ki néhány lyukat a fóliába. Ez megvédi a talajt a kiszáradástól. A fóliát két-három naponta 2 órára le kell venni. Ez megakadályozza a penészképződést a növekvő talajon. Helyezze a magcserepet világos és meleg helyre, ahol a hőmérséklet 20-25°C, és a virágföldet tartsa nedvesen, de ne nedvesen. Általában két-négy hétig tart a csírázás. **A legjobb hely:** Mivel a korallbokor csak viszonylag későn hajt ki, célszerű márciustól előrehajtani a szobában a kora nyári virágzás érdekében. Konténernövényként a legjobb, ha a cserjét a szabadban, meleg, teljes napsütésben helyezi el nyáron május közepétől szeptember végéig. Ebben a növekedési és virágzási szakaszban a helynek a lehető legnaposabbnak kell lennie. **Optimális gondozás:** Konténernövényként a korallcserje a könnyen kezelhető fajták közé tartozik. A növekedési és virágzási szakaszban azonban rendszeres és sok vízre van szüksége. Forró napokon gyakran reggel és este kell öntözni. A növekedési szakaszban kénthetente, a virágzási szakaszban hetente folyékony műtrágyával kell etetni. Virágzás után csökkentse az öntözést, és októbertől minimális alapértékre csökkentse az öntözést. A növényt tavasszal két-négy évente ültetjük át virágföldbe vagy fél kerti föld és komposzt keverékébe. Az elszáradt virágzatot rendszeresen távolítsuk el, hogy több szakaszban hosszú virágzást érjünk el. **Télen:** Késő ősszel a hajtásokat a törzs felett körülbelül 10 cm-rel levágják, és a korallcserje minimális talajnedvesség mellett telet át legjobban egy sötét, fagymentes helyiségben, ahol a hőmérséklet 10 °C alatt van. Márciustól érdemes melegebb, világos helyet adni neki a helyiségben a meghajtáshoz, és lassan ismét növelni az öntözést.

: : : : :



カイコウズ

Erythrina crista-galli

6月から9月にかけて真っ赤な景色

アルゼンチンの国花は鉢植えでも簡単に栽培でき1,5mの高さまで育ち6月から9月には真っ赤な花が咲き誇ります。短く太い幹から鋭く優雅な枝が伸び、先端に5cmほどの大きさの花をつけます。秋には葉が落ちて乾燥するので、大量に剪定できます。植物学名は鶏冠に似た花に由来します：「エリスロス」はギリシア語で赤を意味し「クリスタ・ガリ」はラテン語で鶏冠を意味します。注意！植物のすべての部分は有毒です。

自然な場所:

生息地はブラジル、パラグアイ、ボリビア、アルゼンチンです。川岸近くの森林で見かけます。現在では観葉植物として世界中で栽培されています。

栽培成功:

種子繁殖は室内で年間を通して可能です。植えてから最初の花が咲くまで約4年かかります。発芽性を高めるには、種を温水に約12時間浸します。湿った培養土の深さ約1cmに種を植え、サランラップなどの透明フィルムで鉢をカバーします。透明フィルムには空気穴をいくつかあけ、2~3日に1回は約2時間、完全にフィルムを鉢から外します。そうすることで、カビの発生を防ぎます。20°C~25°Cの明るく暖かい場所に置き、用土は湿った状態に保ちます。2~4週間後に発芽します。

最高のロケーション:

発芽まで時間を要します。初夏の開花のためには3月頃に室内で発芽させるようにします。その後5月中旬から9月下旬にかけては、日当たりのよい暖かい場所に鉢を保管します。成長期と開花期にはできるだけ日の当たる場所に置きます。

最適なケア:

手間のかからない植物ですが、成長期と開花期には十分な水やりが必要です。暑い時期には1日に朝晩2回水やりを行います。液体肥料を成長期には2週間ごと、開花期には毎週与えます。花が終わったら水やりは少なめに、10月からは最低限の水やりで十分です。2~4年ごとに植え替えをします。高品質の用土または庭の土と堆肥を合わせた用土を使用します。定期的に乾燥した花を切り取ることで開花期間が長くなります。

冬に:

秋の終わりには茎の上約10cmの芽を切り戻します。冬籠りは10°C以下で少し湿気がある日陰の霜のつかない場所が最適です。3月に室内の暖かく明るい場所に置く事により、ゆっくと発芽します。それに応じて水やりを行います。

注意：この種は毒性です！

SKU: 12337 / Karibischer Korallenstrauch