



SAFLAX®



Tips



© J.M.Garg - GFDL

Bauhinia tomentosa

 Български	BG	2	 Malti	MT	5
 Dansk	DK	2	 Nederlands	NL	5
 Deutsch	DE	2	 Norsk	NO	6
 English	UK	2	 Polski	PL	6
 Eesti	EE	3	 Português	PT	6
 Suomalainen	FI	3	 Românesc	RO	6
 Français	FR	3	 Svenska	SE	7
 Ελληνική	GR	3	 Slovensky	SK	7
 Gaeilge	IE	4	 Slovenski	SI	7
 íslenskur	IS	4	 Español	ES	7
 Italiano	IT	4	 Český	CZ	8
 Hrvatski	HR	4	 Türkçe	TR	8
 Latviešu	LV	5	 Magyar	HU	8
 Lietuvių kalba	LT	5	 日本語	JP	9



Жълто орхидеено дърво

Bauhinia tomentosa

Малко дърво с много ароматни цветя, подобни на орхидея

Сред многобройните видове орхидеи жълтоцветящият декоративен храст е много рядко явление. Но дори по-малките му красиви листа са нарязани в средната жилка и изглеждат като крила на пеперуда или формата на камилски крак, на което родът дължи и английското си име Camel Foot Tree. Петте листа на чудесно ароматните цветя са оцветени в лимоненожълто, а тъмно лилавото петно в центъра на цветето насочва пчелите. Жълтата баухиния расте като рехаво разклонен малък храст и може да се съхранява много добре в кофа. **Естествено местоположение:** Тропическите и субтропическите пейзажи на Африка и Азия формират естественото местообитание на жълтата орхидея. **Успешно отглеждане:** Отглеждането от семена на закрито е възможно през цялата година. За да увеличите кълняемостта на семената, първо трябва да ги оставите да се накиснат във вода със стайна температура за 24 часа. След това натиснете семената плоско върху влажна почва за саксии и само леко ги покрийте със средата за саксии. Покрийте съда с култура с домакинско фолио, което сте осигурили с дупки. Това предпазва почвата от изсушаване. Трябва да отстранявате фолиото за 2 часа на всеки два до три дни. Това предотвратява образуването на мухъл върху растящата почва. Поставете саксията със семена на светло и топло място с 20 до 25° по Целзий и поддържайте почвата влажна, но не мокра. След две до четири седмици ще се появят първите разсад. **Най-доброто местоположение:** Дървото на орхидеята обича пълно слънце и топли места - на открито през летните месеци, също така обича да е защитено от вятъра близо до топлосъхраняваща стена. **Оптимална грижа:** Поливайте редовно, особено през лятото, но избягвайте преовлажняване. От април до края на септември се препоръчва торене с течен растителен тор на всеки две седмици. Между другото, можете също да култивирате вашата орхидея като увивно растение с подходящо средство за катерене. Трябва да намалите само ако растежът е твърде силен. Най-добре е да се направи след цъфтежа през лятото - резитбата в края на зимата само потиска цъфтежа. **През зимата:** Дървото на жълтата орхидея, разбира се, не е издръжливо поради произхода си. Презимува най-добре при ярка светлина от 12° до 18° по Целзий. Листата се хвърлят, което обаче се случва всяка година, само в края на зимата и понякога дори през пролетта. Трябва също така да поливате по-малко през тази фаза.



Gul orkidé træ

Bauhinia tomentosa

Lille træ med mange duftende orkidé-lignende blomster

Blandt de talrige arter af orkidétræer er den gulblomstrende prydbusk et meget sjældent fænomen. Men selv dens mindre, smukke blade er indskåret i midterribben og fremstår som sommerfuglevinger eller form som en kamelfod, som slægten også skylder sit engelske navn Camel Foot Tree. De fem blade på de vidunderligt duftende blomster er farvet citrongule, og den mørkelilla plet i midten af blomsten guider bierne. Den gule Bauhinia vokser som en løst forgrenet lille busk og kan fint holdes i en spand. **Naturlig beliggenhed:** De tropiske og subtropiske landskaber i Afrika og Asien danner det gule orkidétræs naturlige habitat. **Succesfuld dyrkning:** Dyrkning fra frø indendørs er muligt hele året rundt. For at øge spireevnen af frøene bør du først lade dem trække i vand ved stuetemperatur i 24 timer. Tryk derefter frøene flade på fugtig pottejord og dæk dem kun let med pottemediet. Dæk dyrkningskarret til med husholdningsfilm, som du forsyner med huller. Dette beskytter jorden mod udtørring. Du bør fjerne folien i 2 timer hver anden til tredje dag. Dette forhindrer mug i at dannes på den voksende jord. Stil frøpotten et let og varmt sted med 20 til 25° Celsius og hold pottejorden fugtig, men ikke våd. Efter to til fire uger vises de første frøplanter. **Den bedste beliggenhed:** Orkidétræet elsker fuld sol og varme steder - udendørs i sommermånederne kan det også godt lide at være i læ for vinden nær en varmelagrende væg. **Optimal pleje:** Vand regelmæssigt, især om sommeren, men undgå vandledning. Fra april til slutningen af september anbefales gødkning med flydende beholderplantegødning hver anden uge. Du kan i øvrigt også dyrke dit orkidétræ som klatreplante med et passende klatrehjælpemiddel. Du skal kun skære ned, hvis væksten er for kraftig. Det gøres bedst efter blomstring om sommeren - beskæring sidst på vinteren hæmmer kun blomstringen. **Om vinteren:** Det gule orkidétræ er naturligvis ikke hårdfjort på grund af sin oprindelse. Den går bedst i dvale i stærkt lys ved 12° til 18° Celsius. Bladene fældes, hvilket ikke desto mindre finder sted hvert år, først sidst på vinteren og nogle gange endda om foråret. Du bør også vande mindre i denne fase.



Gelber Orchideenbaum

Bauhinia tomentosa

Kleiner Baum mit vielen duftenden orchideenartigen Blüten

Unter den zahlreichen Arten des Orchideenbaums ist der gelb blühende Zierstrauch eine sehr seltene Erscheinung. Aber auch seine kleineren hübschen Blätter sind an der Mittelrippe eingeschnitten und erscheinen dadurch wie Schmetterlingsflügel oder wie die Form eines Kamelfußes, dem die Gattung auch seinen englischen Namen Camel Foot Tree verdankt. Die fünf Blätter der wunderbar duftenden Blüten sind zitronengelb gefärbt und der dunkelviolette Fleck im Blütenzentrum weist den Bienen ihren Weg. Die Gelbe Bauhinie wächst als locker verzweigter kleiner Strauch und kann sehr gut im Kübel gehalten werden. **Naturstandort:** Die tropischen und subtropischen Landschaften Afrikas und Asiens bilden den Naturstandort des Gelben Orchideenbaums. **Anzucht:** Im Haus ist die Anzucht aus Samen das ganze Jahr über möglich. Um die Keimfähigkeit der Samen zu erhöhen, sollten Sie sie zunächst für 24 Stunden in Wasser bei Raumtemperatur vorquellen lassen. Drücken Sie die Samen dann flach auf feuchte Anzuchterde und bedecken Sie sie nur leicht mit dem Anzuchtsubstrat. Decken Sie das Anzuchtgefäß mit Klarsichtfolie ab, die Sie mit Löchern versehen. So ist die Erde vor Austrocknung geschützt. Alle zwei bis drei Tage sollten Sie die Folie für 2 Stunden entfernen. Das beugt einer Schimmelbildung auf der Anzuchterde vor. Stellen Sie das Anzuchtgefäß an einen hellen und warmen Ort mit 20 bis 25° Celsius und halten Sie die Anzuchterde feucht, aber nicht nass. Nach zwei bis vier Wochen erscheinen dann die ersten Sämlinge. **Standort:** Der Orchideenbaum liebt vollsonnige und warme Standorte - im Freien während der Sommermonate steht er auch gerne windgeschützt in der Nähe einer wärmespeichernden Mauer. **Pflege:** Wässern Sie vor allem im Sommer regelmäßig, aber vermeiden Sie Staunässe. Von April bis Ende September empfiehlt sich eine Düngung mit flüssigem Kübelpflanzendünger im Abstand von zwei Wochen. Mit einer entsprechenden Kletterhilfe können Sie Ihren Orchideenbaum übrigens auch als Kletterpflanze kultivieren. Einen Rückschnitt müssen Sie eigentlich nur bei zu starkem Wachstum vornehmen. Am besten erfolgt er dann nach der Blüte im Sommer - ein Rückschnitt im Spätwinter hemmt nur die Blütenentwicklung. **Im Winter:** Der Gelbe Orchideenbaum ist aufgrund seiner Herkunft natürlich nicht winterhart. Am besten überwintert er hell bei 12° bis 18° Celsius. Der jährlich trotzdem stattfindende Laubabwurf geschieht erst zum Winterende und manchmal sogar erst im Frühjahr. Während dieser Phase sollten Sie dann auch weniger wässern.



Yellow Orchid Tree

Bauhinia tomentosa

Small tree with numerous, aromatic orchid-like flowers

For a type of one of the many various species of orchid trees, the yellow-flowering ornamental bush is a rather rare sight. Its lovely leaves are cut in at the mid rib and create the appearance of butterfly wings or the shape of a camels foot, which gives the genus the English name of Camel Foot Tree. The five petals of the wonderful aromatic flowers are lemon-coloured and the small dark-purple spot in the middle lets the bees find their way. The Yellow Orchid Tree grows as casual branched small bush and is perfectly suited for tub cultivation. **Natural location:** The tropical and subtropical regions of Africa and Asia are the natural habitat of the Yellow Orchid Tree. **Successful cultivation:** Seed propagation indoors is possible throughout the year. To increase the germinability, you should place the seeds for about 24 hours in a bowl with lukewarm water for priming. After that, gently press the seeds onto moist potting compost, put just a little compost earth on top and cover the seed container with clear film to prevent the earth from drying out. Don't forget to make some holes in the clear film and take it every second or third day completely off for about 2 hours. That way you avoid mold formation on your potting compost. Place the seed container somewhere bright and warm with a temperature between 20° and 25° Celsius and keep the earth moist, but not wet. After two to four weeks, the first seedlings will come up. **The best location:** The Yellow Orchid Tree prefers full sunny and warm places. During summer it is ideally kept outdoors in a wind-protected spot near a heat-preserving wall. **Optimal care:** Especially during summer, you need to water your plant regularly, but avoid waterlogging. From April until September it is advisable to give fluid fertilizer for tub plants every two weeks. With a proper climbing aid you may also cultivate the Yellow Orchid Tree as a climbing plant. Pruning is only necessary with strongly growing plants and can best be done after blossoming in summer. Cutting the tree back in late winter might hinder the next flowering. **In the winter:** Since its tropical origins the Yellow Orchid Tree is not frost-hardy. For hibernation it is best kept in a bright place with a temperature of 12° to 18° Celsius. However, the tree casts the leaves annually, but only at the end of winter and sometimes even as late as spring. During this time you may water accordingly modest.



Kollane orhideepuu

Bauhinia tomentosa

Väike puu paljude lõhnavate orhideelaadsete õitega

Arvukate orhideepuuliikide hulgas on kollaselt õitsev ilupõõsas väga haruldane nähtus. Kuid isegi selle väiksemad ilusad lehed on keskribas sisselõigetega ja näevad välja nagu liblika tiivad või kaameli jala juu, millele perekond võlgneb ka oma ingliskeelse nime Camel Foot Tree. Imelisel lõhnavate õite viis lehte on värvitud sidrunkollaseks ja õie keskel olev tumelilla laik juhib mesilasi. Kollane Bauhinia kasvab lõdvalt hargneva väikese põõsana ja seda saab väga hästi hoida ämbris. **Looduslik asukoht:** Aafrika ja Aasia troopilised ja subtropilised maastikud moodustavad kollase orhideepuu loodusliku elupaiga. **Edukas kasvatamine:** Seemnetest siseruumides kasvatamine on võimalik aastaringselt. Seemnete idanemisvõime suurendamiseks tuleks neil esmalt 24 tundi toatemperatuuril vees leotada. Seejärel suruge seemned niiskele potimuldale tasaseks ja katke need ainult kergelt istutussöötmega. Kata kultuurianum toidukilega, mille varustab aukudega. See kaitseb mulda kuivamisest. Peaksite fooliumi eemaldama 2 tunniks iga kahe kuni kolme päeva järel. See takistab hallituse teket kasvupinnal. Asetage külvipott valgusküllasesse ja sooja kohta, mille temperatuur on 20–25 ° C, ning hoidke istutusmuld niiskena, kuid mitte märjana. Kahe kuni nelja nädala pärast ilmuvad esimesed seemikud. **Parim asukoht:** Orhideepuu armastab lauspäikest ja sooja kohta – suvekuudel õues meeldib talle ka soojussalvestava seina ääres tuule eest varjatud olla. **Optimaalne hooldus:** Kastke regulaarselt, eriti suvel, kuid vältige vettimist. Aprillist septembri lõpuni on soovitatav vätada vedela konteinertaimede vätisega iga kahe nädala tagant. Muide, oma orhideepuud saab ka sobiva ronimisabiga kasvatada ronitaimena. Vähendada tuleb ainult siis, kui kasv on liiga tugev. Kõige parem on seda teha pärast õitsemist suvel – hilistalvel pügamine ainult pärsib õitsemist. **Talvel:** Kollane orhideepuu pole oma päritolu tõttu loomulikult vastupidav. Talvitub kõige paremini eredas valguses temperatuuril 12–18 ° C. Lehed langevad, mis sellegipoolest toimub igal aastal, ainult talve lõpus ja mõnikord isegi kevadel. Samuti peaksite selles faasis vähem kastma.



Keltainen orkideapuu

Bauhinia tomentosa

Pieni puu, jossa on monia tuoksuvia orkidealaisia kukkia

Useista orkideapuulajesta keltainen kukkiva koristepensas on hyvin harvinainen ilmiö. Mutta jopa sen pienemmät, kauniit lehdet ovat viillottuna keskiribasta ja näyttävät perhosen siiveltä tai kamelin jalan muodolta, jolle suvulle kuuluu myös englanninkielinen nimi Camel Foot Tree. Ihanan tuoksuvien kukkien viisi lehteä ovat väriltään sitruunankeltaisia ja kukan keskellä oleva tummanpunainen täplä ohjaa mehiläisiä. Keltainen Bauhinia kasvaa löyhästi haarautuvana pienenä pensaana ja sitä voidaan pitää erittäin hyvin ämpäriässä. **Luonnollinen sijainti:** Afrikan ja Aasian trooppiset ja subtropiitit maisemat muodostavat keltaisen orkideapuun luonnollisen elinympäristön. **Onnistunut viljely:** Kasvatusta sisätiloissa on mahdollista ympäri vuoden. Siementen itämiskyvyyn lisäämiseksi sinun tulee ensin antaa niiden liota vedessä huoneenlämmössä 24 tuntia. Paina sitten siemenet litteäksi kostealle istutusmaalle ja peitä ne vain kevyesti istutusaineella. Peitä viljelyastia kelmulla, johon on tehty reikiä. Tämä suojaa maaperää kuivumiselta. Poista folio 2 tunnin ajaksi kahden tai kolmen päivän välein. Tämä estää homeen muodostumisen kasvumaahan. Aseta siemenruukku valoisaan ja lämpimään paikkaan, jonka lämpötila on 20–25 ° C, ja pidä istutusmaa kosteana, mutta ei märkänä. Kahden tai neljän viikon kuluttua ensimmäiset taimet ilmestyvät. **Paras sijainti:** Orkideapuun rakastaa täyttää aurinkoa ja lämpimiä paikkoja - ulkona kesäkuukausina se pitää myös tuulelta suojassa lämpöä varaavan seinän lähellä. **Optimaalinen hoito:** Kastele säännöllisesti, varsinkin kesällä, mutta välttä kastumista. Huhtikuusta syyskuun loppuun on suositeltavaa lannoittaa nestemäisellä säiliökasvilannoitteella kahden viikon välein. Voit muuten viljellä orkideapuusi myös kiipeilykasvina sopivalla kiipeilyavulla. Sinun on leikattava vain, jos kasvu on liian voimakasta. Se on parasta tehdä kukinnan jälkeen kesällä - loppupalven karsiminen vain estää kukinnan. **Talvelle:** Keltainen orkideapuu ei tietenkään ole alkuperänsä vuoksi kestävä. Se talvehtii parhaiten kirkkaassa valossa 12° - 18°C lämpötilassa. Lehdet irtoavat, mikä kuitenkin tapahtuu joka vuosi, vasta talven lopulla ja joskus jopa keväällä. Sinun tulisi myös kastella vähemmän tässä vaiheessa.



Arbre aux tulipes

Bauhinia tomentosa

Petit arbre avec beaucoup de fleurs odorées et en forme d'orchidée

L'arbre aux tulipes, qui appartient aux orchidées, est très rare. Ses petites feuilles jolies sont coupées à la nervure centrale et apparaissent sous forme d'ailes de papillon ou de pied de chameau, ce qui donne le nom commun anglais de Camel Foot Tree. Les cinq feuilles des fleurs merveilleusement parfumées sont jaune citron et la tache violet foncé au centre de la fleur indique le chemin à suivre aux abeilles. L'arbre aux tulipes croît en petit arbuste peu ramifié et peut être entretenu en pot. **Emplacement naturel:** On rencontre l'arbre aux tulipes dans les paysages tropicaux et subtropicaux d'Afrique et d'Asie. **Culture réussie:** La culture des graines à la maison est possible tout au long de l'année. Pour améliorer la faculté germinative des graines, vous devez d'abord mettre les graines dans de l'eau à température ambiante pendant 24 heures. Ensuite, mettez les graines sur du terreau humide et recouvrez-les légèrement avec le substrat. Couvrez le récipient avec une feuille transparente dans laquelle vous faites des trous. Comme ça, le terreau est protégé du dessèchement. Vous devez enlever la feuille pendant deux heures tous les deux ou trois jours. Ceci prévient la formation de moisissures dans le terreau. Mettez le récipient dans un endroit lumineux et chaud de 20° à 25° Celsius et gardez le terreau humide, mais pas mouillé. Les premiers semis apparaissent après deux à quatre semaines. **Le meilleur emplacement:** L'arbre à orchidées aime des emplacements chauds et en plein soleil, il aime aussi les endroits protégés du vent et près d'un mur qui accumule de la chaleur pendant les mois d'été. **Soins optimaux:** Arrosez la plante régulièrement, surtout en été, mais évitez l'eau stagnante. Il est conseillé de l'engraisser toutes les deux semaines d'avril à fin septembre. Vous pouvez cultiver votre arbre à orchidées comme plante grimpante avec un support correspondant. Vous devez tailler l'arbre seulement en cas de forte croissance. Il est préférable de faire la taille après la floraison en été, une taille en fin d'hiver freine le développement des fleurs. **En hiver:** L'arbre aux tulipes n'est pas rustique à cause de ses origines. Il hiverne le mieux dans un endroit entre 12° et 18° Celsius. La chute de feuilles annuelle a lieu en fin d'hiver, et parfois même en printemps. Vous devez aussi l'arroser moins pendant cette période.



Κίτρινο δέντρο ορχιδέας

Bauhinia tomentosa

Μικρό δέντρο με πολλά αρωματικά λουλούδια που μοιάζουν με ορχιδέα

Μεταξύ των πολυάριθμων ειδών ορχιδέας, ο κίτρινος ανθοφόρος διακοσμητικός θάμνος είναι ένα πολύ σπάνιο φαινόμενο. Αλλά ακόμη και τα μικρότερα, όμορφα φύλλα του είναι χαράγμανα στη μέση και φαίνονται σαν φτερά πεταλούδας ή το σχήμα του ποδιού της καμήλας, στο οποίο το γένος οφείλει επίσης το αγγλικό του όνομα Camel Foot Tree. Τα πέντε φύλλα των υπέρροχα αρωματικών λουλουδιών είναι χρωματισμένα με κίτρινο λεμόνι και η σκούρα μωβ κηλίδα στο κέντρο του λουλουδιού οδηγεί τις μέλισσες. Το Yellow Bauhinia αναπτύσσεται ως ένας χαλαρά διακλαδισμένος μικρός θάμνος και μπορεί να διατηρηθεί πολύ καλά σε έναν κουβά. **Φυσική τοποθεσία:** Τα τροπικά και υποτροπικά τοπία της Αφρικής και της Ασίας αποτελούν τον φυσικό βιότοπο της κίτρινης ορχιδέας. **Επιτυχημένη καλλιέργεια:** Η καλλιέργεια από σπόρους σε εσωτερικούς χώρους είναι δυνατή όλο το χρόνο. Για να αυξήσετε τη βλαστική ικανότητα των σπόρων, θα πρέπει πρώτα να τους αφήσετε να μουλιάσουν σε νερό σε θερμοκρασία δωματίου για 24 ώρες. Στη συνέχεια, πιέστε τους σπόρους επίπεδα σε υγρό χώμα γλάστρας και καλύψτε τους μόνο ελαφρά με το μέσο γλάστρας. Καλύψτε το δοχείο καλλιέργειας με μεμβράνη, την οποία ανοίγετε με τρύπες. Αυτό προστατεύει το έδαφος από το στεγνωμα. Θα πρέπει να αφαιρείτε τα αλουμινοχάρτο για 2 ώρες κάθε δύο έως τρεις ημέρες. Αυτό αποτρέπει τη δημιουργία μούχλας στο αναπτυσσόμενο έδαφος. Τοποθετήστε τη γλάστρα σε ένα ελαφρύ και ζεστό μέρος με θερμοκρασία 20 έως 25° Κελσίου και διατηρήστε το χώμα της γλάστρας υγρό αλλά όχι υγρό. Μετά από δύο έως τέσσερις εβδομάδες, θα εμφανιστούν τα πρώτα σπορόφυτα. **Η καλύτερη τοποθεσία:** Η ορχιδέα αγαπά τον ήλιο και τις ζεστές τοποθεσίες - σε εξωτερικούς χώρους κατά τους καλοκαιρινούς μήνες, της άρσει επίσης να είναι προστατευμένη από τον άνεμο κοντά σε έναν τοίχο που αποθηκεύει θερμότητα. **Βέλτιστη φροντίδα:** Ποτίστε τακτικά, ειδικά το καλοκαίρι, αλλά αποφύγετε την υπερχειλίση. Από τον Απρίλιο έως το τέλος Σεπτεμβρίου, συνιστάται η λίπανση με υγρό λίπασμα φυτών δοχείων κάθε δύο εβδομάδες. Παρεμπιπτόντως, μπορείτε επίσης να καλλιεργήσετε την ορχιδέα σας ως αναρριχητικό φυτό με ένα κατάλληλο αναρριχητικό βοήθημα. Πρέπει να μειώσετε μόνο εάν η ανάπτυξη είναι πολύ δυνατή. Γίνεται καλύτερα μετά την ανθοφορία το καλοκαίρι - το κλάδεμα στα τέλη του χειμώνα αναστέλλει μόνο την ανθοφορία. **Το χειμώνα:** Η κίτρινη ορχιδέα φυσικά δεν είναι ανθεκτική λόγω της καταγωγής της. Διαχειμάζει καλύτερα σε έντονο φως στους 12° έως 18° Κελσίου. Τα φύλλα ρίχνονται, κάτι που ωστόσο γίνεται κάθε χρόνο, μόνο στο τέλος του χειμώνα και μερικές φορές ακόμη και την άνοιξη. Θα πρέπει επίσης να ποτίσετε λιγότερο κατά τη διάρκεια αυτής της φάσης.



Crann magairlín buí

Bauhinia tomentosa

Crann beag le go leor bláthanna cumhra cosúil le magairlín

I measc na speiceas iomadúla de chrann magairlín, is feiniméan an-annamh é an tor ornáideach bláthanna buí. Ach fiú a dhuilleoga níos lú, tá na duilleoga deasa greanta ag an lárchrios agus bíonn siad cosúil le sciatháin féileacán nó cruth coise camel, a bhfuil an t-ainm Béarla Camel Foot Tree ag an ghéineas air freisin. Tá dath buí líomóide ar na cúig dhuilleog de na bláthanna cumhra iontacha agus treoraíonn an spota dorcha corca i lár an bhláth na beacha. Fásann an Bauhinia Buí mar tor beag brainseach agus is féidir é a choinneáil go han-mhaith i mbeicéad. **Suíomh nádúrtha:** Cruithnóirín tírdhreacha trópaiceacha agus fothrópaiceacha na hAfraice agus na hÁise gnáthóg nádúrtha an chrainn magairlín buí. **Saothrú rathúil:** Is féidir fás ó shíolta taobh istigh ar feadh na bliana. D'fhonn cumas phéacadh na síolta a mhéadú, ba chóir duit lígean dóibh soak in uisce ag teocht an tseomra ar feadh 24 uair an chloig ar dtús. Ansin brúigh na síolta cothrom ar ithir potaithe tais agus gan ach iad a chlúdach go héadrom leis an meán potaithe. Clúdaigh an soitheach cultúir le scannán cling, a sholáthraíonn tú le poill. Cosnaíonn sé seo an ithir ó thriomú amach. Ba chóir duit an scragall a bhaint ar feadh 2 uair gach dhá nó trí lá. Cuireann sé seo cosc ar mhúnla a fhoirmiú ar an ithir atá ag fás. Cuir an pota síolta in áit éadrom te ag 20 go 25 ° Celsius agus coinnigh an ithir potaithe tais ach ní fliuch. Tar éis dhá nó ceithre seachtaine, beidh na chéad síológa le feiceáil. **An suíomh is fearr:** Is breá leis an gcrann magairlín ghrian iomlán agus áiteanna te - lasmuigh i rith míonna an tsamhraidh, is maith leis a bheith foscadh ón ghaoth in aice le balla stórála teasa. **Cúram is fearr is féidir:** Uisce go rialta, go háirithe sa samhradh, ach seachain uiscebhuí. Ó Aibreán go deireadh mhí Mheán Fómhair, molar fertilizing le leasachán plandaí coimeádán leachtach gach dhá sheachtain. Dála an scéil, is féidir leat do chrann magairlín a chothú mar phlanda dreapadóireachta le cúnamh dreapadóireachta cuí. Ní gá duit ach gearradh siar a dhéanamh má tá an fás ró-láidir. Is fearr é a dhéanamh tar éis bláthanna sa samhradh - ní chuireann bearradh go déanach sa gheimhreadh bac ar bhláthanna. **Sa gheimhreadh:** Ar ndóigh, níl an crann buí magairlín crua mar gheall ar a bhunús. Is fearr a gheimhríonn sé i solas geal ag 12° go 18° Celsius. Tá na duilleoga a chaillfidh, a tharlaíonn mar sin féin gach bliain, ach amháin ag deireadh an gheimhridh agus uaireanta fiú san earrach. Ba chóir duit níos lú uisce a dhéanamh freisin le linn na céime seo.



Gult brónugrös tré

Bauhinia tomentosa

Lítið tré með mörgum ilmandi orkideulíukum blómum

Meðal fjölmargra tegunda brónugrös er gulblómstrandi skrautrinni mjög sjaldgæft fyrirbæri. En jafnvel smærri, falleg blöð hans eru skorin í miðrönd og líta út eins og fiðrildavængir eða í laginu eins og úlfaldafótur, sem ættkvíslin á einnig enska nafnið Camel Foot Tree á. Fimm blöðin af dásamlega ilmandi blómum eru lituð sítrónugul og dökkfjólublái bletturinn í miðju blómsins leiðir býflugurnar. Gula Bauhinia vex sem lauslega greinóttur lítill runni og má geyma mjög vel í fötu. **Náttúruleg staðsetning:** Suðrænt og subtropical landslag Afríku og Asíu mynda náttúrulegt búsvæði gula brónugrös trésins. **Arangursrík ræktun:** Ræktun úr fræjum innandyrá er mögulegt allt árið um kring. Til þess að auka spírurnargetu fræanna ættir þú fyrst að láta þau liggja í bleyti í vatni við stofuhita í 24 klukkustundir. Þrýstu síðan fræjunum flatt á rakan pottamold og hyldu þau aðeins með pottamiðlinum. Hyljið ræktunarlátið með matarfilmu, sem þú útvegar með götum. Þetta verndar jarðveginn gegn þurrkun. Þú ættir að fjarlægja álpappírinn í 2 klukkustundir á tveggja til þriggja daga fresti. Þetta kemur í veg fyrir að mygla myndist á vaxandi jarðvegi. Settu fræpottinn á léttan og heitan stað með 20 til 25° Celsius og haltu pottjarðveginum rökum en ekki blautum. Eftir tvær til fjórar vikur birtast fyrstu plönturnar. **Besta staðsetningin:** Orkideutréd elskar fulla sól og hlýja staði - utandyra yfir sumarmánuðina vill það líka vera í skjóli fyrir vindi nálægt hitageyandi vegg. **Besta umönnun:** Vökvaðu reglulega, sérstaklega á sumrin, en forðastu vatnslosun. Frá apríl til loka september er mælt með því að frjóvga með fljótandi gámaplöntuáburði á tveggja vikna fresti. Við the vegur, þú getur líka ræktað brónugrös tré þitt sem klifurplöntu með viðeigandi klifurhjálpi. Aðeins þarf að skera niður ef vöxturinn er of sterkur. Það er best gert eftir blómgun á sumrin - klipping síðla vetrar hamlar aðeins flóru. **Á veturna:** Gula brónutréd er auðvitað ekki harðgert vegna uppruna síns. Hann liggur best í dvala í björtu ljósi við 12° til 18° Celsius. Blöðin falla, sem engu að síður á sér stað á hverju ári, aðeins í lok vetrar og stundum jafnvel á vorin. Þú ættir líka að vökva minna á þessum áfanga.



Albero di orchidea gialla

Bauhinia tomentosa

Piccolo albero con tanti fiori profumati che ricordano l'orchidea

Fra le tante specie dell'albero di orchidee, questo arbusto decorativo dai fiori gialli ha un aspetto molto particolare. Le foglie, piccole e graziose, sono incise al centro e creano l'effetto di un volo di farfalle, o di zampa di cammello - da qui viene anche il nome inglese Camel Foot Tree. I cinque petali di questi fiori dal profumo meraviglioso sono giallo limone, con una macchia color viola scuro alla base del fiore, che indica alle api il loro cammino. La Bauhinia gialla cresce come piccolo arbusto leggermente ramificato e può essere coltivato bene in vaso. **Posizione naturale:** L'habitat naturale dell'albero di orchidea gialla si trova nei paesaggi dell'Africa tropicale e subtropicale e in Asia. **Coltivazione riuscita:** La coltivazione da semi in casa è possibile durante tutto l'anno. Per aumentare la germinabilità dei semi, lasciateli immersi per 24 ore in acqua a temperatura ambiente perché si gonfino. Poi metteteli a dimora nella terra di coltivo umida e coprite solo leggermente con il substrato. Coprite il recipiente di coltivazione con pellicola trasparente sulla quale praticarete dei fori, in questo modo la terra eviterà di seccarsi. Ogni due o tre giorni rimuovete la pellicola per 2 ore, per prevenire la formazione di muffe sulla terra. Collocate il recipiente di coltivazione in un luogo luminoso e caldo, a una temperatura fra 20° e 25° C e mantenete la terra umida, ma non bagnata. Le prime piantine compariranno da due a quattro settimane dopo. **La posizione migliore:** L'albero delle orchidee predilige gli ambienti in pieno sole e caldi, durante i mesi estivi può stare bene all'aperto, in un punto riparato e vicino a un muro che emani calore. **Cura ottimale:** Innaffiate regolarmente, soprattutto nei mesi estivi, evitando i ristagni idrici. Da aprile alla fine di settembre si consiglia una concimazione ogni due settimane con fertilizzante liquido per piante da vaso. Potete coltivare il vostro albero di orchidee anche come rampicante, fornendogli un supporto adeguato. Sarà necessario potare la pianta solo in caso di crescita eccessiva, in quel caso è preferibile procedere dopo la fioritura estiva, perché una potatura nel tardo inverno frenerebbe lo sviluppo del fiore. **In inverno:** A causa delle sue origini l'albero di orchidea gialla naturalmente non resiste al freddo, la temperatura invernale consigliata è fra i 12° e i 18° C. La perdita delle foglie avviene comunque, alla fine dell'inverno o a volte anche all'inizio della primavera: in questa fase dovrete innaffiare ancora meno.



Stablo žute orhideje

Bauhinia tomentosa

Malo drvo s mnogo mirisnih cvjetova nalik na orhideje

Među brojnim vrstama stabala orhideja, žuti cvjetni ukrasni grm vrlo je rijetka pojava. Ali čak i njegovi manji, lijepi listovi su urezani na središnjoj žilici i izgledaju poput leptirovih krila ili oblika devine noge, čemu rod duguje i svoj engleski naziv Camel Foot Tree. Pet listova predivno mirisnih cvjetova obojeno je limun žuto, a tamnoljubičasta mrlja u središtu cvijeta vodi pčele. Žuta bauhinija raste kao labavo razgranat mali grm i može se vrlo dobro držati u kanti. **Zemlja porijekla:** Tropski i subtropski krajevici Afrike i Azije čine prirodno stanište stabla žute orhideje. **Uspješan uzgoj:** Uzgoj iz sjemena u zatvorenom prostoru moguć je tijekom cijele godine. Kako bi se povećala sposobnost klijavosti sjemena, najprije ih ostavite da se namaču u vodi sobne temperature 24 sata. Zatim pritisnite sjeme ravno na vlažno tlo za posude i samo ih lagano prekritje podlogom za posude. Posudu s kulturom prekritje prozirnom folijom koju ste opremili rupama. To štiti tlo od isušivanja. Svaka dva do tri dana skinite foliju na 2 sata. Time se sprječava stvaranje plijesni na tlu za uzgoj. Stavite posudu za sjeme na svijetlo i toplo mjesto s 20 do 25° Celzija i održavajte tlo za saksije vlažnim, ali ne mokrim. Nakon dva do četiri tjedna pojavit će se prve sadnice. **Najbolja lokacija:** Drvo orhideja voli puno sunca i topla mjesta - na otvorenom tijekom ljetnih mjeseci, također voli biti zaštićeno od vjetrova u blizini zida za skladištenje topline. **Optimalna njega:** Zalijevajte redovito, osobito ljeti, ali izbjegavajte natapanje. Od travnja do kraja rujna preporučuje se gnojdba tekućim gnojivom za biljke svaka dva tjedna. Usput, svoju orhideju možete uzgajati i kao biljku penjačicu uz odgovarajuće pomagalo za penjanje. Morate smanjiti samo ako je rast prejak. Najbolje je to učiniti nakon cvatnje ljeti - obrezivanje u kasnu zimu samo inhibira cvatnju. **U zimi:** Drvo žute orhideje naravno nije otporno zbog svog porijekla. Najbolje hibernira pri jakom svjetlu na 12° do 18° Celzijusa. Opadanje lišća, koje se ipak događa svake godine, tek na kraju zime, a ponekad čak iu proljeće. Također biste trebali manje zalijevati tijekom ove faze.



Dzeltens orhidejas koks

Bauhinia tomentosa

Mazs koks ar daudziem smaržīgiem orhidejām līdzīgiem ziediem

No daudzajām orhideju koku sugām dzeltenī ziedošais dekoratīvais krūms ir ļoti reta parādība. Bet pat tās mazākās, skaistās lapas ir iegrieztais vidusrībā un izskatās kā tauriņa spārni vai kameiļa pēdas forma, kurai ģints ir arī parādā savu angļu nosaukumu Camel Foot Tree. Brīnišķīgi smaržīgo ziedu piecas lapas ir iekrāsotas citrondzeltenā krāsā, un tumši violetais plankums zieda centrā vada bites. Dzeltenā bauhinija aug kā mazs, brīvi zarots krūms, un to var ļoti labi turēt spainī. **Dabiska vieta:** Āfrikas un Āzijas tropu un subtropu ainavas veido dzeltenā orhidejas koka dabisko dzīvotni. **Veiksmīga audzēšana:** Audzēšana no sēklīm telpās ir iespējama visu gadu. Lai palielinātu sēklu dīgspēju, vispirms tās jāļauj 24 stundas iemērt ūdenī istabas temperatūrā. Pēc tam uzspiediet sēklas uz mitras stādīšanas augsnes un tikai viegli pārklājiet tās ar stādīšanas barotni. Nosedziet kultivēšanas trauku ar pārtikas plēvi, kuru nodrošina ar caurumiem. Tas pasargā augsni no izžūšanas. Jums vajadzētu noņemt foliju 2 stundas ik pēc divām līdz trim dienām. Tas novērš pelējuma veidošanos augošajā augsnē. Novietojiet sēklu podu gaišā un siltā vietā ar temperatūru 20 līdz 25 ° C un turiet augsni mitru, bet ne mitru. Pēc divām līdz četrām nedēļām parādīsies pirmie stādi. **Labākā atrašanās vieta:** Orhideju kokam patīk pilns saules stars un siltas vietas - vasaras mēnešos ārā tam patīk arī būt pasargātā no vēja pie siltumu uzkrājošas sienas. **Optimāla aprūpe:** Regulāri laistiet, īpaši vasarā, taču izvairieties no aizsērēšanas. No aprīļa līdz septembra beigām ieteicams ik pēc divām nedēļām mēslot ar šķidrū konteineraugu mēslojumu. Starp citu, ar atbilstošu kāpšanas palīgīdzekli jūs varat arī kultivēt savu orhideju kā kāpšanas augu. Jums ir jāsamazina tikai tad, ja izaugsme ir pārāk spēcīga. Vislabāk to darīt pēc ziedēšanas vasarā – atzarošana ziemas beigās tikai kavē ziedēšanu. **Ziemā:** Dzeltenais orhidejas koks, protams, nav izturīgs savas izcelsmes dēļ. Vislabāk pārziemo spilgtā gaismā no 12° līdz 18° pēc Celsija. Lapas nobirst, kas tomēr notiek katru gadu, tikai ziemas beigās un dažreiz pat pavasarī. Šajā posmā jums vajadzētu arī mazāk laistīt.



Geltonas orchidēju medis

Bauhinia tomentosa

Mažas medis su daugybe kvapniņ j orchidējas gēliņ

Tarp daudzelio orchidēju medžiū rūši geltonai žydintis dekoratyvinis krūmas yra labai retas reiškynis. Tačiau net ir mažesni, gražūs lapai yra įpjauti ties viduriu ir atrodo kaip drugelio sparnai arba kupranugario pėdos forma, kuriai gentis taip pat turi savo anglišką pavadinimą Camel Foot Tree. Penki nuostabiai kvėpiančių gėlių lapai yra citrinos geltonos spalvos, o tamsiai violetinė dėmė žiedo centre veda bites. Geltonoji bauhinija auga kaip laisvai šakotas mažas krūmas ir gali būti labai gerai laikomas kibire. **Natūrali vieta:** Atogrąžų ir subtropikų Afrikos ir Azijos kraštovaizdžiai sudaro natūralią geltonojo orchidėjų medžio buveinę. **Sėkmingas auginimas:** Auginti iš sėklų patalpose galima ištisus metus. Norint padidinti sėklų daigumą, pirmiausia reikia leisti jas 24 valandas mirkyti kambario temperatūros vandenyje. Tada suspauskite sėklas ant drėgnos vazoninės žemės ir tik lengvai uždenkite jas vazoninė terpe. Kultūros indą uždenkite maistine plėvele, kurioje yra skylės. Tai apsaugo dirvą nuo išdžiūvimo. Kas dvi ar tris dienas 2 valandas nuimkite foliją. Tai neleidžia augančioje dirvoje susidaryti pelėsiui. Sėklų vazoną pastatykite šviesioje ir šiltoje vietoje, kurios temperatūra yra 20–25 ° C, o vazono žemė turi būti drėgna, bet ne šlapia. Po dviejų ar keturių savaičių pasirodys pirmieji daigai. **Geriausia vieta:** Orchidėjų medis mėgsta pilną saulę ir šiltas vietas – vasaros mėnesiais lauke jis taip pat mėgsta būti apsaugotas nuo vėjo prie šilumą kaupiančios sienos. **Optimali priežiūra:** Laistykite reguliariai, ypač vasarą, tačiau venkite užmirkimo. Nuo balandžio iki rugsėjo pabaigos rekomenduojama kas dvi savaites tręšti skystomis konteinerinėmis augalų trąšomis. Beje, savo orchidėjų medį kaip vijoklinį augalą galite auginti ir naudodami atitinkamą laipiojimo priemonę. Jūs turite sumažinti tik tuo atveju, jei augimas yra per stiprus. Tai geriausiai daryti po žydėjimo vasarą – genėjimas žiemos pabaigoje tik stabdo žydėjimą. **Ziemą:** Geltonasis orchidėjų medis, žinoma, nėra atsparus dėl savo kilmės. Geriausiai žiemoja esant ryškiai šviesai nuo 12° iki 18° Celsijaus. Lapai nukrenta, o tai vis dėlto vyksta kiekvienais metais, tik žiemos pabaigoje, o kartais net pavasarį. Taip pat šiai etape turėtumėte laistyti mažiau.



Sigra tal-orkidej isfar

Bauhinia tomentosa

Sigra žghira b'hafna fjuri fragranti bhal orkidej

Fost l-ispeči numeruži ta 'sigra tal-orkidej, l-arbuxell ornamentalī tal-fjuri isfar huwa fenomenu rari hafna. Ižda anke l-weraq ižghar u sbieħ tiegħu huma inċizi fin-nofs tal-kosta u jidhru bħal ġwienah ta 'farfett jew forma ta' sieq ta 'ġemel, li l-ġeneru għandu wkoll l-isem Ingliż tiegħu Camel Foot Tree. Il-hames weraq tal-fjuri fragranti mill-isbaħ huma kkuluriti isfar tal-lumi u l-post vjola skur fiċ-ċentru tal-fjura jiggwida lin-naħal. Il-Bauhinia Isfar tikber bħala arbuxell žghir b'fergħat laxk u tista 'tinżamm tajjeb hafna f'barmil. **Post naturali:** Il-pajsaggi tropikali u subtropikali u l-Asja jiffurmar tal-moffa fuq il-hamrija tas-sigra tal-orkidej isfar. **Kultivazzjoni b'suċċess:** It-tkabbir miż-żrieragħ ġewwa huwa possibbli s-sena kollha. Sabiex tiżdied il-kapaċità tal-ġerminazzjoni taż-żrieragħ, l-ewwel għandek tħallihom jixxarrbu fl-ilma f'temperatura tal-kamra għal 24 siegħa. Imbagħad aghfas iż-żrieragħ ċatti fuq hamrija tal-qsari niedja u għattihom biss hafif bil-mezz tal-qsari. Għatti l-bastiment tal-kultura b'cling film, li inti tipprovdi b'toqob. Dan jipprotegi l-hamrija milli tinxef. Għandek tneħħi l-fojl għal sagħtejn kull jumejn jew tlett ijiem. Dan jipprevjeni l-Asja jiffurmar tal-moffa fuq il-hamrija li qed tikber. Poġġi l-borma taż-żrieragħa f'post hafif u sħun b'20 sa 25 ° Celsius u żomm il-hamrija tal-qsari niedja iżda mhux imxarrba. Wara ġimghatejn sa erba 'ġimghat, se jidhru l-ewwel nebbieta. **L-aħjar post:** Is-sigra tal-orkidej tħobb ix-xemx sħiħa u l-postijiet sħan - barra matul ix-xhur tas-sajf, tħobb ukoll tkun kenn mir-riħ hdejn hajt li jaħžen is-sħana. **Kura ottimali:** Ilma b'mod regolari, speċjalment fis-sajf, iżda evita l-ilma. Minn April sal-aħħar ta 'Settembru, fertillizzanti b'fertillizzant tal-pjanti tal-kontenitur likwidu kull ġimghatejn huwa rakkomandat. Mill-mod, tista 'wkoll tikkultiva s-sigra tal-orkidej tiegħek bħala pjanta tat-tixbit b'għajnuma xierqa għat-tixbit. Trid tnaqqas biss jekk it-tkabbir ikun qawwi wisq. L-aħjar isir wara l-fjur fis-sajf - iż-żbir fl-aħħar tax-xitwa biss jinibixxi l-fjoritura. **Fix-xitwa:** Is-sigra tal-orkidej isfar naturalment mhix rezistenti minħabba l-orijini tagħha. Jiberna l-aħjar f'dawl qawwi f'temperatura ta '12° sa 18° Celsius. Il-weraq jintrema, li madankollu jseħħ kull sena, biss fl-aħħar tax-xitwa u xi kultant anke fir-rebbiegħa. Għandek ukoll ilma inqas matul din il-fażi.



Gele Orchideeboom

Bauhinia tomentosa

Kleine boom met veel geurige orchidee-achtige bloemen

Onder de talrijke soorten orchideeboom komt de geelbloeiende sierstruik zeer zelden voor. Maar de kleinere, mooie bladeren zijn ook ingesleden op de hoofdnerf en zien eruit als vlindervleugels of als de vorm van een kameelpoot, die het geslacht zijn Engelse naam te danken heeft aan Camel Foot Tree. De vijf bladeren van de heerlijk geurende bloemen zijn citroengeel gekleurd en de donkerpaarse vlek in het midden van de bloem wijst de bijen de weg. De gele Bauhinie groeit als een los vertakte kleine struik en kan prima in een kuip gehouden worden. **Natuurlijke locatie:** De tropische en subtropische landschappen van Afrika en Azië vormen de natuurlijke habitat van de gele orchideeboom. **Succesvolle teelt:** Binnen kweken uit zaden is het hele jaar mogelijk. Om de kiemkracht van de zaden te vergroten, moet je ze eerst 24 uur laten weken in water op kamertemperatuur. Druk de zaden vervolgens plat op vochtige potgrond en bedek ze slechts licht met het groeimedium. Dek de kweekbak af met vershoudfolie, die u van gaten heeft voorzien. Dit beschermt de aarde tegen uitdroging. Om de twee tot drie dagen moet u de film gedurende 2 uur verwijderen. Dit voorkomt schimmelvorming op de teeltgrond. Zet de kweekbak op een lichte en warme plaats met 20 à 25 ° Celsius en houd de kweekgrond vochtig, maar niet nat. De eerste zaailingen verschijnen na twee tot vier weken. **De beste locatie:** De orchideeboom houdt van volle zon en warme standplaatsen - in de zomermaanden buiten staat hij ook graag beschut tegen de wind bij een warmteopslagmuur. **Optimale verzorging:** Geef regelmatig water, vooral in de zomer, maar vermijd wateroverlast. Van april tot eind september adviseren wij om de twee weken te bemesten met vloeibare potplantenmest. Met een geschikt klimhulpmiddel kunt u uw orchideeboom ook als klimplant opkweken. U hoeft alleen te snoeien als de groei te sterk is. Het kan het beste worden gedaan na de bloei in de zomer - snoeien in de late winter remt alleen de ontwikkeling van bloemen. **In de winter:** De gele orchideeboom is door zijn oorsprong natuurlijk niet winterhard. Hij overwintert het best bij lichte temperaturen tussen 12° en 18° Celsius. De jaarlijkse bladeren vallen pas aan het einde van de winter en soms zelfs in de lente. In deze fase moet u ook minder water geven.



Gult orkide-tre

Bauhinia tomentosa

Lite tre med mange duftende orkidélignende blomster

Blant de mange artene av orkidétrær er den gulblomstrende prydbusken et svært sjeldent fenomen. Men selv de mindre, pene bladene er innskåret på midtribben og ser ut som sommerfuglvinger eller formen på en kamelfot, som slekten også skylder sitt engelske navn Camel Foot Tree. De fem bladene til de fantastisk velduftende blomstene er farget sitrongule og den mørke lilla flekken i midten av blomsten veileder biene. Den gule Bauhinia vokser som en løst forgrenet liten busk og kan fint holdes i bøtte. **Naturlig beliggenhet:** De tropiske og subtropiske landskapene i Afrika og Asia danner det naturlige habitatet til det gule orkidetreet. **Vellykket dyrking:** Å dyrke fra frø innendørs er mulig hele året. For å øke spireevnen til frøene bør du først la dem trekke i vann ved romtemperatur i 24 timer. Trykk deretter frøene flate på fuktig pottejord og dekk dem bare lett med pottemediet. Dekk kulturkaret med matfilm, som du forsyner med hull. Dette beskytter jorda mot å tørke ut. Du bør fjerne folien i 2 timer annenhver til tredje dag. Dette forhindrer at det dannes mugg på den voksende jorda. Plasser frøpotten på et lett og varmt sted med 20 til 25° Celsius og hold pottejorda fuktig, men ikke våt. Etter to til fire uker vil de første frøplantene dukke opp. **Den beste beliggenheten:** Orkidétreret elsker full sol og varme steder - utendørs i sommermånedene liker det også å være i ly for vinden nær en varmelagrende vegg. **Optimal omsorg:** Vann regelmessig, spesielt om sommeren, men unngå vannlogging. Fra april til slutten av september anbefales gjødsling med flytende beholderplantegjødsel annenhver uke. Du kan forresten også dyrke orkidetreet ditt som klatreplante med et passende klatrehjelpemiddel. Du må bare kutte ned hvis veksten er for sterk. Det gjøres best etter blomstring om sommeren - beskjæring på sen vinteren hemmer bare blomstringen. **Om vinteren:** Det gule orkidetreet er selvsagt ikke hardfør på grunn av opprinnelsen. Den går best i dvale i sterkt lys ved 12° til 18° Celsius. Bladene feller, noe som likevel finner sted hvert år, bare på slutten av vinteren og noen ganger til og med om våren. Du bør også vanne mindre i denne fasen.



Żółte Drzewo Orchidei

Bauhinia tomentosa

Małe drzewo z wieloma pachnącymi kwiatami przypominającymi orchidee

Jak na jeden z wielu gatunków orchidei, krzew ozdobny o żółtych kwiatkach jest raczej rzadkim widokiem. Jego uroczyste liście są wycięte na środkowym żebrze i tworzą wygląd skrzydeł motyla lub kształt stopy wielbłąda, co nadaje rodzajowi angielską nazwę Camel Foot Tree. Pięć płatków cudownie aromatycznych kwiatów ma kolor cytrynowy, a mała ciemnofioletowa plamka pośrodku pozwala pszczołom odnaleźć drogę. Żółta orchidea rośnie jak zwykły, rozgałęziony mały krzew i doskonale nadaje się do uprawy w doniczkach. **Naturalne położenie:** Tropikalne i subtropikalne regiony Afryki i Azji są naturalnym siedliskiem żółtej orchidei. **Udana uprawa:** Rozmnażanie nasion w pomieszczeniach jest możliwe przez cały rok. Aby zwiększyć zdolność kiełkowania, należy umieścić nasiona na około 24 godziny w misce z letnią wodą do gruntowania. Następnie delikatnie dociśnij nasiona do wilgotnego kompostu doniczkowego, nałóż niewielką ilość ziemi kompostowej na wierzch i przykryj pojemnik na nasiona przezroczystą folią, aby zapobiec wysychaniu ziemi. Nie zapomnij zrobić dziury w przezroczystej folii i zdejmuj ją co drugi lub trzeci dzień na około 2 godziny. W ten sposób unikniesz tworzenia się pleśni na kompoście doniczkowym. Umieść pojemnik na nasiona w miejscu jasnym i ciepłym o temperaturze od 20 ° do 25 ° Celsjusza i utrzymuj ziemię wilgotną, ale nie mokrą. Po dwóch do czterech tygodni pojawią się pierwsze sadzonki. **Najlepsza lokalizacja:** Żółta Orchidea preferuje miejsca w pełni słoneczne i ciepłe. Latem jest idealnie trzymany na zewnątrz, w miejscu chronionym przed wiatrem, w pobliżu ściany chroniącej przed ciepłem. **Optymalna pielęgnacja:** Szczególnie latem musisz regularnie podlewać roślinę, ale unikaj podlewania. Od kwietnia do września zaleca się co dwa tygodnie podawać płynny nawóz dla roślin doniczkowych. Przy odpowiedniej pomocy do wspinaczki możesz również uprawiać Żółtą Orchideę jako roślinę pnącą. Przycinanie jest konieczne tylko w przypadku silnie rosnących roślin i najlepiej wykonywać je po kwitnieniu latem. Ścinanie drzewa późną zimą może utrudnić następne kwitnienie. **W zimę:** Od swoich tropikalnych korzeni Żółta Orchidea nie jest mrozoodporna. Do hibernacji najlepiej przechowywać w jasnym miejscu o temperaturze od 12 ° do 18 ° Celsjusza. Jednak drzewo co roku zarzuca liście, ale dopiero pod koniec zimy, a czasem nawet na wiosnę. W tym czasie możesz podlewać odpowiednio skromnie.



Árvore de orquídea amarela

Bauhinia tomentosa

Pequena árvore com muitas flores perfumadas semelhantes a orquídeas

Entre as numerosas espécies de orquídeas, o arbusto ornamental de flor amarela é um fenômeno muito raro. Mas mesmo suas folhas menores e bonitas são incisadas na nervura central e parecem asas de borboleta ou a forma de um pé de camelo, ao qual o gênero também deve seu nome em inglês Camel Foot Tree. As cinco folhas das flores maravilhosamente perfumadas são de cor amarelo-limão e a mancha roxa escura no centro da flor guia as abelhas. A Bauhinia amarela cresce como um pequeno arbusto de ramos frouxos e pode ser mantida muito bem em um balde. **Localização natural:** As paisagens tropicais e subtropicais da África e da Ásia formam o habitat natural da orquídea amarela. **Cultivo bem sucedido:** Cultivar a partir de sementes dentro de casa é possível durante todo o ano. Para aumentar a capacidade de germinação das sementes, deve-se primeiro deixá-las de molho em água em temperatura ambiente por 24 horas. Em seguida, pressione as sementes no solo úmido e cubra-as apenas levemente com o meio de envasamento. Cubra o recipiente de cultura com filme plástico, que você fornece com furos. Isso protege o solo de secar. Você deve remover o papel alumínio por 2 horas a cada dois ou três dias. Isso evita a formação de mofo no solo em crescimento. Coloque o vaso de sementes em um local claro e quente com 20 a 25 ° Celsius e mantenha o solo do vaso úmido, mas não molhado. Após duas a quatro semanas, as primeiras mudas aparecerão. **A melhor localização:** A orquídea adora sol pleno e locais quentes - ao ar livre durante os meses de verão, ela também gosta de ser protegida do vento perto de uma parede de armazenamento de calor. **Cuidado ideal:** Regue regularmente, especialmente no verão, mas evite o encharcamento. De abril até o final de setembro, recomenda-se fertilizar com fertilizante líquido para plantas a cada duas semanas. A propósito, você também pode cultivar sua orquídea como planta trepadeira com um auxiliar de escalada adequado. Você só precisa cortar se o crescimento for muito forte. É melhor feito após a floração no verão - a poda no final do inverno apenas inibe a floração. **No inverno:** A orquídea amarela obviamente não é resistente devido à sua origem. Ele hiberna melhor em luz brilhante de 12 ° a 18 ° Celsius. As folhas caem, o que, no entanto, ocorre todos os anos, apenas no final do inverno e às vezes até na primavera. Você também deve regar menos durante esta fase.



Arborele Galben Orhidee

Bauhinia tomentosa

Copac mic cu multe flori parfumate ca de orhidee

Dintre numeroasele specii ale arborelui orhidee, arbustul ornamental cu înflorire galbenă este un eveniment foarte rar. Dar, de asemenea, frunzele sale mai mici și drăguțe sunt incizate pe coasta centrală și apar ca aripi de fluture sau ca forma unui picior de cămilă, pe care genul îi datorează și numele său englez Camel Foot Tree. Cele cinci frunze ale florilor minunate parfumate sunt de culoare galben lămâie și pata purpurie închisă din centrul florii arată albinelor calea lor. Bauhinie galben crește ca un arbust mic, ramificat puțin, și poate fi păstrat foarte bine într-o cadă. **Locație naturală:** Peisajele tropicale și subtropicale din Africa și Asia formează habitatul natural al orhideei galbene. **Cultivare de succes:** Cultivarea din semințe în interior este posibilă pe tot parcursul anului. Pentru a crește germinabilitatea semințelor, trebuie mai întâi să le lăsați să se înmoaie în apă la temperatura camerei timp de 24 de ore. Apoi, apăsați semințele pe un teren umed de ghiveci și acoperiți-le doar ușor cu mediul de creștere. Acoperiți vasul de cultivare cu folie alimentară, pe care ați prevăzut-o cu găuri. Acest lucru protejează pământul de uscare. La fiecare două până la trei zile ar trebui să îndepărtați filmul timp de 2 ore. Acest lucru previne formarea mușgaiului pe solul de cultivare. Așezați vasul de cultivare într-un loc luminos și cald, cu 20-25 ° Celsius și mențineți solul de cultivare umez, dar nu umez. Primele răsaduri apar după două până la patru săptămâni. **Cea mai bună locație:** Arborele de orhidee iubeste plin soare și locații calde - în aer liber în lunile de vară îi place, de asemenea, să fie protejat de vânt lângă un perete de stocare a căldurii. **Îngrijire optimă:** Udati regulat, mai ales vara, dar evitați inundatiile. Din aprilie până la sfârșitul lunii septembrie recomandăm fertilizarea cu îngrășământ lichid pentru plante în ghivece la fiecare două săptămâni. Cu ajutorul unui ajutor adecvat pentru alpinism, vă puteți cultiva orhideea ca plantă cățărătoare. Trebuie să tăiați numai dacă creșterea este prea puternică. Cel mai bine se face după înflorire vara - tăierea la sfârșitul iernii inhibă doar dezvoltarea florilor. **În iarnă:** Arborele galben orhidee nu este bineînțeles rezistent datorită originii sale. Hibernează cel mai bine la temperaturi ușoare cuprinse între 12 ° și 18 ° Celsius. Căderea anuală a frunzelor nu are loc până la sfârșitul iernii și uneori chiar și primăvara. De asemenea, ar trebui să udați mai puțin în această fază.



Gult Orkidéträd

Bauhinia tomentosa

Litet träd med många doftande orkidéliknande blommor

Bland de många arterna av orkidéträdet är den gula blommande prydnadsbusken en mycket sällsynt förekomst. Men dess mindre, vackra blad är också snittade på mittribben och ser ut som fjärilsvingar eller som en kamelfots form, vilket ger släktet sitt engelska namn, Camel Foot Tree. De fem bladen av de underbart doftande blommorna är färgade citrongula och den mörklila fläcken i mitten av blomman visar bin på sin väg. Den gula Bauhinie växer som en löst grenad liten buske och kan förvaras mycket bra i ett badkar. **Naturligt läge:** De tropiska och subtropiska landskapen i Afrika och Asien utgör det gula orkidéträdets naturliga livsmiljö. **Framgångsrik odling:** Att odla från frön inomhus är möjligt året runt. För att öka fröns grobarhet bör du först låta dem suga i vatten vid rumstemperatur i 24 timmar. Pressa sedan fröna platt på fuktig krukväxt och täck dem bara lätt med odlingsmediet. Täck odlingskärlet med plastfolie, som du har försett med hål. Detta skyddar jorden från att torka ut. Varannan till var tredje dag ska du ta bort filmen i två timmar. Detta förhindrar att mögel bildas på odlingsjorden. Placera odlingskärlet på en ljus och varm plats med 20 till 25 ° Celsius och håll odlingsjorden fuktig men inte våt. De första plantorna dyker upp efter två till fyra veckor. **Den bästa platsen:** Orkidéträdet älskar full sol och varma platser - utomhus under sommarmånaderna gillar det också att vara skyddad från vinden nära en värmeförvaringsvägg. **Optimal vård:** Vattna regelbundet, särskilt på sommaren, men undvik vattentätning. Från april till slutet av september rekommenderar vi att man gödslar med flytande krukväxtgödsel varannan vecka. Med ett lämpligt klättringshjälpmedel kan du också odla ditt orkidéträd som en klättrväxt. Du behöver bara beskära om tillväxten är för stark. Det är bäst att göra det efter blomningen på sommaren - beskärning på senvintern hämmar bara blommans utveckling. **På vintern:** Det gula orkidéträdet är naturligtvis inte tåligt på grund av sitt ursprung. Det övervintrar bäst vid ljustemperaturer mellan 12 ° och 18 ° Celsius. Det årliga lövfallet händer inte förrän i slutet av vintern och ibland till och med på våren. Du bör också vattna mindre under denna fas.



Žltý strom orchidey

Bauhinia tomentosa

Malý strom s množstvom voňavých kvetov podobných orchideám

Medzi početnými druhmi orchideí je žltá kvitnúci okrasný ker veľmi vzácnym javom. Ale aj jeho menšie, pekné listy sú v strednej časti vrúbkované a vyzerajú ako motýlie krídla alebo tvar tavej nohy, čomu rod vďačí aj za svoj anglický názov Camel Foot Tree. Päť listov nádherne voňajúcich kvetov je sfarbených do citrónovo žltej farby a tmavofialová škvrna v strede kvetu vedie včely. Bauhinia žltá rastie ako voľne rozvetvený malý krík a dá sa veľmi dobre udržiavať vo vedre. **Prirodzená poloha:** Tropické a subtropické krajiny Afriky a Ázie tvoria prirodzené prostredie žltého orchidea. **Úspešná kultivácia:** Pestovanie zo semien v interiéri je možné po celý rok. Aby ste zvýšili klíčivosť semien, mali by ste ich najskôr nechať namočené vo vode pri izbovej teplote po dobu 24 hodín. Semená potom pritlačte naplocho na vlhkú pôdu v kvetináči a len zľahka ich zasypete substrátom. Kultivačnú nádobu prikryte potravinovou fóliou, ktorú opatrne otvorme. To chráni pôdu pred vysychaním. Fóliu by ste mali odstraňovať na 2 hodiny každé dva až tri dni. To zabraňuje tvorbe plesní na rastúcej pôde. Črepník umiestnite na svetlé a teplé miesto s teplotou 20 až 25 ° C a udržiajte pôdu v črepníku vlhkú, ale nie mokrú. Po dvoch až štyroch týždňoch sa objavia prvé sadenice. **Najlepšie umiestnenie:** Orchidea miluje plné slnko a teplé polohy - v letných mesiacoch vonku, rada je chránená pred vetrom pri stene akumulujúcej teplo. **Optimálna starostlivosť:** Pravidelne zalievajte, najmä v lete, vyhnite sa však podmáčaniu. Od apríla do konca septembra sa odporúča každé dva týždne prihnojovať tekutým hnojivom na kontajnerové rastliny. Mimochodom, svoju orchideu môžete pestovať aj ako popínavú rastlinu s vhodnou pomôckou na šplhanie. Skrátitiť musíte len vtedy, ak je porast príliš silný. Najlepšie je to urobiť po odkvitnutí v lete - rez koncom zimy iba brzdí kvitnutie. **V zime:** Žltá orchidea samozrejme nie je vďaka svojmú pôvodu odolná. Najlepšie prezimuje pri jasnom svetle pri 12° až 18° Celzia. Listy sa zhadzujú, čo sa však deje každý rok, len koncom zimy a niekedy aj na jar. Počas tejto fázy by ste tiež mali menej zalievať.



Drevo rumene orhideje

Bauhinia tomentosa

Majhno drevo s številnimi dišečimi cvetovi, podobnimi orhidejam

Med številnimi vrstami orhidej je rumeno cvetoči okrasni grm zelo redek pojav. Toda tudi njeni manjši, lepi listi so na sredini zarežani in izgledajo kot metuljeva krila ali oblika kamelje noge, čemur rod tudi dolguje svoje angleško ime Camel Foot Tree. Pet listov čudovito dišečih cvetov je obarvanih limonasto rumeno, temno vijolična lisa v središču cveta pa vodi čebele. Rumena bauhinija raste kot majhen ohlapno razvejan grm in se zelo dobro hrani v vedru. **Naravni habitat:** Tropske in subtropske pokrajine Afrike in Azije tvorijo naravni habitat rumene orhideje. **Navodila za gojenje:** Gojenje iz semen v zaprtih prostorih je možno vse leto. Da bi povečali kalivost semen, jih najprej pustite 24 ur namakati v vodi pri sobni temperaturi. Nato semena plosko pritisnite na vlažno zemljo za lončke in jih le rahlo pokrijte s medijem za lončenje. Posodo z kulturo pokrijte s folijo za živila, ki jo opremite z luknjami. To ščiti tla pred izsušitvijo. Vsake dva do tri dni za 2 uri odstranite folijo. S tem preprečimo nastanek plesni na rastni zemlji. Lonček s semeni postavite na svetlo in toplo mesto s temperaturo od 20 do 25 ° C, zemlja v lončku pa naj bo vlažna, vendar ne mokra. Po dveh do štirih tednih se bodo pojavile prve sadike. **Najboljša lokacija:** Drevo orhideje poobzuje polno sonce in tople lege - na prostem je v obeh letnih mesecih ima rada tudi zaščito pred vetrom v bližini stene za shranjevanje toplote. **Optimalna nega:** Redno zalievajte, zlasti poleti, vendar se izogibajte premočevanju. Od aprila do konca septembra je priporočljivo gnojenje s tekočim rastlinskim gnojilom vsaka dva tedna. Mimogrede, svojo orhidejo lahko gojite tudi kot vzpenjavko z ustreznim plezalnim pripomočkom. Porežite le, če je rast premočna. Najbolje jo je opraviti po cvetenju poleti - obrezovanje pozno pozimi samo zavre cvetenje. **V zimskem času:** Drevo rumene orhideje zaradi svojega izvora seveda ni trdoživo. Najbolje prezimi pri močni svetlobi pri 12° do 18° Celzija. Listje odpada, kar pa se zgodi vsako leto, le ob koncu zime in včasih celo spomladi. V tej fazi morate tudi manj zalivati.



Árbol de Santo Tomás

Bauhinia tomentosa

Árbol pequeño con muchas flores fragantes y una forma similar a las orquídeas

Entre los diversos tipos de árbol orquídea, el de la flor de color amarillo es muy infrecuente. Sus hojas son muy pequeñas y con el nervio central parecen como alas de mariposas o la forma de un pie de un camello, por lo que también recibe el nombre inglés de árbol del pie de camello. Las cinco hojas de las flores maravillosas y fragantes son de color amarillo limón y la mancha de color púrpura oscuro en el centro de la flor, muestra el camino a las abejas. La Bauhinia amarilla crece como arbusto pequeño, poco ramificado y se puede mantener muy bien en maceta. **Ubicación natural:** Los paisajes tropicales y subtropicales de África y Asia son el hábitat natural del árbol de orquídea amarilla. **Cultivo exitoso:** La semilla se puede criar en interior durante todo el año. Mantenga las semillas durante 24 horas en agua a temperatura ambiente, para hidratarlas y aumentar la germinación de las mismas. Presione las semillas sobre la superficie del sustrato húmedo y cúbralas ligeramente con sustrato. Cubra el recipiente de cultivo con un film transparente y agujeréelo. Así protegerá la tierra de la desecación. Para evitar la putrefacción del sustrato retire el film cada dos o tres días durante 2 horas. Coloque el recipiente de cultivo en un lugar luminoso y cálido entre 20 y 25 grados y mantenga el sustrato húmedo, pero no mojado. La germinación tardará entre dos y cuatro semanas en producirse. **La mejor ubicación:** El árbol de orquídea ama lugares soleados y cálidos, al aire libre durante los meses de verano, prefiere un lugar protegido del viento cerca de una pared de retención de calor. **Cuidado óptimo:** Riegue con regularidad, sobre todo en verano, pero evite el encharcamiento. De abril a septiembre se recomienda utilizar fertilizante líquido para plantas en maceta, cada dos semanas. Puede cultivar su árbol de orquídea también como planta trepadora. Solo será necesaria una poda si tiene un crecimiento demasiado fuerte. La mejor época para la poda es después de la floración en verano, una poda a finales del invierno sólo inhibe el desarrollo de las flores. **En el invierno:** Debido a su origen, el árbol de orquídea amarilla no tolera heladas. Lo mejor es mantenerlo en un lugar luminoso y a temperaturas de entre 12 y 18 grados. La caída de las hojas se produce al final del invierno, y en ocasiones incluso en primavera. Durante esa fase debe regar menos.



Žlutá orchidej strom

Bauhinia tomentosa

Malý strom s mnoha voňavými květy podobnými orchidejím

Mezi četnými druhy orchidejí je žlutě kvetoucí okrasný keř velmi vzácným jevem. Ale i jeho menší, hezké listy jsou na středním žeburu vykrojené a vypadají jako motýlí křídla nebo tvar velbloudí nohy, čemuž vděčí rod také za svůj anglický název Camel Foot Tree. Pět listů nádherně vonných květů je zbarveno citrónově žlutě a tmavě fialová skvrna uprostřed květu vede včely. Bauhinia žlutá roste jako volně rozvětvený malý keřík a lze ji velmi dobře uchovávat v kbelíku. **Přirozená poloha:** Tropické a subtropické krajiny Afriky a Asie tvoří přirozené prostředí žluté orchideje. **Úspěšné pěstování:** Pěstování ze semínek v interiéru je možné po celý rok. Aby se zvýšila klíčivost semen, měli byste je nejprve nechat 24 hodin máčet ve vodě při pokojové teplotě. Poté semena naplocho přitlačte na vlhkou zeminu a jen lehce je zasypete substrátem. Kultivační nádobu zakryjte potravinářskou fólií, kterou opatříte otvory. To chrání půdu před vysycháním. Fólii byste měli odstraňovat na 2 hodiny každé dva až tři dny. Tím se zabrání tvorbě plísni na rostoucí půdě. Umístěte květináč na světlé a teplé místo s teplotou 20 až 25 °C a udržujte půdu v květináči vlhkou, ale ne mokrou. Po dvou až čtyřech týdnech se objeví první sazenice. **Nejlepší umístění:** Orchideje miluje plné slunce a teplé polohy - v letních měsících venku, ráda je chráněna před větrem u teploakumulační stěny. **Optimální péče:** Zalévejte pravidelně, zejména v létě, vyhněte se však přemokření. Od dubna do konce září se doporučuje přihnojovat každé dva týdny tekutým hnojivem pro kontejnerové rostliny. Mimochodem, svou orchidej můžete pěstovat také jako popínavou rostlinu s vhodnou pomůckou pro šplhání. Zkrátit musíte pouze v případě, že je porost příliš silný. Nejlépe se to dělá po odkvětu v létě - řez koncem zimy pouze brzdí kvetení. **V zimě:** Žlutá orchidej není díky svému původu samozřejmě odolná. Nejlépe hibernuje na jasném světle při 12° až 18° Celsia. Listy opadávají, k čemuž přesto dochází každý rok, pouze na konci zimy a někdy i na jaře. Během této fáze byste také měli méně zalévat.



Sarı orkide ağacı

Bauhinia tomentosa

Birçok kokulu orkide benzeri çiçekleri olan küçük ağaç

Çok sayıda orkide ağacı türü arasında, sarı çiçekli süs çalısı çok nadir görülen bir olgudur. Ancak daha küçük, güzel yaprakları bile orta damarda oyulmuştur ve kelebek kanatları veya bir deve ayağı şekli gibi görünürler, bu cins, İngilizce adını da Camel Foot Tree'ye borçludur. Harika kokulu çiçeklerin beş yaprağı limon sarısı rengindedir ve çiçeğin ortasındaki koyu mor nokta aralara yol gösterir. Sarı Bauhinia, gevşek dallı küçük bir çalı olarak büyür ve bir kovada çok iyi tutulabilir. **Doğal konum:** Afrika ve Asya'nın tropikal ve subtropikal manzaraları, sarı orkide ağacının doğal yaşam alanını oluşturur. **Başarılı yetiştirme:** İç mekanlarda tohumlardan büyüme tüm yıl boyunca mümkündür. Tohumların çimlenme kapasitesini artırmak için öncelikle oda sıcaklığındaki suda 24 saat bekletmelisiniz. Daha sonra tohumları nemli saksı toprağı üzerinde düz bir şekilde bastırın ve saksı ortami ile üzerlerini sadece hafifçe örtün. Kültür kabının üzerini delikler açtığınız streç film ile kapatın. Bu, toprağın kurumasını önler. Folyoyu her iki ila üç günde bir 2 saat çıkarmalısınız. Bu, büyüyen toprakta küf oluşumunu önler. Tohum saksısını 20 ila 25°C sıcaklıkta hafif ve sıcak bir yere koyun ve saksı toprağını nemli tutun ama ıslak değil. İki ila dört hafta sonra ilk fideler görünecektir. **En iyi konum:** Orkide ağacı tam güneşi ve sıcak yerleri sever - yaz aylarında açık havada, ayrıca ısı depolayan bir duvarın yakınına rüzgardan korunmayı sever. **Optimum bakım:** Özellikle yaz aylarında düzenli olarak sulayın, ancak su birikmesinden kaçının. Nisan ayından Eylül sonuna kadar iki haftada bir sıvı kap bitki gübresi ile gübreleme önerilir. Bu arada orkide ağacınızı uygun bir tırmanma yardımcısı ile tırmanıcı bir bitki olarak da yetiştirebilirsiniz. Yalnızca büyüme çok güçlüyse kesmeniz gerekir. En iyi yaz aylarında çiçek açtıktan sonra yapılırlar - kış sonlarında budama sadece çiçeklenmeyi engeller. **Kışın:** Sarı orkide ağacı, kökeni gereği elbette dayanıklı değildir. En iyi 12° ila 18°C sıcaklıktaki parlak ışıkta kış uykusuna yatar. Yapraklar her yıl, ancak kışın sonunda ve hatta bazen ilkbaharda dökülecek şekilde dökülür. Ayrıca bu aşamada daha az sulamalısınız.



Sárga orchidea fa

Bauhinia tomentosa

Kis fa, sok illatos orchidea-szerű virággal

Az orchideafa számos faja közül a sárga virágú díszcserje igen ritka jelenség. De még kisebb, csinos levelei is a középű bordájánál bekarcoltak, és pillangószárnyaknak vagy teveláb alaknak tűnnek, aminek a nemzetség angol Camel Foot Tree nevé is köszönheti. A csodálatosan illatos virágok öt levele citromsárgára színeződött, és a virág közepén lévő sötétlila folt vezeti a méheket. A Yellow Bauhinia lazán elágazó kis cserjeként nő, és nagyon jól tartható vödörben. **Természetes elhelyezkedés:** Afrika és Ázsia trópusi és szubtrópusi tájai alkotják a sárga orchideafa természetes élőhelyét. **Sikeres termesztés:** A beltéri magvak természetese egész évben lehetséges. A magvak csírázóképeségének növelése érdekében először 24 órán át szobahőmérsékleten vízben kell áztatni. Ezután nyomja le a magokat a nedves virágföldre, és csak enyhén takarja be őket a virágfölddel. Fedje le a tenyészedényt ragasztó fóliával, amelyet lyukakkal lát el. Ez megvédi a talajt a kiszáradástól. A fóliát két-három naponta 2 órára le kell venni. Ez megakadályozza a penészképződést a növekvő talajon. Helyezze a magcserepet világos és meleg helyre, ahol a hőmérséklet 20-25°C, és a virágföldet tartsa nedvesen, de ne nedvesen. Két-négy hét múlva megjelennek az első palánták. **A legjobb hely:** Az orchideafa szereti a teljes napsütést és a meleg helyeket - a nyári hónapokban a szabadban, hőtároló fal közelében is szeret védeni a szélétől. **Optimális gondozás:** Rendszeresen öntözze, különösen nyáron, de kerülje a vizesedést. Áprilistól szeptember végéig ajánlott kéthetente folyékony tartályos növényi műtrágyával trágyázni. Egyébként az orchideafádat mászónövényként is nevelheted megfelelő mászási segédeszközzel. Csak akkor kell visszavágni, ha túl erős a növekedés. Nyáron a virágzás után célszerű megtenni - a késő télen végzett metszés csak gátolja a virágzást. **Télen:** A sárga orchideafa természetesen eredete miatt nem szívós. Erős fényben, 12°C és 18°C között hibernál a legjobban. A levelek lehullanak, ami ennek ellenére minden évben megtörténik, csak tél végén, sőt néha tavasszal is. Ebben a fázisban is kevesebbet kell öntözni.

• • • • •



バウヒニア

Bauhinia tomentosa

香りのよい蘭のような花をたくさん咲かせる小木

さまざまな種類がある蘭の一種で、黄色い花で飾られた光景は素晴らしいものです。美しい葉は中央のリブでカットされており、蝶の羽のような外観です。またそれはラクダの足のようにも見える事から英語名のキャメルフットツリーはそれに由来します。素晴らしい香りの花の5つの花弁はレモン色で、中央の小さな濃い紫色の斑点がミツバチ達の指標になります。軽快に分枝して成長する小木で、鉢植えでの栽培に最適です。

自然な場所: アフリカ、アジアの熱帯および亜熱帯地域が生息地です。

栽培成功:

種子繁殖は室内で年間を通して可能です。発芽率を上げる方法として、種を温水に24時間浸します。湿った用土に種を押しつけ、その上から少量の用土をかぶせます。乾燥を防ぐためサランラップなどの透明フィルムでカバーします。透明フィルムには空気穴をいくつかあけ、2~3日に1回は約2時間、完全にフィルムを鉢から外します。そうすることで、カビの発生を防ぎます。20°C~25°Cの明るく暖かい場所に置き、用土は湿った状態に保ちます。通常は2~4週間で発芽します。

最高のロケーション:

日当たりのよい暖かい場所を好みます。夏の間は、屋外の防風された保温壁のそばなどに保管するのが理想的です。

最適なケア:

特に夏は定期的に水を与えます。しかし水浸しにならないように注意します。4月~9月の間は鉢植え植物用の液体肥料を2週間ごとに与える事をお勧めします。適切な支柱などを準備すれば、つる植物として栽培することもできます。剪定は強く成長させたい場合に必要で、花が終わった夏に行うのが最適です。晩冬に剪定をすると、次の開花に悪影響がでる場合があります。

冬に:

熱帯が原産の植物ですので、耐寒性はありません。冬越しは12°C~18°Cの明るい場所に保管します。毎年、葉を落とします。それは冬の終わりだけの時もありますし、時には春の終わりまでの場合もあります。この期間は、それに応じて水は控えめに与えます。

SKU: 12988 / Gelber Orchideenbaum