

# dobrze. niciansie do zwalczania larw pędraków

**nema-green® (*Heterorhabditis bacteriophora*)**

## INSTRUKCJA STOSOWANIA I PRZECHOWYWANIA

### Przechowywanie:

Najlepiej zastosować niciansie jak najszybciej po dostarczeniu.

Jeśli to konieczne, produkt można przechowywać w temperaturze 4-8°C (w lodówce) do daty ważności podanej na opakowaniu.

Nie zamrażać ani nie wystawiać na działanie temperatur powyżej 35°C.

### Termin zastosowania:

Niciansie można stosować przez cały sezon wegetacyjny kiedy temperatura podłoża przekracza 12°C. Ważne aby niciansie były stosowane w czasie występowania larw zwalczanych szkodników.

### Warunki stosowania:



Nie stosować w pełnym słońcu.

Niciansie są efektywne w temperaturze gleby/podłoża od 12 do 25°C. W wyższych temperaturach skuteczność niciansia spada.

min 12°C



W ciągu 1 godziny od aplikacji należy podlać miejsca gdzie były aplikowane niciansie. To konieczne aby niciansie dobrze rozpropagowały się w profilu glebowym.

Powierzchnia gleby podczas aplikacji powinna być wilgotna i powinna pozostać wilgotna przez dwa tygodnie. Co oznacza, że po aplikacji należy regularnie podlewać rośliny aby nie dopuścić do przesuszenia podłoża. Niciansie giną w suchych warunkach.

### Wskazówki dla efektywnego zwalczania pędraków:

Niciansie są najskuteczniejsze w walce z młodymi larwami, dlatego kluczowe jest zastosowanie ich w odpowiednim momencie. Termin zabiegu zależy od gatunku szkodnika: w przypadku chrabąszcza majowego najlepiej działać w kwietniu lub wrześniu, natomiast przy guniaku czerwczyku – od połowy lipca do połowy sierpnia.

Warto pamiętać, że cykl rozwojowy pędraków trwa kilka lat, a starsze larwy są znacznie odporniejsze na środki ochrony roślin i niciansie. Z tego względu zaleca się powtórzenie aplikacji niciansia w kolejnym roku, aby skutecznie wyeliminować kolejne pokolenia szkodników.

DYSTRYBUTOR:  
BIOCONT Polska sp. z o.o.  
Ul. S. Jaracza 24/38, 31-215 Kraków  
tel: +48 795 999 178  
www.biocont.pl

PRODUCENT:  
e-nema  
Klausdorfer Str. 28 - 36, 24223 Schwentental, Niemcy  
www.e-nema.de

# dobrze. niciansie do zwalczania larw pędraków

nema-green® (*Heterorhabditis bacteriophora*)



## INSTRUKCJA PRZYGOTOWANIA ZABIEGU I APLIKACJI

1. Otwórz saszetkę z nicianiami i wsyp całą zawartość do czystego pojemnika (np. słoika, kubeczka lub miski).
2. Dodaj niewielką ilość wody (wystarczająco dużo, aby zawartość łatwo się mieszała i nie tworzyła grudek). Następnie delikatnie wymieszaj, aż uzyskasz zawiesinę bez większych grudek.
3. Wlej gotową zawiesinę bezpośrednio do konewki i dolej resztę wody, aż uzyskasz pożądaną objętość (zgodnie z zaleceniami z etykiety).
4. Podlewaj rośliny tak, aby pokryć powierzchnię gleby. Mieszaj lub potrząśnij konewką co jakiś czas w trakcie podlewania. Dzięki temu niciansie nie osiadną na dnie i będą równomiernie aplikowane. W ciągu godziny od aplikacji należy podlać rośliny aby niciansie mogły się rozprzestrzeniać.

## WSKAZÓWKI!

Wsypanie saszetki prosto do pełnej konewki utrudnia wymieszanie, przez co niciansie mogą osiąść na dnie i nie zostaną równomiernie rozniesione lub zlepić się w grudki zatykające otwory konewki.

**Pamiętaj**, aby podłoże było wilgotne przed i po aplikacji. Niciansie najlepiej działają w wilgotnej glebie!

## DAWKOWANIE

Liczba niciansi w opakowaniu	Wstępnie rozpuść w	Wystarczy na powierzchnię
2,5 miliona	0,5 litrze wody	5 m <sup>2</sup>
5 milionów	1 litrze wody	10 m <sup>2</sup>
10 milionów	2 litrach wody	20 m <sup>2</sup>
25 milionów	5 litrach wody	50 m <sup>2</sup>

Rozpuść zawartość opakowania zgodnie z tabelą. Wyptukaj opakowanie i dobrze wymieszaj roztwór z nicianiami. Zawsze należy zużyć całe opakowanie, ponieważ niciansie nie są w nim równomiernie rozłożone. **1 litr roztworu z nicianiami wymieszaj w konewce z 9 litrami wody i zużyj na powierzchnię 10 m<sup>2</sup>. Powtarzać, aż do zużycia całego roztworu.**