



Tips



© Matt McCarthy - About © : Contact SAFLAX

**Wisteria sinensis**

	..... Български	BG	.....	2		..... Malti	MT	.....	5
	..... Dansk	DK	.....	2		..... Nederlands	NL	.....	5
	..... Deutsch	DE	.....	2		..... Norsk	NO	.....	6
	..... English	UK	.....	2		..... Polski	PL	.....	6
	..... Eesti	EE	.....	3		..... Português	PT	.....	6
	..... Suomalainen	FI	.....	3		..... Românesc	RO	.....	6
	..... Français	FR	.....	3		..... Svenska	SE	.....	7
	..... Ελληνική	GR	.....	3		..... Slovensky	SK	.....	7
	..... Gaeilge	IE	.....	4		..... Slovenski	SI	.....	7
	..... íslenskur	IS	.....	4		..... Español	ES	.....	7
	..... Italiano	IT	.....	4		..... Český	CZ	.....	8
	..... Hrvatski	HR	.....	4		..... Türkçe	TR	.....	8
	..... Latviešu	LV	.....	5		..... Magyar	HU	.....	8
	..... Lietuvių kalba	LT	.....	5		..... 日本語	JP	.....	9



## Глициния

Wisteria sinensis

### Издържлива цъфтяща мечта / бонсай на открито

Китайската глициния (W. Sinensis) прераства в цъфтящ бонсай. На повечето места неговите гъсто цъфтящи, увиснали гроздове се появяват два пъти годишно - през пролетта, дори преди първите листа и по-късно отново през юли до август, като цветовете се разгръщат от основата до върха. **Естествено местоположение:** Китайската глициния произхожда от Източна Азия и по-специално от Китай. Днес обаче ареалът му се простира до Северна Америка и Европа. **Успешно отглеждане:** Семената могат да се отглеждат по всяко време между януари и септември. За да се повиши кълняемостта на семената, те трябва първо да се нагрубят с шкурка или пила и след това да се оставят да набъбнат във вода при стайна температура за 12 часа. Покрийте съда с култура с домакинско фолио, което сте осигурили с дупки. Това предпазва почвата от изсушаване. Поставете саксията със семена на светло и топло място с 20 до 25° по Целзий и поддържайте почвата влажна, но не мокра. Първите разсад се появяват след две до осем седмици. **Най-доброто местоположение:** Wisteria е доста невзискателна, но предпочита слънчево и топло място за богат цъфтеж. **Оптимална грижа:** По време на периода на цъфтеж и през летните месеци глицинията се нуждае от обилно поливане и почвата не трябва да пресъхва. След като горният слой на почвата изсъхне, трябва да напоите вашата глициния обилно. Вашият бонсай ще ви благодари за допълнително ежедневно пръскане. Торете само малко преди цъфтежа, на всеки две седмици по време на цъфтежа и всяка седмица след цъфтежа до есента с течен тор за бонсай. Реже се само след прецъфтяване. Шест до осем пораснали чифта листа след това се режат обратно на два до три чифта листа. Тъй като младите растения все още не развиват цветове, те могат да се режат непрекъснато. Презасаждат се млади растения ежегодно, а по-стари глицинии на всеки четири години през пролетта, преди пъпките да набъбнат. Поради големия разход на вода се препоръчва сравнително висока саксия, за да не изсъхне почвата толкова бързо. **През зимата:** Закътано и прохладно място без минусови температури е идеално през зимата. **Почти всички компоненти на глицинията - включително семената - се считат за отровни, когато се консумират!**



## Wisteria

Wisteria sinensis

### En hårdfør blomstrende drøm / udendørs bonsai

Kineserne Wisteria (W. Sinensis) vokser til en blomstrende bonsai. De fleste steder dukker dens tætblomstrende, hængende klaser op to gange om året - om foråret selv før de første blade og senere igen i juli til august, hvor blomsterne folder sig ud fra bunden til toppen. **Naturlig beliggenhed:** Den kinesiske blåregn har sin oprindelse i Østasien og der især i Kina. I dag strækker den sig imidlertid til Nordamerika og Europa. **Succesfuld dyrkning:** Frø kan dyrkes når som helst mellem januar og september. For at øge spireevnen af frøene bør de først gøres ru med sandpapir eller en fil og derefter lades svulme op i vand ved stuetemperatur i 12 timer. Dæk dyrkningskarret til med husholdningsfilm, som du forsyner med huller. Dette beskytter jorden mod udtørring. Stil frøpotten et let og varmt sted med 20 til 25° Celsius og hold pottejorden fugtig, men ikke våd. De første frøplanter vises efter to til otte uger. **Den bedste beliggenhed:** Wisteria er ret krævende, men foretrækker et solrigt og varmt sted for en rig blomstring. **Optimal pleje:** I blomstringsperioden og i sommermånederne har blåregn brug for masser af vand, og jorden bør ikke tørre ud. Når det øverste jordlag er tørt, bør du vande din blåregn grundigt. Din bonsai vil takke dig for yderligere daglig sprøjtning. Gød kun lidt før blomstringen, hver anden uge under blomstringen og ugentlig efter blomstringen indtil efteråret med flydende bonsai-gødning. Klip kun efter blomstring. Seks til otte voksne blade reduceres derefter til to til tre blade par skåret tilbage. Da unge planter endnu ikke udvikler blomster, kan de klippes kontinuerligt. Genplant unge planter årligt og ældre blåregn hvert fjerde år om foråret, før knopperne svulmer op. På grund af det høje vandforbrug anbefales en forholdsvis høj potte, så jorden ikke tørrer så hurtigt ud. **Om vinteren:** Et beskyttet og køligt sted uden minusgrader er ideelt om vinteren. **Næsten alle komponenter af blåregn - inklusive frøene - anses for at være giftige, når de indtages!**



## Blauregen

Wisteria sinensis

### Ein winterharter Blütenraum / Freiland-Bonsai

Der chinesische Blauregen (W. Sinensis) wächst zu einem blühfreudigen Bonsai heran. An den meisten Standorten zeigen sich seine dicht blühenden, herabhängenden Trauben zweimal jährlich - im Frühjahr sogar noch vor den ersten Blättern und später nochmals von Juli bis August, wobei sich die Blüten von der Basis zur Spitze hin entfalten. **Naturstandort:** Der chinesische Blauregen hat seinen Ursprung in Ostasien und dort vor allem in China. Sein Verbreitungsgebiet erstreckt sich heute aber bis nach Nordamerika und Europa. **Anzucht:** Zwischen Januar und September ist die Anzucht von Samen jederzeit möglich. Um die Keimfähigkeit der Samen zu erhöhen, sollten sie zunächst mit Sandpapier oder einer Feile angeraut werden und danach für 12 Stunden in Wasser bei Raumtemperatur anquellen können. Bedecken das Anzuchtgefäß mit Klarsichtfolie, die Sie mit Löchern versehen. So ist die Erde vor Austrocknung geschützt. Stellen Sie das Anzuchtgefäß an einen hellen und warmen Ort mit 20 bis 25° Celsius und halten Sie die Anzuchtde feucht, aber nicht nass. Nach zwei bis acht Wochen erscheinen dann die ersten Sämlinge. **Standort:** Blauregen ist recht anspruchslos, bevorzugt für eine reiche Blüte aber einen sonnigen und warmen Standort. **Pflege:** Während der Blütezeit und in den Sommermonaten benötigt der Blauregen reichlich Wasser und die Erde sollte nicht austrocknen. Sobald die oberste Erdschicht trocken ist, sollten Sie Ihre Wisteria durchdringend wässern. Zusätzliches tägliches Übersprühen wird Ihr Bonsai Ihnen danken. Düngen Sie vor der Blüte nur wenig, während der Blüte im Abstand von zwei Wochen und nach der Blüte bis in den Herbst wöchentlich mit flüssigem Bonsaidünger. Schneiden Sie erst nach der Blüte. Sechs bis acht gewachsene Blattpaare werden dann auf zwei bis drei Blattpaare zurückgeschnitten. Da Jungpflanzen noch keine Blüten entwickeln, können sie durchgehend geschnitten werden. Junge Pflanzen sollten Sie jährlich und ältere Blauregen alle vier Jahre im Frühjahr, bevor die Knospen anschwellen, umpflanzen. Aufgrund des hohen Wasserverbrauchs ist eine relativ hohe Schale empfehlenswert, damit die Erde nicht so schnell austrocknet. **Im Winter:** Ein geschützter und kühler Standort ohne Minusgrade ist im Winter ideal. **Fast alle Bestandteile des Blauregens - auch die Samen - gelten beim Verzehr als giftig!**



## Bonsai - Blue Chinese Wisteria

Wisteria sinensis

### A frost-hard sea of flowers / Outdoor Bonsai

The Blue Chinese Wisteria grows to a joyfully blossoming bonsai plant. In most places, it produces its narrow growing, hanging grapes twice a year - in spring even before the first leaves, and then a second time between July and August - while its blossoms develop from the base to the top. **Natural location:** The Blue Chinese Wisteria has its origin in East Asia and particularly in China. Today it is found even in North America and Europe. **Successful cultivation:** Seed propagation is possible between January and September. To increase the germinability, you can slightly roughen the seed with a soft file or a piece of sandpaper and place it for about 12 hours in warm water for priming. Then, press the seeds into moist potting compost and cover the seed container with clear film to prevent the earth from drying out. Don't forget to make some holes in the clear film and take it every second or third day completely off for about 2 hours. That way you avoid mold formation on your potting compost. Place the seed container somewhere bright and warm with a temperature between 20°C and 25°C and keep the earth moist, but not wet. The first seedlings will come up after two to eight weeks. **The best location:** The Blue Chinese Wisteria is rather modest in its needs, but prefers for developing a rich blossoming a sunny and warm place. **Optimal care:** During blossoming and in the summer time, the Blue Chinese Wisteria needs to be watered abundantly, so the earth never dries out completely. Always water penetratingly again, when the upper layer of the soil got dry. Your bonsai also appreciates to be water-sprayed once a day. Provide only modest fertilizing until blossoming, then every two weeks during flowering, and afterwards every week until autumn by using fluid fertilizer for bonsai plants. Pruning is best be done after blossoming, while cutting from six to eight leaf pairs down to only two or three pairs. Since young plants not yet develop blossoms, they can be pruned throughout the year. Young plants should be repotted annually, matured trees every four years. The best time for shifting pots would be in spring, before the buds begin to swell. Your bonsai needs plenty of water - a rather tall pot is advisable, so that the earth doesn't dry out too quickly. **In the winter:** During winter, your bonsai is ideally kept in a sheltered and cool place without frost. **Almost all parts of the wisteria - even the seeds - are toxic when consumed!**



**Wisteria**  
Wisteria sinensis  
**Vastupidav õitsemise unistus / välibonsai**

Hiinlased Wisteria (W. Sinensis) kasvab õitsejaks bonsai. Enamikus kohtades ilmuvad selle tihedalt õitsevad rippuvad kobarad kaks korda aastas – kevadel isegi enne esimesi lehti ja hiljem juulis-augustis, kusjuures õied avanevad alt üles. **Looduslik asukoht:** Hiina wisteria on pärit Ida-Aasiast ja seal eriti Hiinast. Tänapäeval ulatub selle levila aga Põhja-Ameerikasse ja Euroopasse. **Edukas kasvatamine:** Seemneid saab kasvatada igal ajal jaanuarist septembrini. Seemnete idanemisvõime suurendamiseks tuleks need esmalt liivapaberi või viiliga karestada ja seejärel 12 tunniks toatemperatuuril vette paisuda. Kata kultuurianum toidukilega, mille varustad aukudega. See kaitseb mulda kuivamise eest. Asetage külvipott valgusküllasesse ja sooja kohta, mille temperatuur on 20–25 °C, ning hoidke istutusmuld niiskena, kuid mitte märjana. Esimesed seemikud ilmuvad kahe kuni kaheksa nädala pärast. **Parim asukoht:** Wisteria on üsna vähenõudlik, kuid eelistab rikkalikuks õitsemiseks päikeselist ja sooja kasvukohta. **Optimaalne hooldus:** Õitsemise ajal ja suvekuudel vajab wisteria rohket vett ja muld ei tohiks läbi kuivada. Kui pealmine mullakiht on kuivanud, kastke oma wisteria põhjalikult. Teie bonsai tänab teid igapäevase lisapihustamise eest. Väetada vaid veidi enne õitsemist, õitsemise ajal iga kahe nädala tagant ja iganädalaselt peale õitsemist kuni sügiseni bonsai vedelväetisega. Lõika alles pärast õitsemist. Kuus kuni kaheksa kasvanud lehtede paari vähendatakse seejärel kahele kuni kolmele. Lehepaarid lõigatakse tagasi. Kuna noortel taimedel õisi veel ei arene, võib neid pidevalt lõigata. Istutage noori taimi ümber igal aastal ja vanemaid wisteriaid iga nelja aasta tagant kevadel, enne kui pungad paisuvad. Suure veekulu tõttu soovistatakse suhteliselt kõrget potti, et muld nii kiiresti läbi ei kuivaks. **Talvel:** Varjatud ja jahe asukoht ilma miinustemperatuurideta on ideaalne talvel. **Peaegu kõiki wisteria komponente - sealhulgas seemneid - peetakse tarbimisel mürgiseks!**



**Wisteria**  
Wisteria sinensis  
**Kestävä kukkiva unelma / ulkobonsai**

Kiinalainen Wisteria (W. Sinensis) kasvaa kukkivaksi bonsaiksi. Useimmissa paikoissa sen tiheästi kukkivat, roikkuvat klusterit ilmestyvät kahdesti vuodessa - keväällä jo ennen ensimmäisiä lehtiä ja myöhemmin taas heinä-elokuussa kukkien avautuessa tyvestä latvaan. **Luonnollinen sijainti:** Kiinan wisteria on peräisin Itä-Aasiasta ja siellä erityisesti Kiinasta. Nykyään sen levinneisyysalue ulottuu kuitenkin Pohjois-Amerikkaan ja Eurooppaan. **Onnistunut viljely:** Siemeniä voidaan kasvattaa milloin tahansa tammi-syyskuussa. Siementen itämiskyvyn lisäämiseksi ne tulee ensin karhentaa hiekkapaperilla tai viilalla ja antaa sitten turvota veteen huoneenlämmössä 12 tuntia. Peitä viljelyastia kelmulla, johon on tehty reikiä. Tämä suojaa maaperää kuivumiselta. Aseta siemenruukku valoisaan ja lämpimään paikkaan, jonka lämpötila on 20–25 °C, ja pidä istutusmaa kosteana, mutta ei märkänä. Ensimmäiset taimet ilmestyvät kahdesta kahdeksaan viikon kuluttua. **Paras sijainti:** Wisteria on melko vaatimaton, mutta suosii aurinkoista ja lämmintä paikkaa runsaan kukinnan vuoksi. **Optimaalinen hoito:** Kukinta-aikana ja kesäkuukausina wisteria tarvitsee runsaasti vettä, eikä maaperä saa kuivua. Kun maaperän yläkerros on kuiva, sinun tulee kastella wisteria huolellisesti. Bonsai kiittää sinua päivittäisestä lisäruokutuksesta. Lannoita vain vähän ennen kukintaa, kahden viikon välein kukinnan aikana ja viikoittain kukinnan jälkeisen syksyn asti nestemäisellä bonsai-lannoitella. Leikkaa vasta kukinnan jälkeen. Kuudesta kahdeksaan kasvanutta lehtiparia vähennetään sitten kahdesta kolmeen lehtipari leikattu pois. Koska nuoret kasvit eivät vielä kehitä kukkia, niitä voidaan leikata jatkuvasti. Istuta nuoret kasvit uudelleen vuosittain ja vanhemmat wisteria neljän vuoden välein keväällä ennen kuin silmut turpoavat. Suuren vedenkulutuksen vuoksi suositellaan suhteellisen korkeaa ruukkua, jotta maa ei kuivu niin nopeasti. **Talvella:** Suojaisa ja viileä paikka ilman pakkasta on ihanteellinen talvella. **Lähes kaikkia wisterian aineosia - mukaan lukien siemenet - pidetään myrkyllisinä nautittaessa!**



**Glycine de Chine**  
Wisteria sinensis  
**Un rêve de fleurs rustique / Bonsai de jardin**

La glycine de Chine (W. sinensis) devient un bonsai florifère. Ses rameaux très florissants et pendants se montrent deux fois par an - en printemps avant les premières feuilles, et plus tard de juillet à août, où les fleurs se développent de la base jusqu'à la pointe. **Emplacement naturel:** La glycine de Chine vient de l'Asie de l'Est, notamment de la Chine. Aujourd'hui, son aire de répartition s'étend à l'Amérique du Nord et l'Europe. **Culture réussie:** La culture des graines est possible entre janvier et septembre. Pour améliorer la faculté germinative des graines, il faut d'abord les rendre rugueuses avec du papier de verre ou une lime, puis les mettre dans de l'eau à température ambiante pendant douze heures. Couvrez le récipient avec une feuille transparente dans laquelle vous faites des trous. Comme ça, le terreau est protégé du dessèchement. Mettez le récipient dans un endroit lumineux et chaud de 20° à 25° Celsius et gardez le terreau humide, mais pas mouillé. Les premiers semis apparaissent après deux à huit semaines. **Le meilleur emplacement:** La glycine de Chine est vraiment peu exigeante mais préfère un emplacement chaud et ensoleillé pour une floraison abondante. **Soins optimaux:** La glycine de Chine a besoin de beaucoup d'eau pendant la floraison et les mois d'été, et la terre ne doit pas se dessécher. Vous devez arroser votre glycine dès que la couche supérieure de la terre est sèche. Votre bonsai appréciera des aspersion quotidiennes en plus. Engraissez la plante peu avant la floraison, toutes les deux semaines pendant la floraison, et toutes les semaines après la floraison jusqu'en automne avec de l'engrais liquide pour bonsai. Coupez la plante seulement après la floraison. Ensuite, six à huit paires de feuilles sont raccourcies de deux à trois paires de feuilles. Comme les jeunes plantes ne poussent pas encore de fleurs, vous pouvez les tailler en permanence. Vous devez repotter les jeunes plantes tous les ans et les glycines plus anciennes tous les quatre ans en printemps, avant que les bourgeons ne gonflent. En raison du fort besoin en eau de la plante, il est conseillé d'utiliser un bac relativement haut, pour que la terre ne se dessèche pas rapidement. **En hiver:** En hiver, un emplacement protégé et froid sans de température glaciale est idéal. **Attention: Presque toutes les parties de la glycine sont toxiques en cas d'indigestion, y compris les semences!**



**Γλυκίνη**  
Wisteria sinensis  
**Ένα ανθεκτικό ανθισμένο όνειρο / υπαίθριο μπονσάι**

Το κινέζικο Η Wisteria (W. Sinensis) μεγαλώνει σε ανθισμένο μπονσάι. Στις περισσότερες τοποθεσίες, οι πυκνά ανθισμένες, πεισμένες συστάδες του εμφανίζονται δύο φορές το χρόνο - την άνοιξη ακόμη και πριν από τα πρώτα φύλλα και αργότερα πάλι τον Ιούλιο έως τον Αύγουστο, με τα λουλούδια να ξεδιπλώνονται από τη βάση προς την κορυφή. **Φυσιολογία:** Η κινεζική γλυκίνα έχει την προέλευσή της στην Ανατολική Ασία και εκεί ειδικά στην Κίνα. Σήμερα, όμως, η γκάμα του εκτείνεται στη Βόρεια Αμερική και την Ευρώπη. **Επιτυχημένη καλλιέργεια:** Οι σπόροι μπορούν να καλλιεργηθούν ανά πάσα στιγμή μεταξύ Ιανουαρίου και Σεπτεμβρίου. Για να αυξηθεί η βλαστική ικανότητα των σπόρων, πρέπει πρώτα να τραχυνθούν με γυαλόχαρτο ή λίμα και μετά να φουσκώσουν σε νερό σε θερμοκρασία δωματίου για 12 ώρες. Καλύψτε το δοχείο καλλιέργειας με μεμβράνη, την οποία ανοίγετε με τρύπες. Αυτό προστατεύει το έδαφος από το στεγνώνει. Τοποθετήστε τη γλάστρα σε ένα ελαφρύ και ζεστό μέρος με θερμοκρασία 20 έως 25° Κελσίου και διατηρήστε το χώμα της γλάστρας υγρό αλλά όχι υγρό. Τα πρώτα σπορόφυτα εμφανίζονται μετά από δύο έως οκτώ εβδομάδες. **Η καλύτερη τοποθεσία:** Η Wisteria είναι αρκετά μη απαιτητική, αλλά προτιμά μια ηλιόλουστη και ζεστή τοποθεσία για πλούσια ανθοφορία. **Βέλτιστη φροντίδα:** Κατά την περίοδο της ανθοφορίας και τους καλοκαιρινούς μήνες, η γουστέρια χρειάζεται άφθονο νερό και το χώμα δεν πρέπει να στεγνώνει. Μόλις στεγνώσει το ανώτερο στρώμα του εδάφους, θα πρέπει να ποτίζετε καλά τη γουστέρια σας. Το μπονσάι σας θα σας ευχαριστήσει για τον επιπλέον καθημερινό ψεκασμό. Λιπάνετε μόνο λίγο πριν την ανθοφορία, κάθε δύο εβδομάδες κατά την ανθοφορία και κάθε εβδομάδα μετά την ανθοφορία μέχρι το φθινόπωρο με υγρό λίπασμα μπονσάι. Κόψτε μόνο μετά την ανθοφορία. Έξι έως οκτώ αναπτυσσόμενα ζεύγη φύλλων μειώνονται στη συνέχεια σε δύο έως τρία ζεύγη φύλλων κομμένα. Δεδομένου ότι τα νεαρά φυτά δεν αναπτύσσουν ακόμη άνθη, μπορούν να κοπούν συνεχώς. Επαναφτεύστε νεαρά φυτά ετησίως και μεγαλύτερη γουστέρια κάθε τέσσερα χρόνια την άνοιξη πριν φουσκώσουν οι οφθαλμοί. Λόγω της μεγάλης κατανάλωσης νερού προτείνεται μια σχετικά υψηλή γλάστρα για να μην στεγνώσει τόσο γρήγορα το χώμα. **Το χειμώνα:** Μια προστατευμένη και δροσερή τοποθεσία χωρίς θερμοκρασίες κάτω από το μηδέν είναι ιδανική το χειμώνα. **Σχεδόν όλα τα συστατικά της wisteria - συμπεριλαμβανομένων των σπόρων - θεωρούνται δηλητηριώδη όταν καταναλώνονται!**



## Wisteria

Wisteria sinensis

### Aisling láidir bláthanna / bonsai amuigh faoin aer

Na SíneFásann Wisteria (W. Sinensis) ina bonsai bláthanna. I bhformhór na n-áiteanna, léiríonn a chuid bláthanna dlúth, braislí drooping dhá uair sa bhliain - san earrach fiú roimh na chéad duilleoga agus níos déanaí arís i mí Iúil go Lúnasa, agus na bláthanna ag leathnú ón mbonn go dtí an barr. **Suíomh náidúrtha:** Tá bunús an wisteria Síneach san Áise Thoir agus ansin go háirithe sa tSín. Sa lá atá inniu ann, áfach, leathnaíonn a raon go Meiriceá Thuaidh agus san Eoraip. **Saothrú rathúil:** Is féidir síolta a fhás ag am ar bith idir Eanáir agus Meán Fómhair. D'fhonn cumas phéacadh na síolta a mhéadú, ba chóir iad a garbh ar dtús le páirín nó comhad agus ansin iad a fhágáil in uisce ag teocht an tseomra ar feadh 12 uair an chloig. Clúdaigh an soitheach cultúir le scannán cling, a sholáthraíonn tú le poill. Cosnaíonn sé seo an ithir ó thriomú amach. Cuir an pota síolta in áit éadrom te ag 20 go 25 ° Celsius agus coinnigh an ithir potaithe tais ach ní fliuch. Tá na chéad síológa le feiceáil tar éis dhá nó ocht seachtaine. **An suíomh is fearr:** Tá Wisteria go leor gan éileamh, ach is fearr leis suíomh grianmhar te le haghaidh bláthanna saibhir. **Cúram is fearr is féidir:** Le linn na tréimhse bláthanna agus i míonna an tsamhraidh, tá go leor uisce ag teastáil ón wisteria agus níor chóir go dtriomóidh an ithir. Nuair a bhíonn an ciseal barr ithreach tirim, ba chóir duit do wisteria a uisce go maith. Gabhfaidh do bonsai buíochas leat as spraeáil laethúil breise. Fertilize ach beagán roimh bláthanna, gach dhá sheachtain le linn bláthanna agus seachtainiúil tar éis bláthainn go dtí an fhómhair le leasachán bonsai leachtach. Gearr ach amháin tar éis bláthanna. Laghdaítear ansin sé go hocht bpéire duilleoga fásta go dtí dhá nó trí péire duilleoga gearrtha siar. Ós rud é nach bhforbraíonn plandaí óga bláthanna fós, is féidir iad a ghearradh go leanúnach. Déan plandaí óga a athphlandáil go bliantúil agus wisteria níos sine gach ceithre bliana san earrach sula n-ataíonn na bachlógá. Mar gheall ar an tomhaltas ard uisce, mholtar pota sách ard ionas nach tirim an ithir amach choimh tapa. **Sa gheimhreadh:** Tá suíomh fothain agus fionnuar gan teochtáí fo-nialas oiriúnach don gheimhreadh. **Meastar go bhfuil beagnach gach comhpháirt de wisteria - lena n-áirítear na síolta - nimhiúil nuair a chaitear!**



## Wisteria

Wisteria sinensis

### Harðgerður blómstrandi draumur / úti bonsai

Kínverjar Wisteria (W. Sinensis) vex í blómstrandi bonsai. Á flestum stöðum birtast péttblómstrandi, hangandi klasar hennar tvisvar á ári - á vorin jafnvel fyrir fyrstu blöðin og síðar aftur í júlí til ágúst, þar sem blómmin breiðast út frá grunni til topps. **Náttúruleg staðsetning:** Kínverska vínvíðurinn á uppruna sinn í Austur-Asíu og þar sérstaklega í Kína. Í dag nær þó svið þess til Norður-Ameríku og Evrópu. **Árangursrík ræktun:** Hægt er að rækta fræ hvenær sem er á milli janúar og september. Til þess að auka spírungargetu fræanna þarf fyrst að grófa þau með sandpappír eða skrá og láta síðan bólgnu í vatni við stofuhita í 12 klst. Hyljið ræktunarílatið með matarfilmu, sem þú útvegar með götum. Þetta verndar jarðveginn gegn þurrkun. Settu fræpottinn á léttan og heitan stað með 20 til 25° Celsius og haltu pottajarðveginum rökum en ekki blautum. Fyrstu plönturnar birtast eftir tvær til átta vikur. **Besta staðsetningin:** Wisteria er frekar lítið krefjandi, en vill frekar sólríka og hlýja stað fyrir ríka blómgun. **Besta umönnun:** Á blómstrandi tímabilinu og yfir sumarmánuðina þarf vínvíðurinn nóg af vatni og jarðvegurinn ætti ekki að þorna. Þegar efsta lagið af jarðvegi er þurr ættir þú að vökva wisteriaíð þitt vel. Bonsaiíð þitt mun þakka þér fyrir frekari daglega úða. Frjövga aðeins örlítið fyrir blómgun, á tveggja vikna fresti meðan á blómgun stendur og vikulega eftir blómgun fram á haust með fljóttandi Bonsai áburði. Skerið aðeins eftir blómgun. Sex til átta vaxin laufapör eru síðan minnkað í tvö til þrjú laufpör skorin niður. Þar sem ungar plöntur þróa ekki enn blóm er hægt að skera þær stöðugt. Gróðursettu ungar plöntur árlega og eldri vínvíðri á fjögurra ára fresti á vorin áður en brumarnir bólgnu. Vegna mikillar vatnsnotkunar er mælt með tiltölulega háum potti svo að jarðvegurinn þorni ekki svo fljótt. **Á veturna:** Skjólgóður og svalur staður án hitastigs undir núll er kjörinn á veturna. **Næstum allir þættir wisteria - þar með talið fræin - eru talin eitruð þegar þau eru neytt!**



## Glicine

Wisteria sinensis

### Un sogno di fiori che resiste al freddo

Il glicine cinese (W. sinensis) cresce bene come bonsai fiorifero. Nella maggior parte dei suoi habitat i grappoli di fiori pendenti e rigogliosi si manifestano due volte all'anno: in primavera, subito dopo le prime foglie e poi più tardi da luglio ad agosto, quando i fiori si schiudono dalla base fino alla punta. **Posizione naturale:** Il glicine cinese ha origine in Asia orientale e soprattutto in Cina. Oggi la sua zona di diffusione si è estesa fino al Nord America e all'Europa. **Coltivazione riuscita:** La coltivazione da semi in casa è possibile fra gennaio e settembre. Per aumentare la germinabilità dei semi, strofinateli prima con carta vetrata o con una lima, poi lasciateli immersi per 12 ore in acqua a temperatura ambiente perché si gonfino. Coprite il recipiente di coltivazione con pellicola trasparente, sulla quale praticerete dei fori, in questo modo la terra eviterà di seccarsi. Collocate il recipiente di coltivazione in un luogo luminoso e caldo, a una temperatura fra i 20° e i 25°C, mantenete la terra umida, ma non bagnata. Le prime piantine compariranno dopo un periodo che va da due a otto settimane. **La posizione migliore:** Il glicine è davvero una pianta senza pretese, ma per produrre una ricca fioritura necessita di un'ambiente soleggiato e caldo. **Cura ottimale:** Durante la fioritura e nei mesi estivi il Glicine ha bisogno di abbondanti irrigazioni, senza lasciare che la terra si secchi. Non appena lo strato superficiale di terra si asciuga, innaffiate di nuovo la vostra Wisteria. Inumidirlo usando quotidianamente uno spruzzino gioverà al vostro bonsai. Prima della fioritura concimate soltanto poco, durante la fioritura fatelo ogni due settimane e, a fioritura conclusa e fino all'autunno, una volta a settimana con fertilizzante liquido per bonsai. Cimate solo dopo la fioritura. Ogni sei-otto coppie di foglie tagliatene due o tre. Poiché le piante giovani non producono ancora fiori, possono essere potate ripetutamente. Trapiantate le piante giovani ogni anno e quelle più adulte ogni quattro, in primavera prima che sboccino i germogli. Poiché il Glicine ha un fabbisogno d'acqua elevato è consigliabile scegliere un contenitore piuttosto alto, in modo che la terra non si asciughi troppo velocemente. **In inverno:** In inverno è ideale una collocazione riparata e fresca, con temperature che non scendano sotto lo zero. **Quasi tutte le componenti del glicine - compresi i semi - sono tossiche se ingerite.**



## Glicinija

Wisteria sinensis

### Otporan cvjetajući san / vanjski bonsai

Kineski Glicinija (W. Sinensis) raste u cvjetni bonsai. Na većini lokacija, njegovi gusto cvjetni, viseći grozdovi pojavljuju se dva puta godišnje - u proljeće čak i prije prvih listova i kasnije ponovno u srpnju do kolovoza, s cvjetovima koji se razvijaju od baze prema vrhu. **Zemlja porijekla:** Kineska glicinija potječe iz istočne Azije, a posebno iz Kine. Međutim, danas se njegov areal proteže do Sjeverne Amerike i Europe. **Uspješan uzgoj:** Sjeme se može uzgajati u bilo koje vrijeme između siječnja i rujna. Da bi se povećala klijavost sjemena, potrebno ga je najprije nahranjavati brusnim papirum ili turpijom, a potom ostaviti da bubri u vodi sobne temperature 12 sati. Posudu s kulturom prekrijte prozirnom folijom koju ste opremili rupama. To štiti tlo od isušivanja. Stavite posudu za sjeme na svijetlo i toplo mjesto s 20 do 25° Celzija i održavajte tlo za saksije vlažnim, ali ne mokrim. Prve sadnice pojavljuju se nakon dva do osam tjedana. **Najbolja lokacija:** Wisteria je prilično nezahtjevna, ali preferira sunčano i toplo mjesto za bogato cvjetanje. **Optimalna njega:** U razdoblju cvatnje iu ljetnim mjesecima gliciniju treba obilno zalijevati, a tlo se ne smije sušiti. Nakon što se gornji sloj zemlje osuši, trebali biste temeljito zaliti svoju gliciniju. Vaš bonsai će vam biti zahvalan na dodatnom svakodnevnom prskanju. Gnojite samo malo prije cvatnje, svaka dva tjedna tijekom cvatnje i jednom tjedno nakon cvatnje do jeseni tekućim gnojivom za bonsai. Režite tek nakon cvatnje. Šest do osam izraslih pari listova zatim se reducira na dva do tri parovi lišća odrezani. Budući da mlade biljke još ne razvijaju cvjetove, mogu se rezati kontinuirano. Mlade biljke sadite jednom godišnje, a starije glicinije svake četiri godine u proljeće prije nego pupoljci nabubre. Zbog velike potrošnje vode preporučuje se relativno visoka posuda kako se tlo ne bi tako brzo isušilo. **U zimi:** Zimi je idealno zaštićeno i hladno mjesto bez temperature ispod ništice. **Gotovo sve komponente glicinije - uključujući i sjemenke - smatraju se otrovnima kada se konzumiraju!**



## Visterija

Wisteria sinensis

### Izturīgs ziedošs sagnis / āra pundurkociņš

Ķīnieši Visterija (W. Sinensis) izaug par ziedošu pundurkociņu. Lielākajā daļā vietu tās blīvi ziedošās, nokarenās kopas parādās divas reizes gadā - pavasarī pat pirms pirmajām lapām un vēlāk jūlijā līdz augustā, kad ziedi izvēršas no pamatnes līdz augšai. **Dabiska vieta:** Ķīniešu visterijas izcelsme ir Austrumāzijā un tur īpaši Ķīnā. Tomēr šodien tās izplatības areāls sniedzas līdz Ziemeļameriku un Eiropu. **Veiksmīga audzēšana:** Sēklas var audzēt jebkurā laikā no janvāra līdz septembrim. Lai palielinātu sēklu dīgtspēju, tās vispirms jāraupina ar smilšpapīru vai vīli un pēc tam 12 stundas jāatstāj uzbriest ūdenī istabas temperatūrā. Nosedziet kultivēšanas trauku ar pārtikas plēvi, kuru nodrošina ar caurumiem. Tas pasargā augsni no izžūšanas. Novietojiet sēklu podu gaišā un siltā vietā ar temperatūru 20 līdz 25 ° C un turiet augsni mitru, bet ne mitru. Pirmie stādi parādās pēc divām līdz astoņām nedēļām. **Labākā atrašanās vieta:** Visterija ir diezgan mazprasīga, bet bagātīgai ziedēšanai dod priekšroku saulainai un siltai vietai. **Optimāla aprūpe:** Ziedēšanas periodā un vasaras mēnešos visterijai ir nepieciešams daudz ūdens, un augsnei nevajadzētu izžūt. Kad augšējais augsnes slānis ir nožuvis, jums rūpīgi jālaista visterija. Jūsu pundurkociņš pateiksies par papildu ikdienas izsmidzināšanu. Mēslojiet tikai nedaudz pirms ziedēšanas, ik pēc divām nedēļām ziedēšanas laikā un reizi nedēļā pēc ziedēšanas līdz rudenim ar šķidro pundurkociņa mēslojumu. Nogrieziet tikai pēc ziedēšanas. Pēc tam sešus līdz astoņus izaugusius lapu pārus samazina līdz diviem līdz trim lapu pāri nogriezt. Tā kā jaunie augi vēl neattīsta ziedus, tos var griezt nepārtraukti. Pārstaždiēt jaunus augus katru gadu un vecākos visterijas ik pēc četriem gadiem pavasarī, pirms pumpuri uzbriest. Liela ūdens patēriņa dēļ ieteicams salīdzinoši augsts pods, lai augsne tik ātri neizžūtu. **Ziemā:** Ziemā ideāla vieta ir aizsargāta un vēsa vieta bez mīnuss. **Gandrīz visas wisteria sastāvdaļas, tostarp sēklas, tiek uzskatītas par indīgām, kad tās tiek patērētas!**



## Visterija

Wisteria sinensis

### Ištverminga žydējimo svajonē / lauko bonsai

Kiniecīai Visterija (W. Sinensis) izauga j žydintj bonsaj. Daugumoje vietj tankiai žydinčios, nusvirusios kekēs pasirodo du kartus per metus - pavasarj dar prieš pirmuosius lapus ir vēliau liepos-rugpjūcio mėn., kai ziedai išsiskleidžia nuo pagrindo iki viršūnės. **Natūrali vieta:** Kinijos wisteria kilusi iš Rytų Azijos ir ypač iš Kinijos. Tačiau šiandien jo arealas apima Šiaurės Ameriką ir Europą. **Sėkmingas auginimas:** Sėklos gali būti auginamos bet kuriuo metu nuo sausio iki rugsėjo. Norint padidinti sėklų daigumą, pirmiausia jas reikia šiurkštinti švitiriniu popieriumi arba dilde, o po to 12 valandų palikti brinkti kambario temperatūros vandenyje. Kultūros indj uždenkite maistine plėvele, kurioje yra skylės. Tai apsaugo dirvą nuo išdžiūvimo. Sėklų vazoną pastatykite šviesioje ir šiltoje vietoje, kurios temperatūra yra 20–25 ° C, o vazono žemė turi būti drėgna, bet ne šlapia. Pirmieji daigai pasirodo po dviejų – aštuonių savaičių. **Geriausia vieta:** Visterija yra gana nereikli, tačiau renkasi saulėtą ir šiltą vietą gausiam žydėjimui. **Optimali priežiūra:** Žydėjimo laikotarpiu ir vasaros mėnesiais visterijoms reikia daug vandens, o dirvožemis neturėtų išdžiūti. Kai viršutinis dirvožemio sluoksnis išdžiūsta, turėtumėte gerai laistyti visteriją. Jūsų bonsai padėkos už papildomą kasdieninį purškimą. Treškite tik šiek tiek prieš žydėjimą, kas dvi savaites žydėjimo metu ir kas savaitę po žydėjimo iki rudens skystomis bonsojų trąšomis. Pjaunama tik po žydėjimo. Po to šėšių iki aštuonių užaugusių lapų porų sumažėja iki dviejų ar trijų lapų poros nupjautos. Kadangi jauni augalai dar nežydi, juos galima pjauti nuolat. Jaunus augalus persodinkite kasmet, o senesnes visterijas – kas ketverius metus pavasarį, kol pumpurai neišbrinks. Dėl didelio vandens suvartojimo rekomenduojamas palyginti didelis vazonas, kad žemė taip greitai neišdžiūtų. **Ziemą:** Apsaugota ir vėsi vieta be minusinės temperatūros idealiai tinka žiemai. **Beveik visi wisteria komponentai, įskaitant sėklas, yra laikomi nuodingais, kai jie vartojami!**



## Wisteria

Wisteria sinensis

### Ħolma tal-fjuri li jifilhu / Bonsai fil-beraħ

Iċ-Ċinīzi Wisteria (W. Sinensis) tikber f'bonsai tal-fjuri. Fil-biċċa l-kbira tal-postijiet, l-għenieqed densament tal-fjuri u mdendlin tiegħu jidhru darbtejn fis-sena - fir-rebbiegħa anki qabel l-ewwel weraq u aktar tard mill-ġdid f'Luġu sa Awiṣsu, bil-fjuri jiżvolġu mill-baži sal-quċċata. **Post naturali:** Il-wisteria Ċinīza għandha l-oriġini tagħha fl-Asja tal-Lvant u hemm speċjalment fiċ-Ċina. Illum, madankollu, il-firxa tagħha testendi għall-Amerika ta 'Fuq u l-Ewropa. **Kultivazzjoni b'suċċess:** Iż-żrieragħ jistgħu jtkabbru fi kwalunkwe ħin bejn Jannar u Settembru. Sabiex tiżdied il-kapaċità tal-germinazzjoni taż-żrieragħ, l-ewwel għandhom jiġu mħarrka b'karta sandpaper jew fajl u mbaġhad jithallex jinteffu fil- ilma f'temperatura tal-kamra għal 12-il siegħa. Għatti l-bastiment tal-kultura b'cling film, li inti tipprovdi b'toqob. Dan jipproteġi l-ħamrija milli tinxef. Poġġi l-borma taż-żerriegħa f'post ħafif u shun b'20 sa 25 ° Celsius u zomm il-ħamrija tal-qsari niedja iżda mhux imxarrba. L-ewwel nebbieta jidhru wara ġimgħatejn sa tmien ġimgħat. **L-aħjar post:** Wisteria hija pjuttost mhux eżiġenti, iżda tippreferi post xemxi u shun għal fġoritura rikka. **Kura ottimali:** Matul il-perjodu tal-fġoritura u fix-xhur tas-sajf, il-wisteria teħtieġ ħafna ilma u l-ħamrija m'għandhiex tinxef. Ladarba s-saff ta 'fuq tal-ħamrija jkun niexef, għandek tirsaq il-wisteria tiegħek sewwa. Il-bonsai tiegħek se niringrazzjak għal bexx addizzjonali ta 'kuljum. Fertilizza ftit biss qabel il-fjur, kull ġimgħatejn waqt il-fġoritura u kull ġimgħa wara l-fjur sal-ħarifa b'fertilizzant bonsai likwidu. Aqta 'biss wara l-fjur. Sitta sa tmien pari ta 'weraq imkabbra mbaġhad jitnaqqsu għal tnejn sa tlietaPari weraq maqtuġħin lura. Peress li l-pjanti zġħar għadhom ma jizviluppawx fjuri, jistgħu jinqatgħu kontinwament. Erġa 'ħawwel pjanti zġħar kull sena u wisteria anzjani kull erba' snin fir-rebbiegħa qabel ma l-blanzuni jinteffu. Minħabba l-konsum għoli ta 'ilma, borma relattivament għolja hija rakkomandata sabiex il-ħamrija ma tinxefx daqshekk malajr. **Fix-xitwa:** Post kenn u frisk mingħajr temperaturi taħt iż-żero huwa ideali fix-xitwa. **Kwaži l-komponenti kollha tal-wisteria - inklużi iż-żrieragħ - huma kkunsidrati velenużi meta jiġu kkunsmati!**



## Bonsai - Blauweregen

Wisteria sinensis

### Een winterharde bloemendroom / buitenbonsai

De Chinese blauweregen (W. Sinensis) groeit uit tot een bloeiende bonsai. Op de meeste locaties verschijnen de dichtbloeiende, hangende druiven twee keer per jaar - in de lente zelfs vóór de eerste bladeren en later weer van juli tot augustus, waarbij de bloemen zich van de basis tot de punt ontvouwen. **Natuurlijke locatie:** De Chinese blauweregen vindt zijn oorsprong in Oost-Azië en daar vooral in China. Het distributiegebied strekt zich vandaag uit tot Noord-Amerika en Europa. **Succesvolle teelt:** Zaden kunnen tussen januari en september op elk moment worden gekweekt. Om de kiemkracht van de zaden te vergroten, moeten ze eerst worden opgeruwd met schuurpapier of een vijl en daarna 12 uur laten weken in water op kamertemperatuur. Dek de kweekbak af met vershoudfolie, die u van gaten heeft voorzien. Dit beschermt de aarde tegen uitdroging. Zet het kweekvat op een lichte en warme plaats met 20 tot 25 ° Celsius en houd de kweekgrond vochtig, maar niet nat. De eerste zaailingen verschijnen na twee tot acht weken. **De beste locatie:** Wisteria stelt weinig eisen, maar geeft de voorkeur aan een zonnige en warme standplaats voor een rijke bloei. **Optimale verzorging:** Tijdens de bloeiperiode en in de zomermaanden heeft de blauweregen veel water nodig en mag de grond niet uitdrogen. Zodra de bovenste laag aarde droog is, moet u uw blauweregen grondig water geven. Extra dagelijks sproeien van uw bonsai zal u dankbaar zijn. Bemest slechts een klein beetje voor de bloei, elke twee weken tijdens de bloei en wekelijks na de bloei tot de herfst met vloeibare bonsaivoeding. Snoei pas na de bloei. Zes tot acht volwassen bladparen worden vervolgens teruggesneden tot twee tot drie bladparen. Omdat jonge planten nog geen bloemen ontwikkelen, kunnen ze continu worden bijgesneden. Jonge planten moeten in het voorjaar jaarlijks worden getransplanteerd en oudere blauweregen om de vier jaar voordat de knoppen opzwellen. Door het hoge waterverbruik is een relatief hoge kom aan te raden zodat de grond niet te snel uitdroogt. **In de winter:** Een beschutte en koude standplaats zonder vriestemperaturen is ideaal in de winter. **Bijna alle componenten van de blauwe regen - inclusief de zaden - worden als giftig beschouwd wanneer ze worden geconsumeerd!**



## Blåregn

Wisteria sinensis

### En hardfør blomstrende drøm / utendørs bonsai

Kineserne Wisteria (W. Sinensis) vokser til en blomstrende bonsai. På de fleste steder dukker dens tettblomstrende, hengende klaser opp to ganger i året - om våren selv før de første bladene og senere igjen i juli til august, med blomstene som utfolder seg fra bunnen til toppen. **Naturlig beliggenhet:** Kinesisk blåregn har sitt opphav i Øst-Asia og der spesielt i Kina. I dag strekker det seg midlertid til Nord-Amerika og Europa. **Vellykket dyrking:** Frø kan dyrkes når som helst mellom januar og september. For å øke spireevnen til frøene bør de først gjøres ru med sandpapir eller fil og deretter la de svulle i vann ved romtemperatur i 12 timer. Dekk kulturkaret med matfilm, som du forsyner med hull. Dette beskytter jorda mot å tørke ut. Plasser frøpotten på et lett og varmt sted med 20 til 25° Celsius og hold pottejorda fuktig, men ikke våt. De første frøplantene vises etter to til åtte uker. **Den beste beliggenheten:** Wisteria er ganske lite krevende, men foretrekker et solrikt og varmt sted for en rik blomstring. **Optimal omsorg:** I blomstringsperioden og i sommermånedene trenger blåregn rikelig med vann og jorda skal ikke tørke ut. Når det øverste jordlaget er tørt, bør du vanne blåregn grundig. Din bonsai vil takke deg for ytterligere daglig sprøyting. Gjødsla bare litt før blomstring, annenhver uke under blomstring og ukentlig etter blomstring til høsten med flytende bonsai-gjødsel. Kutt først etter blomstring. Seks til åtte voksne bladpar reduseres deretter til to til tre bladpar kuttet tilbake. Siden unge planter ennå ikke utvikler blomster, kan de kuttes kontinuerlig. Gjenplant unge planter årlig og eldre blåregn hvert fjerde år om våren før knoppene svulmer. På grunn av det høye vannforbruket anbefales en relativt høy potte slik at jorda ikke tørker ut så raskt. **Om vinteren:** Et lunt og kjølig sted uten minusgrader er ideelt om vinteren. **Nesten alle komponenter av blåregn - inkludert frøene - anses som giftige når de konsumeres!**



## Bonsai - Glicynia

Wisteria sinensis

### Wytrzymałe kwiatowe marzenie / bonsai na świeżym powietrzu

Niebieska glicynia chińska wyrasta na radośnie kwitnącą roślinę bonsai. W większości miejsc produkuje wąsko rosnące, zwisające winogrona dwa razy w roku - wiosną jeszcze przed pierwszymi liśćmi, a następnie drugi raz między lipcem a sierpniem - podczas gdy kwiaty rozwijają się od podstawy do wierzchołka. **Naturalne położenie:** Niebieska glicynia chińska pochodzi z Azji Wschodniej, a zwłaszcza z Chin. Dziś występuje nawet w Ameryce Północnej i Europie. **Udana uprawa:** Rozmnażanie nasion jest możliwe od stycznia do września. Aby zwiększyć zdolność kiełkowania, można lekko zmotać nasiona miękkim pilnikiem lub kawałkiem papieru ściernego i umieścić je na około 12 godzin w ciepłej wodzie w celu zagruntowania. Następnie wciśnij nasiona do wilgotnego kompostu doniczkowego i przykryj pojemnik na nasiona przezroczystą folią, aby zapobiec wysychaniu ziemi. Nie zapomnij zrobić dziur w przezroczystej folii i zdejmować ją co drugi lub trzeci dzień na około 2 godziny. W ten sposób unikniesz tworzenia się pleśni na kompoście doniczkowym. Umieść pojemnik na nasiona w miejscu jasnym i ciepłym o temperaturze od 20 ° C do 25 ° C i utrzymuj ziemię wilgotną, ale nie mokrą. Pierwsze sadzonki pojawiają się po dwóch do ośmiu tygodniach. **Najlepsza lokalizacja:** Niebieska glicynia chińska jest raczej skromna w swoich potrzebach, ale woli rozwijać bogate kwitnienie w słonecznym i ciepłym miejscu. **Optymalna pielęgnacja:** Podczas kwitnienia i latem niebieska glicynia chińska musi być obficie podlewana, aby ziemia nigdy nie wysychała całkowicie. Zawsze ponownie penetrująco, gdy górna warstwa gleby wyschnie. Twoje bonsai również ceni sobie spryskiwanie wodą raz dziennie. Stosować jedynie umiarkowane nawozy do kwitnienia, następnie co dwa tygodnie w okresie kwitnienia, a następnie co tydzień do jesieni, stosując płynny nawóz do roślin bonsai. Cięcie najlepiej wykonywać po kwitnieniu, podczas cięcia z sześciu do ośmiu par liści do zaledwie dwóch lub trzech par. Ponieważ młode rośliny jeszcze nie zakwitły, można je przycinać przez cały rok. Młode rośliny należy przesadzać corocznie, dojrzewające drzewa co cztery lata. Najlepszy czas na przesuwanie doniczek to wiosna, zanim pąki zaczną puchnąć. Twoje bonsai potrzebuje dużo wody - zaleca się raczej wysoką doniczkę, aby ziemia nie wysychała zbyt szybko. **W zimę:** Zimą Twoje bonsai jest idealnie przechowywane w osłoniętym i chłodnym miejscu bez mrozu. **Prawie wszystkie części glicynii - nawet nasiona - są toksyczne po spożyciu!**



## Glicínias

Wisteria sinensis

### Um sonho de floração resistente / bonsai ao ar livre

O chinês Wisteria (W. Sinensis) cresce em um bonsai florido. Na maioria dos locais, seus aglomerados murchos e densamente floridos aparecem duas vezes por ano - na primavera, antes mesmo das primeiras folhas, e mais tarde, novamente em julho a agosto, com as flores desabrochando da base para o topo. **Localização natural:** A glicínia chinesa tem sua origem no leste da Ásia e lá principalmente na China. Hoje, no entanto, seu alcance se estende à América do Norte e à Europa. **Cultivo bem sucedido:** As sementes podem ser cultivadas a qualquer momento entre janeiro e setembro. Para aumentar a capacidade de germinação das sementes, devem primeiro ser lixadas com lixa ou lima e depois deixadas a inchar em água à temperatura ambiente durante 12 horas. Cubra o recipiente de cultura com filme plástico, que você fornece com furos. Isso protege o solo de secar. Coloque o vaso de sementes em um local claro e quente com 20 a 25 ° Celsius e mantenha o solo do vaso úmido, mas não molhado. As primeiras mudas aparecem após duas a oito semanas. **A melhor localização:** Wisteria é bastante pouco exigente, mas prefere um local ensolarado e quente para uma rica floração. **Cuidado ideal:** Durante o período de floração e nos meses de verão, as glicínias precisam de muita água e o solo não deve secar. Quando a camada superior do solo estiver seca, você deve regar bem as glicínias. Seu bonsai agradecerá pela pulverização diária adicional. Fertilize apenas um pouco antes da floração, a cada duas semanas durante a floração e semanalmente após a floração até o outono com fertilizante líquido para bonsai. Corte somente após a floração. Seis a oito pares de folhas crescidas são então reduzidos para dois a três pares de folhas cortadas. Como as plantas jovens ainda não desenvolveram flores, elas podem ser cortadas continuamente. Replante as plantas jovens anualmente e as glicínias mais velhas a cada quatro anos na primavera, antes que os botões cresçam. Devido ao alto consumo de água, recomenda-se um vaso relativamente alto para que o solo não seque tão rapidamente. **No inverno:** Um local protegido e fresco sem temperaturas abaixo de zero é ideal no inverno. **Quase todos os componentes das glicínias - incluindo as sementes - são considerados venenosos quando consumidos!**



## Bonsai - Wisteria

Wisteria sinensis

### Un vis înflorit rezistent / bonsai în aer liber

Wisteria chineză (W. Sinensis) crește într-un bonsai înflorit. În cele mai multe locații, strugurii săi înfloriți și în picioare apar de două ori pe an - primăvara chiar înainte de primele frunze și mai târziu din iulie până în august, cu florile desfășurate de la bază până la vârf. **Locație naturală:** Wisteria chineză își are originea în Asia de Est și acolo în special în China. Zona sa de distribuție se extinde astăzi în America de Nord și Europa. **Cultivare de succes:** Semințele pot fi cultivate oricând între ianuarie și septembrie. Pentru a crește capacitatea de germinare a semințelor, acestea trebuie mai întâi asprite cu șmirghel sau cu o pilă și apoi lăsate să se înmoaie în apă la temperatura camerei timp de 12 ore. Acoperiți vasul de cultivare cu folie alimentară, pe care ați prevăzut-o cu găuri. Acest lucru protejează pământul de uscare. Așezați vasul de cultivare într-un loc luminos și cald, cu 20-25 ° Celsius și mențineți solul de cultivare umed, dar nu umed. Primele răsaduri apar după două până la opt săptămâni. **Cea mai bună locație:** Wisteria este destul de nepretențioasă, dar preferă o locație înșorită și caldă pentru o înflorire bogată. **Îngrijire optimă:** În perioada de înflorire și în lunile de vară, wisteria are nevoie de multă apă și solul nu trebuie să se usuce. Odată ce stratul superior al solului este uscat, ar trebui să vă udați bine glicina. O pulverizare zilnică suplimentară a bonsaiului vă va mulțumi. Fertilizați doar puțin înainte de înflorire, la fiecare două săptămâni în timpul înfloririi și săptămânal după înflorire până în toamnă cu îngrășământ lichid pentru bonsai. Nu tăiați decât după înflorire. Șase până la opt perechi de frunze crescute sunt apoi tăiate înapoi la două până la trei perechi de frunze. Deoarece plantele tinere nu dezvoltă încă flori, ele pot fi tăiate continuu. Plantele tinere ar trebui transplantate anual și glicinele mai vechi la fiecare patru ani primăvara înainte ca mugurii să se umfle. Datorită consumului ridicat de apă, se recomandă un bol relativ ridicat, astfel încât solul să nu se usuce prea repede. **În iarnă:** O locație adăpostită și răcoroasă fără temperaturi de îngheț este ideală iarna. **Aproape toate componentele glicinului - inclusiv semințele - sunt considerate otrăvitoare atunci când sunt consumate!**



## Bonsai - Blåregn

Wisteria sinensis

### En härdig blommande dröm / utomhusbonsai

Den kinesiska blåregn (W. Sinensis) växer till en blommande bonsai. På de flesta platser uppträder de tätblommande, hängande druvorna två gånger om året - på våren redan innan de första löven och senare igen från juli till augusti, med blommorna som viks ut från basen till spetsen. **Naturligt läge:** Den kinesiska blåregn har sitt ursprung i Östasien och där särskilt i Kina. Dess distributionsområde sträcker sig idag till Nordamerika och Europa. **Framgångsrik odling:** Frön kan odlas när som helst mellan januari och september. För att öka fröns gröningskapacitet bör de först grovas med sandpapper eller en fil och sedan får blötläggas i vatten vid rumstemperatur i 12 timmar. Täck odlingskärlet med plastfolie, som du har försett med hål. Detta skyddar jorden från att torka ut. Placera odlingskärlet på en lätt och varm plats med 20 till 25 ° Celsius och håll odlingsjorden fuktig men inte våt. De första plantorna dyker upp efter två till åtta veckor. **Den bästa platsen:** Blåregn är ganska krävande men föredrar en solig och varm plats för rik blomning. **Optimal vård:** Under blomningsperioden och under sommarmånaderna behöver blåregn mycket vatten och jorden bör inte torka ut. När det översta jordskiktet är torrt bör du vattna blåregn ordentligt. Ytterligare daglig sprayning av din bonsai kommer att tacka dig. Gödsla bara lite före blomningen, varannan vecka under blomningen och varje vecka efter blomningen fram till hösten med flytande bonsai-gödselmedel. Skär endast efter blomningen. Sex till åtta odlade bladpar skärs sedan tillbaka till två till tre bladpar. Eftersom unga växter ännu inte utvecklar blommor kan de klippas kontinuerligt. Unga växter bör transplanteras årligen och äldre blåregn vart fjärde år på våren innan knopparna sväller. På grund av den höga vattenförbrukningen rekommenderas en relativt hög skål så att jorden inte torkar ut för snabbt. **På vintern:** En skyddad och sval plats utan frysnings temperaturer är perfekt på vintern. **Nästan alla komponenter i blåregn - inklusive frön - anses vara giftiga när de ätas!**



## Wisteria

Wisteria sinensis

### Odolný kvitnící sen / vonkajší bonsaj

Čínský Vistéria (W. Sinensis) rastie do kvitnúceho bonsaja. Na väčšine lokalít sa jej husto kvitnúce, ovisnuté strapce objavujú dvakrát do roka - na jar ešte pred prvými listami a neskôr opäť v júli až auguste, pričom kvety sa rozvinú od základne až po vrchol. **Prirodzená poloha:** Vistéria čínska má svoj pôvod vo východnej Ázii a tam najmä v Číne. Dnes však jeho rozsah siaha aj do Severnej Ameriky a Európy. **Úspešná kultivácia:** Semená možno pestovať kedykoľvek od januára do septembra. Aby sa zvýšila klíčivosť semien, mali by sa najskôr zdrsníť brúsny papierom alebo pilníkom a potom nechať 12 hodín napučať vo vode pri izbovej teplote. Kultivačnú nádobu prikryte potravinovou fóliou, ktorú opatríte otvormi. To chráni pôdu pred vysychaním. Črepník umiestnite na svetlé a teplé miesto s teplotou 20 až 25 °C a udržiajte pôdu v črepníku vlhkú, ale nie mokrú. Prvé sadenice sa objavia po dvoch až ôsmich týždňoch. **Najlepšie umiestnenie:** Vistéria je pomerne nenáročná, ale pre bohaté kvitnutie uprednostňuje slnečné a teplé stanovište. **Optimálna starostlivosť:** V období kvitnutia a v letných mesiacoch potrebuje vistéria dostatok vody a pôda by nemala presychať. Keď je vrchná vrstva pôdy suchá, mali by ste vistériu dôkladne zaliať. Vaš bonsaj sa vám poďakuje za dodatočné denné postrekovanie. Prihnojujte len trochu pred kvitnutím, každé dva týždne počas kvitnutia a týždenne po odkvitnutí až do jesene tekutým hnojivom na bonsaje. Režte až po odkvitnutí. Šesť až osem vyrastených párov listov sa potom zredukujú na dva až tri páry listov odrežte. Keďže mladé rastlinky ešte nekvitnú, možno ich priebežne strihať. Mladé rastliny každoročne presádzajte a staršie vistérie každé štyri roky na jar pred napučaním púčikov. Kvôli vysokej spotrebe vody sa odporúča pomerne vysoký črepník, aby pôda tak rýchlo nevysychala. **V zime:** V zime je ideálne chránené a chladné miesto bez mínusových teplôt. **Takmer všetky zložky vistérie - vrátane semien - sa pri konzumácii považujú za jedovaté!**



## Glicinija

Wisteria sinensis

### Odporne cvetoče sanje / zunanji bonsaj

Kitajci Glicinija (W. Sinensis) zraste v cvetoči bonsaj. Na večini lokacij se njeni gosti cvetoči povešeni grozdi pokažejo dvakrat letno - spomladi še pred prvimi listi in pozneje ponovno v juliju do avgusta, pri čemer se cvetovi razpirajo od dna do vrha. **Naravni habitat:** Kitajska glicinija izvira iz vzhodne Azije in tam predvsem na Kitajskem. Danes pa njegovo območje razširjenosti sega do Severne Amerike in Evrope. **Navodila za gojenje:** Semena lahko gojite kadar koli med januarjem in septembrom. Da bi povečali kalivost semen, jih najprej nahrapavimo z brusnim papirjem ali pilico in nato pustimo 12 ur nabrekni v vodi pri sobni temperaturi. Posodo z kulturo pokrijte s folijo za živila, ki jo opremite z luknjami. To ščiti tla pred izsušitvijo. Lonček s semeni postavite na svetlo in toplo mesto s temperaturo od 20 do 25 °C, zemlja v lončku pa naj bo vlažna, vendar ne mokra. Prve sadike se pojavijo po dveh do osmih tednih. **Najboljša lokacija:** Wisteria je precej nezahtevna, vendar ima raje sončno in toplo lego za bogato cvetenje. **Optimalna nega:** V času cvetenja in v poletnih mesecih glicinija potrebuje veliko vode, zemlja pa se ne sme izsušiti. Ko se zgornja plast zemlje posuši, morate glicinijo temeljito zaliti. Vaš bonsaj vam bo hvaležen za dodatno dnevno škropljenje. Pred cvetenjem le malo pognojimo, med cvetenjem vsaka dva tedna in po cvetenju tedensko do jeseni s tekočim gnojilom za bonsaj. Režemo šele po cvetenju. Šest do osem zraslih parov listov nato zmanjšamo na dva do tri pare listov porežemo nazaj. Ker mlade rastline še ne razvijejo cvetov, jih lahko režemo sproti. Mlade rastline posadite enkrat letno, starejše glicinije pa vsaka štiri leta spomladi, preden brsti nabreknejo. Zaradi velike porabe vode priporočamo relativno visok lonček, da se zemlja ne izsuši tako hitro. **V zimskem času:** Pozimi je idealna zaščitena in hladna lokacija brez temperatur pod ničlo. **Skoraj vse sestavine glicinije - vključno s semeni - se ob zaužitju štejejo za strupene!**



## Glicinia

Wisteria sinensis

### Un sueño de flores resistentes al invierno / Bonsái exterior

La glicinia crece como bonsái con floración abundante. En la mayoría de los lugares muestra su florescencia dos veces al año, en primavera, incluso antes de las hojas y luego en Julio y Agosto. La flor se desarrolla desde la base hasta la punta. **Ubicación natural:** La flor de la pluma tiene su origen en el Este de Asia y ahí sobre todo en China. Su zona de extensión incluye hoy en día América del Norte y Europa. **Cultivo exitoso:** La semilla se puede criar desde enero a septiembre. Para aumentar la germinación de las semillas debe granearlas con papel de lijar o una lima fina y dejarlas en agua a temperatura ambiente durante 12 horas. Cubra el recipiente con un film transparente y agujeréelo. Así protegerá la tierra de la desecación. Para evitar la putrefacción del sustrato retire el film cada dos o tres días durante 2 horas y cubra las semillas con sustrato. Coloque el recipiente de cultivo en un lugar luminoso y cálido con entre 20 y 25 grados y mantenga el sustrato húmedo, pero no mojado. A unas dos a ocho semanas brotan los primeros plantones. **La mejor ubicación:** El árbol de la pluma es bastante modesto, prefiere un lugar luminoso y cálido para obtener una florescencia abundante. **Cuidado óptimo:** Durante la inflorescencia y los meses de verano el árbol de la pluma necesita abundante agua y la tierra no debe desecarse. En cuanto la primera capa de la tierra se haya secado debe regar abundantemente. Su bonsái le agradecerá también si lo rocía a diario. Sumínistrelle poco de abono antes de la florescencia y durante cada dos semanas y después hasta otoño, semanalmente, concretamente fertilizante líquido especial para bonsái. Poda después de la inflorescencia. Puede podar de seis a ocho pares de hojas hasta dejar de dos o tres pares. La planta joven no tiene florescencia por lo que puede podar durante todo el año. Trasplante las plantas jóvenes cada año y más adelante cada cuatro años, en primavera, antes de que los brotes se hinchen. Su alta demanda en agua hace recomendable un macetero más grande para evitar que la tierra se seque demasiado rápido. **En el invierno:** Un lugar protegido y fresco sin temperaturas bajo cero, es lo ideal en invierno. **¡Casi todas las partes de la glicinia - también las semillas - son tóxicas para el consumo!**



## Wisteria

Wisteria sinensis

### Odolný kvetoucí sen / venkovní bonsai

Číňané Vistárie (W. Sinensis) roste do kvetoucí bonsaje. Na většině lokalit se její hustě kvetoucí, povislé hrozny objevují dvakrát ročně – na jaře ještě před prvními listy a později znovu v červenci až srpnu, kdy se květy rozvinou od báze k vrcholu. **Přírozená poloha:** Vistárie čínská má svůj původ ve východní Asii a tam především v Číně. Dnes však jeho rozsah sahá i do Severní Ameriky a Evropy. **Úspěšné pěstování:** Semena lze pěstovat kdykoli mezi lednem a zářím. Aby se zvýšila klíčivost semen, měla by se nejprve zdrsnit brusným papírem nebo pilníkem a poté nechat 12 hodin nabobtnat ve vodě při pokojové teplotě. Kultivační nádobu zakryjte potravinářskou fólií, kterou opatříte otvory. To chrání půdu před vysycháním. Umístěte květináč na světlé a teplé místo s teplotou 20 až 25 °C a udržte půdu v květináči vlhkou, ale ne mokrou. První sazenice se objevují po dvou až osmi týdnech. **Nejlepší umístění:** Vistárie je vcelku nenáročná, ale pro bohaté kvetení preferuje slunné a teplé stanoviště. **Optimální péče:** V období květu a v letních měsících potřebuje vistárie dostatek vody a půda by neměla vysychat. Jakmile je horní vrstva půdy suchá, měli byste vistárii důkladně zalévat. Vaše bonsai vám poděkují za další každodenní postřik. Hnojte jen trochu před květem, každé dva týdny během květu a týdně po odkvětu až do podzimu tekutým hnojivem na bonsaje. Řez až po odkvětu. Šest až osm vzrostlých párů listů se pak zredukuje na dva až tři páry listů sestříhají. Vzhledem k tomu, že mladé rostlinky ještě nekvětou, lze je průběžně stříhat. Přesazujte mladé rostliny každoročně a starší vistárie každé čtyři roky na jaře, než poupata nabobtnají. Kvůli velké spotřebě vody se doporučuje poměrně vysoký květináč, aby půda tak rychle nevysychala. **V zimě:** V zimě je ideální chráněná a chladná místo bez mínusových teplot. **Téměř všechny složky vistárie – včetně semen – jsou při konzumaci považovány za jedovaté!**



## Salkım

Wisteria sinensis

### Dayanıklı bir çiçekli rüya / açık hava bonsai

Çinliler Wisteria (W. Sinensis) çiçek açan bir bonsaiye dönüşür. Çoğu yerde, yoğun çiçekli, sarkık salkımlar yılda iki kez ortaya çıkar - ilkbaharda, hatta ilk yapraklardan önce ve daha sonra Temmuz'dan Ağustos'a kadar, çiçekler tabandan tepeye doğru açılır. **Doğal konum:** Çin wisteria'sının kökeni Doğu Asya'da ve orada özellikle Çin'dedir. Ancak bugün, menzili Kuzey Amerika ve Avrupa'ya kadar uzanıyor. **Başarılı yetiştirme:** Tohumlar Ocak ve Eylül ayları arasında herhangi bir zamanda yetiştirilebilir. Tohumların çimlenme kapasitesini artırmak için önce zımpara veya törpü ile pürüzlendirilmeli ve ardından oda sıcaklığındaki suda 12 saat şişmeye bırakılmalıdır. Kültür kabının üzerini delikler açtığınız streç film ile kapatın. Bu, toprağın kurumasını önler. Tohum sakısını 20 ila 25°C sıcaklıkta hafif ve sıcak bir yere koyun ve saksı toprağını nemli tutun ama ıslak değil. İlk fideler iki ila sekiz hafta sonra ortaya çıkar. **En iyi konum:** Wisteria oldukça iddiasızdır, ancak zengin bir çiçeklenme için güneşli ve sıcak bir yeri tercih eder. **Optimum bakım:** Çiçeklenme döneminde ve yaz aylarında salkım bol suya ihtiyaç duyar ve toprak kurumamalıdır. Toprağın üst tabakası kuruduktan sonra, wisteria'nızı iyice sulamalısınız. Bonsai'niz ek günlük ilaçlama için size teşekkür edecek. Çiçeklenmeden önce biraz, çiçeklenme sırasında iki haftada bir ve çiçek açtıktan sonra sonbahara kadar haftalık olarak sıvı bonsai gübresi ile gübreleyin. Sadece çiçek açtıktan sonra kesin. Altı ila sekiz büyümüş yaprak çifti daha sonra iki ila üçe düşürülür. Yaprak çiftleri geri kesilir. Genç bitkiler henüz çiçek geliştirmedikleri için sürekli olarak kesilebilirler. Genç bitkileri her yıl ve daha yaşlı wisteria'yi ilkbaharda tomurcuklar şişmeden önce her dört yılda bir yeniden dakin. Yüksek su tüketimi nedeniyle, toprağın bu kadar çabuk kurumaması için nispeten yüksek bir saksı önerilir. **Kışın:** Sifirin altındaki sıcaklıkların olmadığı korunaklı ve serin bir yer kışın idealdir. **Wisteria'nın neredeyse tüm bileşenleri - tohumlar dahil - tüketildiğinde zehirli kabul edilir!**



## Wisteria

Wisteria sinensis

### Tartós virágzó álom / kültéri bonsai

A kínaiak Wisteria (W. Sinensis) virágzó bonsaivá nő. A legtöbb helyen sűrűn virágzó, lelogó fürtjei évente kétszer jelennek meg - tavasszal még az első levelek megjelenése előtt, majd később július-augusztusban, a virágok tövétől a tetejéig bontakoznak ki. **Természetes elhelyezkedés:** A kínai wisteria Kelet-Ázsiából, és ott különösen Kínából származik. Mára azonban elterjedési területre Észak-Amerikára és Európára is kiterjed. **Sikeres termesztés:** A magvakat január és szeptember között bármikor termesztethetjük. A magvak csírázókéességének növelése érdekében először csiszolópapírral vagy reszelővel érdesíteni kell, majd 12 órán át szobahőmérsékleten vízben megduzzadni. Fedje le a tenyészedényt ragasztófóliával, amelyet lyukakkal lát el. Ez megvédi a talajt a kiszáradástól. Helyezze a magcserepet világos és meleg helyre, ahol a hőmérséklet 20-25°C, és a virágföldet tartsa nedvesen, de ne nedvesen. Az első palánták két-nyolc hét után jelennek meg. **A legjobb hely:** A Wisteria meglehetősen igénytelen, de a napos és meleg helyet kedveli a gazdag virágzás érdekében. **Optimális gondozás:** A virágzási időszakban és a nyári hónapokban a wisteria sok vizet igényel, és a talajnak nem szabad kiszáradnia. Miután a talaj felső rétege megszáradt, alaposan meg kell öntözni a wisteria-t. Bonsaija hálás lesz a további napi permetezésért. Virágzás előtt csak keveset, virágzáskor kéthetente, virágzás után öszig hetente trágyázzunk folyékony bonsai műtrágyával. **Télen:** Télen ideális a védett és hűvös hely, mínusz mínusz nélkül.

: : : : :



## フジ

Wisteria sinensis

耐寒性を備えた花の海/屋外盆栽

フジは盆栽に適しており沢山の花を咲かせます。ほとんどの場所で細長く成長し花房を年に2回つけます - 最初は葉の出る前の春、そして2度目は7月と8月の間 - 花は根元から上に向かって付いていきます。

**自然な場所:** 原産は東アジア、特に中国に由来します。現在では北アメリカやヨーロッパでも見られます。

### 栽培成功:

種子繁殖は1月~9月の間に可能です。発芽率を高める方法として、柔らかめのサンドペーパーなどで種の表面を粗面化し、温水に12時間浸します。湿った栽培用土に種を軽く押し込み、乾燥を防ぐためサランラップなどの透明フィルムで鉢をカバーします。透明フィルムには空気穴をいくつかあけ、2~3日に1回は約2時間、完全にフィルムを鉢から外します。そうすることで、カビの発生を防ぎます。20°C~25°Cの明るく暖かい場所に置き、用土は湿った状態に保ちます。約2~8週間後に発芽します。

**最高のロケーション:** 多くの条件はありませんが、豊かな花のため日当たりの良い暖かい場所を好みます。

### 最適なケア:

開花期と夏期には、豊富な水を必要とするので土壌が乾燥しないように注意してください。常に土壌の表面が乾いてから、次の水を与えるようにしてください。1日に1回水をスプレーすることをお勧めします。開花までは控えめに、開花期は2週間ごとにそして開花後は秋まで毎週盆栽用の液体肥料を与えてください。

開花後6組~8組の葉を2組~3組残して剪定するのが最善です。まだ花をつけない若い木は年間を通して剪定ができます。若い木は毎年、成熟した木は4年ごとに植え替えが必要です。春に芽が膨らみ始める前が植え替えに最適な時期です。たっぷりの水が必要です; 深さのある鉢を使用することで土壌の乾燥が緩やかになります。

**冬に:** 冬の間は霜の降りない涼しく保護された場所で保管するのが理想的です。

**注意:** フジは種を含めほとんどの部分が有毒です - 摂取した場合!

SKU: 14360 / Blauregen