



Dawkowanie Deltam:

→ Ziemniak:

✗ larwy stonki ziemniaczanej

Maksymalna dawka dla jednorazowego zastosowania: **5 ml/100 m²**

Zalecana dawka dla jednorazowego zastosowania: **4-5 ml/100 m²**

Wyższą z zalecanych dawek stosować do zwalczania chrząszczy oraz w przypadku bujnej naci ziemniaczanej.

Termin stosowania: opryskiwać po wystąpieniu szkodnika

Maksymalna liczba zabiegów w sezonie wegetacyjnym: 1

Zalecana ilość wody: 1,5-4 l/100 m²

→ Jabłoń:

✗ kwieciek jabłkowiec

Maksymalna/zalecana dawka dla jednorazowego zastosowania: **7,5 ml/100 m²**

Termin stosowania: opryskiwać tuż przed pękaniem lub w czasie pękania pąków kwiatowych jabłoni. Zabieg wykonywać w dni słoneczne przy temperaturze co najmniej 12°C.

Maksymalna liczba zabiegów w sezonie wegetacyjnym: 2

Odstęp pomiędzy zabiegami: co najmniej 14 dni

Zalecana ilość wody: 7 l/100 m²

→ Truskawka:

✗ kwieciek malinowiec

Maksymalna dawka dla jednorazowego zastosowania: **8 ml/100 m²**

Zalecana dawka dla jednorazowego zastosowania: **6-8 ml/100 m²**

Termin stosowania: opryskiwać bezpośrednio po zaobserwowaniu szkodnika

Maksymalna liczba zabiegów w sezonie wegetacyjnym: 2

Odstęp pomiędzy zabiegami: co najmniej 14 dni

Zalecana ilość wody: 7 l/100 m²

➡ **Kapusta głowiasta biała:**

✗ bielinek kapustnik, bielinek rzepnik

Maksymalna dawka dla jednorazowego zastosowania: **5 ml/100 m²**

Zalecana dawka dla jednorazowego zastosowania: **4-5 ml/100 m²**

Termin stosowania: opryskiwać bezpośrednio po zaobserwowaniu gąsienic motyli

Maksymalna liczba zabiegów w sezonie wegetacyjnym: 2

Odstęp pomiędzy zabiegami: co najmniej 14 dni

Zalecana ilość wody: 6 l/100 m²

➡ **Pomidor:**

✗ stonka ziemniaczana

Maksymalna dawka dla jednorazowego zastosowania: **5 ml/100 m²**

Zalecana dawka dla jednorazowego zastosowania: **4-5 ml/100 m²**

Termin stosowania: opryskiwać bezpośrednio po zaobserwowaniu pierwszych larw stonki ziemniaczanej

Maksymalna liczba zabiegów w sezonie wegetacyjnym: 1

Zalecana ilość wody: 6 l/100 m²

➡ **Kocimiętka faassena (uprawa pod osłonami):**

✗ skoczek melisowy

Maksymalne/zalecane stężenie dla jednorazowego zastosowania: **0,075% (7,5 ml środka/10 l wody)**

Termin stosowania: opryskiwać po wystąpieniu szkodnika

Maksymalna liczba zabiegów w sezonie wegetacyjnym: 2

Odstęp pomiędzy zabiegami: co najmniej 14 dni

Zalecana ilość cieczy użytkowej: 7 l/100 m²

➔ **Aster chiński (uprawa w gruncie):**

✗ porazik kocankowy

Maksymalne/zalecane stężenie dla jednorazowego zastosowania: **0,075% (7,5 ml środka/10 l wody)**

Termin stosowania: opryskiwać po wystąpieniu szkodnika

Maksymalna liczba zabiegów w sezonie wegetacyjnym: 2

Odstęp pomiędzy zabiegami: co najmniej 14 dni

Zalecana ilość cieczy użytkowej: 10 l/100 m²

➔ **Róża (uprawa w gruncie):**

✗ mszyce, skoczek różany

Maksymalne/zalecane stężenie dla jednorazowego zastosowania: **0,075% (7,5 ml środka/10 l wody)**

Termin stosowania: opryskiwać po wystąpieniu szkodnika

Maksymalna liczba zabiegów w sezonie wegetacyjnym: 2

Odstęp pomiędzy zabiegami: co najmniej 14 dni

Zalecana ilość cieczy użytkowej: 7 l/100 m²